3亿6700万年前—
泥盆纪后期

6億年の博物旅

首次的卷首彩页！
泥盆纪垂钓进行时!?

みなぱか　翻译：院长
监修：泉 賢太郎　校嵌：千叶和菜子



说起来伊野知呢？

伊野知现在正准备抓个大家伙在和它斡旋哦～




哦 在搞呢
在搞呢

能钓到大鱼
就好了呢
ス
ラ





哦

上钩啦！

快给我上来吧!?

话说这什么啊
好重!!

虽说感觉
也不像挂底了……

！

果然是钓到
什么东西了！

…欸
欸!?

不好意思明莉
来搭把手！

伊野知！

这什么啊
这也太重了

这是挂在
什么东西上面了吗!?

骗人的吧!?

鱼竿
断了!!
抱歉来晚了
没事吧!?

不好意思
杆子
帮我拿一下!!

伊野知

你这是要干什么!?

直接抓着鱼线来钓！

绝对要把它钓上来！

ギュッ

能行……！

——!!

鱼石螈!?

哈哈…没想到能钓上来个这么大的

半奈小心点

据说它的力气相当大…

应该
没问题吧

你们两个
都从来不会
感到害怕的吗
!?
啊哈哈
它在陆地上的
行动十分缓慢
没事的哦


怎么办
伊野知
要吃了它吗？

不 吃了它
实在是有点…
从体型上来说
咱们三个也吃不完


…拍个照片
就把它放生吧
好的来啦

啊哈哈

还真是个出乎意料的大家伙呢～

这巨大的下颚～

欸？

为什么这孩子指头这么多？

畸形吗？

ずしゃ

啊——那个啊

据说是未进化完全的鳍的残留呢

不是畸形哦

也就是说
这是残留下来的
原始的特征？

嗯 差不多
就是那样
欸—


感觉有些
浪漫呢
是吗？

嗯

因为它
就是从此开始
登上陆地

和我们人类也
开始产生联系

哈啊～

ぱちぱち

好暖和～

结果自那条之后
大小合适的共有5条

多亏了二位
有口福了呢

话是这么说
半奈不也
钓上来了嘛

…只钓上了一条
很小的就是了嘛

嗐嗐

好啦

做好了哦

ほわ

ぁ。。。

泥盆纪鱼类的大什锦！

哇——是沟鳞鱼～!!

但这只不过是用酱油和味淋煮过罢了

料理过后看起来挺不错的

！

好柔软啊

这个也是
虽然小刺很多
但味道很不错哦～

ぱくり。

采集之后的
晚饭…

真是
沁人心脾…

那么来尝尝
作为主菜的小沟鳞…

！

欸、哇
好吃!!
ほわわわ


虽然是白肉
但脂肪非常
饱满
じゅわっ
好鲜美
感觉真的好幸福~
如果是
这样的兼职的话
无论什么时候
都很想来呢

啊哈哈
世上哪有那么多
那么好的事啊
确实呢~

饱餐一顿呢～

真美味啊

话说

下次咱们去钓邓氏鱼吧！

啊啊 幼鱼的话 好像可以在 河口钓到哦

真的吗!?

去白垩纪 钓莫森氏鱼 也不错呢

わっ

那么我就去
和剑射鱼一起
在海里游泳…如何？

欸——半奈
绝对会害怕的吧

果然谈到那个时代
就要说到地球史上最大的鱼
利兹鱼吧

确实

噗

不不
明摆着
全都不行嘛

啊哈哈哈

而且我啊

哪怕是一点一滴地也好
很想要记录
各式各样的物种啊

ニュポ…

Stammbaum des Menschen.
Menschen
Gorilla
Orang
Schimpanse
Gibbon
Anthropoiden
Affen
Huftthiere
Faulthiere
Walfische
Knochenfische (Teleostei)
Schmelzfische (Ganoides)
Petromyzon
Myxine
Wirbelthiere (Vertebrata)
Wirbellose Darmthiere (Metazoa vertebrata)
Wirbellose Darmthiere (Protozoa)
Infusionsthiere (Infusoria)
钓到鱼石螈的时候啊
明莉不是说它从此开始和人类产生联系了嘛
但是真正的进化要更加的混乱呢

未数支配的
正数淫在客一
无数角淫
明代的
思考中！沉沉的沒
錢的無奈無力感
36

我知道

这只是浪漫的发想哦

实际上因为工作量过于庞大需要数代人的努力呢





不过
不觉得有些兴奋吗？

我们把最初的一步
镌刻进历史里了

感觉和我们
所知道的星座
不太一样呢

毕竟是将近
4亿年前呢

星星也是会变的哦

果然
没有什么头绪呢

说起来
有个类似于UMA的话题

听说有人发现了
比现在还要早大约
2000万年的时候
踏上陆地的生物的足迹

而且步幅
有26cm！

26cm

好大！
真浪漫啊

实际上那件事
还有后续呢

欸
好在意～

那就说来话长了哦
那是——

パチッ

つづく

次号7月号は
5月23日発売!!

在很长一段时间里，君临海洋生态系统顶点的都是诸如节肢动物和头足纲之类的无脊椎动物。但是进入泥盆纪之后，鱼类的多样性急剧扩大，一部分的鱼类登临了海洋生态系统的顶点。

加之泥盆纪是6大鱼类全部出现的时代，由此，它被部分研究者称为鱼类的时代。顺带一提，鱼类的6大类分别是圆口纲、盾皮鱼纲、棘鱼纲、软骨鱼纲、辐鳍鱼纲、肉鳍鱼纲，而其中的盾皮鱼和棘鱼纲如今已经灭绝。盾皮鱼纲是尤其能够代表泥盆纪的一种鱼类，在今天的我们看来它的姿态十分奇特。

不仅如此，泥盆纪也存在森林的形成初期以及昆虫的出现等等的现象，是一个十分多彩的时代。



盾皮类
沟鳞鱼
Bothriolepis canadensis
生存年代：泥盆纪后期
推测全长：40cm

盾皮类
邓氏鱼
Dunkleosteus terrelli
生存年代：泥盆纪后期
推测全长：4~6m

泥盆纪鱼类的多样化与更加适应陆地生活的物种的出现有关。棘被螈和鱼石螈之类的名字，各位或许都曾有所耳闻。

那么，在此容我向大家介绍一则趣事。2010年，在波兰东南部约3亿9500万年前(泥盆纪中期)的地层中，人们发现了许多足迹化石。这是比棘被螈和鱼石螈所生存的年代还要古早的时代。而且，此足迹化石中混杂着不拖行身体的生物痕迹，被认为是比鱼石螈等生物更加适应陆地生活的生物。但是，人们只发现了这足迹的化石，并未发现其他任何线索。

虽然有关古生物的发展，越来越多的谜团正被一一解开，但仍有许多的谜题被神秘的面纱所包裹着。



提塔利克鱼属
Tiktaalik
生存年代:泥盆纪后期
推测全长:2.7m
被称为鱼类与四足动物间缺失的一环的四足形类。



棘被螈属
Acanthostega
生存年代:泥盆纪后期
推测全长:60cm
曾经被分类为两栖动物，而如今则被认为是在两栖动物之前便分化开来的另一个物种。

鱼石螈

鱼石螈属(学名:Ichthyostega)是一支生活在泥盆纪晚期的坚头类四足动物,为化石纪录最早的四足动物类群之一。拥有肺和四肢,帮助它们在沼泽的浅水中游动。尽管鱼石螈因有四肢和足趾而常被称作"四足动物",但它们比真正的四足动物冠群(即四足总纲)更为原始,更准确地称法为"坚头类四足动物"或"干—四足动物"(表示为四足动物干群成员)。同样的,尽管它们无疑具备两栖动物的部分构造和习性,但在狭义上并不被认为是真正的两栖动物,因为第一支现代两栖动物(滑体亚纲)出现在三叠纪。直到20世纪末,其他早期坚头类化石以及与鱼石螈密切相关的鱼类化石被发现后,才确定鱼石螈为鱼类和四足动物之间的过渡类群,并结合了二者的特征。



2012年的研究表明,鱼石螈有着不寻常的解剖结构,生理功能更近似海豹一类的鳍脚动物,而非过去假设的蝾螈。

邓氏鱼

邓氏鱼(学名:Dunkleosteus),又称胴壳鱼、恐鱼,是一种晚泥盆纪(距今约3.82亿至3.59亿年前)的盾皮鱼,其中最大种类D. terrelli体长可达8.79米(28.8英尺)重量则可达4吨,被视为当时最大的海洋掠食者,是已知体型最大的盾皮鱼,主食有硬壳保护的鱼类及无脊椎动物。邓氏鱼的存在比陆上第一只恐龙的诞生还要早1.35亿年,其化石被广泛发现于波兰、比利时、摩洛哥以及北美洲等。



白垩纪

白垩纪(英语:Cretaceous;符号记为K,是德文"白垩纪"Kreidezeit""的缩写)是地质年代中生代的最后一个纪,时长将近8000万年,是显生宙的最长一个阶段。白垩纪因欧洲西部该年代的地层主要为白垩沉积而得名。白垩纪位于侏罗纪和古近纪之间,约1亿4550万年(误差值为400万年)前至6550万年前(误差值为30万年),发生在白垩纪末的灭绝事件,是中生代与新生代的分界。

陆地上,白垩纪和侏罗纪中晚期一样,恐龙总目占据了陆地所有阶层的生态位,白垩纪晚期恐龙物种数量达到巅峰。另外,属于恐龙总目的鸟类的平行演化开始于白垩纪早期。即使在计算白垩纪时期恐龙物种总量时将鸟类剥离出该总量的计算范畴,非属鸟类的恐龙的物种数量依旧可达有史以来的巅峰。与此同时,白垩纪时期淡水中生活的恐鳄、帝鳄等真鳄类,在洞穴、树冠层、平原和雨林中生活的哺乳动物、蜥蜴和蛙类,也呈现出侏罗纪时期所没有的爆发式增长。虽然恐龙依然是陆地的绝对优势物种,但是中下层生态位则挤进了更多的小型掠食者,这些小型掠食者中的很大一部分都成功存活到了现代。



海洋里,侏罗纪海中的顶级掠食者鱼龙超目和上龙亚目在白垩纪中前期壮大,在后期迅速凋零至灭绝。与之相对应的是,和上龙亚目同宗、和鱼龙超目同时期出现的蛇颈龙亚目在整个白垩纪继续繁盛。白垩纪末期,鳞龙超目中的沧龙超科在短时间内崛起成为新一代海中王者,甚至在很多淡水流域挤压鳄鱼的生态位。头足纲中的菊石亚纲则继续大型化、厚重化,数量持续增多,形状也变得千奇百怪,鱿鱼、章鱼等现今也能看到的新头足类开始数量上升。辐鳍鱼中以剑射鱼为代表的乞丐鱼目迅速成长为海洋中的顶级掠食者,是它们在地球历史上少有的突破。软骨鱼中以白垩尖吻鲨等鼠鲨目在白垩纪中晚期成功重归海洋的顶级生态位。鸟类中的黄昏鸟和鱼鸟所属的扇尾亚纲也在海洋中有一席之地。以现代海洋的标准来看,白垩纪的海洋环境异常凶险,在每个海洋物种类群里面几乎都有大型掠食者出现瓜分海洋资源,因此又被古生物爱好者戏称为"地狱水族馆"。

天空中,翼龙目保持着天空顶级掠食者的地位,并且体型增大,不过种类数量却缓慢减少,树栖生态位、低空生态位逐渐被鸟类中的反鸟亚纲霸占。

莫森氏鱼

莫森氏鱼属(学名:Mawsonia)为史前时代腔棘鱼中已灭绝的一个属,为目前已知体型最大的腔棘鱼,体长可达5.3米(17.4英尺)。它们生存于侏罗纪晚期至白垩纪中期(提通期至森诺曼期,约1.52亿年至9,600万年前)的南美洲、北美洲东部及非洲的淡水与半咸水水域中。本属是由英国古生物学家亚瑟·史密斯·伍德沃德于1907年进行发表与命名。



剑射鱼

剑射鱼属(属名:Xiphactinus)是一类大型的掠食性辐鳍鱼,栖息在上白垩纪的西部内陆海道。它们就像一条巨大及有獠牙的大海鲢。由爱德华·德林克·科普所描述的Portheus molossus是剑射鱼的异名。在美国肯萨斯州、阿拉巴马州及乔治亚州、欧洲及澳洲都有发现剑射鱼的化石遗骸。

剑射鱼是掠食性鱼类,在其胃部最少发现了12种猎物。乔治·史登柏格(George F. Sternberg)就曾发现了一个长达4米的剑射鱼标本,而在其胃内就仍保有一条长1.8米的鳃腺鱼。那条剑射鱼似乎是在吞下猎物后不久死亡,可能是猎物挣扎时破坏了其器官所致。剑射鱼是大型沧龙类(如霍夫曼沧龙、海王龙及倾齿龙)和白垩纪鲨鱼(如白垩刺甲鲨及角鳞鲨属)的食物。在一条白垩刺甲鲨的体内就发现了剑射鱼的遗骸。对于剑射鱼的幼生阶段现时未有资料。最细小的剑射鱼化石包括了一颗牙齿及下颌,个体估计长30厘米。



利兹鱼/困惑利兹鱼

困惑利兹鱼(学名:Leedsichthys problematicus)是利兹鱼属(学名:Leedsichthys),又称利兹鲲属,的唯一物种及模式种;而这个属是一种已经灭绝的巨大中生代辐鳍鱼厚茎鱼目的成员,生活在1亿6500万至1亿5200万年前的侏罗纪中晚期的海洋,直到白垩纪结束。它们代表了真骨类的一个早期分支。

本物种首个被发现的遗骸在19世纪时被认出,被认为是有史以来最巨大的硬骨鱼类。在现存鱼类中与利兹鱼最接近的是弓鳍鱼,虽然这两种鱼类之间的关系仍然距离很远。利兹鱼的名称意为"利兹的鱼",因化石收集家Alfred Nicholson Leeds于1889年在英格兰彼得伯勒发现它的化石而得名。利兹鱼的化石可以在英格兰的卡洛夫阶、德国及法国北部、智利的牛津阶及法国的启莫里阶等地发现。1999年,在智利的一次发现,学者一度以为发现了本属的第二个物种,被曾将之命名为Leedsichthys notocetes,但事后发现这个"新物种"的遗骸无法与原有的遗骸分辨,所以认为这次发现的其实亦是原来的物种。

本属物种的化石非常难以辨认及描述,因为它们的化石非常破碎:其遗骸中有不少部分由软骨组成,而这些软骨均无法成为化石;而亦有多次这些碎片被错误辨认为剑龙亚目的恐龙遗骸。因此,利兹在发现它的化石后,以problematicus作为利兹鱼的种小名。

提塔利克鱼属

提塔利克鱼属(属名:Tiktaalik,转写自伊努克提图特语)是一种已灭绝的早期鱼类,生存于泥盆纪晚期,拥有许多类似两生类的特征,一些保存良好的化石于2004年在加拿大北部的埃尔斯米尔岛被发现。它是鱼类演化成能更适应氧气含量较低的浅海的一种物种,它们后来逐渐进化成两生类。

提塔利克鱼大约生存于3亿7,500万年前,古生物学家认为它是鱼类(如生存在3亿8,000万年前的潘氏鱼)及早期四足类(例如生存于3亿6,500万年前的棘螈与鱼石螈)之间的物种。因为提塔利克鱼同时具有鱼类及两生类的特征,所以发现者尼尔·舒宾(Neil Shubin)认为它属于四足形类。



棘被螈属

棘被螈(属)(学名:Acanthostega)又名棘螈、棘鱼石螈,一支已灭绝的坚头类动物,约在 3.65 亿年前的晚泥盆世出现,是最早具有明显四肢的脊椎动物,也是水生肉鳍鱼类和陆生四足动物之间的过渡类群。

棘被螈的化石保存完好,最早由瑞典古生物学家古纳尔·塞韦 - 瑟德贝里和埃里克·亚尔维克在1933年发现一些头颅骨碎片,而最著名的是1987年詹妮弗·克拉克在格陵兰东部发现的标本。

棘被螈体长约 60 厘米,每只脚上有八趾,趾间有蹼,没有腕,并不适合行走陆地。棘被螈的肩膀及前肢很像鱼类的。前脚在肘位不能向前弯曲,不能形成承力的姿态,故似乎较适合在水中划动或握着水中植物。它有肺部,但肋骨太短,不能支撑胸腔离开水面。它们也有鳃,是在内侧及像鱼类般覆盖着,而不像两栖类般外露的。故此古生物学家推测棘被螈可能是生活在浅水沼泽中,而四肢演化来其他非行走的用途。詹妮弗·克拉克(Jennifer A. Clack)解释棘被螈是演化自从未离开海洋的鱼类,四足动物后来衍生了对陆地生活非常有用的特征,而非以往推测的在陆地上拖行身体再演化出四肢。在棘被螈生存的时期,落叶植物开始滋生及每年落下叶子到水中,吸引了细小的猎物到来。克拉克指在棘被螈的下颌中,小数较大的牙齿在外列,细小的牙齿则在内列;在鱼类的颌中,大量细小的牙齿在外列,两颗尖牙及一些细小的牙齿则在内列。她认为这种改变可能是因早期的四足动物从水中摄食改为在水上或陆地摄食有关。

根据棘被螈头颅骨的骨缝形态进行的研究发现,棘被螈可能是直接在或近水边咬住猎物。在与鱼类的头颅骨比较下,发现棘被螈像陆上动物般直接咬住猎物。这个研究结果显示棘被螈是适应了陆地摄食的,进一步支持了陆地摄食是由水中动物开始的假说。

棘被螈是泥盆纪晚期大量形成的物种之一。它始于纯水中的肉鳍鱼类,并由有较强呼吸能力、颈部肌肉支援头部运动及以鳍来支撑身体的物种继承。这些特征都在早期的提塔利克鱼及鱼石螈中可以见到。



和菓子

漫画屋

便利店上夜班的小·恶魔

她那伊始的安谧归宿分外美丽

精灵茲娜娜超麻烦！

开始当吸血鬼

第零场 第一镜

渴望焦糖之爱

魔女魔女S-WITCH

嘴笨食堂

水族馆不会跳舞

本组主攻萌系百合漫画
急缺新人!急招翻译!
欢迎大佬莅临指导!!!

招募群:468138159
交流群:762072988