201
welcome to
古生物研究室
Palaeontology Lab.
欢迎回来
哟
你们回来了
侏罗纪感觉怎样呀？
6億年の博物旅
みなぱか
監修：泉 賢太郎

半奈
我们回来啦

哎呀～
太棒了啊～

那个梁龙啊
真的超级庞大的～

真的是每踏一步
就咚咚的
整个大地都在震动～

真好啊
蜥脚类

我也想去
看一次啊

那半奈
下次和我们
一起穿越到
某个时代吧～

等

蹭蹭

新生的
三人小队哦

去半奈
想去的时代
不就好了吗～
欸——

但是
我感兴趣的
可是地质哦？


是吗？
不过
在古生物研里
喜欢地质的人
很少见呢


因为爱好的不同
感兴趣的方向
也会有所不同
Amblyrhynchus cristatus
Pleuroceras apinatum
确实啊
是有那种
喜欢古生物的人
因为爱好生物而加入
但是也有人因为爱好
化石和岩石加入进来呢

石头很好的~

很浪漫

你那样说的话古生物也是很浪漫啊！

不是 我并没有否定那点啊…

打开

唯 新生们都到齐了啊~

和你们三个都是初次见面对吧

我是大四的栗山
请多关照咯
初次见面
栗山学姐！
听说你们立马
就去了侏罗纪
真像小孩子呢
是的！
正好我也
刚从侏罗纪回来

然后我把这家伙给捡回来了

嘎哦哦哦

这是什么呀多么可爱的生物啊！

这不是蛙嘴龙嘛！

还挺罕见的吧

因为我看它很虚弱就带它回来了

蛙嘴龙…生活在侏罗纪后期的翼龙。
翼展50cm 体型很小但眼睛很大

而且饲养它说不定还能了解到它的一些生活习性呢

也就是说会成为研究室的宠物对吧！

已经取好名字了吗？



那个…我养的都是海胆之类的

海胆!?

养的东西真奇特啊

还是就叫「蛙嘴龙」怎么样？

欸~

名字是很重要的

不取名派

比起把玩喜欢观赏

在养的动物
球蟒
橄榄蟒
日本锦蛇

取名派

宠物是家人♪

在养的动物
0只

喜欢做鱼缸

在养的动物
紫海胆
梅花参
裂纹泽鳝…etc

为什么把我也算上…

在养的动物
猫(名字:摩卡)

不过明莉居然什么都没养令人有些意外呢

ふんすっ

哼哼





这是双冠蜥
名字是马克西米利安

这是大鳗螈
名字是蜿蜒助～

这是花罗汉鱼
名字是克雷欧！

够了
够了

中华鳖（月亮）
红腹蝾螈（炒碳）
日本草蜥（小麦）
墨西哥钝口螈（柴鱼片）
鸡尾鹦鹉（乌鱼子）
苏卡达龟（苏卡）
[illegible]色龙（糖乃香）
[illegible]冠龟（雏菊）
[illegible]（麻薯）
[illegible]蝾螈（静）
[illegible]奥大利亚
[illegible]（油橄榄）
[illegible]（丘比）
东方铃蟾（枯山水）
日本蟾蜍（泥团子）
南美角蛙（卷心菜）
虎纹钝口螈（椰子）
意大利壁蜥（芥菜）

这么多！

ドヤ

还有
好多好多的呢～

← 黄喉拟水龟（泰勒斯）

你还养着蛮多挺难养的品种呢

诶嘿嘿～我们全家人都非常喜欢生物呢～

不过还是先给这孩子取个名啦～

呃

呃——

那我们四个人同时说一个名字

然后选那当中最好的一个怎么样？

大家想好了吗？

那就准备——

贝多芬
栗子
毛球
……
欸—
这孩子看上去没有栗子的感觉吧？
不对
你那贝多芬多少有点不合适吧
而且为什么是贝多芬？
不知怎的就出现在脑海里了
这样吗……
学姐念的「毛球」…
感觉意外的还不错？
说起来
就伊野知你还什么都没说吧？
那、那个
我觉得名字随便哪个都行吧…
欸—就你不说好狡猾啊～

茄……

茄子……

……这个怎么样

为什么是「茄子」？

嗯、嗯嗯
该说是语感吗
真是的
别让我说啦

好
那就决定了
名字就叫茄子
等
为什么啊!?

你说为什么…
有点开心
因为伊野知很可爱？



强迫喂食…通过强行将食物塞入从而让动物进食

你用了什么食物试的？

人工饲料和面包虫还有蟋蟀

プイ

它看都不看一眼呢

因为是野生个体吧可能会有点敏感

……

我去老家那边拿些饲料回来

走掉了

ダッ ダッ

那孩子真有活力啊

我回来了

好快


暂时先拿了蚕
和杜比亚过来哦
欸——杜比亚好像是蟑螂来的吧～
是的
不喜欢蚕的孩子就会吃这个哦～
咦？半奈？
为什么？
？
为什么…

※译注：远古蜈蚣虫是现今蜈蚣和千足虫的远古亲属

※译注：原词为外来语写法的シルクワーム特指爬宠圈喂食的饲料，这里原文解释了该词的和名写法。


!
叮——


爆出
爆出


……
叮——

走出
走出

吃掉了♪

好可愛

然后再试试杜比亚吧！

啊也吃掉了～

今天姐姐来请客吧

哇～谢谢大家

一起去吃饭吧！

当然也有半奈学妹的份～

我都没帮上什么忙…

没事没事一起开心地喝一顿吧！

きゅいっ

对了这次的新人欢迎会就去白垩纪办吧

我知道一个好地方

哇超想去的呀！

つづく

次号4月号は2月21日発売!!

魔女魔女S-WITCH
开始当吸血鬼
吸血王
手倒立！
精灵菈娜娜起床顶！
水族馆不会跳舞
招募
翻译：急招
·日语N2或同等水平；
·有良好的汉语表达能力。
校对：
·日语N1或同等水平；
·能发现初翻错误并适当润色。
校字：急招
·有时间不拖稿；
·善于学习，有耐心修图。
图源：
·提供技术支持；
·或者可以提供失行扫图。
招募群：46813159
水群：762072988
本组主攻萌系日合漫画
欢迎大佬莅临指导!!!

海鬣蜥

学名：Amblyrhynchus cristatus，又名加拉帕戈斯海鬣蜥或钝鼻蜥，是仅出没在厄瓜多尔科隆群岛的鬣蜥科物种，独有在海中生活及觅食的能力。它们分布在群岛的所有岛屿上。它们主要栖息在岩石海边，但也会出没在沼泽及红树林。



Amblyrhynchus cristatus

幼蜥的背鳍较为淡色，一些成年标本呈灰色。它们阴沉的颜色是为吸收热能，减低消耗能量，避免进入海中容易疲惫。它们只吃海中的藻类，在取暖时会从鼻喷出多余的盐，故其头部有时会被一层盐所覆盖，看似呈白色。雄性在不同季节的颜色也有所不同。在南方岛屿正值繁殖期的雄性较为鲜艳，会呈红色及绿色；在圣克鲁斯岛的则会呈砖红色及黑色；而在费尔南迪纳岛的呈砖红色及暗绿色。

在陆地上，海鬣蜥较为笨拙，但它们在水中却很灵活，以强壮的尾巴来游泳。

学者认为陆鬣蜥及海鬣蜥是的共同祖先由南美洲来到科隆群岛后开始演化出它们。一般相信这个祖先曾栖息在已沉没的火山岛上。

另一派的学说指海鬣蜥是源自一类已灭绝的海中爬行动物。

头上有一层盐覆盖的海鬣蜥。

肋菊石：

学名：Pleuroceras spinatum.（此处估计是作者误打单词），一种是一目已灭绝的头足类，有一个特别漂亮的肋壳，外面有锯齿龙骨。它的意思是“带肋的角”，它们是快速移动的食肉动物，生活在现在的英国、阿尔及利亚、奥地利、法国、德国、西班牙和加拿大的海洋水域中。不同种类的贝壳直径可达 140 毫米.




Pleuroceras spinatum

蛙嘴龙

又译无颚龙、蛙嘴翼龙或无尾颌翼龙，是种小型翼龙类，属于喙嘴翼龙亚目蛙嘴龙科，生存于侏罗纪晚期的欧洲，接近 1 亿 5080 万年前到 1 亿 4850 万年前。蛙嘴龙的双翼长，是种行动迅速的飞行动物，可用迅速飞行突袭捕捉猎物，类似现代夜鹰科。蛙嘴龙的双翼较短，加上其尾巴短，蛙嘴龙其实是飞行速度缓慢的动物。蛙嘴龙的眼睛大，适合测量与猎物之间的距离，加上其翼部关节有高度灵活性，推测蛙嘴龙是慢速捕捉猎物的飞行动物。

蛙嘴龙的复原图，正在猎食脉翅目的丽蛉

球蟒

球蟒是有鳞目蚺科蟒蛇属爬行动物，又称国王蟒、皇蟒。一般成体长度 100 厘米，最长可达 250 厘米。躯体较粗大，颈部较细，显得颈部较突兀。底色淡褐色，具有不规则暗褐色斑纹，尾部呈直条花纹；头部暗褐色，眼部上方有明显的直条纹。因受惊吓后常以头部为中心盘成圆球状而得名。大多数寿命为 20-40 岁。球蟒分布在中非和西非的雨林中。栖息于草地、热带草原及疏林地带，喜欢躲在其他动物所挖掘的洞穴里。不喜欢强烈的光线，经常在黎明和黄昏的时候活动、觅食。以小型哺乳动物为食，幼蛇则会捕鸟类。球蟒是非洲蟒类中最小的种类。目前，数量正在逐年递减，已处于濒临灭绝的状态。是国家二级保护动物。

橄榄蟒

蟒亚科岩蟒属的一种，是澳大利亚第二大蛇类，仅次于紫晶蟒。虽无毒，但有锋利的牙齿且咬力大。是一种非常温顺的适合家庭饲养的蟒蛇，但是幼年确是非常的易怒，（这一点和澳洲另一种美丽的蟒蛇沃玛蟒很相似）橄榄蟒通常 2 年就可以长到 2～3 米，生长速度不是很慢。背部呈橄榄色微黄，这一点与棕伊澳蛇很像；无论幼年或者成年身体均无纹路，腹部嘴唇为白色或奶白色；高中间背部鳞片数 61~72，使皮肤看起来比其他蟒蛇更光滑，腹面鳞片的数量是 355~377。最大体长可达 4 米。

日本锦蛇

学名：Elaphe climacophora，亦称日本鼠蛇，是蛇亚目游蛇科锦蛇属下的一种无毒蛇类，主要分布于日本，是当地的特有种，在日本被称为“青大将”、“黄颔蛇”。

日本锦蛇身长约有 100 至 200 公分，雌蛇体格一般较雄蛇为大，躯体横切直径约为 5 公分。日本锦蛇是体型最大的日本蛇类之一，但如果包括日本西南群岛范围的蛇类在内的话，其体型则尚次于黑眉锦蛇(Elaphe taeniura)、王锦蛇(Elaphe carinata)及日本原矛头蝮(Protobothrops flavoviridis)。

日本锦蛇身体以棕色、青色及橄榄色为主。背鳞为数约有 23 至 25 排鳞片，腹鳞则有 221 至 245 片，身体两侧的鳞片非常粗糙，有强力的抓缘力，能让日本锦蛇轻易攀上垂直的大树。

与一般锦蛇相比，日本锦蛇的头部较呈四角形，当它们感到受威胁时，会从口中释出一股臭味，以助逃逸。日本锦蛇的幼蛇阶段时，外表跟日本蝮（Gloydius blomhoffii）颇为相似，时常令人混淆。这大概是日本锦蛇的一种拟态手段，利用外表模仿日本蝮以达到威吓外敌的效果。然而毕竟有方法可以区别二者，日本锦蛇的眼睛呈圆形，而日本蝮的瞳孔则呈直线，状如猫眼。

紫海胆

学名：Anthocidaris crassispina，分布于日本南部和中国东南部沿海的一种海胆。在中国的自然分布海域主要为浙江、福建、广东等沿海。

壳形侧面观为半球形，口面观为接近于圆形的圆滑正五边形。外表呈黑紫色，大棘针形，长而粗壮，表面光滑，末端尖锐。有些个体出现两侧大棘不均等现象，一侧大棘偏长，而另一侧大棘偏短。本种外观与光棘球海胆极其相似。雌雄异体。暖水性种类，生存水温为 10～34℃，生长适宜水温 22～27℃。杂食性，但以大型藻类为主，幼海胆摄食石莼时效果较好。

梅花参

身体长可达 1 米；背面肉刺很大，每 3—11 个肉刺基部相连呈花瓣状，所以得名“梅花参”；又因为体形像凤梨，所以又称“凤梨参”；腹面平坦，管足小而密布；口稍偏于腹面，周围有 20 个触手；背面为橙黄色或橙红色，散布黄色和褐色斑点，腹面带赤色，触手黄色。自 1960 年代以来，本种由于其中上的商业价格而成为渔业的捞捕对象，在至少一半的栖息地里，其种群数量估计已经大幅减少了 80%至 90%，因而《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》自 2010 年起将其列为濒危物种。



裂纹泽鳝

又称裂纹勾吻鲟，为辐鳍鱼纲鳗鲡目鲟亚目鲟科的其中一种。分布于印度太平洋区，从查戈斯群岛至马克萨斯群岛、社会群岛，北起琉球群岛，南迄马里亚纳群岛海域，体长可达 120 厘米，为底栖性鱼类，生活潟湖及向海礁坡，属肉食性，生活习性不明。体延长而呈圆柱状，尾部侧扁。吻部尖长。前鼻管呈漏斗状，后鼻孔不为长管状。颌部尖长且呈钩状，颌齿在下颌前半部两排，上颌内侧者较为尖长，嘴闭合时颌齿依然外露。脊椎骨数 139-142。背鳍、臀鳍带有黄白边。

疣鼻栖鸭

瘤头鸭，俗称番鸭，又名疣鼻栖鸭、麝香鸭，为鸭科栖鸭属被驯化的一种家禽。番鸭体型较大，平均体重约为 4.3kg，翼展在 137~154cm 之间；其体躯前后狭小而中间大，呈橄榄状，站立时体躯与地面平行；头大，颈短，嘴的基部和眼圈周围有红色的肉瘤，头顶部有一排纵向长羽，翅膀大而有力，尾羽平伸，翼羽延伸至尾端；羽色有棕黑色、纯白、花斑、浅黄色、棕色、栗色、淡紫色和蓝色等各种。番鸭原产于以墨西哥为中心的中、南美洲地区，后来被人类驯化成为一种养殖鸭类，其野生种群分布在北美、加拿大和欧洲的部分地区；是一种适应于气候温暖多雨的亚热带地区，不太喜水且善于飞行的森林禽种。番鸭是杂食性动物，既吃植物的根、茎、叶和种子，也捕食小型陆生和水生动物。该物种是一种具有显著社会行为的群居性动物，营“一夫多妻制”。

双冠蜥

双冠蜥是海帆蜥科背鳍蜥属动物，成年后全身呈绿色，雄性的头部、背部及尾部均有明显发达的骨质棘支撑的脊突。背上及尾巴有 3 个由骨质棘支撑的脊突，只有雄性背上才长有帆状背鳍。眼睛内有亮橙色的虹膜，尾巴很长，脚趾很长。双冠蜥产地是洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马等地，一般栖息于热带雨林，树栖。双冠蜥的寿命一般是 10-12 年。双冠蜥吃昆虫、小鱼、饲料鼠等。双冠蜥性格较神经质，不适合上手把玩，以观赏为主。

大鳗螈

大鳗螈，为鳗螈科两栖动物。身体圆柱状，鲵形。大鳗螈原本用于连接腿和身体的骨盆退化了，身体细长，就像一条鲠鱼，它们体形巨大，因此得名大鳗螈的身长一般都有 60～70 厘米，有的甚至达到 100 厘米。成体终身有 2～3 对外鳃和 3 对鳃裂；有肺、毛细血管占 60%并参与呼吸。无上腭骨，腭部由角质鞘代替牙齿。眼小，没有眼皮，不能眨动。体背暗灰绿色，腹部色淡。大鳗螈前肢短小，有 4 趾，无蹼；后肢完全退化。尾巴短而末端尖细，体背暗灰绿色，腹部色淡。

大鳗螈以昆虫等为食．分布于美国东南部和墨西哥东北部，生活在水池、泥沼中，经常到水面呼吸，偶尔也到陆地活动，平时隐蔽在水生植物风信子的根部。能翻挖泥浆，使自身埋藏在泥下而度过干旱期，此间皮肤失去黏滑性。生活于水池的泥沼中。经常到水面呼吸，偶尔也到陆地活动。平时隐蔽在水生植物风信子的根部。能翻控泥浆，使自身埋藏在泥下而度过干旱期，此间皮肤失去粘滑性。以昆虫等为食。

花罗汉鱼

花罗汉鱼是著名的观赏鱼，属慈鲷科，因其色彩生动和形状独特的头而被命名。其在自然界中本不存在，是经人工反复改良而成的品种。花罗汉鱼首先在马来西亚，泰国和台湾等地被培育出来，它们现在被世界各地的鱼类爱好者所饲养。一些批评人士质疑花罗汉鱼育种计划的影响。此种鱼普遍性格凶猛。

黄喉拟水龟



黄喉拟水龟是龟鳖目龟科拟水龟属爬行动物，又名黄喉水龟、石龟、黄龟、柴棺龟、水龟、蕲龟。[12]头小光滑无鳞，顶部淡橄榄色；背甲较平扁，椭圆形棕黄色，中央具一嵴棱；腹甲黄色，每一盾片后缘有一大黑斑；眼后有两条黄色短纵纹，喉部淡黄色；四肢外侧灰色或橄榄色。黄喉拟水龟在国际上主要分布于日本、越南，在中国分布于江苏、浙江、安徽、湖北、云南、海南、台湾等地。主要栖息于丘陵及半山区的河流或池塘中，也常在灌木丛林及稻田中出现，多在傍晚和夜间活动。野外及人工饲养时均为杂食性，取食蚯蚓、昆虫、鱼、蛙、田螺及植物果实等。

黄喉拟水龟被《世界自然保护联盟红色名录》（IUCN）列为极危（CR），被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录 II，被《中国濒危动物红皮书》列为濒危（EN），在中国 2021 年农业部修订的《国家重点保护水生野生动物名录》中被列为国家 II 级保护动物。

中华鳖

学名：Pelodiscus sinensis，又名水鱼、甲鱼、团鱼、泥龟，是中华鳖属的一种软壳淡水龟，是东亚地区最常见的食用鳖，泰国、马来西亚等地皆有养殖。其种加词“sinensis”意为“中华的”。

成鳖头胸甲长度平均约 33 公分，甲壳呈橄榄褐色。全身皮肤坚韧。腹甲呈灰白色。头部可能有纹向眼后伸延。鼻孔像猪鼻，且灵活；颈部较长。四肢都有蹼并长有三爪。

少数中华鳖个体会发生突变，比正常个体多 1 枚胸椎和 1 对肋骨（即胸椎 11 枚，肋骨 9 对），称为九肋鳖。

红腹蝾螈

学名：Cynops pyrrhogaster，生长在日本本州、四国和九州的稻田、池塘和河川地区。身体具有再生能力。体长平均在 9—14 厘米（3.5—5.5 英寸），其身体上半部分呈黑色，有红色斑点，下半部分呈红色到橘色不等，有深色标记，皮下具毒腺会产生高浓度的毒素，名为河豚毒素的一种神经毒素，蝾螈属下的蝾螈如果摄取到足够的毒素将会导致医学上的重大威胁。

日本草蜥

学名：Takydromus tachydromoides，日本草蜥的背面为灰黑色至褐色，腹面则为黄白色至黄褐色。通常在身体侧面共有三道色带：一道自鼻孔正上方，经眼、耳延伸至尾巴前端的黑褐色色带，及一道由眼的下缘发出，经过耳的下方而延伸至身体后半段的黑褐色色带。在这两条色带之间，是一道黄褐色的色带。但有时这些色带只延伸到前肢附近就不再继续往后延长了。

墨西哥钝口螈

学名：Ambystoma mexicanum，英文：Axolotl，又名“美西螈”，俗称“六角恐龙”，是水栖型的两栖类，是墨西哥的特有种，因其独特的外貌及幼态延续而著名。也就是说，即使在性成熟后也不会经历适应陆地的变态，仍保持它的水栖幼体型态。墨西哥钝口螈的“不老容颜”使得它成为许多科学家研究的对象。

鸡尾鹦鹉

学名：Nymphicus hollandicus，凤头鹦鹉科鸡尾鹦鹉属的一种鸟类，也称作玄凤鹦鹉。因日本于明治后期（约 1910 年）引进，因此在台湾又名欧卡妹（“オカメインコ”的音译，日名源自此鸟脸颊橙红斑点很像阿龟面具（Okame））。它是澳大利亚特有的凤头鹦鹉，是最常见的宠物鸟。



苏卡达象龟

学名：Centrochelys sulcata，又名非洲盾臂龟、盾臂龟及苏卡塔尔陆龟，原为象龟属，之后被分入 Centrochelys 属，目前是 Centrochelys 属下的唯一现存的物种。

原产于非洲的撒哈拉沙漠、萨赫勒地区和西非的荒漠草原，主要分布在乍得、厄立特里亚、埃塞俄比亚、马里、毛里塔尼亚、尼日利亚、塞内加尔、苏丹一带。

东方铃蟾

学名：Bombina orientalis，为盘舌蟾科铃蟾属的两栖动物，俗名臭蛤蟆、红肚皮蛤蟆。其种加词“orientalis”意为“东方的”。

体型微小玲珑，体长约 4.5 厘米。背面灰棕色或绿色，具有黑色斑点和大小不等的刺疣，腹部和四肢腹面橘红色，有黑色斑点，但是体色可能同环境色泽一起加深到棕色甚至黑色。

舌呈盘状，周围与口腔粘膜相连；皮肤粗糙；趾间有蹼；雄性无声囊。

日本蟾蜍

是蟾蜍属的一种生物，原产于日本淡水水域，日本人会使用它制作蛤蟆油。

首尾长 17.5 cm（7 英寸），雌性稍大，脚趾的蹼不明显，身体呈灰褐色、黄褐色或深褐色，繁殖季节体色稍淡。



南美角蛙

学名：Ceratophrys cranwelli，又名绿角蛙、翡翠角蛙，分布南美洲阿根廷、玻利维亚、巴拉圭及巴西的大厦谷地带。幼体通常呈浅绿色，成体则大部分为褐色（也有绿色或橘色但很稀少），是此种的最大特色，全身有较大的不规则斑块，脸部也呈斑块状。

南美角蛙背侧的颜色多为深绿及棕色，而白化症个体则为橘色与黄色。这样的颜色可以在南美角蛙捕食时提供伪装。它们为潜伏型掠食者，利用有黏性的舌头将猎物拉入口中，以昆虫或其他体型相近的动物为食，甚至是其他种类的青蛙。南美角蛙在吞咽猎物时有时会因为猎物体型过大而噎死

虎纹钝口螈

学名 Ambystoma tigrinum，又名虎斑蝾螈。

虎纹钝口螈体型很大，一般长 6-8 吋。它们可以长达 14 吋，尤其是持续幼态的个体。成年的身体上有疙瘩，呈灰色、绿色或黑色。眼睛很大及有眼帘。它们的吻很短，颈厚，脚很粗壮，有很长的尾巴。它们主要吃细小的昆虫及蠕虫，也会有吃细小的青蛙及老鼠。成年虎纹钝口螈栖息在地面下 2 呎的巢穴。

它们差不多是完全陆生的，只会在繁殖时才走回水中。它们忠于自己的出生地，愿意走很远的距离回到此地。不过，它们只有 50%的机会一生中繁殖多于一次。雄螈会轻推雌螈进行交配，并会将精囊放到湖底。雌螈会捡起精囊，并会将受精卵产在植物上。

幼螈是完全水生的，有很大的外鳃及自头部延伸的尾鳍。四肢在孵化后短期内就完全发育。一些幼螈，尤其是在季节湖及北方的，会尽快变态；而其他的则会待身体成长至成年大小才会变态。有些群落不会变态，以其幼体的外观达至性成熟；这种称为幼态持续，往往是在陆地生长条件不良时才会出现。



意大利壁蜥蜴，原产于波斯尼亚和黑塞哥维那，克罗地亚，法国，意大利，塞尔维亚和黑山，斯洛文尼亚和瑞士，但也已传入西班牙，土耳其，美国和加拿大。意大利壁蜥是意大利南部最丰富的蜥蜴物种。

杜比亚蟑螂

杜比亚蟑螂是蜚镰目中体积较大的昆虫之一。成虫体长 35 — 40 毫米，黑褐色，雄性翅长于腹部末端，触角较长，前胸背板中间有较大的半圆形褐色斑纹；雌性翅退化为翅鞘，残余背部两侧，雌雄具有一定的飞行能力，攀爬运动能力极弱，完全不能攀爬光滑的垂直表面。



此外，杜比亚、蚕、面包虫、蟋蟀是爬宠的常见活体饲料。

常见饲料虫营养对照表

品种	钙磷比	水分	粗蛋白	粗脂肪	粗纤维	钙	磷
		(%)	(%)	(%)	(%)	(mg/100g)	(mg/100g)
白蚁王	1 : 3.7	65.6	23.4	7.2	1.2	2.9	700	2600
白蚁卵	1 : 9.2	77.1	15.4	3.3	1.1	2.2	273	2520
白蚁幼虫	1 : 7.2	71.6	15.7	8.4	1.1	2.2	407	2950
白蚁成虫	1 : 4.6	69.1	19	9	1.2	2.2	385	1760
白蚁蛹	1 : 6.2	62.3	22	5	1.1	6.5	372	2325
蚕	1 : 1.2	88	9	0.9	1.6	1.1	1000	1200
蚕蛹粉	1.5 : 1	61.2	17.3	9.4	3.5	3	8155	5355
豆粉	1 : 3	85	9	3	1.2	2.5	464	1394
面粉虫	1 : 8	58.5	14.1	22.2	0.6	3.4	243	1950
大麦虫	1 : 18	59.3	17.4	17.9	1.2	2.7	124	2320
黄粉虫	1 : 25	62.4	20.3	12.7	1.6	1.7	133	3345

远古蜈蚣虫

学名：Arthropleura，又称节胸蜈蚣属，是史前的倍足纲节肢动物，即现今蜈蚣及马陆的远古亲属。虽然名叫节胸蜈蚣，但是实际上比起蜈蚣与马陆的亲缘关系较近。它们生存于 3 亿 4500 万至 2 亿 9000 万年前的石炭纪维宪期至二叠纪的萨克马尔期，分布在北美洲及苏格兰。它们已知陆地上最大型的无脊椎动物



图源：千叶和菓子
翻译：御庭
校对：千叶和菓子
嵌字&尾页：鱼缸
监修：柯蓝