這風吹著真舒服～

果然比悶熱要涼快多了呢

車前的氣溫 25℃

早點開啟車燈 防止交通事故

道路狀況

這說起來可

小雞家的別墅大概在哪裡啊？

藏王連峰

熊野岳

御釜

刈田岳

藏王溫泉

坊平高原

差不多就在藏王山的半山腰來著

在坊平高原一帶哦

海拔1000米的話差不多是亞高山帶吧

藏王國定公園

藏王坊平高原

海拔1000米

在這片區域內

能看到許多來避暑的鳥兒哦

好期待～

●走咯、向著今泉家別墅！

しあわせ鳥見んぐ

Presented by

わらびもちきなこ

性自己選

不過拜某些人所賜
咱們只能明天再去觀鳥了
搖了我吧～
趣味活動可不止觀鳥這一項哪
到達目的地了哦
那個就是別墅嗎!?
!?
…？怎麼了嗎？
是有錢人家裡才會擺的裝飾…
好可愛啊～!!
太…太了吧…
別墅裡面是什麼樣的呢～
打開門
大家請進來吧
肉好了嗎？
是是是不會了吃
肉和味汁在這裡

哈哈
哈哈
哈哈

不是是夜鷹哦！

夜鷹

○白天時站在枝頭全神貫注進行著觀察
○太陽落下后、會張開自己那青蛙一般的巨大嘴巴以便捕食昆蟲

讓大家久等啦～

要來一個收尾的飯團嗎？

收尾？

飯團裡摻了羊肉沫還澆了調味汁哦

本來今天沒看成鳥兒還有點不爽呢

這下子舒服多啦

啊

這肚對胃口了吧！

然後再把飯團…

有流星！

這是夜鷹之星呢

烤一下！

暖暖～!!

漫貝漫畫

しあわせ鳥見んぐ



拷貝漫畫

咚咚咚咚咚咚咚

小翼——!!

唔唔!?

咳咳…

怎、怎麼了啊…？

我剛才在黑暗中聽到了回响一樣的聲音…

怎麼說呢…簡直就是不存在於這個世界的聲音…

…啊—那應該…

是鵺呢

鵺？

是妖怪鵺嗎？

沒錯…

有著蛇的尾巴虎的四爪

狸的身軀以及猿猴的相貌…

撫說它的鳴叫聲可是不祥之兆哦…

噫～～～!!

海貝漫畫

しあわせ鳥見んぐ

拷貝漫畫





周圍人眼中的自己、真實的自己。述說真心般的聲音，回蕩秋日夜空。

拷貝漫畫

藏王山-坊平高原、藏王温泉



先放一张谷歌地图的大致位置



坊平高原位于藏王山西边，海拔1000-1200m，景区的主要特色为四季景色各异，春天适合踏青，秋天可以赏红叶，冬天则可以欣赏雪景。



藏王温泉是热门滑雪和温泉度假区，位于山形县和宫城县交界处的山野间。

藏王温泉以富含矿物质的泉水而闻名，有助于缓解疲劳，养颜美容，也是雪季著名的滑雪胜地。据说早在公元 110 年，人们就已经发现了这里疗愈的泉水。

上图为冬季藏王温泉一带的观光指引图

贝壳

1. 成吉思汗锅

成吉思汗羊肉（日语：ジンギスカン）是一种使用羊肉和羔羊肉制作的日式烤肉料理，是北海道最具代表性的乡土料理之一，但在岩手县远野市、长野县长野市等地也很流行。
成吉思汗羊肉于二战后在日本主要的羊肉产地北海道普及。尽管此料理以成吉思汗为名，并且有“成吉思汗在远征中为麾下将士所发明的料理”的俗传，实际上与蒙古饮食并无直接关系。其起源一般认为是当时的日本陆军省参考了伪满洲（今中国东北地区）烤羊肉的食谱，后来传回日本本土。



2. 流星与《夜鹰之星》

《夜鹰之星》日本作家宫泽贤治创作的童话，约成稿于1921年9月。夜鹰虽然是美丽的蜂鸟和翠鸟的兄长，却因为容姿丑陋而被大家所嫌弃，并被老鹰逼迫不要使用带“鹰”字的名字。由于讨厌为了自我生存而剥夺许多虫子的性命，它对活着产生绝望，一边飞向太阳一边祈求太阳的收容，但太阳却说它是夜里的鸟而让它去求星星。它去拜托星星却也遭到拒绝。失去容身之处的夜鹰拼命飞向夜空。不知何时它燃烧成一缕青白，变成了“夜鹰之星”，仍在夜空中燃烧着。

拷贝漫画

3. 妖怪「鵺」

最早记录于《平家物语》当中，据描述它拥有猿猴的相貌、狸的身躯、老虎的四肢与及蛇的尾巴，没有翅膀却能飞翔。（在日本古文献中关于鵺的躯体记载并不统一，亦有指它有着虎的躯体的说法）。鵺的叫声像虎鸫（虎斑地鸫），被认为是不祥的叫声。



4. 普通夜鹰（学名：Caprimulgus indicus）

夜鹰目夜鹰科夜鹰属鸟类，普通夜鹰嘴黑色，眼深褐色，喙短小但嘴裂甚大，嘴边具须，眼睛较大，翼较尖，脚甚短小。整体体色似树皮，呈斑驳的灰褐色；上体灰褐色，具黑褐色和灰白色的虫蠹斑；头顶中央具黑色纹；喉黑色，其下具一白斑；下体浅灰褐色，具黑色横斑；翼角具白斑；尾羽具深色横斑，外侧尾羽近末端具宽阔的浅色斑，雄鸟为白色，雌鸟为皮黄色；脚黑褐色。

栖息环境：普通夜鹰主要栖息于海拔3000米以下的阔叶林和针阔叶混交林；也出现于针叶林、林缘疏林、灌丛和农田地区竹林和丛林内。

生活习性：单独或成对活动。夜行性，白天多蹲伏于林中草地上或卧伏在阴暗的树干上，故名“贴树皮”。由于体色和树干颜色很相似，很难发现。黄昏和晚上才出来活动。尤以黄昏时最为活跃，不停的在空中回旋飞行捕食。飞行快速而无声，常在鼓翼飞翔之后伴随着一阵滑翔。繁殖期间常在晚上和黄昏鸣叫不息，其声似不断快速重复的“chuck”或“tuck”。主要以天牛、岔龟子、甲虫、夜蛾、蚊、蚋等昆虫为食。

分布范围：普通夜鹰分布于印度次大陆、菲律宾、印度尼西亚及新几内亚。在中国分布于华东、华南至西南的绝大多数地区。

繁殖方式：普通夜鹰的繁殖期为5-8月。在长白山地区为6-7月。通常营巢于林中树下或灌木旁边地上。巢甚简陋，实际上没有巢，直接产卵于地面苔藓上。每窝产卵2枚；卵白色或灰白色，其上被有大小不等，形状不规则的褐色斑，尤以钝端较多。卵的形状为卵圆形，大小为27-33×20-24毫米，平均31×22毫米，重6.5克。雌雄亲鸟孵卵。孵化期16-17天。

鸡贝漫画

6.虎斑地鸫/怀氏虎鸫（学名：Zoothera aurea）

虎斑地鸫，是雀形目鸫科的中型鸟类。其成鸟自额至整个上体为鲜亮的橄榄褐色，羽片具棕白色羽干纹、金棕色次端斑和黑色边缘，在上体形成鲜明的黑色鳞状斑；翼上覆羽同背部，飞羽黑褐色；中央尾羽橄榄褐色，外侧尾羽渐为黑色，且具有白色端斑；眼大而圆，眼圈白色，头侧棕白色微具黑色端斑，耳区有一黑褐斑；下体棕白色，除颏、喉和腹中央斑纹不明显，其余下体均布有醒目的黑色鳞状纹；虹膜暗褐色，喙褐色，下喙基部肉黄色；脚肉色。栖息环境：主要栖息于阔叶林、针阔叶混交林和针叶林中，尤以溪谷、河流两岸和地势低洼的密林中较常见，春秋迁徙季节也出人于林缘疏林和农田地边以及村庄附近的树丛和灌木丛中活动和觅食。

生活习性：
食性：主要以昆虫和无脊椎动物为食，据在长白山通过成鸟胃的解剖和幼鸟扎颈取食的方法得知，所吃食物主要为鞘翅目、鳞翅目、直翅目等昆虫和昆虫幼虫（幼鸟则主要以鳞翅目幼虫和蚯蚓为食）。此外也吃少量植物果实、种子和嫩叶等植物性食物。
习性：地栖性，常单独或成对活动，多在林下灌丛中或地上觅食。性胆怯，见人即飞。多贴地面在林下飞行，有时亦飞到附近树上，起飞时常发出‘喝’的一声鸣叫，每次飞不多远即又降落在灌丛中。也能在地上迅速奔跑，多在林下地上落叶层中觅食。
叫声：轻柔而单调的哨音及短促单薄的tzeet声。指名亚种鸣声多变，为缓慢断续的chirrup…chwee…chueu…weep…chirrol…chup…
迁徙：虎斑地鸫在中国北部繁殖的种群全为夏候鸟，在中国南部繁殖的种群部分为夏候鸟，部分为留鸟。

分布范围：
世界分布：分布于西伯利亚东南部、俄罗斯远东、中国、朝鲜、日本、巴基斯坦、尼泊尔、克什米尔、锡金、不丹、孟加拉国、印度、缅甸、老挝、越南、泰国、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新几内亚和澳大利亚。
中国分布：繁殖于内蒙古东北部、黑龙江大兴安岭和小兴安岭、吉林长白山、四川北部松潘和马尔康及西部康定、贵州北部绥阳、云南和北部和西部以及广西瑶山和台湾等地。越冬于云南、贵州、湖南、浙江、福建、广东、广西、海南（海口五源河国家湿地公园）香港、台湾等地，迁徙期间经过辽宁、河北、山东、河南、陕西、甘肃、青海、四川等地。

繁殖方式：繁殖期5-8月，通常营巢于溪流两岸的混交林和阔叶林内，迁到东北繁殖地时已基本上成对。巢一般多置于距地不高的树干枝杈处，也发现一窝筑在采伐后留下的树桩上，树桩四周生长出来的幼苗成为巢的隐蔽物。巢距地高0.3厘米-3米。巢呈碗状或杯状，主要由细树枝、枯草茎、草叶、苔藓、树叶和泥土构成，其中尤以苔藓最多，巢壁糊有少许黄泥，巢内垫有松针、细草茎、细树枝和草根。巢的大小为外径16-19厘米×17-20厘米，内径11-12厘米×11-12厘米，高18-23厘米，深6-8厘米。1年繁殖1窝，每窝产卵4-5枚。卵灰绿色或淡绿色、稀疏的散布有一些褐色斑点，尤以钝端较多。卵的大小据5枚卵的测量为33-36毫米×23.5-25.0毫米，重8.5-9.5克。孵化期11-12天。雏鸟晚成性，雏鸟孵出时体重仅8克，比卵轻，体长56-58毫米，全身除枕部和眼泡后面有几撮白色绒羽外，其余全赤裸无羽。雌雄亲鸟共同育雏，留巢期12-13天。

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI

图源：抱枕
翻译：月的爆击机
校对：列于勒的牡蛎
嵌字：Yuricat

贝壳