◆單行本②卷特別好評發售中◆







咚咚聲盈耳不絕的豪宅。在雛家裡的抹茶時間！

Let's do Birdwatching

しあわせ鳥見んぐ

Presented by
わらびもちきなこ



宮内鈴（miyauchi suzu）
就讀於陸奥藝術大學油畫專攻的大二學生。與翼相遇後開始了解自己的繪畫方式，是一位個性活潑、天真無邪的少女。

可是燕子怎麼會叫成吃蟲吃土呢也太奇怪了吧？
這能聽出來？
吱啾吱啾吱啾

燕子

○從南邊國家飛來的代表夏候鳥
○叉狀的尾部與紅色的喉部為其特征







荒碎美（arato misaki）
馬鈴薯就讀於市裡的國一，所屬的大學，是一名女攝影學門拍鳥類的照片，水平比鳥還高。

小鳥巢
為了吸引更多人能夠聚集到野生鳥類的魅力而活躍中的第一名鳥類沖會主。實際上是由穿著皮衣的貓頭鷹



也可以反過來說
因為家庭興旺 所以燕子們才會築巢呢
什麼意思？


和我們之前在公園見到的鴨子很相似呢
是呢

燕子們反而喜歡在人來人往的地方築巢
就是說門庭若市人往來不絕

可是這樣的話它們在公園裡築巢也可以吧…


它們的天敵烏鴉與蛇都比較畏懼人類
這就是所謂的將計就計吧

為什麼它們會如此親近人類
恐怕只有燕子們自己才知道為什麼吧
或許對於燕子來說身邊的人們就是特殊的存在呢
這樣啊…

也就是說我在不知不覺中就成為了燕子們的保鏢嗎？
……啊、這樣說來！

…可是近來山林的數量減少

作為食物的昆蟲也減少了

沒有房檐的住宅增加了它們也找不到築巢的地方了

因此它們的數量就減少了

之前在小鳥桑視頻里看到過

放置在地板上

諸如放置一個紙箱子

安裝在墻壁上

確保周圍的地方不會被弄髒

再加上衛生面的原因

也有許多的燕子巢被搗毀…

……

如果要安裝在墻壁上的話

需要與巢保持50cm以上的距離◎

雛燕破殼后兩周左右才會離巢

這段時間內請盡量溫柔地守護著它們哩！

打掃鳥糞的確很煩人呢—

啊、那麼製作一個托糞板怎麼樣？

托糞板？

錚—錚

完成～！

對了
還有最後一道工序…
嘎吱
嘎吱

它們選擇在這裡養育自己的雛鳥
就說明它們信賴這個地方…信賴這裡的人吧？

對了、翼

老實說我真的很開心
我現在只想看到它們順利離巢的樣子
雛…

我
我打算一直觀察這些孩子們 直到它們離巢為止
誒
雛居然!?


做好啦！
落下

兩位湊近一點唄
??
咔嚓









○呷也發來了新的雛鳥情報。簡直是春天的雛鳥大遊行呢～!!

1.聞きなし

漫畫中的“鳴聲模擬”其實並不太準確，「聞きなし」本意指將鳥類或其他動物的鳴叫聲用發音相近的日語替換掉，並不局限於鳥鳴聲，但由於該詞暫無明確的中文翻譯，為便於理解故譯成“鳴聲模擬”了。

常見的鳥類「聞きなし」有：日本樹鶯「法華経」、家燕「土食って虫食って渋い」、紅角鴞「仏法僧」等。

2.「冥土（めいど）の土産」與「メイドの土産」

這裡屬於是作者每話不可不品嘗的諧音梗時間了，「冥土の土産」本意為最後的願望、最後的安慰，但這裡特意用片假名的メイド（女僕）並著重強調，只能說非常樂了。

3.日本樹鶯（學名: Horornis diphone）

為鶯科樹鶯屬的鳥類。小型鳥類，共有6個亞種。體長10–18厘米。上體概呈棕褐色，前額、頭頂特別鮮亮；腰和尾上覆羽的色澤較淺；眉紋，自嘴基沿眼上方伸至頸側，呈淡皮黃色；虹膜褐色；自眼先，穿過眼睛向後延伸至枕的貫眼紋，呈深褐色；頰及耳羽呈淡褐和黃白色相混雜；上嘴褐色，下嘴淡灰褐色；飛羽暗棕褐色，各羽外翈與背同呈棕褐色；尾羽亦暗棕褐色，但較淡。下體汙白，胸、兩脅和尾下覆羽沾皮黃色；腳灰白色。（普通亞種）

東北亞種: 上體灰褐色或草黃褐色；額頭及尾羽的褐色較明顯；兩翼褐色，羽緣草黃色。暗褐色的貫眼紋與蒼白的眉紋甚明顯。頦、喉及腹部汙白；體側及胸部沾棕黃。似蘆鶯而體型稍小，有明顯的眉紋，嘴不及蘆鶯粗壯，尾呈平尾狀。雌、雄兩性羽色相似。



臺灣亞種: 上體橄欖褐色，下體較琉球為淡，胸和兩脅均沾橄欖色；體形小，翅長64–69毫米。

琉球亞種: 上體較臺灣亞種為淡，更多灰色，下體近白；翅長70–73毫米。

庫頁島亞種: 上體較臺灣亞種更多純灰綠色，更少橄欖色。

主要生活於海拔1500米以下稀疏的闊葉林和灌叢中，尤其喜歡林緣道旁次生楊樺幼林和灌叢，也出現於地邊宅旁附近小塊叢林、灌叢和高草叢中，不進入茂密的大森林中。

常單獨或成對活動，性膽怯，善於藏匿多在灌叢或草叢下部低枝間或地面活動覓食，一般不易見到。繁殖期間喜歡站在在高的灌木和幼樹的頂枝間鳴叫，一見人則立刻降到灌叢中，並較長時間不再鳴唱，要人未離開時即使恢復鳴叫，亦多是躲藏要茂密的枝葉間，常常僅聽其聲，不見其影。

分布範圍

世界

原產地: 中國、日本、朝鮮民主主義人民共和國、韓國，菲律賓、俄羅斯聯邦（東亞區）。

引進: 美國。

中國:

黑龍江（小興安嶺）、吉林（長白山）、遼寧（丹東）、陝西（南部太白山）、甘肅（東南部、武山南部）、山西（永濟、沁水）、雲南、河北、河南（羅山）、江蘇、浙江（繁殖鳥、夏候鳥），遷徙或越冬於山東（青島）、福建（福州、廈門）、四川（東北部及中部）、貴州（羅甸）、湖北、湖南（醴陵）、廣東、海南東南部及香港和臺灣。

4.冕柳鶯（學名: Phylloscopus coronatus）

體長11-12厘米，體重6-11克，是中等體型的黃橄欖色柳鶯。冕柳鶯雌雄兩性羽色相似。上體概呈橄欖綠，頭頂羽色較深暗，富於褐色；頭部中央有一條淡黃色冠紋；眉紋前端黃色，後端淡黃色或黃白色；自鼻孔穿過眼部一直延伸至枕部的貫眼紋呈暗褐色；背部橄欖綠色往後逐漸變淡，至腰及尾上覆羽轉為淡黃綠色；飛羽暗褐，外翮邊緣黃綠色；大覆羽先端淡黃色，形成一道翅上翼斑；尾羽亦呈暗褐色，兩對最外側尾羽的內翮具狹窄白色羽緣。下體銀白色，並若隱若現地稍沾黃色；脊部沾灰；尾下覆羽輝黃色，或呈淡綠黃色。虹膜褐色或暗褐色；上嘴黑褐色，下嘴角黃白色或黃褐色；跗蹠和爪墨綠褐色或鉛褐色。

主要棲息於2000米以下的山地針葉林、針闊葉混交林和闊葉林及其林緣地帶，尤以林緣疏林、灌叢、河谷和路旁疏林灌叢地帶較常見。

常單獨或成對活動，遷徙期間亦成群，有時亦和其他柳鶯混群，多活動在樹冠層枝葉間，多在槭、椴、水曲柳等闊葉樹的樹冠取食。性活潑，不停在枝葉間跳躍覓食，或從一棵樹飛向另一棵樹，有時也到林下灌叢中覓食。繁殖期間叫聲清脆、洪亮，100米左右亦能聽見。冕柳鶯的鳴聲似「qio-qio-qio-bi-,qio-qio-bi-,yao-qi-bi-」或「qi-qi-yao-」,「qi-qi-yao-」,「bi-qi-qi-bu-」,「ji-qi-qi-bu-」,「qi-qi-bu-,jiu-yi」等，其中有的反復第一句的「qio-qio」或「qiu-yin」。而呼喚聲為「fu-yi-ci,fu-yi-ci」。

主要以昆蟲為食，包括有尺蠖蛾科幼蟲、甲蟲、螟蛾科幼蟲、步行蟲，以及其它半翅目、鞘翅目、膜翅目、蜉蝣目等昆蟲及其幼蟲。

分布範圍:

世界

分布於柬埔寨、中國、印度尼西亞、日本、朝鮮民主主義人民共和國、韓國、老撾人民民主共和國、馬來西亞、緬甸、俄羅斯聯邦（東亞區）、新加坡、泰國、越南。

中國

內蒙古（呼倫貝爾盟、赤峰）、黑龍江（小興安嶺朗鄉、伊蘭、大興安嶺伊春、以及帽兒山、玉泉、完達山、佳木斯等地）、吉林（長白山、延邊、通化、渾江、四平、遼源、吉林）、遼寧（丹東、鳳城、本溪、大連、朝陽、錦州）、北京、陝西（周至、留壩、漢中、西鄉、佛坪、寧陝）、甘肅（文縣、康縣、武山）、重慶、四川（灌縣）、雲南（麗江、保山、漾濞、昆明、新平）（繁殖鳥），遷徙期間經重慶（秀山）、四川（萬源、彭水、屏山、樂山、雅安）、貴州（遵義、江口、貴陽、望謨、雷山、榕江）、河北、山西、山東、湖南、廣東、廣西、浙江、福建、香港，偶見於臺灣。

5.三道眉草鹀（學名: Emberiza cioides）

鹀科鹀屬的物種，共有五個亞種，體長約16厘米。道眉草鹀雄雌個體同形異色。雄性成鳥額呈黑褐色和灰白色混雜狀；頭頂及枕深栗紅色，羽緣淡黃色；眼先及下部各有一條黑紋；耳羽深栗色；眉紋白色，自嘴基伸至頸側；上體余部栗紅色，向後漸淡，各羽緣以土黃色，並具黑色羽幹紋，而下體和尾上覆羽純色；中央一對尾羽栗紅色而具黑褐色羽幹紋，其余尾羽黑褐色，外翮邊緣土黃色，最外一對有一白色帶從內翮端部直達外翮的近基部，外側第二對末端中央，有一楔狀白斑；小覆羽灰褐色，羽緣較淺白；中覆羽內翮褐色，外翮栗紅色，羽端土黃色；大覆羽和三級飛羽中央黑褐色，羽緣黃白；小翼羽，初級飛羽暗褐，羽緣淡棕；飛羽均暗褐色，初級飛羽外緣灰白，次級飛羽的羽緣淡紅褐色；頦及喉淡灰色；上胸栗紅，呈顯明橫帶；兩脅栗紅色而至栗黃，越往後越淡，直至和尾下覆羽及腹部的砂黃色相混合。腋羽和翼下覆羽灰白，羽基微黑。

雌性成鳥體羽色較雄鳥差淡；頭頂、後頸和背部均呈淺褐色沾棕，而滿布黑褐色條紋；耳羽也沾土黃色，眼先和頰紋沾汙黃色；眉紋、耳羽及喉均土黃色；胸部栗色橫帶不顯明。幼鳥上體黃褐，有的腰以下微沾黃；下體砂黃，除腹和尾下覆羽外，通體滿布黑褐色條紋或斑點。

虹膜栗褐色；嘴灰黑色，下嘴較淺；腿腳肉色。

三道眉草鹀喜棲在開闊地帶，在吉林地區棲於丘陵地帶的稀疏闊葉林，人工林和其他小片林緣；在半山區的開闊地區也有分布；在沈陽它喜棲於明亮的丘崗，而有濃厚的雜草、稀疏的散布著小柞樹、小松林和小桑樹地區；在膠東半島它喜棲山麓和溝谷附近的灌木叢和草叢間；在秦嶺常在山麓平原地區；在湖南和貴州見於離村較遠的樹叢和田地中活動；但在青海見於湟水河谷的丘陵草地中。有的亞種於夏日見於海拔2800米的高山上，但不進入密暗林內。據統計三道眉草鹀垂直分布界在1100米以下，而500-1100米間此鳥為優勢種。

夏季多見於丘陵及高山上；冬季抵達山腳或山谷及平原等地。常棲息在草叢中，矮灌木間、巖石上，或空曠而無掩蔽的地面、玉米稈上、電線或電桿上等。冬季常見成群活動，由數十只結集在一起；繁殖時則分散成對活動。雄鳥有美妙動聽的歌聲，特別是在繁殖時期。到了冬季，它們就會沖到山腳下和平原處生活。在電線桿上、巖石上、空曠的地面上、草叢中都能看到它們的身影。如果在天氣寒冷的時候，一般它們都是成群結隊的集體活動。在進入繁殖期時，它們就會分散找配偶，此時它們的叫聲會更加的動聽，可以說的上是惟妙惟肖。食物大部分為鞘翅目和鱗翅目昆蟲及其幼蟲和雜草種，如蓼、稗、狗尾草、鵝觀草、葶薺、蘿蔔、麥等種子。

繁殖期成對生活，雛鳥離巢後多以家族群方式生活，冬季集結成小群，而很少單獨活動。性頗怯疑，一見有人便立刻停止鳴叫，或遠飛或快速藏匿。

雄鳥鳴聲動聽，特別在繁殖時期，從清晨到中午站在小樹尖端或電線上鳴唱不已。在吉林地區，它於4月間開始鳴叫，5-6月最強烈，8月後鳴叫減少，但在冬季明朗天氣時也進行「大合唱」。此鳥在草叢中有時發出3至4聲的「jê-ji-ji」聲。

冬季以各種野生草子為主，也有少量的樹木種子、各種谷粒和冬菜等；夏季以昆蟲為主，食物中以鱗翅目昆蟲幼蟲最多，其次是甲蟲、小型蝗蝻，間或有蠕蟲。吃植物，包括蓼、稗、狗尾草、鵝冠草、葶薺、蘿蔔、稻谷、麥等種子，但主要為草子。其次為直翅目與同翅目昆蟲；也吃少量雙翅目、膜翅目昆蟲及蜘蛛等。

分布範圍

分布於日本，哈薩克斯坦，老撾人民民主共和國，朝鮮半島，吉爾吉斯斯坦，俄羅斯聯邦。中國分布很廣，從東北北部，西至新疆，南至廣東，西南至廣西大瑤山 、四川等地。

旅鳥：中國香港。

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI

图源：抱枕
翻译：月的爆击机
校对：剜于勒的牡蛎
嵌字：shinka