しあわせ！鳥見んぐ

漫画第①巻，特別好評售賣中…！

Presented by
わらびもちきなこ

宮内鈴 (miyauchi suzu)

時雨翼 (tokiniwa tsubasa)

今泉雛 (imaizumi hina)



しあわせ鳥見んぐ



荒巻美 (arato misaki)

[illegible]

小鳥遊

[illegible]

飛快
!!

剛、剛才的是鴉嗎…!?
不過感覺飛得好快啊…
寂——靜
……?

又來了…!
飛快


真、真的有啊…!
寂——靜
……

我確實拍到了…
不、不會是靈異照片…?
是哪一張這個是…

白腰雨燕哦
白腰雨燕
嚇、嚇我一跳呼…
外形就像是迴力標一樣呢~
○水平飛行速度為全世界最快


它非常擅長飛行甚至可以邊飛邊睡覺呢
太強了!
好厲害~



翼醬？
飛鳥姐…！



沒想到能在飛島上見到你們
鈴醬也一起來啦？
嗯
飛鳥姐不也是今年也一樣來這裡了呢
嘿嘿
畢竟是遷徙的季節呢～
那個…

人還真不少呢
那邊是學校的操場吧？

大家都聚在這兒是在幹什麼呀？
指指
指指
！


運動會…！
啊
拍手
不可能、因爲很久之前就已經停辦了哦
看這些人的打扮像是來觀鳥的人呢



※1…根據季節在國內進行遷徙的鳥。
※2…定期在海外與日本之間遷徙的鳥。

しあわせ鳥見んぐ

啊啊 灰頭鷸
為什麼你會是
灰頭鷸呢～


明明這麼艱辛
為什麼還要遷徙呢
唔——…

灰頭鷸～
硫磺鷸～
不要把鳥名
當人名用啊

是因為這裡
食物豐富嗎…？
答對啦——
而且生存壓力
也相對較低哦

不過遷徙其實
非常嚴酷
說不定…
這可能是它們倆
最後一次相見哦
居然這樣…！


此外還有天敵較少
更適合繁殖等原因…
不過
也有些事
無法只靠這些
原因來解釋

灰頭鷸——
抱住!!
硫磺鷸——
畢竟種類本來
就不同啊

還是有不少
未解之謎呢







接下來的目的地、是黑尾鷗的繁殖地「御積島」！快快上船～！

本話中
一行人的
旅游路線



1. 鼻戶崎觀景台

2. 巨木之森

3. 飛島小・中學校

所以本話中，一行人的旅遊路線大致是鼻戸崎觀景台—巨木之森—飛島小中學校（可能只是路過），而接下來她們即將去島西邊的御積島。



※這裏還有個名叫百合島的小島

御積島位於飛島西邊大約一公里處，是日本海海底由於火山活動形成的流紋岩島嶼，由於其作為黑尾鷗的一個重要繁殖地，因此連同飛島等一起被認定為國家自然紀念物、以及被山形縣指定為鳥獸保護區。

可愛的鳥兒們

1. 黑林鴿（学名：Columba janthina）

別名：黑果鴿、鴉鴿

黑林鴿體長400-430毫米，嘴峰18-21毫米，翅213-242毫米，尾153-177毫米，跗跖30-35毫米。雄鳥通體石板黑色。頭頂、背和腰等處羽緣具紫色金屬光澤，後頸和胸具金屬綠色光澤。翅上覆羽和下體余部光澤較弱，隨光線的不同或呈綠色或呈紫色。下背、腰、肩和翅上覆羽還具青銅色光澤。翅下覆羽，飛羽及尾羽石板黑色。雌鳥和雄鳥相似 但羽色不及雄鳥鮮艷和有光澤。虹膜褐色，嘴暗藍色，腳與趾灰色。

喙短，基部大都柔軟，被蠟質；翼發達，善飛行；尾短而圓；腿短健，無蹼，後趾與前三趾同在一個水平面上或缺後趾。多棲息於多林小島上的稠密常綠林間。棲息於海島和海岸上稠密的常綠森林中。常在林中樹上或地面活動。主要以山茶等植物等果實與種子為食。

分布於日本南部島嶼、南抵琉球群島、硫黃群島、小笠原群島以及中國大陸的山東等地。指名亞種為中國山東威海及臺灣附近島嶼的罕見夏候鳥。

2. 白腰雨燕（学名：Apus pacificus）



兩翼和尾大都黑褐色，頭頂至上背具淡色羽緣、下背、兩翅表面和尾上覆羽微具光澤，亦具近白色羽緣，腰白色，具細的暗褐色羽幹紋，頦、喉白色，具細的黑褐色羽干紋；其余下體黑褐色，羽端白色。虹膜棕褐色。嘴黑色，腳和爪紫黑色。喜成群，常成群的在棲息地上空來回飛翔。飛行速度甚快，常邊飛邊叫，聲音尖細，為單音節。以各種昆蟲為食，主要種類有葉蟬、小蜂、姬蜂、蜻蜓、食蚜蠅、寄生蠅、蠅、蚊、蜘蛛、蜉蝣等。在飛行中捕食。

白腰雨燕是夏候鳥。春季於4~5月遷來。秋季於9~10月遷走。部分留居於香港和臺灣。

國內分布於黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古東部和中部、河北、山西、山東、河南、江蘇、往西至甘肅、青海東北部和西藏南部，往南至雲南、四川、貴州、廣西、廣東、香港和臺灣。遷徙期間也見於新疆西部和海南島。

國外分布於西伯利亞、遠東、日本、印度，越冬至澳大利亞和東南亞。



3. 灰头鹀(学名：Emberiza spodocephala)



屬小型鳴禽。體重 14-26 克，體長 125-161 毫米。雄鳥嘴基、眼先、頰黑色，頭、頸、頦、喉和上胸灰色而沾綠黃色，有的頦、喉、胸為黃色而微具黑色斑點。上體橄欖褐色具黑褐色羽幹紋兩翅和尾黑褐色。胸黃色，腹至尾下覆羽黃白色兩脅具黑褐色縱紋。雌鳥頭和上體灰紅褐色具黑色縱紋，腰和尾上覆羽無縱紋，下體白色或黃色，胸和兩脅具黑色縱紋，鷂紋皮黃白色，嘴基、眼生、頰、頦不為黑色，其余同雄鳥。

廣泛棲息於海拔 3000 米以下的平原和中高山地區，生活於山區的河谷溪流，平原灌叢和較稀疏的林地、耕地等環境中，常常結成小群活動，但是在繁殖季節回成對活動，非繁殖期常集群活動，一般主食植物種子。繁殖期在地面或灌叢內築碗狀巢。分布於中國、俄羅斯、日本、朝鮮、緬甸、尼泊爾和印度。

4. 硫磺鹀(学名：Emberiza sulphurata)

屬小型鳴禽。體重 17-26 克；體長 140-170 毫米嘴短，呈圓錐形，堅實而尖；切緣微向內曲。鼻孔半遮以短額須。翅頗發達，第一枚初級飛羽常退化，第 2-5 枚近乎等長。爪彎曲，後爪短於後趾。頭偏綠，眼先及頦近黑，白色眼圈顯著，具兩道粗顯的白色一般兩脅有模糊的黑色縱紋。上體灰綠而帶淡黃色，下體大都檸檬黃色。虹膜褐色；嘴紅褐色，下嘴較淡；腳肉色繁殖期雄鳥與雄灰頭鹀的區別為頭色較淺且喉與胸之間無對比。

喜山麓地帶的落葉林或混交林及次生植被。棲息於島嶼山麓灌叢，或市郊花園中，繁殖期棲於山地和丘陵灌木叢生的向陽地帶。常單獨或成對活動，非繁殖期間亦成小群活動。主要以野生植物種子、草子、果實等為食，繁殖於日本。越冬在中國南方和臺灣及菲律賓。

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI

图源：抱枕　嵌字：shinka
翻译：月的爆击机
校对：剜子勒的牡蛎