一年都見不到幾回的稀罕景象。

COMICS ①～② ON SALE.





しあわせ！鳥見んぐ∞

Presented by わらびもちきなこ

宮内鈴 (miyauchi suzu)
ときわつばさ (tokiwa tsubasa)

拾貝愛漫

しあわせ鳥見んぐ



今泉鳴 (Imaizumi hina)

荒砦嵐 (arato misaki)



小鈴

沙貝愛蜜

是很出名的小杜鵑的鳴叫記憶法哦

啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

聽聽看是不是聽著很像呢？

很像嗎……？

或許吧……

托卵為何？

被誰？

聽明？

合理嗎？

小杜鵑這種鳥名字倒是早就知道了但從來沒見過呢……

畢竟小杜鵑的警惕性很強嘛

托卵的鳥蛋相比其他的卵孵化時間要短

這樣先破殼的雛鳥會將其他的蛋拱出巢外哩

不過「托卵」這個詞你以前應該聽說過吧？

雛鳥將巢占為己有之後

養鳥會還衝本能悉心照料僅剩的那只雛鳥哩～

把蛋產在其他鳥的巢中讓其他鳥育雛嗎……？

沒錯沒錯

看到養鳥給比自己體型還要大的雛鳥喂食總感覺心情很複雜啊……

小杜鵑用心險惡啊……

拾貝堂

的確
這種育兒方式
很狡詐…
不過某種意義上
也很有趣
總之是一種有著
奇妙魅力的鳥兒呢

喔～…

漫畫裡不也經常見到
這種迷人的狡詐惡徒嘛
為了達到
自己目的
不論要做什麼
都在所不惜…
啊哈哈～

那麼
這下得進一步
看看它的樣子了
企圖產下
蛋蛋蛋的蛋蛋
究竟在哪裡呢～？

ﾊｲﾄ
ﾊｲﾄ
ﾊｲﾄ

居然
因著爬樹…？
喔
這不是茶腹鳴嗎

沙貝爱蜜

啊
難不成這就是
鳥的皮囊…？
小鳥桑是
山雀(四十雀)啥
呼呼
居然的領教
可是咱的面榜味

這麼小的鳥兒
居然掌握著
這麼厲害的特技啊

茶腹鴨(五十雀)
茶腹鴨一般
會像那樣
啄食躲藏在
樹皮內的蟲子
它們的爪子很穩
抓力很強
甚至能夠
頭朝下自由地上下移動
尋找食物
不愧是
小鳥桑的前輩～

…托卵
也是哦
只是我們不知道
不管是什麼鳥
為了在大自然中生存
都有專屬的生存術哦
生存術…

日本的鳥類種
只有茶腹鴨
能夠做到
這種事
誒…

沸貝愛蜜

啊！

那只鳥應該就是杜鵑吧？

……快看和圖鑒一樣！

好耶！新鳥觀察GET～

等等…心急吃不了熱豆腐哦

只靠看的就能夠確定那只鳥是杜鵑 哪怕是我也沒這麼自信…

小賢居然!?

意外自信!?

什麼意思…？

還有許多其他的鳥和小杜鵑長得很像哦

即使對於老手來說區分它們之間的不同也是很難的哦

啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

小杜鵑

郭公郭公

普通杜鵑

咕咕咕咕

還是得聽一下它的鳴聲才能確定是不是呢

中杜鵑

正所謂杜鵑不啼則待之啼

德川家康說不定也是個觀鳥愛好者呢

拷貝漫畫

●鈴強烈的願望讓小杜鵑發出了鳥鳴。信長言行、絕不可學!

漫貝愛蜜

一、德川家康、丰臣秀吉、织田信长的川柳

读者们可能对最后一页岬所说的：“没有变成信长太好了呢”不太明白什么意思，接下来看看下面三句川柳就明白了。

德川家康：
「鳴かぬなら　鳴くまで待とう　時鳥」
（杜鹃不啼则待之啼）

丰臣秀吉：
「鳴かぬなら　鳴かしてみよう　時鳥」
（杜鹃不啼则使之啼）



织田信长：
「鳴かぬなら　殺してしまえ　時鳥」
（杜鹃不啼则杀之）

现在明白为什么不能当信长了吧。

浮月爱蜜

二、小杜鹃（学名：Cuculuspoliocephalus）

特征

小杜鹃是鹃形目杜鹃科杜鹃属鸟类，又称小布谷鸟。体型小。额棕灰色，头顶和后颈灰色稍沾褐色；背和肩黑褐色，腰和尾上覆羽蓝黑色；尾羽黑褐；羽缘具若干棕色点斑，羽干两侧具白斑，末端白色；翼缘纯白；飞羽暗褐色，外翎基部有棕白色斑点，内翎基部具白色横斑；颏、喉灰色；上胸沾棕色；下胸和腹部白色而具黑色粗著横斑；尾下覆羽皮黄色。上嘴黑色，嘴基和下嘴黄色，跗跖、趾和爪等亦黄色。似杜鹃。

栖息环境

小杜鹃主要栖息于低山丘陵、林缘地边及河谷次生林和阔叶林中，有时亦出现于路旁、村屯附近的疏林和灌木林。

生活习性

小杜鹃性孤独，常单独活动。性藏匿，常躲藏在茂密的枝叶丛中鸣叫。尤以清晨和黄昏鸣叫频繁，有时夜间也鸣叫，每次鸣叫由6个音节组成，重复三次，鸣声清脆有力。飞行迅速，常低飞，每次飞翔距离较远。无固定栖息地，常在一个地方栖息几天又迁至他处。主要以昆虫为食，尤以粉蝶幼虫、春蛾科幼虫等鳞翅目幼虫为主要食物，也吃鞘翅目、尺蠖和其它昆虫，偶尔也吃植物果实和种子。

繁殖方式

小杜鹃繁殖期为5-7月。自己不营巢和孵卵，通常将卵产于鹪鹩、白腹蓝鹟，以及柳莺和画眉亚科等鸟类巢中，由别的鸟代孵代育。卵白色或粉白色。

分布范围

世界：东亚至东南亚、南亚沿线各国、俄罗斯、中南非各国等。

旅鸟：孟加拉国、老挝、塞舌尔、索马里、南非、泰国。

中国：分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、四川、云南、贵州和西藏、海南岛和台湾等。

海貝愛蜜

三、普通䴓/茶腹䴓（学名：Sittaeuropaea）

特征

普通䴓，又名蓝大胆、穿树皮、松枝儿、贴树皮、欧亚䴓、森林䴓。是雀形目䴓科䴓属小型鸣禽。体长11-13厘米。上体纯蓝灰色；贯眼纹黑色达于颈侧；眉纹白色或棕白色；中央一对尾羽与上体同色，其余尾羽黑色，外侧两枚具白斑；翅黑；颏、喉近白色；下体余部肉桂色；胁沾栗色；尾下覆羽栗红色，具白色端斑。冬季有时到林中住宅区附近取食，甚至到住宅内偷吃食物，因此在东北民间有“蓝大胆”的绰号。

普通䴓地理变异较大，各亚种在形态上不尽相同。

栖息环境

普通䴓是广泛的山林中的鸟类，喜居高大的乔木，针阔混交林和阔叶林中，在森林草原的高大栎树林里及古老的公园内也有分布。一般分布在海拔800-1300米，有时也在村落附近的树丛或低山丘陵地带的森林中活动。

生活习性

普通䴓除繁殖期单独或成对活动以及繁殖后期成家族群外，其他季节多单独或与其他小鸟混群。性活泼，行动敏捷，能在树干向上或向下攀行，啄食树皮下的昆虫，鸣声似“zhe-zhe”。不停的从一棵树飞向另一棵树上，当遇惊吓时，可以发出“der-der”的急叫声。鸣声多样，优美动听。

食物以昆虫为主，其中害虫几乎占98%；亦取食一部分益虫。所食的植物种子中有红松种子。育雏期间以昆虫幼虫为食。

繁殖方式

繁殖期的普通䴓常利用啄木鸟的弃洞或在树干上自己凿洞，洞口背风向东南或南，衔入树皮和泥土以作巢。巢筑毕5-6天即开始产卵，日产一枚，每窝产6-8枚卵，经过13-18天的孵化，幼鸟出壳。经22-26天育雏，幼鸟飞出。在寻找巢址、筑巢、配对、产卵时，雌雄鸟总是形影不离。寿命9年。

分布范围

原产地：亚洲至欧洲沿线多国均有分布。

游荡：黎巴嫩。



海贝爱鱼

四、普通杜鹃（学名：Cuculus canorus）

特征



普通杜鹃成鸟额浅灰褐色，腰及尾上覆羽色较亮；尾羽褐黑色，有白色羽端斑，沿羽轴两旁具一对对通连而不对位的白点斑，这些白斑在外侧尾羽为形较大，且连成横斑状，羽缘也常有一列白色锯齿形斑；翅表暗褐色，略见绿色光泽，飞羽的羽干黑褐色，外侧初级飞羽的内翈具一列白色横斑；翅缘白色而具褐色横斑。头侧及颏、喉至上胸淡灰色；下体余部包括腋羽、翼下覆羽、覆腿羽等白色，满布不规则的、狭形的横斑，以尾下覆羽的横斑最粗，且相距最宽。



栖息环境

栖息于山地、丘陵和平原地带的森林中，有时也出现于农田和居民点附近高的乔木树上。

生活习性

主要为夏候鸟，部分旅鸟。春季于4-5月份迁往繁殖地，9-10月份迁走。性孤独，常单独活动。飞行快速而有力，常循直线前进。飞行时两翅震动幅度较大，但无声响。主要以鳞翅目幼虫为食，也吃其它昆虫。繁殖期间喜欢鸣叫，常站在乔木顶枝上鸣叫不息。有时晚上也鸣叫或边飞边鸣叫，叫声凄厉宏亮，很远便能听到它“布谷——布谷”的粗犷而单调的声音。鸣声响亮，二声一度，像“KUK-KU”。

繁殖方式

繁殖期5-7月。求偶时雌雄鸟在树枝上跳来跳去，飞上飞下互相追逐，并发出“呼-呼-”的低叫声。之后雌鸟站在树枝上不动，两翅半下垂，头向前伸，雄鸟随即飞到雌鸟背上、颤抖双翅进行交尾，2-3分钟后，雄鸟飞离雌鸟，停栖于30-40米外，稍停在飞到雌鸟身边，也曾见到3只杜鹃在一起追逐争偶现象。普通杜鹃无固定配偶，也不自己营巢和孵卵，而是将卵产于大苇莺、麻雀、灰喜鹊、伯劳、棕头鸦雀、北红尾鸲、棕扇尾莺等各类雀形目鸟类巢中，由这些鸟替它带孵带育。

分布范围

原产地：欧亚非多国均有分布。

旅鸟：大洋洲各岛国、中国台湾、格陵兰岛、冰岛、美国佐治亚州等。

海貝爱蜜

五、中杜鹃（学名：Cuculus saturatus）

特征

中杜鹃的额、头顶至后颈灰褐色；背、腰至尾上覆羽蓝灰褐色；翅暗褐色，翅上小覆羽略沾蓝色。初级飞羽内侧具白色横斑。中央尾羽黑褐色，羽轴辉褐色，羽端微具白色，羽轴两侧具有成对排列，但不甚整齐的小白斑；外侧尾羽褐色，羽轴两侧也有呈对生排列而不整齐的白斑，端缘白斑较大。



栖息环境

栖息于山地针叶林、针阔叶混交林和阔叶林等茂密的森林中。夏季繁殖于海拔1300-2700米的丘陵山地。华北亚种繁殖于中国西北及东北，南至北纬32°；指名亚种繁殖在北纬32°以南地区，包括中国台湾及海南。

生活习性

中杜鹃在中国主要为夏候鸟，部分为旅鸟，春季多于4-5月迁来，秋季于9-10月迁走。常单独活动，多站在高大而茂密的树上不断的鸣叫。有时也边飞边叫和在夜间鸣叫。鸣声低沉，单调，为二音节一度，其声似“嘣一嘣”。性较隐匿，常常仅闻其声。主要以昆虫为食。

繁殖方式

繁殖期为5-7月。繁殖期间鸣声频繁。反复不变的重复同一单调的声音，有时晚上也可听见。无固定配偶，也不自己营巢和孵卵。常将卵产于其它雀形目鸟类巢中，由这些鸟代孵代育。卵的颜色也常随寄主卵色而变化。但大小明显不同，孵化期也多较寄主卵短。卵的大小为19-25×12-16毫米。

分布范围

世界：东亚、东南亚、南亚、大洋洲多国。

产地不确定：马里亚纳群岛北部。



图源:抱枕

翻译:月的爆击机

校对:刚于勒的牡蛎

嵌字:shinka

鸟贝爱蜜