●嘛，找鳥需耐心，萬萬急不得…。







＼単行本②巻好評発売中／

Let's do Birdwatching

しあわせ鳥見んぐ

Presented by
わらびもちきなこ

宮内鈴（miyauchi suzu）
以擅於陸奥語聞名的大一學生。與表姐遠藤鳥助的學校，是一位觀鳥新手。天真爛漫且好奇心旺盛。



時雨翼（tokiniwa tsubasa）
非常熱愛觀察鳥類的高中生。
擅長在自己的教室中找尋小鳥與鳥類的形象出現。

我這邊倒挺吵
聽取鳥聲一片

你聽

啾啾啾啾

哇啊…！

呱呱呱呱呱呱呱呱

啾啾啾啾

青蛙…？

是鳥叫…

那個
呱呱聲…

啊、正好有一只
停在顯眼的地方

不是吧！

她掛斷了…

一瞥

……

我現在就過去
等我哦…！

上

車

誒
小鳥怎麼
等你…

額…

小鳥啊、
等等她吧…？

今泉雛（imaizumi hina）

中學時代開始就成績優秀的美少女。家裡是當地的名門望族，是千女。心目中最厭惡的就是在學校中少女。鄉山形縣方言。


翼醬
久等啦—
啊
鈴同學…

我覺得那邊的蘆葦杆肯定是剛才那只小鳥的鳴叫站點
過一會兒它應該就會飛回來了
鳴叫什麼…？

抱歉…
剛才的鳥兒已經飛走了…
我用意念讓它等你但看來沒有效果…
誒？啊、嗯嗯

每種鳥兒都有鳴叫時的特定站點
比如樹頂呀電線桿
向外延展的枝頭等等
根據種類與個體不同鳴叫站點也多種多樣
原來如此…
行行子 鳴囀最閃亮
也就是說這是…
野鳥們的音樂大會場啊…！
野鳥單推

不要緊、既然這裡有這麼多鳥兒的話很快就能發現的吧
啾啾啾
啾啾啾
啾啾啾
幾分鐘後
失一落…
還是找不到…
畢竟蘆葦葉很礙眼找起來確實很麻煩呢

しあわせ鳥見んぐ





東方大葦鶯

這是東方大葦鶯呢

啾啾啾唧

啾啾啾唧

○叫聲在鳴叫記憶法中被記作「行行子」
是日本夏天的季語

○嘴中的紅色非常顯眼


啊、潛水了
在哪？
猛扎

失一落…
沒事啦
畢竟對手可是被稱為溪流忍者的鳥兒呢


又出來了哦
從哪出來!?
露頭

正在移動啊
往哪去!?!
刷刷刷刷刷…

鶺河鳥
○會邊上下抖動腰部
邊在岩石上走動
甩動
甩動
找、找到啦～！
尾巴抖來抖去的
好可愛～
○其生存非常依賴於水
若不時常泡水
甚至會變得虛弱

最右邊石頭
能看到嗎？
在哪——
!?!?

……不過
烏…鴉…？
是替身之術嗎？
鴉科
只是顏色接近而已
它可不是烏鴉的
同類哦
河烏科

しあわせ鳥見んぐ

它們可是雀形目當中唯一會潛水的鳥兒哦很厲害吧

從外表看它的腹部發白

它應該是在學習如何獨立生活的幼鳥

成鳥全身都是巧克力色的

這…不可能…

飛過去……

明明沒有蹼卻能在水中飛一般地游泳

在水底走動尋找食物

難道它會用水遁之術…！

……說起來

雞醬家裡燕子的雞鳥

是不是也長得挺大了？

啊確實呢…

居然能瞞過老夫的眼睛

那家伙可真是技藝高超…

嗯…

…沒有啦

它還沒長大半吊子而已啦

？

它們說不定也快了呢









燕子　兄弟們、是時候離巢了…！

1.大嘴乌鸦（学名: Corvus macrorhynchos）

特征

又叫巨嘴鸦，俗称老鸦、老鸹。是雀形目鸟类中体型最大的几个物种之一，成年的大嘴乌鸦体长可达50厘米左右。雌雄相似。喙粗且厚，上喙前缘与前额几成直角。额头特别突出，在栖息状态下，这一点是辨识本物种的重要依据。大嘴乌鸦与小嘴乌鸦的区别在喙粗厚且尾圆，头顶更显拱圆形。



主要栖息于低山、平原和各种森林类型中，尤以疏林和林缘地带较常见。

生活习性

除繁殖期间成对活动外，其他季节多成3-5只或10多只的小群活动，有时亦见和秃鼻乌鸦、小嘴乌鸦混群活动。多在树上或地上栖息。性机警，常伸颈张望和注意观察四周动静，对持枪的人尤为警惕。早晨和下午较为活跃，觅食频繁，中午多在食场附近树上休息。

大嘴乌鸦对环境的适应能力很强，无论山区、平原均可见到，是中国常见的留鸟。大嘴乌鸦在城市中极为常见，以路旁、公园中的高大乔木为落脚点。

大嘴乌鸦主要以昆虫、昆虫幼虫和蛹为食，也吃雏鸟、鸟卵、鼠类、腐肉、动物尸体以及植物农作物种子等，属杂食性。

叫声单调粗犷，似‘呱-呱-呱’声。粗哑的喉音kaw及高音的awa, awa, awa声；也作低沉的咯咯声。

分布范围

分布于亚洲东部和南部。

繁殖方式

繁殖期3-6月。营巢于高大乔木顶部枝杈处，距地高5-20米，巢呈碗状。3月开始营巢，4月中下旬开始产卵，每窝产卵3-5枚。雌雄鸟轮流孵卵，孵化期18±1天。雏鸟晚成性，由雌雄亲鸟共同喂养留巢期26-30天。

2.东方大苇莺（学名: Acrocephalus orientalis）

特征

是莺科苇莺属的一种动物，体长18-19厘米，体重22-29克。体型略大的褐色苇莺。

东方大苇莺雄性成鸟夏羽额至枕部暗橄榄褐色；背橄榄褐色；腰及尾上覆羽橄榄棕褐色；眼先深褐色，耳羽淡棕色；飞羽及覆羽深褐色，外缘具橄榄褐色羽缘，覆羽淡色羽缘较宽；尾羽12枚，圆尾形，褐色，具污白色羽端缘，越外侧尾羽，白色羽端越明显。下体的颏、喉部棕白色，下喉及前胸羽毛具细的棕褐色羽干纹，向后变为皮黄色；两胁皮黄沾棕色。覆腿羽色更深。秋羽羽色鲜艳，上体黄色。下体赭色；腹部中央乳白色；尾下覆羽棕白色；两胁与翼下覆羽均淡棕色。

雌性成鸟与雄鸟相似，但羽色较暗淡，体型稍小。

生活习性

东方大苇莺在中国属于夏候鸟，部分留鸟。春季于5月初至5月中下旬迁来中国繁殖，秋季于9月末10月初开始迁离繁殖地飞往越冬地。

常单独或成对活动，性活泼，常频繁的在草茎或灌丛枝间跳跃、攀缘。常大声鸣叫，声音如："ga-ga-ji"。繁殖期间常站在巢附近的芦苇顶端或附近的小枝头上鸣叫。冬季仅间歇性地发出沙哑似喘息的单音chack。活动于苇地。

主要以甲虫、金花虫、鳞翅目幼虫以及蚂蚁、豆娘和水生昆虫等昆虫为食，也吃蜘蛛、蜗牛等其他无脊椎动物和少量植物果实和种子。

主要栖息在海拔900米以下的低山、丘陵和山脚平原地带，常出没于水域或水域附近的植物丛和芦苇丛、柳灌丛中有茂密的植物覆盖的沼泽和湿草地。

分布范围

东亚、东南亚各国均有分布。

繁殖方式

繁殖期在5月下旬到7月末。通常筑巢于水边和水域附近的灌木丛或小柳树丛中，。巢驻在通风良好的苇地。孵卵期11-13天。雏鸟体温低而不恒定，雌鸟常伏在巢中保暖。随着日龄的增加，恒温机制逐渐建立。当体温恒定并达到成鸟体温时便开始离巢。育雏由雌雄亲鸟共同承担，约经19天的哺育，小鸟即可离巢飞出。

3.褐河乌（学名: Cinclus pallasii）

特征

雀形目河乌科的鸟类，全长约21厘米。褐河乌雌鸟形态与雄鸟相似，成鸟通体呈咖啡褐色，背和尾上覆羽具棕红色羽缘；翅和尾黑褐色，飞羽外翈具咖啡褐色狭缘；眼圈白色，常为眼周羽毛遮盖而外观不显著；下体腹中央色较浅淡，尾下覆羽色较暗。虹膜褐色；嘴、跗蹠和趾黑褐色。

生活习性

活动于山间河流两岸的大石上或倒木上，从不远离河流而飞往他处，也很少上河岸地上活动，遇河流转弯处亦不从空中取截径飞行。主要在水中取食，以水生昆虫及其他水生小形无脊椎动物为食。 一般常单个或成对活动。在水中寻食，全年以动物性食物为主，偶尔吃些植物叶子和禾本科植物种子。

鸣声在平时较单调而清脆，常为“zhi-，zhi-，”或“zhina-，zhina-，”声，遇惊扰顺河流急飞时发出急促的“za. za. za. za……”声，而后仍为“zhina-，zhina-”声。在繁殖期雌、雄配对嬉戏时和幼鸟出巢后带幼鸟习飞寻食时，鸣声则婉转多变、悦耳动听，尤其在幼鸟互相追逐嬉戏时鸣声变化则更多。

褐河乌为山区水域鸟类，终年栖息活动于河流中的大石上或河岸崖壁凸出部，从不到河流两岸树上停落。活动高度在海拔500-2500米或更高的山间河流。

分布范围

东亚、东南亚各国有分布。

繁殖方式

繁殖期4-7月,巢筑于河流两岸石隙间、石壁凹处、树根下或垂岩下边。雌雄共同营巢，一年繁殖一窝，每窝产卵3-4枚。雌鸟孵卵，孵卵期15-16天；雌雄共同育雏，育雏期21-23天。

TRANSLATION STUDIO
KOBO
KUKUGUMI

图源:抱枕
翻译:月的爆击机
校对:剜于勒的牡蛎
嵌字:shinka