

Пример. На локализованном интервале $[1; 1,5]$ уточнить корень нелинейного уравнения

$$x^3 - \frac{x^2 + x}{5} = 1,2$$

до точности $\varepsilon = \delta = 10^{-3}$ с помощью метода Риддерса.

Решение. Вначале вычисляется координата середины заданного интервала

$$c = \frac{1 + 1,5}{2} = 1,25$$

и значения функции на концах заданного интервала, а также во вновь найденной точке

$$f(1) = 1^3 - \frac{1^2 + 1}{5} - 1,2 = -0,6,$$

$$f(1,25) = 1,25^3 - \frac{1,25^2 + 1,25}{5} - 1,2 = 0,190625,$$

$$f(1,5) = 1,5^3 - \frac{1,5^2 + 1,5}{5} - 1,2 = 1,425.$$

Прежде чем воспользоваться формулой для определения координаты точки пересечения экспоненты с осью абсцисс определяется знак разности $f(a) - f(b) = -2,025$, поскольку результат меньше нуля, то первый множитель в числителе $\text{sign}[f(a) - f(b)]$ принимает значение -1 .

Подставляем определенные значения в формулу для определения искомой неизвестной

$$x_0 = 1,3497612 + (1,3497612 - 1).$$

$$\cdot \frac{-1 \cdot 0,190625}{\sqrt{0,190625^2 - (-0,6) \cdot 1,425}} = 1,1995224$$

и вычисляем значение функции во вновь найденной точке

$$f(1,1995224) = 1,1995224^3 - \frac{1,1995224^2 + 1,1995224}{5} -$$

$$-1,2 = -0,0017377.$$

Найденное значение функции в точке x_0 позволяет выполнить анализ интервалов $[a, x_0]$ и $[x_0, b]$, а также выделить тот подинтервал, на котором происходит смены знака функции. В рассматриваемом случае знак функции меняется на интервале $[x_0, b]$, таким образом, осуществляется перенос точки a на место найденной x_0 . В результате заданный первоначальный интервал сузился до $[1,1995224; 1,5]$.

Для вновь определенного интервала проводится повторное вычисление координаты середины интервала

$$c_1 = \frac{1,1995224 + 1,5}{2} = 1,3497612$$

и значение функции в этой точке

$$f(1,3497612) = 1,3497612^3 - \frac{1,3497612^2 + 1,3497612}{5} - 1,2 = 0,6247463.$$

Перед определением координаты точки пересечения экспоненты с осью абсцисс проводится анализ знака первого члена в числителе, который, как и ранее является отрицательным. Находим точку пересечения экспоненты с осью абсцисс

$$x_1 = 1,3497612 + (1,3497612 - 1,1995224) \cdot \frac{-1 \cdot 0,6247463}{\sqrt{0,6247463^2 - (-0,0017377) \cdot 1,425}} = 1,1999967$$

и значение функции в точке x_1

$$f(1,1999967) = 1,1999967^3 - \frac{1,1999967^2 + 1,1999967}{5} -$$

$$-1,2 = -0,0000119.$$

Проводится проверка на достижение полученным решением заданной точности

$$|x_1 - x_0| < \varepsilon,$$

$$|1,1999967 - 1,1995224| = 0,0004743 < 0,001.$$

Как видим необходимое условие достижения решения с заданной точностью выполнено. Далее проверяется достаточное условие по достижению значением функции в точке x_1 заданной точности

$$|f(x_1)| < \delta,$$

Таблица 10 – Решение нелинейного уравнения методом Риддерса.

k	a	$f(a)$	b	$f(b)$	c
0	1	-0,6	1,5	1,425	1,25
1	1,1995224	-0,0017377	1,5	1,425	1,3497612

k	$f(c)$	$\text{sign}(x)$	x	$f(x)$
0	0,1906250	-1	1,1995224	-0,0017377
1	0,6247463	-1	1,1999967	-0,0000119

$$|-0,0000119| < 0,001.$$

Видим, что и достаточное условие сходимости для полученного решения также выполнено.

Процесс нахождения решения нелинейного уравнения методом Риддерса представлен в таблице 10.

В итоге для достижения решения с требуемой точностью сверхлинейному методу потребовалось всего две итерации.

Точное решение заданного нелинейного уравнения соответствует $x^* = 1,2$.

Ответ. Данное нелинейное уравнение на рассматриваемом интервале имеет решение $x = 1,1999967$, которое получено с точностью $\varepsilon = 0,001$ за две итерации.