

# Compilation de données : R Markdown & GitHub

Groupe 2 : Louise ARSAC, Zélie FROMENT, Charlène LAROCHE, Paul SERVAIN, Axel FALIGOT-G

29/04/20

## Contents

<b>1</b>	<b>Présentation des données</b>	<b>1</b>
1.1	Les données . . . . .	3
1.2	Représentation des données en graphique . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Une première analyse</b>	<b>5</b>
2.1	Création d'une fonction graphique . . . . .	5
2.2	Application . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Analyse en Composante Principale</b>	<b>5</b>
3.1	Rappels . . . . .	5
3.2	Les valeurs propres . . . . .	7
3.3	Le cercle des corrélations . . . . .	7
3.4	Le nuage des individus . . . . .	7
3.5	Conclusions . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Références</b>	<b>10</b>

**Résumé :** Dans ce rapport nous analyserons les températures des principales villes françaises.

.....  
.....

## 1 Présentation des données

Les données sont téléchargeables directement sur ce site ou peuvent être importée directement sous R avec :

```
link <- "http://factominer.free.fr/course/donnees/AnaDo_JeuDonnees_TemperatFrance.csv"
datatemp <- read.table(link, h=TRUE, sep=";", dec=".", row.names=1, encoding="latin1")
datatibble <- as_tibble(datatemp)
knitTab1 <- knitr::kable(datatemp[,1:12], caption="Moyennes de T°C par ville par mois",align = "c")
knitTab2 <- knitr::kable(datatemp[,13:17], caption="Informations sur les villes",align = "c")
```



Figure 1: Logo Rmarkdown

## 1.1 Les données

Table 1: Moyennes de T°C par ville par mois

	Janv	Févr	Mars	Avri	Mai	Juin	juil	Août	Sept	Octo	Nove	Déce
Bordeaux	5.6	6.6	10.3	12.8	15.8	19.3	20.9	21.0	18.6	13.8	9.1	6.2
Brest	6.1	5.8	7.8	9.2	11.6	14.4	15.6	16.0	14.7	12.0	9.0	7.0
Clermont	2.6	3.7	7.5	10.3	13.8	17.3	19.4	19.1	16.2	11.2	6.6	3.6
Grenoble	1.5	3.2	7.7	10.6	14.5	17.8	20.1	19.5	16.7	11.4	6.5	2.3
Lille	2.4	2.9	6.0	8.9	12.4	15.3	17.1	17.1	14.7	10.4	6.1	3.5
Lyon	2.1	3.3	7.7	10.9	14.9	18.5	20.7	20.1	16.9	11.4	6.7	3.1
Marseille	5.5	6.6	10.0	13.0	16.8	20.8	23.3	22.8	19.9	15.0	10.2	6.9
Montpellier	5.6	6.7	9.9	12.8	16.2	20.1	22.7	22.3	19.3	14.6	10.0	6.5
Nantes	5.0	5.3	8.4	10.8	13.9	17.2	18.8	18.6	16.4	12.2	8.2	5.5
Nice	7.5	8.5	10.8	13.3	16.7	20.1	22.7	22.5	20.3	16.0	11.5	8.2
Paris	3.4	4.1	7.6	10.7	14.3	17.5	19.1	18.7	16.0	11.4	7.1	4.3
Rennes	4.8	5.3	7.9	10.1	13.1	16.2	17.9	17.8	15.7	11.6	7.8	5.4
Strasbourg	0.4	1.5	5.6	9.8	14.0	17.2	19.0	18.3	15.1	9.5	4.9	1.3
Toulouse	4.7	5.6	9.2	11.6	14.9	18.7	20.9	20.9	18.3	13.3	8.6	5.5
Vichy	2.4	3.4	7.1	9.9	13.6	17.1	19.3	18.8	16.0	11.0	6.6	3.4

Table 2: Informations sur les villes

	Lati	Long	Moye	Ampl	Région
Bordeaux	44.50	-0.34	13.33	15.4	SO
Brest	48.24	-4.29	10.77	10.2	NO
Clermont	45.47	3.05	10.94	16.8	SE
Grenoble	45.10	5.43	10.98	18.6	SE
Lille	50.38	3.04	9.73	14.7	NE
Lyon	45.45	4.51	11.36	18.6	SE
Marseille	43.18	5.24	14.23	17.8	SE
Montpellier	43.36	3.53	13.89	17.1	SE
Nantes	47.13	-1.33	11.69	13.8	NO
Nice	43.42	7.15	14.84	15.2	SE
Paris	48.52	2.20	11.18	15.7	NE
Rennes	48.05	-1.41	11.13	13.1	NO
Strasbourg	48.35	7.45	9.72	18.6	NE
Toulouse	43.36	1.26	12.68	16.2	SO
Vichy	46.08	3.26	10.72	16.9	SE

## 1.2 Représentation des données en graphique

Le jeu de données est complété pour 15 villes et contient 17 variables dont les températures des 12 mois de l'année, la moyenne, l'amplitude, latitude et longitude ainsi qu'un indicateur de grandes régions. La température moyenne en France est égale à  $11.81 \pm 5.93$  degrés Celsius (moyenne  $\pm$  écart type). La ville la plus froide est : Strasbourg ; et la ville la plus chaude est : Nice (Figure 2).




Figure 2: Températures par villes

## 2 Une première analyse

Nous réalisons des graphiques permettant d'analyser, par région :

- La position globale de la températures vis à vis de la moyenne nationale.
- L'évolution mensuelle des températures dont notamment :
  - L'amplitude
  - L'hétérogénéité inter-villes.

### 2.1 Création d'une fonction graphique

Nous souhaitons produire un graphique représentant par région les courbes mensuelles de chaque ville avec la courbe moyenne nationale. Voici un script possible :

```
Tplot<-function(tempr,tmean) {  
  plot(c(1,12),c(-10,30),type="n",ylab="Temperature (°C)",xlab="Mois",cex.lab=0.8,cex.axis=0.8)  
  apply(tempr[,1:12],1,function(x) lines(1:12,x))  
  text(2,28,tempr$Région[1],cex=0.8)  
  lines(1:12,tmean,lwd=2,col="red")  
}
```

### 2.2 Application

```
#température moyenne  
tmean<-apply(datatemp[,1:12],2,mean)  
#Découpage du tableau par région  
sptemp<-split(datatemp,datatemp$Région)  
#Découpage de la fenêtre graphique  
par(mfrow=c(2,2),mar=c(3,3,1,1),mgp=c(2,1,0))  
#Application de la fonction  
plot<-lapply(sptemp,Tplot,tmean)  
#Légende  
legend(4,0,"Moyennes nationales",bty="n",col="red",lwd=2,cex=0.7)
```

**Interpretation:** Nous observons que .....

## 3 Analyse en Composante Principale

### 3.1 Rappels

Une ACP permet d'analyser simultanément les liens entre de multiples variables quantitatives et d'analyser les positions des individus statistiques vis à vis de l'ensemble de ces variables. Elle est basée sur la recherche d'axes principaux indépendants, chacun plus ou moins liés aux variables d'entrées. Le premier axe explique




Figure 3: Courbes de températures mensuelles par régions

un maximum d'inertie, le second une moindre partie et ainsi de suite. Pour rappel l'inertie totale se calcul par :

$$I = \sum_{i=1}^N \frac{1}{N} d_{(e_i;g)}^2$$

Avec :  $d_{e_i,g}^2 = \sum_{j=1}^p x_{ij}^2$  = Distance euclidienne au centre de gravité du nuage de point (soit (0;0)) avec des données centrée et normées.

## 3.2 Les valeurs propres

Elles permettent de déterminer la proportion d'inertie expliquée par chacun des axes.

```
res <- PCA(datatemp, quanti.sup=13:16, quali.sup=17, graph=F)
par(mfrow=c(1,1), mar=c(4,4,2,2))
barplot(res$eig[,2], ylab="Inertie %", names.arg = paste("Axe", 1:nrow(res$eig)), las=2, cex.axis=0.7, cex.lab=1.5)
```




Figure 4: Valeurs propres

**Interpretation:** Nous observons que l'axe 1 explique 79.85% de l'inertie totale

.....

.....

## 3.3 Le cercle des corrélations

**Interpretation:** Nous observons que l'axe 1 est expliqué par .....

.....

.....

```
plot.PCA(res, choix="var", cex.axis=0.7, cex.lab=0.8)
```

## 3.4 Le nuage des individus




Figure 5: Cercle des corrélations



```
plot.PCA(res, choix="ind", habillage=17,cex.axis=0.7,cex.lab=0.8)
```




Figure 6: Nuage des individus

**Interpretation:** Nous observons que les villes du nord ouest se caractérisent par

.....

.....

.....

### 3.5 Conclusions

Les variations mensuelles des température semblent être liées aux différents climats existants en France et plus largement en Europe (Rebetez et al., 2006). Néanmoins la France est soumise à des changements climatiques (passés, ex : Moisselin et al., 2002 ; et présents, ex : Lespinas et al., 2010). Ceci pourrait fortement impacter les activités agricoles notamment la viticulture Cook, Wolkovich (2016) même si Van Leeuwen et al. (2013) suggère que ces changements pourraient ne pas être aussi marqués que prévu.

.....

.....

## 4 Références

### *Liens*

[http://factominer.free.fr/course/donnees/AnaDo\\_JeuDonnees\\_TemperatFrance.csv](http://factominer.free.fr/course/donnees/AnaDo_JeuDonnees_TemperatFrance.csv)

<https://husson.github.io/data.html>

### *Bibliographie*

COOK, Benjamin I et WOLKOVICH, Elizabeth M, 2016. Climate change decouples drought from early wine grape harvests in France. In : *Nature Climate Change*. 2016. Vol. 6, n° 7, p. 715.

LESPINAS, Franck, LUDWIG, Wolfgang et HEUSSNER, Serge, 2010. Impact of recent climate change on the hydrology of coastal Mediterranean rivers in Southern France. In : *Climatic Change*. 2010. Vol. 99, n° 3-4, p. 425-456.

MOISSELIN, Jean-Marc, SCHNEIDER, Michel et CANELLAS, Claire, 2002. Les changements climatiques en France au XX<sup>e</sup> siècle. Etude des longues séries homogénéisées de données de température et de précipitations. In : *La météorologie*. 2002.

REBETEZ, Martine, MAYER, Helmut, DUPONT, Olivier, SCHINDLER, Dirk, GARTNER, Karl, KROPP, Jürgen P et MENZEL, Anette, 2006. Heat and drought 2003 in Europe: a climate synthesis. In : *Annals of Forest Science*. 2006. Vol. 63, n° 6, p. 569-577.

VAN LEEUWEN, Cornelis, SCHULTZ, Hans R, CORTAZAR-ATAURI, Iñaki Garcia de, DUCHÊNE, Eric, OLLAT, Nathalie, PIERI, Philippe, BOIS, Benjamin, GOUTOULY, Jean-Pascal, QUÉNOL, Hervé, TOUZARD, Jean-Marc et OTHERS, 2013. Why climate change will not dramatically decrease viticultural suitability in main wine-producing areas by 2050. In : *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2013. Vol. 110, n° 33, p. E3051-E3052.