- 增量计算：$d_{new} = d_{old} + 2dy$（选择 E）或 $d_{old} + 2dy - 2dx$（选择 NE）
- 优势：只使用整数运算，效率高
- 适用范围：任意斜率直线（分 8 个象限处理）

Bresenham 画线法（BresenhamLine）

- 原理：误差累积法，判断像素点与理想直线的距离
- 误差项：$e = 2dy - dx$
- 误差更新：$e = e + 2dy$（选择 E）或 $e = e + 2dy - 2dx$（选择 NE）
- 优势：整数运算，无浮点数，速度快
- 特点：与中点法本质相同，但推导过程不同

2. 圆绘制算法

中点画圆法（**MidpointCircle**）

- 原理：利用圆的八对称性，只需计算 1/8 圆弧
- 决策参数：$d = 1 - r$（初始值）
- 增量计算：
  - 选择 E 点：$d_{new} = d_{old} + 2x + 3$
  - 选择 SE 点：$d_{new} = d_{old} + 2x - 2y + 5$
- 八对称性：$(x, y) \to (\pm x, \pm y), (\pm y, \pm x)$
- 优势：只需计算 1/8 圆弧，效率提高 8 倍

Bresenham 画圆法（BresenhamCircle）

- 原理：类似中点画圆法，使用不同的决策参数
- 决策参数：$d = 3 - 2r$（初始值）
- 增量计算：
  - 选择 E 点：$d_{new} = d_{old} + 4x + 6$
  - 选择 SE 点：$d_{new} = d_{old} + 4(x - y) + 10$
- 特点：决策参数更新更简单