

Statistiques et probabilités

Cours n°1

Guillaume Postic

Université Paris-Saclay, Univ. Evry
Département informatique

Master 1 MIAGE - 2022/2023

Dénombrement

- Détermination du nombre d'éléments d'un **ensemble**
- S'obtient par un comptage ou par un calcul de son **cardinal** à l'aide de techniques combinatoires

Exemple : quelle est la probabilité de faire exactement 1 fois « face » avec 3 lancers d'une pièce équilibrée ?

Ensembles de mots

Proverbe : il ne faut manger des huîtres que les mois en « r »

- S = tous les mois
- L = le mois a 31 jours
- R = le mois a un « r » dans son nom

$S = \{\text{Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Jun, Jul, Aou, Sep, Oct, Nov, Déc}\}$








$L = \{\text{Jan, Mar, Mai, Jul, Aou, Oct, Déc}\}$

$R = \{\text{Jan, Fév, Mar, Avr, Sep, Oct, Nov, Déc}\}$

$L \cap R = \{\text{Jan, Mar, Oct, Déc}\} = \text{les mois de 31 jours et un « r »}$

Diagramme de Venn

Représenter les opérations ensemblistes


 S

 L

 R

 $L \cup R$

 $L \cap R$

 L^c

 $L - R$

Principes de comptage

Les deux principes suivants jouent un rôle fondamental en combinatoire.

- Principe d'addition

- Soit deux ensembles A et B contenant respectivement m et n éléments et tels que $A \cap B = \emptyset$. Alors l'ensemble $A \cup B$ contient $m + n$ éléments.

- Principe de multiplication

- Soit deux ensembles A et B contenant respectivement m et n éléments. Alors l'ensemble $A \times B$ contient $m \cdot n$ éléments.
- Notation : $S \times T = \{(s, t)\}$


Principe d'inclusion-exclusion (1/2)

Exprimer le nombre d'éléments (ou **cardinal**) d'une **union** finie d'ensembles finis en fonction du nombre d'éléments de ces ensembles et de leurs **intersections**.

Principe d'inclusion-exclusion (2/2)

Parmi 20 étudiants, 10 étudient les mathématiques, 11 étudient la physique, et 4 étudient les deux.

Q : Combien y a-t-il d'étudiants qui n'étudient ni les mathématiques ni la physique ?



Question 1

L'ADN est constitué d'une séquence de nucléotides : A, C, G et T
Combien existe-t-il de séquences d'ADN différentes d'une longueur de 3 nucléotides ?

(A) 12 (B) 24 (C) 64 (D) 81

Combien existe-t-il de séquences de 3 nucléotides sans répétition (c. -à-d. que tous les nucléotides sont différents) ?

(A) 12 (B) 24 (C) 64 (D) 81

Question 1

L'ADN est constitué d'une séquence de nucléotides : A, C, G et T
Combien existe-t-il de séquences d'ADN différentes d'une longueur de 3 nucléotides ?

(A) 12 (B) 24 (C) 64 (D) 81

Réponse : $4 \times 4 \times 4 = 64$

Combien existe-t-il de séquences de 3 nucléotides sans répétition (c. -à-d. que tous les nucléotides sont différents) ?

(A) 12 (B) 24 (C) 64 (D) 81

Réponse : $4 \times 3 \times 2 = 24$

Question 2

Il y a 5 participants à la finale du 100 mètres.

De combien de façons les médailles d'or, d'argent et de bronze peuvent être attribuées ?

Question 2

Il y a 5 participants à la finale du 100 mètres.

De combien de façons les médailles d'or, d'argent et de bronze peuvent être attribuées ?

Réponse : $5 \times 4 \times 3$.

Il y a 5 façons de choisir la vainqueur. Il reste ensuite 4 façons de choisir le second, puis 3 façons de choisir le troisième.

Question 3

Je ne porte pas de vert (G) avec du rouge (R).

Je pense que le noir (B) et le denim (D) vont avec tout.


Voici ma garde-robe : T-shirts : 3B, 3R, 2G ; sweats 1B, 2R, 1G ; pantalons 2D, 2B.



Combien d'ensembles différents puis-je porter ?

Question 3 : solution

Admettons que l'on choisisse le T-shirt en premier. Selon que l'on choisisse un T-shirt compatible avec le vert ou le rouge, le nombre de sweats que l'on peut choisir ensuite varie. Ainsi, on divise le problème avant d'utiliser le principe de multiplication. La réponse peut facilement être représentée par un arbre :



En multipliant chacun des chemins :

$$\text{Nombre d'ensembles} = (3 \times 3 \times 4) + (3 \times 4 \times 4) + (2 \times 2 \times 4) = 100$$

Arrangement (*permutation*)

Une permutation d'objets distincts rangés dans un certain ordre correspond à un changement de l'ordre de succession de ces objets.

« abc » et « cab » sont différentes permutations de $\{a, b, c\}$

Arrangement de p éléments dans un ensemble de taille n (*partial permutation*)

Donnez tous les arrangements de 3 éléments de l'ensemble $\{a, b, c, d\}$.

abc	abd	acb	acd	adb	adc
bac	bad	bca	bcd	bda	bdc
cab	cad	cba	cbd	cda	cdb
dab	dac	dba	dbc	dca	dcb

Pourriez-vous le faire pour 7 éléments issus d'un ensemble de 10 ?

Combinaison

La combinaison est la sélection d'éléments d'un ensemble, sans tenir compte de l'ordre.

Donnez toutes les combinaisons de 3 éléments de $\{a, b, c, d\}$.

Combinaison

La combinaison est la sélection d'éléments d'un ensemble, sans tenir compte de l'ordre.

Donnez toutes les combinaisons de 3 éléments de $\{a, b, c, d\}$.

Réponse : $\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$

Formules

✓ Ordre

✗ Remise

Arrangement
Cas part. : $n = p$
(permutation)

$$A(p, n) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

✗ Ordre

✗ Remise

Combinaison

$$C(p, n) = \frac{A(p, n)}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

✓ Ordre

✓ Remise

✗ Ordre

✓ Remise

Multienemble
(multiset)

$$p\text{-uplet} = n^p$$

$$D(p, n) = C(p, n+p-1) = \frac{(n+p-1)!}{p!(n-1)!}$$

Question 4

- (a) Comptez le nombre de façons d'avoir exactement 3 « face » pour 10 lancers de pièce.
- (b) Pour une pièce équilibrée, quelle est la probabilité de faire exactement 3 fois « face » pour 10 lancers ?

Question 4

- (a) Comptez le nombre de façons d'avoir exactement 3 « face » pour 10 lancers de pièce.
- (b) Pour une pièce équilibrée, quelle est la probabilité de faire exactement 3 fois « face » pour 10 lancers ?

Réponses

- (a) $C(3, 10)$; autres notations ${}_{10}C_3$ ou $\binom{10}{3}$
- (b) Il y a 210 résultats possibles pour 10 lancers (principe de multiplication). Pour une pièce équilibrée, chaque résultat est équiprobable :

$$\frac{\binom{10}{3}}{2^{10}} = \frac{120}{1024} = 0.117$$

Main au poker

- Jeu de 52 cartes
 - 13 valeurs : 2, 3, ..., V, D, R, A
 - 4 couleurs : ♥, ♠, ♦, ♣
- Main
 - 5 cartes
 - Possession d'une *paire* : deux cartes de la même valeur, les trois autres cartes ayant des valeurs différentes
 - Exemple : {2♥, 2♠, 5♥, 8♣, K♦}
- Q : la probabilité qu'une main contient une paire est
 - Inférieure à 5 % ?
 - Entre 5 % et 10 % ?
 - Entre 10 % et 20 % ?
 - Entre 20 % et 40 % ?
 - Supérieure à 40 % ?

Main au poker : solution

NON-PUBLIÉE

Terminologie

- **Expérience aléatoire** : procédure qui peut être répétée.
- **Univers** : l'ensemble de toutes les issues (résultats) pouvant être obtenues au cours d'une expérience aléatoire ; il est noté Ω , U ou S .
- **Évènement**, ω : une partie (sous-ensemble) de l'univers
- **Fonction de probabilité**, $P(\omega)$: associe à chaque évènement $\omega \in \Omega$ sa probabilité de se produire
 - Cette probabilité est comprise entre 0 et 1
 - La probabilité totale de tous les évènements est 1

Exemple

Expérience aléatoire : lancer d'une pièce équilibrée et observation du résultat : pile (*tail*, T) ou face (*head*, H).

Univers : $\Omega = \{ H, T \}$.

Fonction de probabilité : $P(H) = 0,5$; $P(T) = 0,5$

L'univers est discret

Discret : qui contient un nombre défini de valeurs (c.-à-d., qui peut être listé)

Exemples :

- $\{ a, b, c, d \}$ (fini)
- $\{ 0, 1, 2, \dots \}$ (infini)

Les évènements

Les événements forment des ensembles, qui peuvent être décrits par

- des mots
- des notations (mathématiques)
- des diagrammes de Venn

Expérience aléatoire : lancer d'une pièce 3 fois

Évènement :

faire au moins 2 fois face = $\{ HHH, HHT, HTH, THH \}$

Les évènements

Les évènements « exactement 2 fois face » et « exactement 2 fois pile » sont **mutuellement exclusifs** (ou **disjoints**) :

$$\{ THH, HTH, HHT \} \cap \{ TTH, THT, HTT \} = \emptyset$$

Notations mathématiques

Univers : $\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \}$

Évènement $\omega \in \Omega$

Probabilité entre 0 et 1 : $0 \leq P(\omega) \leq 1$

Probabilité totale égale à 1 : $\sum_{j=1}^n P(\omega_j) = 1, \quad \sum_{\omega \in S} P(\omega) = 1$

Évènement $A : P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$

Probabilités et opérations sur les événements (ensembles)

Événements A, L, R


1. Événements complémentaires : $P(A^c) = 1 - P(A)$

2. Principe d'inclusion-exclusion :


$$P(L \cup R) = P(L) + P(R) - P(L \cap R)$$

3. Événements disjoints ou mutuellement exclusifs :


$$P(L \cup R) = P(L) + P(R)$$



$\Omega = A \cup A^c$, pas de recouvrement



$L \cup R$, pas de recouvrement



$L \cup R$, recouvrement = $L \cap R$