



Homework — Numerical Linear Algebra

Dimitri Tabatadze · 13:54, December 22, 2023

1. The steps:

(1)

$$\begin{aligned} r_0 &= b - Ax_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_0 &= \frac{\langle Ar_0, r_0 \rangle}{\langle Ar_0, Ar_0 \rangle} = \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} = \frac{1}{2} \\ x_1 &= x_0 + \alpha_0 r_0 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} r_1 &= b - Ax_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} \\ \alpha_1 &= \frac{\langle Ar_1, r_1 \rangle}{\langle Ar_1, Ar_1 \rangle} = \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle} = 1 \\ x_2 &= x_1 + \alpha_1 r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} r_2 &= b - Ax_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 &= \frac{\langle Ar_2, r_2 \rangle}{\langle Ar_2, Ar_2 \rangle} = \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \right\rangle} = 1 \\ x_3 &= x_2 + \alpha_2 r_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(4)

$$r_2 = b - Ax_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

stop.

2. (a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = QR$$

(b)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{23}{3\sqrt{337}} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{50}{3\sqrt{337}} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{3\sqrt{337}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 \\ 0 & \frac{\sqrt{337}}{3} \end{pmatrix} = QR$$

3. (a)

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$R \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q^T \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 \\ 0 & \frac{\sqrt{337}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{23}{3\sqrt{337}} & -\frac{50}{3\sqrt{337}} & -\frac{2}{3\sqrt{337}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{77}{\sqrt{337}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{229}{\sqrt{2}} \\ 231 \end{pmatrix}$$