

Vzorka príkladov korešpondujúca s problematikou numerického cvičenia č. 2

1. Študent na skúške z kinematiky opisoval krivočiary pohyb hmotného bodu v priestore. Pri zavedení vektora rýchlosti zabudol označiť polohový vektor šípkou (t.j. zabudol nad písmeno r napísať šíпку ako symbol vektora). Pri reklamácii výsledkov skúšky argumentoval tým, že zabudol na „bezvýznamný detail“. Ukážte, čomu sa rovná výraz:

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r} = ?$$

ak derivácia polohového vektora podľa času určuje vektor rýchlosti objektu:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \vec{v}$$

t.j. ukážte ako sa zmení výsledok operácie derivovania, ak zabudneme písmeno označiť symbolom vektora.

Poznámka: Písmeno bez šípky označuje veľkosť vektora, ktorej časová derivácia je $\dot{r} = \vec{\rho} \cdot \vec{v}$ ($\vec{\rho}$ je jednotkový vektor v smere polohového vektora). Úloha umožňuje dokumentovať, že dôslednosť pri zápise vektorov nie je len úchyľka učiteľa, ale má principiálny význam. Úlohu možno riešiť aj pre časovú deriváciu rýchlosti napr. v rámci zadania.

2. Hmotný bod sa pohybuje pozdĺž osi x tak, že závislosť jeho polohy od času určuje rovnica:

$$x = A + Bt + Ct^2$$

kde x je poloha v metroch, t je čas v sekundách a A , B a C sú konštanty $A = 3$ m, $B = 5$ m.s⁻¹, $C = -1$ m.s⁻². V čase 3 s určte:

- a) polohu hmotného bodu. b) rýchlosť hmotného bodu. c) zrýchlenie hmotného bodu.

3. Pohyb hmotného bodu v rovine je opísaný polohovým vektorom, ktorého časová závislosť je určená rovnicou:

$$\vec{r}(t) = [At + B, Ct^2 + D \ln(Et) + Q]$$

kde t je čas v sekundách a A , B , C , D , E sú konštanty: $A = 2$ m.s⁻¹, $B = 4$ m, $C = 6$ m.s⁻², $D = 8$ m, $E = 1$ s⁻¹, $Q = 1$ m. Súradnice polohového vektora sú v metroch. Určte rovnicu dráhy hmotného bodu.


4. Polohový vektor hmotného bodu pohybujúceho sa v rovine je možné v zavedenej vzťažnej sústave vyjadriť vzťahom:

$$\vec{r}(t) = [At^2, Bt + C]$$

kde t je čas v sekundách a A , B , C sú konštanty: $A = 3$ m.s⁻², $B = 20$ m.s⁻¹, $C = -4$ m. Určte veľkosť rýchlosti a zrýchlenia hmotného bodu v čase 4 s. Určte aj dĺžku dráhy, ktorú prejde hmotný bod počas svojho pohybu v časovom intervale $\langle 2, 5 \rangle$ s.

5. Teleso koná priamočiary pohyb, pričom veľkosť jeho rýchlosti sa v závislosti od času mení tak, ako je to znázornené na grafe vpravo. Určte:

- c) veľkosť rýchlosti a zrýchlenia v čase 1 s.
d) veľkosť rýchlosti a zrýchlenia v čase 3 s.
a) veľkosť dráhy, ktorú uvedené teleso prejde za 4 sekundy svojho pohybu.
b) veľkosť dráhy, ktorú uvedené teleso prejde za 7 sekúnd svojho pohybu.



Poznámka: Variabilita úlohy je prakticky nekonečná, možno si vymyslieť ľubovoľný graf. V prípade lineárnych závislostí (resp. po častiach lineárnych) je možné hľadať funkčné závislosti $v(t)$ a $s(t)$ a problém riešiť analyticky. So zdatnejšími študentami je možné diskutovať o reálnosti pohybu znázorneného na grafe, t.j. špekulovať o tom ako je to so zrýchlením objektu v časových okamihoch 2s, 4s a 5s.

6. Teleso prešlo tretinu svojej dráhy konštantnou rýchlosťou 36 km.h⁻¹. Určte priemernú rýchlosť telesa na celej dráhe. Zvyšnú časť dráhy dlhú 300 m prešlo za 60 s. Určte jeho priemernú rýchlosť.

7. Teleso prešlo prvú tretinu svojej dráhy konštantnou rýchlosťou 2 m.s⁻¹. Zostávajúce dve tretiny svojej dráhy prešlo konštantnou rýchlosťou 8 m.s⁻¹. Určte jeho priemernú rýchlosť.

8. Zrýchlenie hmotného bodu pri jeho priamočiarnom pohybe rovnomerne klesá zo začiatkovej hodnoty $a_0 = 10 \text{ m.s}^{-2}$ v čase $t_0 = 0 \text{ s}$, na nulovú hodnotu v čase $t_1 = 20 \text{ s}$. Aká je rýchlosť hmotného bodu v čase $t_2 = 10 \text{ s}$ a akú dráhu za tento čas vykonal, keď v čase $t_0 = 0 \text{ s}$ bol v pokoji?

9. Aká je začiatková rýchlosť častice, ktorá sa pohybuje priamočiarno tak, že jej zrýchlenie v závislosti od času rovnomerne rastie a za prvých 5 sekúnd vzrástlo z nulovej hodnoty na 3 m.s^{-2} , keď po uplynutí 10 sekúnd od začiatku zrýchleného pohybu mala častica rýchlosť 50 m.s^{-1} ?

10. Teleso koná priamočiary pohyb, pričom jeho zrýchlenie exponenciálne klesá z hodnoty $a_1 = 8 \text{ m.s}^{-2}$ v čase $t_1 = 2 \text{ s}$ na hodnotu $a_2 = 2 \text{ m.s}^{-2}$ v čase $t_2 = 10 \text{ s}$. Na začiatku pohybu, t.j. v čase $t = 0 \text{ s}$, bolo teleso v pokoji. Určte:

- a) zrýchlenie telesa na začiatku pohybu.
- b) rýchlosť telesa v čase 20 s od začiatku pohybu.
- c) dráhu, ktorú teleso prejde za čas 30 s od začiatku pohybu.
- d) dráhu, ktorú teleso prejde v priebehu časového intervalu $\langle t_1, t_2 \rangle$.

Pomôcka: Exponenciálny pokles je možné analyticky opísať funkciou $a(t) = Ae^{-Bt}$, kde A a B sú konštanty.

11. Z miesta A vyšli na tú istú trasu v tom istom čase dva nákladné automobily. Prvý šiel rýchlosťou $v_1 = 40 \text{ km/h}$, druhý rýchlosťou $v_2 = 50 \text{ km.h}^{-1}$. Po istom čase vyrazilo za nimi osobné auto rýchlosťou $v_3 = 70 \text{ km.h}^{-1}$. Dostihlo pomalšie nákladné auto a o pol hodiny na to i rýchlejšie nákladné auto. O aký čas neskôr vyšlo na trasu osobné auto?

12. Furman s fúrou naloženého dreva sa pohybuje konštantnou rýchlosťou. Počas pohybu zoskočí z kozlíka a ide na koniec fúry niečo skontrolovať. Urobí pritom 10 krokov. Hneď potom sa otočí a vracia späť na začiatok fúry pričom urobí 15 krokov. Koľko krokov je dlhá fúra ?

Poznámka: Prikklady 11 a 12 sú venované problematike „zloženého pohybu“. Na numerickom cvičení sa stačí obmedziť na zjednodušený prípad zloženého pohybu v zmysle „princípu nezávislosti pohybov“ (resp. skladania rýchlostí) a ukázať ako vyzerá opis pohybu z hľadiska dvoch rôznych vzťažných sústav. „Skutočný“ zložený pohyb a také pojmy ako Coriolisovo zrýchlenie a pod... bohužiaľ nemôžu byť obsahom prednášky.

13. Ak na hladine vody voľne pustíme guľičku, bude klesať ku dnu tak, že jej rýchlosť sa v závislosti od času bude meniť podľa vzťahu:

$$v = v_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right),$$

kde $v_0 = 0,2 \text{ m.s}^{-1}$ a $\tau = 0,1 \text{ s}$. V akej hĺbke bude mať guľička rýchlosť rovnú 99 % rýchlosti ustáleného pohybu a aké bude v tejto hĺbke jej zrýchlenie ?

14. Hmotný bod koná jednorozmerný pohyb pozdĺž osi x . Okamžitá rýchlosť v hmotného bodu závisí od jeho polohy na osi x . Uvedená závislosť je určená vzťahom $v^2 = kx$, kde k je konštanta udávaná v jednotkách m.s^{-2} . Určte závislosť polohy, rýchlosti a zrýchlenia hmotného bodu od času, keď na začiatku, t.j. v čase $t = 0 \text{ s}$ bol hmotný bod v počiatku osi x (t.j. v polohe $x = 0 \text{ m}$).

15. Pri prejazde zákrutou tvaru kružnice s polomerom 150 m vlak za 15 sekúnd rovnomerne spomalil z rýchlosti 90 km.h^{-1} na 50 km.h^{-1} . Určte veľkosť celkového zrýchlenia vlaku v okamihu, keď dosiahol rýchlosť 50 km.h^{-1} .

16. Rotor elektromotora rotujúci s frekvenciou 4000 ot.min^{-1} sa počas 8 s celkom zastaví. Koľko otáčok pritom vykoná, ak jeho pohyb je rovnomerne spomalený ?

17. Kotúč s polomerom $R = 10 \text{ cm}$ sa roztáča z pokoja tak, že jeho uhlové zrýchlenie s časom rovnomerne vzrastá z hodnoty $\varepsilon_1 = 3 \text{ s}^{-2}$ v čase $t_0 = 0 \text{ s}$ na hodnotu $\varepsilon_2 = 8 \text{ s}^{-2}$ v čase $t_1 = 10 \text{ s}$. Koľko otáčok urobí kotúč za čas $t = 20 \text{ s}$ svojho pohybu ?

18. Je dvanásť hodín. Koľko bude hodín, keď sa budú veľká a malá ručička znovu prekrývať ?

19. Rotor elektromotora rotujúci s frekvenciou 4000 ot.min^{-1} sa počas 8 s celkom zastaví. Koľko otáčok pritom vykoná, ak jeho pohyb je rovnomerne spomalený ?

20. Koleso s polomerom R sa valí po vodorovnej zablátenej ceste konštantnou rýchlosťou v . Kúsky blata, ktoré sa lepia na povrch kolesa, sú neustále vymršťované zo všetkých bodov na jeho obvod. Určte, do akej maximálnej výšky vyletujú tieto kúsky blata nad povrch cesty.