

ไพริอกซิแคม

ความแรง < > มิลลิกรัม

ชนิด < เม็ด, เม็ดเคลือบฟิล์ม, เม็ด

เคลือบน้ำตาล, แคปซูล >

ชื่อการค้า < tradename >

(< ชื่อการค้า >)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไพ-ร็อก-ซิ-แคม (piroxicam)
- เป็นยาในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ [เอ็น-เสด (NSAIDs)]

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด หรือลดการอักเสบ ที่เกิดขึ้นจากโรคหรืออาการต่อไปนี้ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 6 เดือน
- วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลัน จากการแพ้ยาแอสไพริน หรือ ยาอื่นในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- เคยมีอาการแพ้ทางผิวหนังรุนแรง เช่น ผื่นแดง ลอกเป็นขุย แผลพุพอง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง เยื่อเมือกบริเวณตา ปาก หรืออวัยวะเพศลอก
- อายุน้อยกว่า 12 ปี
- มีเลือดออกหรือมีแผลทะลุในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
- เคยผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร (ต่อ)

- มีภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง
- เป็นโรคตับที่รุนแรง หรือโรคไตที่รุนแรง
- เป็นโรคไข้เลือดออก
- กำลังใช้ยาที่ต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาวาฟาริน
- กำลังใช้ยาที่มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคหอบหืด
- เคยมีอาการเลือดออกหรือมีแผลทะลุในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
- ความดันโลหิตสูง หรือ โรคเบาหวาน
- โรคหัวใจ โรคไต หรือ โรคตับ
- โรคหลอดเลือดสมอง
- มีประวัติเจ็บค่อน้ำออก
- ไขมันในเลือดสูง
- มีแนวโน้มที่จะเลือกออกได้ง่ายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือดอื่นๆ หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ
- มีภาวะบวมน้ำ
- อายุมากกว่า 70 ปี
- อาการติดเชื้อร่วมกับมีไข้
- ถ้าใช้ยานี้ขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเพิ่มความเสี่ยงของการการตีบตันของหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ และอาการมองเห็นไม่ชัด
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามมากๆ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการแล้ว สามารถหยุดยาได้เลย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว ง่วงซึม สับสน ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ เวียนหัว ง่วงซึม เหนื่อยล้า หรือ มองเห็นไม่ชัด
- หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องผ่าตัดหรือทำฟัน
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
 - อาเจียนเป็นเลือดสดหรือสีน้ำตาล แผล อุจจาระสีดำคล้ายยางมะตอย
 - หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ มองเห็นไม่ชัด นานวสันรนแรง
 - ปริมาณปัสสาวะลดลง
 - ขาบวมหรือข้อเท้าบวมโดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง แสบร้อนกลางอก ท้องเสีย ท้องผูก เมื่ออาหาร
- เวียนหัว ปวดหัว ง่วงซึม ได้ยินเสียงผิดปกติในหู

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ ไพร็อกซิแคม
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>