

พาราเซตามอล

ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>
มิลลิลิตร

ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พาราเซตามอล (paracetamol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดไข้
- ใช้บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางเช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไขหวัด ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคตับอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคตับ
- เป็นโรคไตอย่างรุนแรง
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้อยู่
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยานี้ตามน้ำหนักตัว โดยเทียบจากตารางต่อไปนี้
<ปรับตามทะเบียน>

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ปริมาณยา	
4 - 6	ครึ่งช้อนชา	2.5 มิลลิลิตร
6 - 8		3.5 มิลลิลิตร
8 - 12	1 ช้อนชา	5 มิลลิลิตร
12 - 16	1 ช้อนชา ครึ่ง	7.5 มิลลิลิตร
16 - 24	2 ช้อนชา	10 มิลลิลิตร

- กินยานี้ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
- อย่าขูดก่อนทยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้ายังมีอาการอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที แม้จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หากใช้ยาแล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวยาสสำคัญ คือ พาราเซตามอล
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code
ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.
<ปรับตามทะเบียนยา>

คำแนะนำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจจะทำให้ได้รับยาเกินขนาด
3. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

<หมายเหตุ>

ตารางการบริหารยา ปรับเปลี่ยนตามความแรงของยา โดยยึดจากความสะดวกในการบริหารยาเป็นหลัก เช่น ความแรง 120 mg/5 ml

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ปริมาณยา	
4 - 6	ครึ่งช้อนชา	2.5 มิลลิลิตร
6 - 8		3.5 มิลลิลิตร
8 - 12	1 ช้อนชา	5 มิลลิลิตร
12 - 16	1 ช้อนชา ครึ่ง	7.5 มิลลิลิตร
16 - 24	2 ช้อนชา	10 มิลลิลิตร

ความแรง 250 mg/5 ml

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ปริมาณยา	
9 - 13	ครึ่งช้อนชา	2.5 มิลลิลิตร
13 - 17		3.5 มิลลิลิตร
17 - 25	1 ช้อนชา	5 มิลลิลิตร
25 - 34	1 ช้อนชา ครึ่ง	7.5 มิลลิลิตร
34 - 50	2 ช้อนชา	10 มิลลิลิตร