

## ยาแก้ไอน้ำดำ

### ชนิดน้ำ

#### ประกอบด้วย

#### สารสกัดชะเอมเทศ

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เทรต

1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

[ข้อควรคำ ปรับตามทะเบียนยา]

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ไอน้ำดำ
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ไอขับเสมหะ

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

### 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

#### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่มีอาการท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

#### 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยากลุ่มโอปิออยด์
- ดับหรือไต่ทำงานบกพร่อง
- มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต หรือต่อมอดีนีผิดปกติ
- มีโรคหืด ต่อมลูกหมากโต ลมชัก อ้วน หรือโรคหัวใจ
- เคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ
- มีประวัติติดสารเสพติด
- วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ ครึ่ง ถึง 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
- กินยานี้วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ

#### 3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามกินยานี้ติดต่อกันเกิน 3 วัน เนื่องจากทำให้เกิดอาการดื้อยา และติดยาได้
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้ทำให้ง่วงซึมได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

แสดง URL หรือ QR code ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจุดตามผิวหนัง
- ชัก
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป เห็นภาพไม่ชัด
- มึนงง สับสน อารมณ์แปรปรวน เห็นภาพหลอน
- ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคเกี่ยวกับท่อน้ำดี

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**

- ปวดหัว เวียนหัว
- ง่วงซึม
- นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เบื่ออาหาร
- ปัสสาวะออกน้อย หรือปัสสาวะลำบาก

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] หรือในที่เย็น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 60 มิลลิลิตร (ตามที่ขึ้นทะเบียน)
- **ตัวยาสาคัญ คือ**
  - สารสกัดชะเอมเทศ (glycyrrhiza fluidextract) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร
  - แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เทรต (antimony potassium tartrate) 1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
  - ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร (camphorated opium tincture) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร