

**เบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์**  
**ความแรง < > มิลลิกรัม**  
**ชนิด<เม็ด, เม็ดเคลือบฟิล์ม>**  
**ชื่อการค้า <tradename>**  
**(<ชื่อการค้า>)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบ-ตา-ฮิส-ทีน-ได-ไฮ-โดร-คลอ-ไรด์ (betahistine dihydrochloride)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการเวียนหัวบ้านหมุน
- ใช้รักษากลุ่มอาการมีเนียร์ (Ménière's) ซึ่งทำให้เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุน การได้ยินลดลง หรือได้ยินเสียงรบกวน

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีแผลในทางเดินอาหาร
- เป็นโรคหอบหืด
- เป็นโรคภูมิแพ้ หรือกำลังมีอาการแพ้
- ความดันโลหิตต่ำ
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหาร
- ขนาดยาต่อวันสูงสุด ไม่เกิน 48 มิลลิกรัม

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืมไปรอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ ง่วงซึม ปวดท้อง หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ ชัก ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- หากใช้ยาแล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากกินยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้มีมึนงง สับสนได้

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

**“ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**

- คลื่นไส้
- อาหารไม่ย่อย
- ปวดหัว

## 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวยาสำคัญ คือ เบตาฮิสทีนไดไฮโดรคลอไรด์
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด .....**

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

**ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.**

**<ปรับตามทะเบียนยา>**