

פתרון מטלה 07 – פונקציות מרוכבות, 80519

23 בדצמבר 2024



שאלה 1

נחשב את האינטגרלים הבאים על-ידי שימוש במשפט קושי.

סעיף א'

$$J = \int_0^\infty \frac{1 - \cos(x)}{x^2} dx$$

על-ידי שימוש בהרכבת המסילות

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= (1-t)\epsilon + tr & t &\in [0, 1] \\ \gamma_2(t) &= re^{it} & t &\in [0, \pi] \\ \gamma_3(t) &= (1-t)(-r) + t(-\epsilon) & t &\in [0, 1] \\ \gamma_4(t) &= \epsilon e^{i(\pi-t)} & t &\in [0, \pi] \end{aligned}$$

פתרון נגדיר $f(z) = \frac{1-e^{iz}}{z^2}$ ונבחין כי $J = \operatorname{Re}(\int_0^\infty f)$

לכל $\epsilon, r \in \mathbb{R}$ האינטגרל מתאפס ממשפט קושי, אנו גם יודעים שהאינטגרל מתכנס מאינפי 2 ולכן נעבור לחישובו.

נבדוק את האינטגרל על γ_2 :

$$I_2 = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

נבחין כי

$$\max_{z \in \gamma_2} |f(z)| = \max_{z \in \gamma_2} \left| \frac{1 - e^{iz}}{z^2} \right| \leq \max_{z \in \gamma_2} \frac{|1 - e^{iz}|}{r^2} \leq \frac{1 + 1 \cdot \max_{t \in [0, \pi]} e^{-\sin t}}{r^2} = \frac{2}{r^2}$$

ולכן מאי-שוויון ML,

$$I_2 \leq \frac{2}{r^2} \cdot \frac{2\pi r}{2} = \frac{2}{r}$$

לכן $I_2 \rightarrow 0$

נעבור לבחינת

$$I_4 = \int_{\gamma_4} f(z) dz$$

הפעם מקירוב לינארי כפי שראינו בהרצאה

$$\int_{\gamma_4} f = \int_{\gamma_4} \frac{1 - (1 + iz + o(|z|))}{z^2} dz = - \int_0^\pi \frac{ie^{i(\pi-t)} + o(|\epsilon e^{i(\pi-t)}|)}{\epsilon e^{i(\pi-t)} \cdot \epsilon e^{i(\pi-t)}} (-i\epsilon) e^{i(\pi-t)} dt = i \int_0^\pi \frac{i\epsilon e^{i(\pi-t)} + o(|\epsilon|)}{\epsilon e^{i(\pi-t)}} dt \rightarrow -\pi$$

נבחין כי גם

$$I_1 = \int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^1 \frac{1 - e^{i(1-t)\epsilon + itr}}{((1-t)\epsilon + tr)^2} dt = \int_\epsilon^r \frac{1 - e^{it}}{t^2} dt$$

וכן

$$I_3 = \int_{-r}^{-\epsilon} \frac{1 - e^{it}}{t^2} dt = \int_r^\epsilon -\frac{1 - e^{-it}}{t^2} dt = \int_\epsilon^r \frac{1 - e^{-it}}{t^2} dt$$

ולכן

$$I_1 + I_3 = 2 \operatorname{Re} \left(\int_\epsilon^r \frac{1 - e^{it}}{t^2} dt \right) = 2 \int_\epsilon^r \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

ונוכל להסיק $I_1 + I_3 \rightarrow 2J$

ממשפט קושי נוכל להסיק

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0 \implies -\pi + 2J = 0$$

ולכן $J = \frac{\pi}{2}$

סעיף ב'

נחשב את

$$J = \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{x^n + 1} dx$$

עבור $n > m$ טסעיים על-ידי שימוש במסילה הבאה

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= t & t &\in [0, r] \\ \gamma_2(t) &= re^{it} & t &\in [0, \frac{2\pi}{n}] \\ \gamma_3(t) &= e^{i\frac{2\pi}{n}}(r-t) & t &\in [0, r] \\ \gamma_4(t) &= e^{i\frac{\pi i}{n}} + \epsilon e^{-it} & t &\in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

פתרון נגדיר

$$f(z) = \frac{z^{m-1}}{z^n + 1}$$

ונבחין כי הפונקציה מוגדרת ורציפה בכל נקודה פרט ל- $z = e^{i\frac{\pi i}{n}}$, לכן התחום הסגור שהמסילות מגדירות הוא תחום בו f רציפה כך שהוא מקיים את תנאי משפט קושי המורחב (את תנאי רגל שמאל) ולכן הוא תקף.

כמובן מאינפי 2 האינטגרל המבוקש מתכנס ויש הצדקה לדבר על ערכו, ונגדיר

$$I_1 = \int_{\gamma_1} f(z) dz, \quad I_2 = \int_{\gamma_2} f(z) dz, \quad I_3 = \int_{\gamma_3} f(z) dz, \quad I_4 = \int_{\gamma_4} f(z) dz$$

אז מהמשפט נקבל $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$ לכל $\epsilon, r > 0$

נעבור לבדיקת האינטגרלים הללו.

$$I_1 = \int_0^r \frac{t^{m-1}}{t^n + 1} dt \rightarrow J$$

וכן

$$I_3 = \int_0^r \frac{e^{i\frac{2\pi(m-1)}{n}}(r-t)^{m-1}}{(r-t)^n + 1} dt = e^{i\frac{2\pi(m-1)}{n}} \int_0^r \frac{t^{m-1}}{t^n + 1} dt \rightarrow e^{i\frac{2\pi(m-1)}{n}} J$$

נחסום את f ב- γ_2 ונקבל

$$\sup_{t \in [0, \frac{2\pi}{n}]} |f(\gamma_2(t))| \leq \sup_{t \in [0, \frac{2\pi}{n}]} \frac{r^{m-1}}{r^n + 1} = \frac{r^{m-1}}{r^n + 1}$$

ולכן מאי-שוויון ML והנתון אודות $n > m$,

$$I_2 \leq \frac{r^{m-1}}{r^n + 1} \cdot \frac{2\pi r}{n} = \frac{r^m}{r^n + 1} \cdot \frac{2\pi}{n} \rightarrow 0$$

נעבור לחישוב I_4 ,

$$I_4 = \int_0^{2\pi} \frac{(e^{i\frac{\pi i}{n}} + \epsilon e^{it})^{m-1}}{(e^{i\frac{\pi i}{n}} + \epsilon e^{it})^n + 1} dt = \int_0^{2\pi} \frac{e^{\frac{(m-1)\pi i}{n}} + o(\epsilon)}{2 + o(\epsilon)} dt \rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{e^{\frac{(m-1)\pi i}{n}}}{2} dt = \pi e^{\frac{(m-1)\pi i}{n}}$$

ולכן

$$J + e^{i\frac{2\pi(m-1)}{n}} J + 0 + \pi e^{i\frac{\pi(m-1)}{n}} = 0$$

ובפרט

$$J + \cos\left(\frac{2\pi(m-1)}{n}\right)J = -\pi \cos\left(\frac{\pi(m-1)}{n}\right)$$

ולכן

$$J = \frac{-\pi \cos\left(\frac{\pi(m-1)}{n}\right)}{1 + \cos\left(\frac{2\pi(m-1)}{n}\right)}$$

שאלה 2

יהי $r > 0$ ו- $\gamma_r : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ על-ידי $\gamma_r(t) = re^{it}$.

אם $g : \overline{B}(0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ רציפה בכל תחומה ואנליטית ב- $B(0, r)$ אז נוכיח שמתקיים

$$\left| \int_{\gamma_r} e^{iaz} g(z) dz \right| \leq M \cdot \frac{\pi}{a}$$

עבור $M = \max_{t \in [0, \pi]} |g(\gamma_r(t))|$ לכל $a > 0$.

הוכחה. נרצה להשתמש באי-שוויון ML, ולכן נחפש חסם לפונקציה הפנימית,

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq \pi} |e^{ia\gamma_r(t)} g(\gamma_r(t))| &= \sup_{0 \leq t \leq \pi} |e^{iare^{it}}| \cdot |g(z)| \\ &\leq M \sup_{0 \leq t \leq \pi} |e^{iar(\cos t + i \sin t)}| \\ &= M \sup_{0 \leq t \leq \pi} |e^{iar \cos t}| \cdot |e^{-ar \sin t}| \\ &= M \sup_{0 \leq t \leq \pi} e^{-ar \sin t} \\ &= \frac{M}{e^{ar}} \\ &\leq \frac{M}{ar} \end{aligned}$$

וכן $L(\gamma_r) = \pi r$ ונובע

$$ML(\gamma_r) \leq M \cdot \frac{\pi r}{ar} = M \frac{\pi}{a}$$

כפי שרצינו להראות.

□

שאלה 3

יהי $G \subseteq \mathbb{C}$ תחום כוכבי.

נוכיח כי לכל פונקציה אנליטית $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ קיימת פונקציה קדומה.

הוכחה. תהי $z_0 \in G$ נקודה כך שלכל $z \in G$ גם $[z_0, z] \subseteq G$, קיימת כזו מהיות G כוכבי.

נגדיר מסילה $\gamma_z(t) = z_0(1-t) + zt$ וכן את הפונקציה $F(z) = \int_{\gamma_z} f(w) dw$

אנו רוצים להראות ש- F' רציפה וכן ש- $F' = f$.

תהי z ותהי $z' \in B(z, \epsilon)$ אז ממשפט קושי למשולשים מתקיים

$$|F(z) - F(z')| = \left| \int_{[z', z]} f(w) dw \right| \leq M|z' - z| = M\epsilon$$

עבור $M = \sup_{w \in [z, z']} f(w)$ אז גם

$$\lim_{z' \rightarrow z} \frac{|F(z') - F(z) - f(z)(z' - z)|}{|z' - z|} \leq \lim_{z' \rightarrow z} \sup_{w \in [z, z']} |f(w) - f(z)| = 0$$

ומצאנו כי הפונקציה F גזירה כך ש- f נגזרתה.

□

שאלה 4

קדי f פונקציה הנתונה על-ידי טור חזקות מתכנס עם רדיוס התכנסות r ונסמן

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

סעיף א'

נוכיח כי רדיוס ההתכנסות של טור הנגזרות הנתון על-ידי

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

הוא r .

הוכחה. יהי $z \in B(0, r)$ אז $f(z)$ מוגדר ואף מתכנס בהחלט בנקודה זו, כלומר

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \cdot |z|^n$$

מוגדר אף הוא, זאת ראינו בתחילת הקורס.

נבחין שזהו טור ממשי ולכן נוכל לגזור אותו איבר איבר ויתקבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} n |a_n| |z|^{n-1}$$

טור מתכנס, אבל זוהי התכנסות בהחלט של הטור אותו אנו מחפשים, לכן $g(z)$ מוגדר ומתכנס בהחלט לכל $z \in B(0, r)$, לכן רדיוס ההתכנסות של

g הוא r .

סעיף ב'

נוכיח שמתקיים

$$f(z) = f(0) + \int_{[0,z]} g(w) dw$$

הוכחה. נבחין כי מהשאלה הקודמת והעובדה שכדור הוא תחום כוכבי קיימת G פונקציה הולומורפית כך ש- $G' = g$, נבחין כי קיימת יחידה כזו כך שגם $G(0) = f(0)$, ונראה ש- $f = G$.

$$\left| f(0) + \int_{[0,z]} g(w) dw - f(z) \right| \leq \left| \int_{[0,z]} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^n dw - \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \right| \leq \int_{[0,z]} |g(w)| dw$$

יהי $N \in \mathbb{N}$, אז נגדיר f_N, g_N התחיליות של הטורים, כלומר $f_N \rightarrow f, g_N \rightarrow g$, ולכן

$$\left| f_N(z) - f(0) - \int_{[0,z]} g_N(w) dw \right| = \left| \sum_{n=1}^N a_n z^n - \int_{[0,z]} \sum_{n=1}^N n a_n z^{n-1} dw \right| = \left| \sum_{n=1}^N a_n z^n - \sum_{n=1}^N \int_{[0,z]} n a_n z^{n-1} dw \right| = 0$$

כאשר המהלך האחרון נובע מאינטגרליות פולינום שראינו כבר, ועתה נוכל להסיק גם

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |f(z) - f(0) - \int_{[0,z]} g(w) dw| = 0$$

ולכן ממשפט התכנסות במידה שווה נסיק $f(z) = f(0) + \int_{[0,z]} g(w) dw$.

סעיף ג'

נוכיח ללא שימוש במשפט קושי שלכל מסילה סגורה $\gamma : I \rightarrow B(0, r)$ מתקיים

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 0$$

הוכחה. יהי $N \in \mathbb{N}$ ונגדיר חלוקה למסילה γ על-ידי $[\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}]$ כך ש- $\gamma = \gamma_0 + \dots + \gamma_{n-1}$. עוד נגדיר

$$I = \int_{\gamma} g(z) dz$$

נסמן את נקודות הקצה של γ_i ב- a_i, b_i ונגדיר

$$I_i = \int_{\gamma_i} g(z) dz + \int_{[0, a_i]} f(z) dz + \int_{[b_i, 0]} f(z) dz$$

לבסוף נבחין כי

$$I = I_1 + \dots + I_{n-1}$$

ישירות מהגדרה ומהעובדה ש- $a_{i+1} = b_i$.

מתוצאת הסעיף הקודם נובע גם

$$I_i = f(b_i) - f(a_i) + \int_{\gamma_i} g(z) dz$$

ולכן מרציפות f נובע ש- $N \rightarrow \infty$ גורר $I_i = \int_{\gamma_i} g(z) dz$

כאשר N מספיק קטן I_i שואף לקירוב הפוליגוני של γ ולכן משפט קושי למשולשים (אותו אנו יכולים להוכיח מחדש) תקף ונובע ש- $I_i \rightarrow 0$, ולכן $\int_{\gamma_i} g(z) dz \rightarrow 0$ לכל $0 \leq i < n$ וכן $I \rightarrow 0$ כלומר $I = 0$ כמבוקש. \square

סעיף ד'

נשתמש בהגדרת הגבול ונוכיח כי f אנליטית ב- $B(0, r)$ כך ש- $f' = g$.

הוכחה.

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\int_{[0, z_0]} g(w) dw - \int_{[0, z]} g(w) dw}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\int_{[z, z_0]} g(w) dw}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \int_{[z, z_0]} \frac{g(w)}{z - z_0} dw \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 \frac{g(\gamma(t)) \cdot (z - z_0)}{z - z_0} dt \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 g(\gamma(t)) dt \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} g(z_0) - g(z - z_0) \\ &= g(z_0) \end{aligned}$$

\square

שאלה 5

תהי $K \subseteq \mathbb{C}$ קבוצה קמורה קומפקטית.

סעיף א'

לכל $\delta > 0$ תהי הקבוצה $K_\delta = \{z \in \mathbb{C} \mid d(z, K) < \delta\}$. נראה ש- K_δ קבוצה פתוחה וקמורה.

הוכחה. תהי נקודה $z \in K$, אז ברור ש- $z \in K_\delta^\circ$ מהגדרה, ואילו $z \in K_\delta \setminus K$ אז קיימת $w \in K$ כך ש- $d(z, w) < \delta$, ולכן נוכל לבנות כדור פתוח עם $d(z, w) - r < \delta$ ונקבל שהנקודה פנימית.

נעבור להוכחת הקמירות. תהינה שתי נקודות $z, z' \in K_\delta$, אז קיימות $w, w' \in K$ כך ש- $d(z, w), d(z', w') < \delta$. מקמירות K נסיק $[w, w'] \subseteq K$ ונרצה להראות שגם $[z, z'] \subseteq K_\delta$. תהי $t \in [0, 1]$ ולכן

$$\begin{aligned} d(z(1-t) + z't, [w, w']) &= \inf_{0 \leq s \leq 1} d(z(1-t) + z't, w(1-s) + w's) \\ &\leq \inf_{0 \leq s \leq 1} |z(1-t) + z't - (w(1-s) + w's)| \\ &\leq |(z-w)(1-t) + (z'-w')t| \\ &\leq |z-w|(1-t) + |z'-w'|t \\ &< \delta(1-t) + \delta t \\ &= \delta \end{aligned}$$

ומצאנו כי K_δ אכן קמורה. \square

סעיף ב'

נוכיח כי לכל קבוצה פתוחה $K \subseteq U \subseteq \mathbb{C}$ קיים $\delta > 0$ כך ש- $K_\delta \subseteq U$.

הוכחה. מידת לבג של השפה של K היא אפס ולכן קיים ϵ -כיסוי לשפה, ולכן גובה ישירות ש- $K_{\epsilon/2} \subseteq U$ ממשפטים רלוונטיים שהוכחו באינפי 3. \square

סעיף ג'

נאמר שפונקציה $f : K \rightarrow \mathbb{C}$ היא אנליטית אם קיימת קבוצה פתוחה $K \subseteq U \subseteq \mathbb{C}$ ופונקציה אנליטית $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbb{C}$ כך ש- $\tilde{f}|_K = f$. נסיק שלכל פונקציה f כזאת ניתן לבחור U כך של- \tilde{f} תהיה קיימת פונקציה קדומה.

הוכחה. ממשפט קושי לקבוצות קמורות אנו יודעים שקיימת קדומה $F : K \rightarrow \mathbb{C}$ כך ש- $F' = f$. עוד אנו יודעים ש- F' היא אנליטית ולכן ניתן לייצוג כטור חזקות בעל רדיוס התכנסות כלשהו המכסה את K , ונבחר מספר δ קטן מרדיוס זה, ולכן $\tilde{f}|_K = f$ ו- $\tilde{f} : K_\delta \rightarrow \mathbb{C}$ נגדיר $\tilde{F} = \tilde{f}$ ולכן $\tilde{F}|_K = F'$ רציפה ו- $\tilde{F} : K_\delta \rightarrow \mathbb{C}$ אנליטית. \square