

פתרון מטלה 04 – חשבון אינפיניטסמלי 3 (80415)

7 ביוני 2024



שאלה 1

נוכיח מהגדרה כי הפונקציות הבאות הן דיפרנציאביליות ונמצא את הדיפרנציאל שלהן.

סעיף א'

תהי $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ העתקה לינארית ו- $b \in \mathbb{R}^m$, ונבדוק את הפונקציה $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ המוגדרת על-ידי

$$f(x) = Tx + b$$

נבחין כי

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(x+v) - f(x) - Sv}{\|v\|} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{T(x+v) + b - Tx - b - Sv}{\|v\|} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{Tv - Sv}{\|v\|}$$

ונבחין כי עבור $S = T$ גבול זה אכן מתקיים, ולכן f דיפרנציאבילית בכל נקודה ונגזרתה T .

סעיף ב'

תהי $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי

$$g(x) = \|x\|^2 = \langle x, x \rangle$$

נבדוק את הגבול כאשר נגדיר את הנורמה להיות מכפלה פנימית:

$$\begin{aligned} \lim_{v \rightarrow 0} \frac{g(x+v) - g(x) - Tv}{\|v\|} &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\langle x+v, x+v \rangle - \|x\|^2 - Tv}{\|v\|} \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|x\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle x, v \rangle - \|x\|^2 - Tv}{\|v\|} \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|v\|^2 + 2\langle x, v \rangle - Tv}{\|v\|} \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \|v\| + \frac{2\langle x, v \rangle - Tv}{\|v\|} \end{aligned}$$

ונקבל כי הגבול מתקיים אילו $T = 2x$ ובהתאם $Tv = \langle x, v \rangle$.

שאלה 2

תהי פונקציה $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ונסמן ב- f_1, \dots, f_m את רכיביה. תהי $p \in \mathbb{R}^n$. נוכיח ש- f גזירה אם ורק אם כל הרכיבים שלה גזירים ב- p .

הוכחה. כיוון ראשון: נניח כי f גזירה ב- p ותהי T נגזרת שלה, לכן מתקיים

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|} = 0$$

אנו יודעים כי העתקות לינאריות משרות מהמטלה הקודמת ולכן נוכל לקבוע כי עבור העתקה לינארית $S : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ כי

$$\lim_{v \rightarrow 0} S\left(\frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|}\right) = 0 \implies \lim_{v \rightarrow 0} \frac{Sf(p+v) - Sf(p) - STv}{\|v\|} = 0$$

עתה נגדיר $S = \pi_i$ עבור $1 \leq i \leq m$ ונקבל

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f_i(p+v) - f_i(p) - (Tv)_i}{\|v\|} = 0$$

בפרט עבור $t \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(p + te_i) - f_i(p) - |t|(Te_i)_i}{|t|} = 0$$

והגדרת הנגזרת מתקיימת ונקבל $f'_i(t) = (Te_i)_i$

כיוון שני: נניח כי f_i גזירה לכל $1 \leq i \leq m$ ונסמן $T_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ נגזרת זו.

נגדיר $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ התעתקה לינארית המוגדרת על-ידי $Tv = (T_1v, T_2v, \dots, T_mv)^t$. עתה נבחן את הגבול

$$\begin{aligned} \lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|} &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|} \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{(f_1(p+v) - f_1(p) - T_1v, \dots, f_m(p+v) - f_m(p) - T_mv)^t}{\|v\|} \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \left(\frac{f_1(p+v) - f_1(p) - T_1v}{\|v\|}, \dots, \frac{f_m(p+v) - f_m(p) - T_mv}{\|v\|} \right)^t = (0, \dots, 0)^t \end{aligned}$$

התכנסות בנפרד בכלל האגפים על-פי הגדרות הנגזרות T_i וקיבלנו כי T דיפרנציאל של f ב- p .

□

שאלה 3

סעיף א'

נוכיח שאם $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ גזירה בנקודה $p \in \mathbb{R}^n$ אז היא רציפה ב- p .

הוכחה. נניח כי f גזירה ב- p וגזרתה T , לכן

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|} = 0$$

ואנו יודעים כי $\|v\| \xrightarrow{v \rightarrow 0} 0$ ולכן גם

$$\lim_{v \rightarrow 0} \|v\| \cdot \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|} = \lim_{v \rightarrow 0} f(p+v) - f(p) - Tv = 0$$

אבל אנחנו יודעים השיעור כי $Tv \xrightarrow{v \rightarrow 0} 0$ ולכן בהכרח

$$\lim_{v \rightarrow 0} f(p+v) - f(p) = 0$$

ונקבל בהתאם גם כי

$$\lim_{v \rightarrow p} f(v) = f(p)$$

דהינו הפונקציה רציפה ב- p .

סעיף ב'

נוכיח כי אם $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ גזירות בנקודה p אז גם $f+g$ גזירה בנקודה זו ומתקיים $D(f+g)|_p = Df|_p + Dg|_p$.

הוכחה. נגדיר T, S גזירות f, g בהתאמה בנקודה p , לכן מתקיים

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|}, \lim_{v \rightarrow 0} \frac{g(p+v) - g(p) - Sv}{\|v\|}$$

ולכן נוכל לחבר את הגבולות ונקבל

$$\begin{aligned} \lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv}{\|v\|} + \frac{g(p+v) - g(p) - Sv}{\|v\|} &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(p+v) - f(p) - Tv + g(p+v) - g(p) - Sv}{\|v\|} \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{(f+g)(p+v) - (f(p) + g(p)) - (T+S)v}{\|v\|} = D(f+g)|_p = Df|_p + Dg|_p \end{aligned}$$

שאלה 4

סעיף א'

תהי $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת על-ידי

$$f(x, y, z) = (x^2 y^3 z^4, x^8 - \cos(xy))$$

נמצא את נגזרתה של f .

$$Df = \begin{pmatrix} 2xy^3z^4 & 8x^7 + y \sin(xy) \\ 3x^2y^2z^4 & x \sin(xy) \\ 4x^2y^3z^3 & 0 \end{pmatrix}$$

נשים לב כי f מוגדרת על-ידי פונקציות רציפות וגזירות ולכן גם היא רציפה וגזירה בכל תחומה.

סעיף ב'

נגדיר $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{n}{5}} \sin\left(\frac{y}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

נמצא את הערכים של $n \in \mathbb{N}$ עבורם הפונקציה גזירה ב- $(0, 0)$.

נתחיל במציאת Df ב- $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$\begin{aligned} Df &= \left(\frac{n}{5} x^{\frac{n}{5}-1} \sin\left(\frac{y}{x}\right) + x^{\frac{n}{5}} \cos\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{-y}{x^2}, x^{\frac{n}{5}} \cos\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= \left(\frac{n}{5} x^{\frac{n}{5}-1} \sin\left(\frac{y}{x}\right) - x^{\frac{n}{5}-1} y \cos\left(\frac{y}{x}\right), x^{\frac{n}{5}-1} \cos\left(\frac{y}{x}\right) \right) \end{aligned}$$

ועלינו למצוא ערכי n כך שהפונקציה רציפה באפס. נשים לב כי כלל איברי שני הביטויים הם מכפלה של $x^{\frac{n}{5}-1}$ והם ביטויים חסומים או אפסות (y) , ולכן מספיק שיתקיים $x^{\frac{n-5}{5}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

גבול זה כמובן מתקיים כל תנאי ש- $5 \neq n$, ולכן התנאי ההכרחי לגזירות f ב- $(0, 0)$ הוא $5 \neq n$.

שאלה 5

סעיף א'

זכוב נמצא בנקודה $p = (0, 0, 5)$ בחדר שהטמפרטורה בו נתונה על-ידי הפונקציה

$$T(x, y, z) = e^x + 2y + z^2 - 7z$$

נמצא את הווקטור אליו יעוף הזכוב כדי להתחמם.

נחשב תחילה את הגרדיאנט של T בנקודה.

$$DT = (e^x, 2, 2z - 7)$$

ובהתאם נציב ונקבל כי $\nabla p = (1, 2, 3)$.

לכן עלינו למצוא $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש- $\langle \nabla p, v \rangle > 0$, ונקבל $\{ \frac{1}{\sqrt{5t^2 + 2ts + 10s^2}}(-2t - 3s, t, s) \mid s, t > 0 \}$.
כדי להתחמם במהירות הגבוהה ביותר הזכוב יבחר את הכיוון $(0, 0, 1)$.

סעיף ב'

תהי נמלה המוכללת בשולחן המוגדר על-ידי $z = 5$, נחשב את הכיוון אליו היא צריכה ללכת כדי להתחמם.

נשים לב כי נוכל להשתמש בקבוצת הפתרונות מהסעיף הקודם ולהציב $s = 0$ ולקבל כי עליה ללכת בכיוון $(0, 1, 0)$ (כך היא אכן לא תצטרך לעוף, ואין סתירה לנתון כי היא איננה מעופפת).

נוכל כמובן גם להגדיר פונקציה חדשה על-ידי $3 + e^x + 2y = T(x, y, 5) = \tilde{T}(x, y)$ ונקבל עבורה $\nabla \tilde{T}p = (4, 5)$ ומכאן נסיק ישירות כי עליה ללכת בכיוון $(1, 0)$ או $(0, 1)$ או כל שילוב חיובי שלהם.

שאלה 6

נגדיר

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

סעיף א'

עבור כל $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ נראה שהנגזרת המכוונת $\partial_v f|_{(0,0)}$ קיימת ונחשב אותה.

$$\partial_v f|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0)}{\|tv\|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^3 a^3}{t^2(a^2+b^2)} - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 a^3 - 0}{t^3(a^2+b^2)} = \frac{a^3}{a^2+b^2}$$

ומצאנו כי הנגזרת המכוונת לכל כיוון ב- $(0, 0)$ מוגדרת.

סעיף ב'

נוכיח ש- f לא גזירה ב- $(0, 0)$.

הוכחה. נניח בשלילה ש- f גזירה בנקודה $(0, 0)$ ונניח כי T הנגזרת בנקודה.

בסעיף הקודם מצאנו נגזרת מכוונת ולכן נשתמש בה כדי למצוא את ערכי המטריצה מסדר 2×1 המייצגת את T .

תחילה נבדוק את $(0, 1)$, הצבתו בנגזרת המכוונת מציבה $\partial_{(0,1)} f|_{(0,0)} = 0$ ולכן $T(0, 1) = 0$.

עוד נקבל כי $\partial_{(1,0)} f|_{(0,0)} = 1$ ובהתאם $T(1, 0) = 1$ ונוכל להסיק כי $T = (1, 0)$.

נציב שוב עבור $(1, 1)$ ונקבל בהתאם $T(1, 1) = \frac{1}{2}$ בסתירה לזה שמצאנו כי $T(1, 1) = T(1, 0) + T(0, 1) = 1$.

נוכל אם כן להסיק שהעתקה זו לא קיימת ובהתאם f לא דיפרנציאבילית בנקודה.

□