

## פתרון מטלה 04 – תורת הקבוצות האקסיומטית, 80650

13 בדצמבר 2024



## שאלה 1

נניח ZFC, ונניח גם  $\kappa$  מונה רגולרי לא בן-מניה, נבחין כי מהמטלה הקודמת נובע  $H(\kappa^+)$  הוא מודל של ZFC – Power set.

יהי  $p \in H(\kappa^+)$ , נראה שקיים סל"ח  $\kappa \subseteq C$  כך שלכל  $\delta \in C$  קיים  $M \prec H(\kappa^+)$  כך ש- $p \in M$  וגם  $M \cap \kappa = \delta$ .

הוכחה. מצאנו בהרצאה כי קבוצת הנוסחות של תורת הקבוצות היא בת-מניה, נגדיר לכל נוסחה  $\varphi$  את פונקציית סקולם שלה  $f_\varphi$  שמצאנו שקיימת (שימוש בבחירה).

נבנה סדרה בת-מניה  $\langle G_n \mid n < \omega \rangle$  של פונקציות סקולם סגורה להרכבה, נבחין כי היא אכן סגורה להרכבה כהוכחה באינדוקציה על מבנה הפסוק.

נגדיר  $S(\alpha) = \{G_n(\gamma_0, \dots, \gamma_{m-1}, p) \mid n < \omega, \gamma_0, \dots, \gamma_{m-1} < \alpha\}$  ונבחין כי לכל  $\alpha < \kappa$  מתקיים  $S(\alpha) \prec H(\kappa^+)$  ממשפט 6.3.

נבחין כי  $|S(\alpha)| \leq \omega \times |\alpha| \leq \kappa$  ולכן גם  $|S(\alpha) \cap \kappa| = |S(\alpha)|$ , לכן נגדיר  $R(\alpha) = S(\alpha) \cap \kappa$  עדיין מגדיר תת-מודלים אלמנטריים.

עוד נראה כי לכל  $p \in R(\alpha)$  מהסגירות לנוסחות, ונגדיר.

לבסוף נגדיר  $h(\alpha) = \sup R(\alpha)$  וגם  $C = \text{rng } h$ , ונקבל ש- $\sup C = \kappa$  וכן ש- $C$  סגורה, זאת ישירות מההגדרה, ולכן מצאנו כי זהו סל"ח

המקיים את כל הנדרש.  $\square$

## שאלה 2

יהי  $M \prec N = H(\kappa^+)$  ויהיו  $a_0, \dots, a_{n-1} \in H(\kappa^+)$ .  
 נוכיח ש- $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \in M$  אם ורק אם  $\forall i < n, a_i \in M$ .  
 נראה גם שטענה זו לא בהכרח תתקיים עבור קבוצה בת־מניה של איברים.

*הוכחה.* נניח ש- $a = \{a_0, \dots, a_{n-1}\} \in M$ . נבחן את  $\varphi(x, y) = x \in y$ , ידוע ש- $N \models \varphi(a_i, a)$ , ולכן בפרט  $\exists x, \varphi(x, a)$  ומהשיכון הנתון גם  $M \models \exists x, \varphi(x, a)$ , אבל בהתאם  $N \models \varphi(x, a)$  ולכן  $x = a_i$  עבור  $0 \leq i < n$ , לכן  $M \models a_i \in a$ . נוכל להמשיך עתה בתהליך זה ולבנות  $n$  נוסחות ובכך נשלים  $M \models \forall i, a_i \in a$ .

נבחין כי תהליך זה בדיוק עלול להיכשל במקרים שאינם סופיים. למעשה, אנו יודעים כי קיים מודל  $|M| = \omega$  עבור  $H(\kappa^+)$  ולכן אם נבחר את  $\omega_1$  ונגדיר עם סעיף א' שהוא מוכל ב- $M$ , נקבל סתירה ל- $|M| = \omega$ .  $\square$

### שאלה 3

תהי  $\kappa \subseteq S$ , ונראה ש- $S$  קבוצת שבת אם ורק אם לכל  $p \in H(\kappa^+)$  קיים תת־מבנה אלמנטרי  $M \prec H(\kappa^+)$  כך ש- $p \in M$  וגם  $M \cap \kappa \in S$ .

הוכחה. נניח ש- $S$  קבוצת שבת ויהי  $p \in H(\kappa^+)$ .

עוד נגדיר  $C$  הסל"ח שקיים עבור  $p$  לפי שאלה 1, ויהי  $\delta \in C \cap S$ , אז קיים  $M \prec H(\kappa^+)$  עבורו  $p \in M$  וגם  $M \cap \kappa = \delta \in S$ .

נניח עתה כי לכל  $p \in H(\kappa^+)$  קיים תת־מבנה אלמנטרי  $M \prec H(\kappa^+)$  כך ש- $p \in M$  וגם  $M \cap \kappa \in S$  ונראה ש- $S$  קבוצת שבת. יהי סל"ח  $\kappa \subseteq C$  ויהי  $\alpha \in C$  סודר גבולי שסגור ב- $C$ . אז קיים בהתאם מודל  $M \prec H(\kappa^+)$ , נבנה סדרה לא חסומה ב- $M$  של  $\alpha$  על־ידי הגדרת נוסחות מהצורה  $\varphi(x, y) = x < y$ .

שימוש בפונקציות סקולם מתאימות ושימוש בתכונות ב- $H(\kappa^+)$  של  $\alpha$  יניב לנו סדרה עולה לא חסומה ב- $M$  של סודרים, ובהתאם נוכל להסיק

$$M \cap p \cap C = M \cap C$$

מצד שני  $M \cap \kappa \in S$  ולכן בפרט  $S \cap C \neq \emptyset$  ומצאנו כי  $S$  אכן קבוצת שבת.

□

## שאלה 4

יהי  $M \prec H(\kappa^+)$  כך ש- $M \cap \kappa = \delta \in C$ .  
 נוכיח שלכל  $C \in M$  סל"ח ב- $\kappa$ , מתקיים  $\delta \in C$ .

הוכחה. נבחין כי  $\delta \cap C = M \cap \kappa \cap C = M \cap C$ , ונבחן את  $\varphi(x, y) = \sup(x) = y$ , אנו יודעים כי  $\varphi(C, \kappa)$  מההגדרה של  $C$ .  
 נשים לב כי אם  $\kappa \in M$  אז  $\delta \in \delta$  בסתירה להנחה שלנו.

אם  $\sup(\delta \cap C) = \delta$  אז  $\delta \in C$  כפי שרצינו ולכן נניח אחרת, אבל אז בהכרח  $\sup(\delta \cap C) < \delta$  שכן אם  $\sup(\delta \cap C) > \delta$  זו תהיה סתירה לאקסיומת היסוד.

בנוסף מהשוויון שמצאנו נובע  $\sup(M \cap C) = \sup(\delta \cap C) < \delta$ , דהינו  $M \models \varphi(C, \alpha)$  עבור  $\alpha < \delta$  כלשהו.

אבל  $H(\kappa^+) \models \varphi(C, \alpha) \iff M \models \varphi(C, \alpha)$ , ו- $C$  סל"ח ולכן  $\sup C = \kappa$ , אז  $\alpha = \kappa$  וקיבלנו סתירה להנחה, לכן  $\delta \in C$ .  $\square$

## שאלה 5

תהי  $S \subseteq \kappa$  קבוצת שבת ותהי  $f : S \rightarrow \kappa$  פונקציה יורדת.

יהי  $\{f, S\} \in M$  ו- $M \cap \kappa = \delta \in S$  כך ש- $M \prec H(\kappa^+)$ .

נגדיר  $\gamma = f(\delta)$ , נוכיח ש- $X = \{\alpha \in S \mid f(\alpha) = \gamma\}$  היא קבוצת שבת ותת-קבוצה של  $\kappa$ .

נסיק שהלמה של פודור חלה.

*הוכחה.* אנו כבר יודעים מההגדרה ש- $X \subseteq \kappa$ , ונניח בשלילה שהיא לא קבוצת שבת, לכן קיים  $C \subseteq \kappa$  סל"ח, כך ש- $C \cap X = \emptyset$ .

ידוע ש- $\kappa \in M \cap \kappa \implies M \cap \kappa = \delta \in S \subseteq \kappa$  ולכן תנאי השאלה הקודמת חלים ומתקיים  $\delta \in C$ .

$f(\delta) = \gamma$  ולכן  $\delta \in X$  ובהתאם  $\delta \in X \cap C \neq \emptyset$  בסתירה להנחת השלילה.

□