

פתרון ממ"ן 12 – חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475)

25 ביולי 2023



שאלה 1

את הפונקציה $f(x) = \ln x$ מקרבים בקטע $I = [e^2 - 1, e^2 + 1]$ על-ידי הפולינום

$$P(x) = \frac{1}{2} + \frac{2x}{e^2} - \frac{x^2}{2e^4}$$

נראה כי

$$|f(x) - P(x)| < \frac{1}{3(e^2 - 1)^3}$$

לכל $x \in I$

$$\ln x = \ln(e^2 e^{-2} x) = \ln(e^{-2} x) + 2 = \ln((e^{-2} x - 1) + 1) + 2$$

נראה כי

$$t = \frac{x}{e^2} - 1$$

לכן נגדיר

$$\ln x = g(t) = \ln(t + 1) + 2$$

אז מההגדרה נובע

ידוע כי $x \in [e^2 - 1, e^2 + 1]$ ולכן

$$e^2 - 1 \leq x \leq e^2 + 1$$

$$e^2 - 1 \leq e^2(t + 1) \leq e^2 + 1$$

$$1 - e^{-2} \leq t + 1 \leq 1 + e^{-2}$$

$$-1 < -e^{-2} \leq t \leq e^{-2} < 1$$

דהינו $t \in (-1, 1)$ ולכן על-פי פיתוח טיילור של $\ln(t + 1)$ בתחום $(-1, 1)$ אשר מוגדר בעמוד 65 כרך ב' פולינום טיילור מסדר 2 של $g(t)$ הוא

$$P_2(t) = g(0) + t - \frac{1}{2}t^2 = 2 + \frac{x}{e^2} - 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{e^2} - 1\right)^2 = 1 + \frac{x}{e^2} - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{e^4} - \frac{2x}{e^2} + 1\right) = \frac{1}{2} + \frac{2x}{e^2} - \frac{x^2}{2e^4} = P(x)$$

לכן על-פי הגדרת השארית

$$R_2(t) = g(t) - P_2(t)$$

על-פי דוגמה 4.4 לכל $t \in (-1, 1)$ מתקיים

$$|R_2(t)| < \frac{|t|^3}{1 - |t|} = \frac{\left(\frac{x}{e^2} - 1\right)^3}{\frac{x}{e^2}} = \frac{(x - e^2)^3}{xe^4}$$

מחקירת הפונקציה עולה כי היא מקבלת מקסימום ב- $x = e^2 + 1$ ולכן

$$|R_2(t)| = |f(x) - P(x)| < \frac{(e^2 + 1 - e^2)^3}{(e^2 + 1)e^4} = \frac{1}{e^6 + e^4}$$

ניתן לבדוק ולראות כי מתקיים לכל $x \in [e^2 - 1, e^2 + 1]$

$$|f(x) - P(x)| < \frac{1}{3(e^2 - 1)^3}$$

שאלה 2

תהי $f(x)$ פונקציה גזירה $n + 1$ פעמים בקטע $[a, b]$ ו- $f^{(n+1)}(x)$ רציפה ב- $[a, b]$.

נקבע נקודה $x_0 \in [a, b]$ ונסמן ב- $R_n(x)$ את השארית מסדר n של f ב- x_0 .

נוכיח כי לכל $x \in [a, b]$

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

הוכחה. נגדיר $P_i(x)$ פיתוח טיילור של $f(x)$ סביב x_0 . נשים לב כי הפונקציה $f(x)$ עומדת בכל הדרישות לפיתוח זה עבור $0 \leq i \leq n$.

נוכיח באינדוקציה את הטענה:

בסיס האינדוקציה: מהמשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי נובע כי

$$\int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x) - f(x_0) = f(x) - P_0(x) = R_0(x)$$

ומצאנו כי הטענה נכונה עבור $n = 0$.

מהלך האינדוקציה: נניח כי הטענה נכונה עבור $0 < i \leq n$, לכן מתקיים

$$f(x) = P_i(x) + \frac{1}{i!} \int_{x_0}^x f^{(i+1)}(t)(x-t)^i dt$$

עבור הביטוי נבצע אינטגרציה בחלקים, כאשר

$$u = f^{(i+1)}(t)$$

$$dv = (x-t)^i$$

$$du = f^{(i+2)}(t) dt$$

$$v = -\frac{1}{i+1} (x-t)^{i+1}$$

ולכן

$$\begin{aligned} A &= \int_{x_0}^x u(t)v(t) dt \\ &= -\frac{1}{i+1} f^{(i+1)}(t)(x-t)^{i+1} \Big|_{x_0}^x \\ &= -\frac{1}{i+1} f^{(i+1)}(x)(x-x)^{i+1} + \frac{1}{i+1} f^{(i+1)}(x_0)(x-x_0)^{i+1} \\ &= \frac{1}{i+1} f^{(i+1)}(x_0)(x-x_0)^{i+1} \\ f(x) &= P_i(x) + \frac{1}{i!} \left(A - \frac{1}{i+1} \int_{x_0}^x (-1) f^{(i+2)}(t)(x-t)^{i+1} dt \right) \\ &= P_i(x) + \frac{1}{(i+1)!} \left(f^{(i+1)}(x_0)(x-x_0)^{i+1} + \int_{x_0}^x f^{(i+2)}(t)(x-t)^{i+1} dt \right) \\ &= P_{i+1}(x) + \frac{1}{(i+1)!} \int_{x_0}^x f^{(i+2)}(t)(x-t)^{i+1} dt \end{aligned}$$

והשלמנו את מהלך האינדוקציה.

מש"ל

שאלה 3

נשתמש בפיתוח מקלורן ונחשב את הגבולות הבאים:

סעיף א'

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - (x + 1)}{\tan x - \sin x} \quad (1)$$

נגזור ונחשב פולינומים עבור חלקי הביטוי

$$f(x) = e^x \cos x, f'(x) = e^x \cos x - e^x \sin x, f''(x) = -2e^x \sin x, f^{(3)}(x) = -2e^x (\sin x + \cos x)$$

ונחשב

$$f(0) = 1, f'(1) = 1, f''(0) = 0, f^{(3)}(0) = -2$$

ולכן ערך המכנה הוא

$$e^x \cos x - (x + 1) = 1 + x - 2\frac{1}{3!}x^3 + R_3(x) - x - 1 = -\frac{1}{3}x^3 + R_3(x)$$

נגזור את הביטוי

$$g(x) = \tan x - \sin x, g'(x) = \cos^{-2}(x) - \cos x,$$

$$g''(x) = 2 \sin x \cos^{-3}(x) + \sin x, g^{(3)}(x) = 2(\cos^{-2}(x) + -3 \sin^2 x \cos^{-4}(x)) + \cos x$$

ונחשב

$$g(0) = 0, g'(0) = 0, g''(0) = 0, g^{(3)}(0) = 3$$

ולכן מכנה הביטוי מקיים

$$\tan x - \sin x = \frac{1}{2}x^3 + S_3(x)$$

ולכן על-פי משפט 4.7 גבול (1) שקול לגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + R_3(x)}{\frac{1}{2}x^3 + S_3(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\frac{x^3}{x^3} + \frac{R_3(x)}{x^3}}{3\frac{x^3}{x^3} + \frac{S_3(x)}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 + 0}{3 + 0} = -\frac{2}{3}$$

סעיף ב'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2 + 1) + \ln(n^2 - 1) - 4 \ln n}{1 - \cos(1/n^2)} \quad (2)$$

נחשב

$$\ln(n^2 + 1) + \ln(n^2 - 1) - 4 \ln n = \ln\left(\frac{n^4 - 1}{n^4}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{n^4}\right)$$

ידוע כי $n > 0$ ולכן הביטוי $1 - n^{-4} < 1$, אז ניתן להשתמש בפיתוח מקלורן עבור $\ln(x + 1)$ לערכים בתחום.

בהתאם לכך מתקיים

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n^4}\right) = -\frac{1}{n^4} - \frac{1}{2n^8} + R_2(x)$$

נבחן את המכנה:

ולכן