יסודות באלגברה קומוטטיבית — סיכום

25 באוקטובר 2026



תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 18.10.2026 **3**

1.1 מבוא . . . 3

1.2 פעולות בסיסיות בחוגים . . . 3

1.3 יחידות . . . 4

2 שיעור 2 — 20.10.2026 **5**

2.1 יחידות — המשך . . . 5

2.2 מחלקי אפס . . . 5

2.3 אידאלים . . . 5

2.4 חוגי מנה . . . 7

2.5 הומומורפיזמים . . . 8

3 שיעור 3 — 25.10.2026 **10**

3.1 משפטי האיזומורפיזם — המשך . . . 10

3.2 אידאלים ראשוניים . . . 10

1 שיעור 1 — 18.10.2026

אלגברה קומוטטיבית היא למעשה התורה של חוגים חילופיים (commutative). היסטורית האלגברה הקומוטטיבית קיימת עבור תורת המספרים, הגאומטריה האלגברית ותורת האינווריאנטים אליה לא ניכנס.

1.1 מבוא

המושג הראשי שעליו נדבר בקורס הוא חוג חילופי (commutative ring), אובייקט הדומה לשדה אך ללא חילוק, ואידאל (ideal), המקבילה של תורת החוגים עבור תת־החבורה בתורת החבורות. נעסוק גם במודול (module), המקבילה של מרחב וקטורי אך מעל חוג סקלרים במקום שדה סקלרים.

הקורס מבוסס בעיקר על הספר של Atiyah Macdoald שנקרא Introduction to commutative algebra, פרקים 1 עד 10.

הגדרה 1.1 (חוג) הוא קבוצה עם שתי פעולות בינאריות, $(A,+:A\times A\to A,\cdot:A\times A\to A)$ המקיים את התכונות:

1. $(A,+)$ הוא חבורה חילופית, כלומר אסוציאטיבית, בעלת איבר נייטרלי (נסמן 0) ולכל איבר יש איבר נגדי ביחס לפעולה
2. חוק הקיבוץ בכפל: לכל $a,b,c\in A$ מתקיים $a(bc)=(ab)c$
3. קיום איבר נייטרלי ביחס לכפל: קיים איבר $1\in A$ כך ש־$1\cdot a=a\cdot 1=a$ לכל $a\in A$
4. חלוק הפילוג (distributivity): לכל $a,b,c\in A$ מתקיים $(a+b)c=ac+bc$ וכן $a(b+c)=ab+ac$

הערה האיבר הנייטרלי ביחס לכפל הוא יחיד, זאת שכן,

$$1'=1\cdot 1'=1$$

סימון 1.2 ההופכי ביחס לחיבור יסומן $-a$, ובהתאם $a-b=a+(-b)$.

הגדרה 1.3 (חוג חילופי) חוג $(A,+,\cdot)$ נקרא חילופי (commutative) יש חילופיות גם ביחס לכפל, כלומר,

$$\forall a,b\in A,\ a\cdot b=b\cdot a$$

הערה חילופיות החיבור נובעת משאר התכונות. זאת שכן,

$$(a+b)(1+1)=(a+b)1+(a+b)1=a\cdot 1+b\cdot 1+a\cdot 1+b\cdot 1=a+b+a+b$$

אבל מהצד השני,

$$(1+1)(a+b)=a+a+b+b$$

$(A,+)$ היא חבורה ולכן נוכל לצמצם ולקבל בדיוק ש־$a+b=b+a$.

הערה מקיבוציות הכפל נובע שמכפלה $a_1\cdot a_k$ אינה תלויה בהצבת סוגריים, ולכן מותר להשמיט את הסוגריים.

דוגמה 1.1 חוג השלמים $\mathbb{Z}$ עם פעולות הכפל והחיבור הסטנדרטיות הוא חוג חילופי.

דוגמה 1.2 לכל שדה $\mathbb{F}$, $(\mathbb{F},+,\cdot)$ הוא חוג חילופי גם כן.

דוגמה 1.3 חוג המטריצות $A=M_n(\mathbb{F})$, כלומר המטריצות מעל $\mathbb{F}$ מגודל $n\times n$ כאשר $1_A=I_n$ ו־$0_A=0$. זהו חוג שחילופי אם ורק אם $n=1$. נבחין גם כי במקום שדה $\mathbb{F}$ יכולנו לבחור חוג כללי.

דוגמה 1.4 חוג הפולינומים, יהי $\mathbb{F}$ שדה, נסמן את $\mathbb{F}[x]$ להיות אוסף הפולינומים במשתנה x עם מקדמים ב־$\mathbb{F}$, וזהו חוג חילופי.

דוגמה 1.5 החוג הטריוויאלי: יהי A יחידון, אז נגדיר את $+,\cdot$ טריוויאלית ונקבל ש־$(A,+,\cdot)$ הוא חוג חילופי. בחוג זה אף מתקיים $1_A=0_A$, וזוהי תכונה המאפיינת ביחידות חוג זה, כלומר אם $0=1$ אז מתקיים,

$$a=a(1+0)=a(1+1)=a+a$$

כלומר $a=0$ לכל $a\in A$.

1.2 פעולות בסיסיות בחוגים

יהי $(A,+,\cdot)$ חוג.

הגדרה 1.4 (חזקה) אם $n \in \mathbb{N}$ ו־$a \in A$ אז נגדיר,

$$a^n = \overbrace{a \cdots a}^{n \text{ times}}$$

טענה 1.5 (תכונות חזקה) *לכל $n, m \in \mathbb{N}$ ו־$a, b \in A$ מתקיים,*

1. $a^{n+m} = a^n a^m$
2. *אם A חילופי אז גם,*

$$(ab)^n = a^n b^n$$

הגדרה 1.6 (הכפלה במספר שלם) אם $n \in \mathbb{N}$ ו־$a \in A$ אז נגדיר את,

$$na = \begin{cases} \overbrace{a + \cdots + a}^{n\text{times}} & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ \overbrace{(-a) + \cdots + (-a)}^{n\text{times}} & n < 0 \end{cases}$$

לכפל בשלם יש אסוציאטיביות.

1.3 יחידות

הגדרה 1.7 (איבר הפיך) $a \in A$ נקרא הפיך (invertible) או יחידה (unit) אם קיים $b \in A$ כך שמתקיים $ab = ba = 1$. במקרה זה נאמר ש־b הוא ההופכי של a ונסמן $b = a^{-1}$.

סימון 1.8 נסמן את קבוצת ההפיכים על־ידי,

$$A^\times = \{a \in A \mid a \text{ is invertible}\}$$

סימון מקובל נוסף הוא A^*.

טענה 1.9 *$A^\times$ חבורה ביחס לכפל.*

הוכחה. נבדוק ש־$A^\times$ סגור ביחס לכפל. אם $a, b \in A^\times$ אז קיימים $a', b' \in A^\times$ המקיימים $aa' = bb' = 1$. מתקיים,

$$(ab)(b'a') = abb'a' = aa' = 1$$

וכן באופן דומה נקבל זאת עבור כפל הפוך, לכן $ab \in A^\times$. בהתאם נובע שכפל הוא פעולה בינארית על $A^\times$, וכן ברור כי $1 \in A^\times$ נייטרלי וכן שלכל $a \in A^\times$ גם $a' \in A^\times$. □

לחבורה $A^\times$ קוראים גם החבורה הכפלית של החוג (multiplication group).

2 שיעור 2 — 20.10.2026

2.1 יחידות — המשך

דוגמה 2.1 נניח ש־$A = \mathbb{Z}$. אם $m, n \in \mathbb{Z}$ ו־$mn = 1$ אז $m = n = \pm 1$ ולכן $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

דוגמה 2.2 אם $A = \mathbb{F}$ שדה כלשהו, אז $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$.
בכיוון ההפוך אם A חוג חילופי המקיים $A^\times = A \setminus \{0\}$ אז A הוא שדה.

דוגמה 2.3 במקרה $A = M_n(\mathbb{F})$ עבור שדה $\mathbb{F}$ אז מתקיים,

$$A^\times = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid \det A \neq 0$$

זוהי חבורה מוכרת ומסומנת לרוב $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ (General Linear).

דוגמה 2.4 אם $A = \mathbb{F}[x]$ שדה פולינומים פורמליים במשתנה x מעל השדה $\mathbb{F}$, ונניח ש־$f, g \in \mathbb{F}[x]$ מקיימים $fg = 1$. ידוע כי $\deg fg = \deg f + \deg g$ בכל חוג פולינומים ולכן נובע שבמקרה שלנו $\deg f + \deg g = \deg 1 = 0$ וכן $f, g \neq 0$ ולכן $\deg f = \deg g \geq 0$. נסיק ש־$\deg f = \deg g = 0$, כלומר אלו הם ערכים קבועים שונים מאפס, כלומר $\mathbb{F}[x]^\times = \mathbb{F}^\times$.

הערה תמיד נזהה איברים מ־$\mathbb{F}$ עם פולינומים קבועים, כלומר $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{F}[x]$.

2.2 מחלקי אפס

הגדרה 2.1 (מחלק אפס) יהי A חוג חילופי. איבר $a \in A$ נקרא מחלק אפס (zero divisor) אם קיים $0 \neq b \in A$ כך ש־$ab = 0$.

הערה תמיד מתקיים $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ בכל חוג, זאת שכן,

$$a \cdot 0 = a(1 - 1) = a \cdot 1 - a \cdot 1 = a - a = 0$$

תרגיל 2.1 הראו כי בכל חוג A מתקיים,

$$a - a = 0 \qquad a(b - c) = ab - ac \qquad (a - b)c = ac - bc$$

לכל $a, b, c \in A$.

דוגמה 2.5 הראו כי אם $a \in A$ מחלק אפס ו־$b \in A$ איבר כלשהו אז ab מחלק אפס.

הגדרה 2.2 (תחום שלמות) חוג חילופי A נקרא תחום שלמות (integral domain) או בקיצור תחום, אם $A \neq \{e\}$ וכן אין ב־A מחלקי אפס.

נעבור לדוגמות למחלקי אפס.

דוגמה 2.6 אם A חוג לא טריוויאלי אז 0 הוא מחלק אפס, שכן $1 \cdot 0 = 0$.

דוגמה 2.7 אם $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ אז $2, 3$ מחלקי אפס שכן $(2 + 6\mathbb{Z}) \cdot (3 + 6\mathbb{Z}) = 0 + 6\mathbb{Z}$.

דוגמה 2.8 $\mathbb{Z}, \mathbb{F}, \mathbb{F}[x]$ לכל שדה $\mathbb{F}$ הם תחומי שלמות.

אך כמובן $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ אינו תחום שלמות.

2.3 אידאלים

באלגברה קומוטטיבית נהוג לסמן $A \subset B$ להכלה או שוויון ו־$A \subsetneq B$ עבור הכלה ממש.

סימון 2.3 אם $X, Y \subset A$ תת־קבוצות של חוג A אז נסמן,

$$X \pm Y = \{x \pm y \mid x \in X, y \in Y\}, \quad X \cdot Y = \{xy \mid x \in X, y \in Y\}$$

וכן לכל $a \in A$ גם,

$$aX = \{ax \mid x \in X\}, \quad Xa = \{xa \mid x \in X\}$$

ולבסוף $-X = \{-x \mid x \in X\} = (-1) \cdot X$.

הגדרה 2.4 (אידאל) תת־קבוצה $I \subset A$ תיקרא אידאל (Ideal) אם מתקיים:

1. I תת־חבורה של A ביחס לחיבור
2. $IA = AI = I$, כלומר לכל $b \in I$ ו־$a \in A$ מתקיים $ab, ba \in I$

סימון 2.5 אם $I \subset A$ אידאל אז נסמן $I \triangleleft A$.

הערה כדי לבדוק ש־$I \subset A \neq \emptyset$ אידאל מספיק לבדוק ש־I סגורה לחיבור ($I + I \subset I$),
וכן שיש סגירות לכפל באיברי A ($IA, AI \subset I$).

נבחין כי $0 = 0 \cdot a \in I$ לכל $a \in A$ וכן $-a = (-1) \cdot a \in I$ ולכן $(I, +)$ תת־חבורה.
בנוסף $IA = I, AI = I$ שכן $I = I \cdot 1 \subset IA$.
נבחין כי I לא בהכרח חוג כי אין לו בהכרח יחידה כפלית.

דוגמה 2.9 אם A חוג כלשהו אז $I = \{0\}$ הוא אידאל האפס.
אידאל היחידה או האידאל הטריוויאלי הוא $I = A$.

מסקנה 2.6 אידאל הוא טריוויאלי אם ורק אם $1 \in I$.

דוגמה 2.10 נגדיר,

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{F} \right\}$$

עבור $\mathbb{F}$ שדה אז מתקיים,

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{F} \right\}$$

הוא אידאל של A, כלומר $I \triangleleft A$.

דוגמה 2.11 אם X קבוצה ו־$A = \mathbb{R}^{\times} = \{f : X \to \mathbb{R}\}$ ונגדיר את הפעולות $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ אז $(fg)(x) = f(x)g(x)$ הוא חוג.
יהי $x_0 \in X$ ונגדיר,

$$I = \{f \in A \mid f(x_0) = 0\}$$

אז $I \triangleleft A$.

דוגמה 2.12 עבור $A = \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N} \cup \{0\} = \mathbb{N}_0$ מתקיים $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$. מתקיים $n\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ וכן $a(n\mathbb{Z}) = (an)\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$.
בכיוון ההפוך כל $I \triangleleft \mathbb{Z}$ הוא מהצורה הזו כי כל תת־החבורות של $\mathbb{Z}$ הן מהצורה הזו.

הגדרה 2.7 (אידאל שמאלי וימני) יהי A חוג. אידאל שמאלי ב־A הוא תת־קבוצה $I \subset A$ כך ש־$(I, +)$ היא תת־חבורה וכן $AI = I$. אידאל ימני הוא זהה אך ש־$IA = I$ במקום. כלומר אידאל שמאלי סגור לכפל משמאל ואידאל ימני סגור לכפל מימין.

אידאל שמאלי שהוא גם ימני נקרא לעתים אידאל דו־צדדי. בחוגים חילופיים כל ההגדרות הללו שקולות.

נעבור לפעולות על אידאלים.

טענה 2.8 *יהי A חוג ויהיו $I_\alpha \triangleleft A$ אוסף אידאלים עבור $\alpha \in T$. אז גם $I = \bigcap_{\alpha \in T} I_\alpha \triangleleft A$.*

טענה 2.9 *יהיו $I_1, \ldots, I_k \triangleleft A$ אידאלים עבור $k \in \mathbb{N}$. אז גם $I = \sum_{i=1}^{k} I_i = \{a_1 + \cdots + a_k \mid a_i \in I_i\} \triangleleft A$.*

הוכחה. תרגיל. □

טענה 2.10 *חיבור אידאלים נכון גם במקרה האינסופי, כלומר אם T קבוצת אינדקסים ו־$I_\alpha \triangleleft A$ לכל $\alpha \in T$ אז גם $I = \sum_{\alpha \in T} I_\alpha \triangleleft A$. כאשר אנו מגדירים זאת עם סכימות של תת־קבוצות סופיות.*

דוגמה 2.13 עבור $A = \mathbb{Z}$ וכן $I_i = n_i\mathbb{Z}$ מתקיים,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} I_i = \operatorname{lcm}\{n_i \mid i \in T\}\mathbb{Z}, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} I_i = \gcd\{n_i \mid i \in T\}\mathbb{Z}$$

עתה נעבור לדון במקרה שבו A אידאל חילופי.
הערה במקרה זה כדי לבדוק ש־$I \subset A \neq \emptyset$ אידאל מספיק לבדוק ש־$I + I \subset I, AI \subset I$, כלומר השמטנו בדיקה של כפל בשני הכיוונים.

הגדרה 2.11 (אידאל נוצר) תהי $S \subset A$ תת־קבוצה. נגדיר את האידאל הנוצר על־ידי S ב־A על־ידי,

$$(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} a_i s_i \mid a_i \in A, s_i \in S, k \in \mathbb{N} \right\}$$

טענה 2.12 *(S) הוא אכן אידאל, וכן כל אידאל של A המכיל את S מכיל גם את (S).*

הוכחה. יהיו $a = \sum_{i=1}^{k} a_i s_i, b = \sum_{i=1}^{l} b_i s_i \in (S)$. אז $a + b \in (S)$ על־ידי הסכום של $(a_i + b_i)s_i$. בנוסף לכל $c \in A$ נקבל $ca = \sum_{i=1}^{k} (ca_i)s_i \in (S)$ ולכן $(S) \triangleleft A$.

לחלק השני יהי $S \subset I \triangleleft A$. לכל $a_1, \ldots, a_k \in A, s_1, \ldots, s_k \in S$ מתקיים $a_i \in A, s_i \in S \subset I$. לכן,

$$a_i s_i \in I \implies \sum a_i s_i \in I.$$

ולכן נובע ש־$(S) \subset I$. □

סימון 2.13 נסמן $(\{a_1, \ldots, a_n\}) = (a_1, \ldots, a_n)$ ובפרט $(\{a\}) = (a) = Aa$.

תרגיל 2.2 הראו כי $(a_1, \ldots, a_n) = Aa_1 + \cdots + Aa_n$.

הגדרה 2.14 (אידאל ראשי) לכל A חוג, אידאל הנוצר על־ידי איבר אחד, כלומר $I = (a)$ עבור $a \in A$, אז נאמר ש־I אידאל ראשי (principal ideal).

דוגמה 2.14 בחוג $\mathbb{Z}$ כל אידאל הוא מהצורה $(n) = n\mathbb{Z}$ ולכן ראשי.

טענה 2.15 *אם $I, J \triangleleft A$ אידאלים וכן,*

$$K = IJ = \{ \sum_{i=1}^{k} a_i b_i \mid a_i \in I_i, b_i \in J_i, k \in \mathbb{N} \}.$$

אז $K \triangleleft A$.

הוכחה. תרגיל. □

דוגמה 2.15 אם $I = (a)$ ו־$J = (b)$ אז $IJ = (ab)$.

נבחין כי IJ איננה מכפלת הקבוצות I ו־J, בדרך־כלל אם אנו כופלים אידאלים הכוונה היא לפעולה של כפל אידאלים.

2.4 חוגי מנה

בהינתן חוג A ואידאל $I \triangleleft A$ נרצה להגדיר את חוג המנה A/I. A הוא חילופי ביחס לחיבור ולכן $I \leq A$ תת־חבורה נורמלית ביחס לחיבור. נגדיר את,

$$R = A/I = \{a + I \mid a \in A\}.$$

אם פעולת החיבור $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$ היא חבורה, עתה נרצה להגדיר כפל ולהפוך אותה לחוג.

סימון 2.16 נסמן $\bar{a}$ עבור $a + I$.

בהתאם מתקיים $\bar{a} = \bar{b}$ אם ורק אם $a - b \in I$. סימון נוסף הוא $a \equiv b \mod I$.

טענה 2.17 *עבור $\bar{a}, \bar{b} \in R$ הפעולה $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{ab}$ מוגדרת היטב וכן $(R, +, \cdot)$ חוג.*

הוכחה. נבחר נציגים $a - a' \in I$ וכן $b - b' \in I$ ונראה כי $ab - a'b' \in I$.

$$ab - a'b' = a\overbrace{(b - b')}^{\in I} + \overbrace{(a - a')}^{\in I} b' \in I.$$

בהתאם באמת מצאנו שהפעולה מוגדרת היטב עבור חבורת המנה.

החלק של בדיקת הגדרות החוג עבור $(R, +, \cdot)$ מושארת כתרגיל. □

הגדרה 2.18 (חוג מנה) עבור $I \triangleleft A$ חוג ו־A נקרא חוג המנה (quotient ring) של A ב־I.
$R = A/I$
ההעתקה $\pi : A \to A/I$ המוגרת על־ידי,

$$\pi(a) = \bar{a} = a + I \in R.$$

נקראת העתקת המנה ביחס לאידאל I.

דוגמה 2.16 אם $A = \mathbb{Z}$ וכן $I = n\mathbb{Z}$ כאשר $n \in \mathbb{N}_0$ אז,

$$A/I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

חוג שאריות מודולו n.

2.5 הומומורפיזמים

הגדרה 2.19 (הומומורפיזם חוגים) יהיו A, B חוגים. פונקציה $\varphi : A \to B$ נקראת הומומורפיזם חוגים אם היא מקיימת את התכונות הבאות:

1. $\varphi : (A, +) \to (B, +)$ הומומורפיזם של חבורות, כלומר $\varphi(0_A) = 0_B$ וכן $\varphi(a \pm b) = \varphi(a) \pm \varphi(b)$ לכל $a, b \in A$
2. $\varphi(1_A) = 1_B$
3. פעולת הכפל משומרת, כלומר לכל $a, b \in A$ מתקיים $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot_B \varphi(b)$

כאשר אנו יודעים כי הומומורפיזם הוא הומומורפיזם חוגים לעתים נשמיט את המילה חוגים.

דוגמה 2.17 אם A חוג ו־$I \triangleleft A$ אידאל אז העתקת המנה $\pi : A \to A/I$ היא הומומורפיזם.

דוגמה 2.18 נגדיר את $\varphi : \mathbb{C} \to M_2(\mathbb{R})$ על־ידי,

$$\varphi(a + bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

על־ידי בדיקה פשוטה נקבל שזהו הומומורפיזם.

הגדרה 2.20 (איזומורפיזם חוגים) הומומורפיזם חוגים נקרא איזומורפיזם חוגים אם הוא פונקציה הפיכה, ובמקרה זה גם הפונקציה ההופכית היא איזומורפיזם חוגים.

סימון 2.21 נסמן איזומורפיזם על־ידי $\varphi : A \xrightarrow{\sim} B$.

הגדרה 2.22 (חוגים איזומורפיים) חוגים A, B יקראו איזומורפיים אם קיים $\varphi : A \xrightarrow{\sim} B$ ביניהם.

הגדרה 2.23 (גרעין) הגרעין של הומומורפיזם $\varphi : A \to B$ מוגדר להיות,

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{0_B\}) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0\}.$$

טענה 2.24 *אם $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם אז $\ker \varphi \triangleleft A$.*

הוכחה. מתורת החבורות ידוע שהגרעין הוא תת־חבורה חיבורית של A. נשאר אם כן ש־$I = \ker \varphi$ סגור לכפל ב־A. יהי $a \in A$ ו־$b \in I$, אז,

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(a) \cdot 0_B = 0.$$

ולכן $ab \in I$. □

הגדרה 2.25 (תמונה) התמונה של הומומורפיזם $\varphi : A \to B$ היא,

$$\operatorname{Im} \varphi = \varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\}.$$

הגדרה 2.26 (תת־חוג) תת־חוג (sub-ring) של חוג A היא תת־קבוצה $B \subset A$ כך ש־B סגורה לחיבור, חיבור וכפל, וכן $1_A \in B$.

תרגיל 2.3 אם $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם של חוגים אז $\varphi(A) \subset B$ תת־חוג.

משפט 2.27 (האיזומורפיזם הראשון לחוגים) *יהי $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם חוגים, אז יש איזומורפיזם* $A/\ker \varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} \varphi$ על־ידי $a + \ker \varphi \mapsto \varphi(a)$.

הוכחה. מתורת החבורות נקבל שההעתקה הזו אכן מוגדרת היטב, ומהווה איזומורפיזם חבורות ביחס לפעולת החיבור. נשאר להראות שהיא שומרת

על כפל ו־1. יהיו $a, b \in A$ אז,

$$(a + \ker\varphi)(b + \ker\varphi) = ab + \ker\varphi \mapsto \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

ולכן קיבלנו שאכן הפעולה משמרת כפל.

בנוסף נבחין כי $1 + \ker\varphi$ הוא איבר היחידה של $A/\ker\varphi$ והוא נשלח ל־1_B ולכן $\varphi(1) = 1_B$ ולכן φ אכן איזומורפיזם חוגים. □

משפט 2.28 (ההתאמה לחוגים) *יהי A חוג ו־$I \triangleleft A$ אידאל, ונסמן $\pi : A \to A/I$ העתקת המנה. אז יש התאמה חד־חד ערכית ועל בין $\{I \subset J \triangleleft A\}$ ל־$\{K \triangleleft A/I\}$ המוגדרת על־ידי,*

$$J \mapsto \pi(J) = J/I.$$

לפני שניגש להוכחת המשפט נוכיח טענת עזר חשובה.

למה 2.29 *יהי $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם חוגים, אז,*

1. *אם $I \triangleleft B$ אז $\varphi^{-1}(I) \triangleleft A$*
2. *אם $I \triangleleft A$ וכן φ על אז $\operatorname{Im}\varphi \triangleleft B$*

הוכחה. החלק הראשון מושאר כתרגיל.

אנו יודעים כי $\varphi(I)$ תת־חבורה חיבורית של B, עלינו להראות שגם $B\varphi(I), \varphi(I)B \subset \varphi(I)$. מתקיים,

$$B\varphi(I) = \varphi(A)\varphi(I) = \varphi(AI) = \varphi(I).$$

כאשר המעבר הראשון נובע מהעובדה ש־φ על, והכיוון השני זהה. □

נחזור למשפט ההתאמה.

הוכחת המשפט. ידוע מתורת החבורות שההתאמה שתיארנו קיימת בין תת־חבורות חיבוריות $\{I \subset H \subset A\}$ לבין תת־חבורות $\{Q \subset A/I\}$. נותר להראות שההתאמה זו משמרת אידאלים. π היא על ולכן מטענת העזר נובע שאם $I \subset J$ אידאל אז $\pi(J)$ וכן אם $K \triangleleft A/I$ אז $\pi^{-1}(K) \triangleleft A$ כנדרש. □

הערה $\pi(J) = J/I$ הוא אידאל ב־A/I.

משפט 2.30 (האיזומורפיזם השלישי) *יהי A חוג ויהי $I \triangleleft A$ אידאל, וכן $I \subset J \triangleleft A$ אידאל נוסף. אז מתקיים,*

$$A/J \cong (A/I)/(J/I).$$

על־ידי המיפוי,

$$a + J \mapsto \pi(a) + J/I.$$

הוכחה. מתורת החבורות קיים איזומורפיזם כזה, וקל לבדוק שוב את התנאים הנוספים הנדרשים. □

3 שיעור 3 — 25.10.2026

3.1 משפטי האיזומורפיזם — המשך

נעבור לדבר על משפט האיזומורפיזם השני.

משפט 3.1 (האיזומורפיזם השני) *יהי A חוג, $B \subset A$ תת־חוג ו־$I \triangleleft A$ אידאל.*

1. *$I + B$ הוא תת־חוג של A*
2. *$B \cap I \triangleleft B$ וכן $I \triangleleft I + B$*
3. *$B/(I \cap B) \cong (I + B)/I$ נתון על־ידי $b + (I \cap B) \mapsto b + I$*

הוכחה. **1.** יהיו $a, b \in I + B$, אז ברור ש־$a \pm b \in I + B$. נסמן עבור $a = c + d, b = e + f$ ו־$c, e \in I$, $d, f \in B$, אז מתקיים,

$$ab = (c + d)(e + f) = \overbrace{ce + de + cf}^{\in I} + \overbrace{df}^{\in B} \in I + B.$$

וכן $1 = 1 + 0 \in I + B$ ולכן $I + B$ אכן תת־חוג.

2. ניתן לבדיקה ישירה.

3. מתורת החבורות ידוע שההעתקה הנתונה מוגדרת היטב ומהווה איזומורפיזם חבורות, ולכן מספיק לבדוק שהיא שומרת על כפל ויחידה (תרגיל).
□

3.2 אידאלים ראשוניים

באנגלית נקרא prime ideal, בהלק זה נניח ש־A הוא חוג **חילופי**.

הגדרה 3.2 (אידאל ראשוני) $P \triangleleft A$ נקרא אידאל **ראשוני** אם:

1. $P \neq A$, כלומר זהו אידאל ממש
2. לכל $a, b \in A$ אם $ab \in P$ אז או ש־$a \in P$ או ש־$b \in P$, כלומר המצב ההפוך לסגירות לכפל של האידאל

טענה 3.3 (תנאי שקול לאידאל ראשוני) *P הוא ראשוני אם ורק אם A/P תחום.*

הוכחה. נניח ש־A/P תחום, לכן $A/P \neq 0$, או באופן שקול $A \neq P$. בנוסף אם $a, b \in A$ כך ש־$ab \in P$ אז $\pi(ab) = 0$ עבור $\pi : A \to A/P$ העתקת המנה, ו־A/P תחום ולכן $\pi(a) = 0$ או $\pi(b) = 0$, כלומר $a \in P$ או $b \in P$ ולכן P ראשוני לפי ההגדרה.

הכיוון השני זהה. □

דוגמה 3.1 נגדיר $A = \mathbb{Z}$ חוג השלמים, ונבדוק עבור אילו טבעיים $n \in \mathbb{N}_0$ האידאל $(n) = n\mathbb{Z}$ הוא ראשוני.
אם $n = 0$ אז $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(0)$ וזהו תחום ולכן (0) ראשוני.
אם $n = 1$ אז $\mathbb{Z}/(1) \cong \{0\}$ וזהו אינו תחום ולכן (1) לא ראשוני.
נניח עתה ש־n מספר ראשוני, אז $\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{F}_p$ הוא שדה ובפרט תחום ולכן (n) ראשוני.
אם n מספר פריק גדול וגדול מ־1, אז קיימים $a, b > 1$ עבורם $n = ab$ אז גם $ab \in (n)$ אבל $a, b \notin (n)$ ולכן (n) לא ראשוני.
מצאנו שב־$\mathbb{Z}$ האידאלים הראשוניים הם אידאל האפס ו־(p) לכל p ראשוני.

הגדרה 3.4 (אידאל מקסימלי) יהי A חוג כלשהו (לא בהכרח חילופי), $M \triangleleft A$ נקרא אידאל **מקסימלי** אם הוא מתקיים:

1. $M \neq A$
2. לא קיים $A \neq I \triangleleft A$ כך ש־$M \subsetneq I$, או באופן שקול כל אידאל $M \subset I \triangleleft A$ מקיים $I = A$ או $I = M$

למה 3.5 *יהי $A \neq 0$ חוג חילופי, אז A שדה אם ורק אם כל האידאלים ב־A הם $(0), (1)$.*

הוכחה. יהי A שדה ויהי $A \triangleleft I$. אם $I = (0)$ אז סיימנו ולכן נניח ש־$I \neq 0$ ולכן קיים $a \in I$, אבל אז גם $1 = a \cdot a^{-1} \in I$ ולכן $I = (1)$.

בכיוון ההפוך נניח שכלל האידאלים הם $(0),(1)$ וכן ש־$0 \neq 1$ ונראה שכל $a \neq 0$ הפיך. $(0) \neq (a)$ ולכן $(a) = (1)$, כלומר $1 = ab$ ו־a בהתאם הפיך. □

טענה 3.6 *$M \lhd A$ מקסימלי אם ורק אם A/M שדה.*

הוכחה. M מקסימלי אם ורק אם כל האידאלים בין M ו־A הם בדיוק M, A ובנוסף $M \neq A$, ממשפט ההתאמה טענה זו שקולה לכך שכל האידאלים ב־A/M הם $(0),(1)$ והם שונים, וזוהי בדיוק הלמה אותה הוכחנו זה עתה. □

מסקנה 3.7 כל אידאל מקסימלי הוא ראשוני.

הוכחה. אם M מקסימלי אז A/M שדה ולכן בפרט A/M הוא תחום ולכן M ראשוני. □

נראה שטענה זו נכונה רק בכיוון הזה.

דוגמה 3.2 נבחן שוב את $A = \mathbb{Z}$ ונבחין כי (0) ראשוני אבל לא מקסימלי כי $(1) \neq (2) \subsetneq (0)$.
אם p מספר ראשוני אז נראה ש־(p) מקסימלי. אם $(1) \subsetneq (n) \subsetneq (p)$ אז $n \mid p$ וכן $n > 1$ וזו סתירה לראשיות של (p). נסיק שכל האידאלים ב־$\mathbb{Z}$ הם מהצורה (p) עבור p מספר ראשוני. נובע גם ש־$\mathbb{Z}/(p)$ הוא אכן שדה, וש־$\mathbb{F}_p$ שדה אם ורק אם p ראשוני.

משפט 3.8 (האידאל המקסימלי) *בכל $A \neq 0$ קיים אידאל מקסימלי. נקרא גם משפט Krull.*

הגדרות ומשפטים

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (חוג) 3
הגדרה 1.3 (חוג חילופי) 3
הגדרה 1.4 (חזקה) 4
טענה 1.5 (תכונות חזקה) 4
הגדרה 1.6 (הכפלה במספר שלם) 4
הגדרה 1.7 (איבר הפיך) 4
הגדרה 2.1 (מחלק אפס) 5
הגדרה 2.2 (תחום שלמות) 5
הגדרה 2.4 (אידאל) 5
הגדרה 2.7 (אידאל שמאלי וימני) 6
הגדרה 2.11 (אידאל נוצר) 7
הגדרה 2.14 (אידאל ראשי) 7
הגדרה 2.18 (חוג מנה) 7
הגדרה 2.19 (הומומורפיזם חוגים) 8
הגדרה 2.20 (איזומורפיזם חוגים) 8
הגדרה 2.22 (חוגים איזומורפיים) 8
הגדרה 2.23 (גרעין) 8
הגדרה 2.25 (תמונה) 8
הגדרה 2.26 (תת־חוג) 8
משפט 2.27 (האיזומורפיזם הראשון לחוגים) 8
משפט 2.28 (ההתאמה לחוגים) 9
משפט 2.30 (האיזומורפיזם השלישי) 9
משפט 3.1 (האיזומורפיזם השני) 10
הגדרה 3.2 (אידאל ראשוני) 10
טענה 3.3 (תנאי שקול לאידאל ראשוני) 10
הגדרה 3.4 (אידאל מקסימלי) 10
משפט 3.8 (האידאל המקסימלי) 11