

# 階数の高いアーベル多様体の構成について

寺杣友秀

## 第一章 序

今回お話をさせて頂くのは、一般の次元の有理数体上に定義された simple な Abel 多様体で  $\mathbf{Q}$ -rank の高いものを構成することについてです。 $\mathbf{Q}$  上の Abel 多様体で simple なものを得ることは数論的な問題なのですが、ここでアピールしたい事の一つは、こういうものの構成に古典的な topology が役立つことです。ここでいう topology とは monodromy 変換から得られる braid 群の表現に関する知識です。Abel 多様体で一次元の場合は楕円曲線として良く知られており、 $\mathbf{Q}$  上の楕円曲線についても様々な研究がなされています。

一般に  $\mathbf{Q}$  上定義された Abel 多様体についてその  $\mathbf{Q}$  有理点全体のなす群は Mordell–Weil の定理により有限生成であることが知られています。その自由部分の rank (以下単に Abel 多様体の rank という) についてもいろいろな研究がなされています。しかし楕円曲線においてでさえまだ謎につつまれている部分も多く、たとえばこの楕円曲線の rank が果してどれくらいまで大きくなりえるかという問題については未だに未解決問題として残っています。経験的には大きな rank の楕円曲線を見つけることは一般的に難しいようです。ある種の楕円曲線の族のなかでは rank が高くなればなる程その分布が少なくなることともわかっていて、そのことからもうなずけると思います。ちなみに現在の楕円曲線の rank の world record は 23 (?) あたりです。

さて一般次元の  $\mathbf{Q}$  上定義された Abel 多様体についてはどうかというのが今回のテーマです。お話をさせて頂くのは塩田徹治先生との共同研究で、今年の春、Johns Hopkins 大学の日米数学研究所 (JAMI Seminar) においてなされました。

今回の話のおおまかな outline はつぎの通りです。まず塩田氏による多くの有理点をもつ代数曲線族の構成についての復習をします。この楕円曲線族の Jacobi 多様体の族を考えると rank の高い Abel 多様体の族が得られます。さらに  $\mathbf{Q}$  上に定義されたひとつのメンバーとして rank の高い Abel 多様体を得ます。このとき得られた Abel 多様体の本質的に新しいものであることを保障するために Abel 多様体が simple であること (あるいは simple であるものがとれること) を証明します。ここで braid monodromy の既約性を利用します。ちなみにもし simple であることを要請しなければ、例えば楕円曲線の直積を考えることにより、 $\mathbf{Q}$  上の次元  $g$  の Abel 多様体で rank が  $23g$  のものが存在することになります。

## 第二章 Section をたくさんもつ曲線族

$n$  を 3 以上の自然数とする。まず 3 個の  $\mathbf{Q}$  係数の多項式  $\Phi(x)$ ,  $h(x)$ ,  $f(x)$  で次の性質をもつものを考える。

1.  $\Phi(x)$  (resp.  $h(x)$ ) は degree  $N = 2n$  (resp.  $n$ ) の monic な多項式。  $f(x)$  は高々 degree  $n - 1$  の多項式。

$$\Phi(x) = x^N + c_1 x^{N-1} + \cdots + c_N,$$

$$h(x) = x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n,$$

$$f(x) = a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}.$$

2.  $\Phi(x)$ ,  $h(x)$ ,  $f(x)$  は恒等式

$$\Phi(x) = (h(x))^2 - f(x)$$

を満たす。

このとき係数  $(c_1, \dots, c_N)$ ,  $(b_1, \dots, b_n)$ ,  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  は代数的な関係式で結ばれている。 $(b_1, \dots, b_n)$ ,  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  から  $(c_1, \dots, c_N)$  が定まるのは明らかだが、逆に  $(c_1, \dots, c_N)$  から  $(b_1, \dots, b_n)$ ,  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  も定まる。すなわち係数  $(b_1, \dots, b_n)$ ,  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  は  $(c_1, \dots, c_N)$  の多項式として表される。 $h(x)$  は  $\Phi$  の Tschirnhausen root といわれている。

さらに  $\Phi(x)$  が  $\mathbf{Q}$  上因数分解された形

$$\Phi(x) = \prod_{i=1}^N (x - u_i), \quad u_i \in \mathbf{Q} \quad (i = 1, \dots, N)$$

で与えられているとすると、係数  $(b_1, \dots, b_n)$ ,  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  は  $u = (u_1, \dots, u_N)$  の多項式で与えられている。

ここで  $(x, y)$  を座標とする超楕円曲線族

$$\mathcal{C}: y^2 = f(x)$$

を考えれば、これは  $u$  をパラメータとする曲線族と考えることができる。簡単のため、 $n$  を奇数とする。このとき  $u$  が generic ならば  $\mathcal{C}$  は種数  $g = (n - 3)/2$  の超楕円曲線族である。

この超楕円曲線族には  $u$  でパラメータ付けされた有理点の族、すなわち曲線族の  $u$ -パラメータ空間上の section  $P_k$  ( $k = 1, \dots, N$ ) が次のようにして定義される：

$$P_k = \{(x, y) = (u_k, h(u_k))\}.$$

ここでこの曲線族の Jacobi 多様体の族を考えよう。代数曲線  $C$  上の点の形式的和の有理同値類 (因子類と呼ぶ) 全体  $\text{Pic}(C)$  のなかで次数 0 の元のなす群には代数多様体の構造が入るが、それ

をその曲線の Jacobi 多様体とよぶ。これは Abel 多様体となる。曲線の Jacobi 多様体は Abel 多様体を構成する代表的な方法である。曲線族があるパラメータ付けされていれば同じパラメータでパラメータ付けされた Jacobi 多様体の族  $\mathcal{J}$  が構成される。

先に定義した section  $P_i$  を使って次数 0 の因子類の族を  $P_k - P_1$  ( $k = 2, \dots, N$ ) によって定義する。パラメータを  $\mathbf{Q}$  上代数的超越元にとれば  $\mathcal{J}$  は  $N$ -変数有理関数体  $\mathbf{Q}(u_1, \dots, u_N)$  上の Abel 多様体となる。これを  $J$  と書く。さらに  $P_k(u) - P_1(u)$  は  $J$  の  $\mathbf{Q}(u_1, \dots, u_N)$  有理点を与える。

**定理 1 [S]**  $P_k(u) - P_1(u)$  は  $J$  の  $\mathbf{Q}(u_1, \dots, u_N)$  有理点のなす群  $J(\mathbf{Q}(u_1, \dots, u_N))$  のなかで  $\text{rank } N - 1 = 4g + 5$  の自由加群を生成する。

**定理 2 [M, S]** Abel 多様体  $J$  は  $\mathbf{Q}(u_1, \dots, u_N)$  の代数閉体上 *simple* な Abel 多様体である。すなわちより低い次元の Abel 多様体の直積と同種となり得ない。

証明の概略については以下の章でとりあげることにしよう。

### 第三章 特殊化と Q-rank, simplicity

いままでの構成法で  $u = (u_1, \dots, u_N)$  を  $\mathbf{Q}^N$  に特殊化することを考える。このとき  $\mathbf{Q}$  上に定義された Abel 多様体およびその  $\mathbf{Q}$  有理点  $P_k(u) - P_1(u)$  ( $k = 1, \dots, N$ ) が得られる。定理 1 と定理 2 の性質を保ちつつ特殊化することができるか、というのがここでの主眼である。ここまでは算術的というよりも幾何学的な側面で見えていたわけであるが、 $\mathbf{Q}$  上の特殊化に関しては Diophantos 幾何的な見方が必要である。まず rank についてはつぎの定理がなりたつ。

**定理 3 [S]**  $u = (u_1, \dots, u_N)$ ,  $u_i \in \mathbf{Q}$  なる特殊化であって、 $P_k(u) - P_1(u)$  が  $\mathcal{J}$  の  $u$  における特殊化  $\mathcal{J}(u_1, \dots, u_N)$  の中で  $\text{rank } N - 1 = 4g + 5$  の自由群を生成するようなものが無限個存在する。

定理 1 と定理 3 は Néron–Tate height を使って証明できる。Mordell–Weil Lattice の考え方では Mordell–Weil group に幾何学的方法を使って楕円曲面や曲線束の Néron–Severi 群を使って二次形式を導入するが、Néron–Tate height では関数体の付値を使って二次形式を導入する。二つの二次形式は base = parameter space が一変数有理関数体のときはより直接的に関連している。すなわち Mordell–Weil lattice は Néron–Tate height のよい近似を与える。この事実は次のように表される ([1], p.322) :

$$\text{height}_{\text{Néron-Tate}}(P(x)) = (P, P)_{\text{MWL}} \cdot \text{height}(x) + O(1).$$

定理 1 および定理 3 は超越次数が  $N$  の関数体について定義される Néron–Tate height およびその特殊化の議論を使って証明される。ここで有限群  $\mathfrak{S}_N$  の作用をうまく使うことにより height pairing のグラム行列式の非退化性を示す。実際の Néron–Tate height を求めるのは困難であるにもかかわらず非退化性は示せるのである。ここでは幾何学的な意味での Mordell–Weil lattice の議論は使わなくてもよい。

つぎに simplicity も保たれるように  $\mathbf{Q}$  上に specialize することができるかどうかということを考えてみる。この問に対して威力を発揮するのが braid monodromy の計算と Hilbert の既約性定

理である。この二つを結びつけるよりどころとなるのが étale cohomology の比較定理である。

$g$  を与えられた 2 以上の自然数として、まず複素数体上で generic な種数  $g$  の超楕円曲面の Jacobian が simple であることの証明を与えてみよう。この事実は森重文氏による証明があるが、ここでは braid monodromy を使う証明を与えよう。まず  $n - 3 = 2g$  として

$$U_\alpha = \{ (\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \mid \alpha_0 \neq 0, \alpha_i \neq \alpha_j (i \neq j) \}$$

と置くと、 $U_\alpha$  上には universal な楕円曲線

$$\mathcal{D}^0 = \left\{ (y, x, \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbf{A}^2 \times U_\alpha \mid y^2 = \alpha_0 \prod_{i=1}^{n-1} (x - \alpha_i) \right\}$$

およびその compact 化  $\mathcal{D}$  が定義される。いま  $U_\alpha$  上に起点  $\alpha^{(0)}$  をとれば基本群  $\pi_1(U_\alpha, \alpha^{(0)})$  が fiber の cohomology  $H^1(\mathcal{D}_{\alpha^{(0)}}, \mathbf{Z})$  に monodromy group として作用する。その作用が群の準同型

$$M_{\alpha^{(0)}}^{an} : \pi_1(U_\alpha, \alpha^{(0)}) \rightarrow \text{Aut}(H^1(\mathcal{D}_{\alpha^{(0)}}, \mathbf{Z}), \psi)$$

で与えられているとする。ここで  $\text{Aut}(H^1(\mathcal{D}_{\alpha^{(0)}}, \mathbf{Z}), \psi)$  は cup product を保つ  $H^1(\mathcal{D}_{\alpha^{(0)}}, \mathbf{Z})$  の自己同型写像で、適当な基底をとることにより  $Sp(g, \mathbf{Z})$  と同一視される。

**命題 4 (井草・露峰)**  $M_{\alpha^{(0)}}^{an}$  の像是 Level 2 の主合同群  $\Gamma(2)$  と一致する。ここで

$$\Gamma(2) = \{ g \in Sp(g, \mathbf{Z}) \mid g \equiv \text{id} \pmod{2} \}$$

とする。

**証明** 証明は  $g$  に関する帰納法で行う。まず  $g = 2$  のときは井草の定理である。帰納法のステップは  $U_\alpha$  の基本群の元すなわち braid をうまくとって fiber の cohomology への作用を位相的に計算することにより、 $Sp(g-1, \mathbf{Z}) \cap \Gamma(2)$  と同型な群が十分たくさん含まれることを示す。□

**系** generic な超楕円曲面の Jacobian は simple である。

**証明** もしも generic な Jacobi 多様体が simple でないとすると、十分小さな指数有限の  $\Gamma(2)$  の部分群  $G$  が存在して  $H^1(\mathcal{D}_{\alpha^{(0)}}, \mathbf{Q})$  は既約な表現でない。ところが  $G$  は命題から  $Sp(g, \mathbf{Z})$  の指数有限の部分群なのでこれは矛盾である。□

さて  $u = (u_1, \dots, u_N)$  を座標とする  $N$ -次元 affine space  $\mathbf{A}^N(u)$  および  $U_\alpha$  の対称群  $\mathfrak{S}_{n-1}$  による商多様体  $U_a$  を考える。 $U_a$  の座標  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  と  $U_\alpha$  の座標は関係式

$$a_0 x^{n-1} + \dots + a_{n-2} x + a_{n-1} = \alpha_0 \prod_{i=1}^{n-1} (x - \alpha_i)$$

によって関係付けられている。さらに dominant な有理写像  $f : \mathbf{A}^N(u) \rightarrow U_a$  が  $u = (u_1, \dots, u_N)$  に対して  $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$  を対応させるものとして定義される。

$U_a$  にも超楕円曲線族

$$\tilde{\mathcal{D}} = \{ (x, y) \mid y^2 = a_0 x^n + \dots + a_{n-2} x + a_{n-1} \}$$

が定義されていて、 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  はそれぞれ  $\mathbf{A}^N(u)$ ,  $U_\alpha$  への  $\tilde{D}$  の引き戻しとして得られている。 $U_u$  を  $\mathbf{A}^N(u)$  の点でそこでの  $\mathcal{C}$  の fiber が smooth となるもののなす集合とする。写像  $f: U_u \rightarrow U_a$  の generic な fiber が connected であることより、 $U_u$  上での超楕円曲面の族  $\mathcal{C}$  の一次の整係数 cohomology への monodromy の像は  $\Gamma(2)$  を含むことがわかる。

さて今までの議論に加え étale cohomology と classical cohomology の比較定理を使うと次の命題が示される。

**命題 5**  $\pi_1^{alg}(U_u, \bar{u})$  を  $U_u$  の代数的基本群、

$$M_u^{alg} : \pi_1^{alg}(U_u, \bar{u}) \rightarrow \text{Aut}(H_{\text{et}}^1(\mathcal{C}_{\bar{u}}, \mathbf{Z}_l), \psi \cdot \mathbf{Z}_l^\times)$$

を代数的な monodromy representation とする。この時、 $M_u^{alg}$  の像は  $\Gamma(2)$  の  $l$ -進閉包を含む。

次に Hilbert の近似定理を使って  $H^1(\mathcal{C}_{\bar{u}^{(0)}}, \mathbf{Z})$  への Galois 表現が十分大きくなるような specialization  $u \rightarrow u^{(0)}$  の存在を示そう。像が十分大きい事を示す際、次の補題は有用である。

**補題**  $G$  を  $Sp(g, \mathbf{Z}_l)$  の開部分群とする。この時十分大きな  $e$  をとると次のことが成立する。

$G$  の部分群  $H$  が  $G$  の  $Sp(g, \mathbf{Z}/l^e \mathbf{Z})$  の像を生成しているならば、 $G = H$  となる。

さて代数的基本群と specialization は次のように関連している。 $U_u$  の  $\mathbf{Q}$  有理点  $u^{(0)}$  が与えられると、自然な基本群の準同型

$$i_{u^{(0)*}} : \pi_1^{alg}(u^{(0)}, \bar{u}^{(0)}) \rightarrow \pi_1^{alg}(U_u, \bar{u}^{(0)})$$

が定まるが、この写像による  $M_u^{alg}$  の

$$\pi_1^{alg}(u^{(0)}, \bar{u}^{(0)}) \simeq \text{Gal}(\bar{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$$

への制限  $M_u^{alg} \circ i_{u^{(0)*}}$  が  $H^1(\mathcal{C}_{\bar{u}^{(0)}}, \mathbf{Z}_l)$  の  $l$ -進表現を与えている。先の補題により十分大きな  $e$  に対して  $M_u^{alg} \circ i_{u^{(0)*}}$  の像が  $\Gamma(2) \bmod l^e$  を生成していれば、 $\Gamma(2)$  において  $M_u^{alg} \circ i_{u^{(0)*}}$  の像が全体を生成する。これにより  $\mathcal{J}_{u^{(0)}}$  が simple Abel 多様体となることが結論される。 $M_u^{alg} \circ i_{u^{(0)*}}$  の像が  $\Gamma(2) \bmod l^e$  を生成するような特殊化がとれることは次の Hilbert の既約性定理から結論される。

**命題 (Hilbert の既約性定理)**  $L$  上の既約多項式  $F(X) = \sum_{i=1}^n a_i X^i$  に対して無限に多くの特特殊化  $u^{(0)}, u^{(1)}, \dots$  が存在して、 $a_i$  を  $u^{(j)}$  によって特殊化したものを  $a_i(u^{(j)})$  と書くと

$$F_j(X) = \sum_{i=1}^n a_i(u^{(j)}) X^i$$

は  $\mathbf{Q}$  上既約な多項式となる。

これまでの議論では rank が落ちないようにすることと simplicity を同時に両立させることについては述べなかったが、いままでのことをもう少し注意深くすれば Mordell–Weil rank を落さずかつ simple な特殊化をすることができることがわかる。まとめてつぎのような定理を得る。

**定理 6 (塩田–寺杣)**  $g$  を 2 以上の自然数とする。 $\mathbf{Q}$  上定義された Abel 多様体であって rank が  $4g + 5$  以上となるものが存在する。

**注意** 代数曲線の Jacobian のかわりに代数曲線の double covering に関する Prym variety を使えば rank が  $4g + 7$  以上のものを得ることができる。この時も simple なものとしてとることができる。

**注意** 同様の議論を射影空間の超曲面の完全交叉を fiber としてもつ Lefschetz pencil に対して適用すると、与えられた multi-degree をもつ  $\mathbf{Q}$  上定義された完全交叉で代数的サイクルが超平面切断で生成されるものの存在が示される ([4])。

## 参考文献

## 参考文献

- [1] Lang, S., *Fundamentals of Diophantine Geometry*, Springer-Verlag (1983).
- [2] Mori, S., The endomorphism rings of some abelian varieties I, II, *Japanese J. Math.* **2**, **3** (1976, 77), 109–130, 105–109.
- [3] Shioda, T., Constructing curves with high rank via symmetry (Preprint).
- [4] Terasoma, T., Complete intersections with middle Picard number 1 defined over  $\mathbf{Q}$ , *Math. Z.* **189** (1985), 289–296.
- [5] Tsuyumine, S., Thetanullwerte on a moduli space of curves and hyperelliptic loci, *Math. Z.* **207**, no. 4 (1991), 539–568.