

ENCOUNTER with MATHEMATICS

数学との遭遇

第 28 回 リーマン面の退化と再生

2003 年 11 月 7 日（金）14:30～18:10 ～ 11 月 8 日（土）10:30～17:10

於：東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部

プログラム

11 月 7 日（金）

14:30～16:00 リーマン面の退化と再生入門

今吉 洋一 氏（大阪市立大・理）

16:40～18:10 リーマン面の退化形の位相的分類

松本 幸夫 氏（東大・数理）

11 月 8 日（土）

10:30～12:00 退化不変量の様々な顔

足利 正 氏（東北学院大・工）

13:20～14:30 分裂族の織りなす宇宙

高村 茂 氏（京大・理）

14:50～15:50 タイヒミューラー空間から見たリーマン面の退化と再生

今吉 洋一 氏（大阪市立大・理）

16:10～17:10 Lefschetz fibration の紹介

松本 幸夫 氏（東大・数理）

17:30～ 懇親会（ワイン・パーティー）

別紙の趣旨に沿った集会の第 28 回を以上のような予定で開催いたします。非専門家向けに入門的な講演をお願い致しました。多くの方々のご参加をお待ちしております。講演者による講演内容へのご案内を別紙に添付いたしますのでご覧下さい。

連絡先

112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部数学教室

tel : 03-3817-1745

ENCOUNTER with MATHEMATICS : e-mail : encmath@math.chuo-u.ac.jp homepage : <http://www.math.chuo-u.ac.jp/ENCwMATH>

三松 佳彦 : yoshi@math.chuo-u.ac.jp / 高倉 樹 : takakura@math.chuo-u.ac.jp

リーマン面の退化と再生入門

今吉 洋一（大阪市立大・理）

種数 1 の閉リーマン面（＝ トーラス ＝ 楕円曲線）を具体例にして、今回のテーマである「リーマン面の退化と再生」で取り上げられる一つの中心的な問題と基本的なことがらについて説明する。複素多様体、複素解析、代数幾何、トポロジーなど様々な分野が交差するところである。

リーマン面の正則族 $\{S_t\}_{t \in R}$ とは、複素パラメータ t に関して“正則に動く”リーマン面の族である。ここで留意することは、各リーマン面 S_t の位相構造は t に依存しないが、その複素構造は t に関して正則に変化することである。特に、パラメータ空間 R として、穴開き円板 $D^* = D \setminus \{0\} = \{t \in \mathbf{C} \mid 0 < |t| < \delta\}$ の場合を考える。このとき、素朴な疑問として、

$\bigsqcup_{t \in \Delta} \{t\} \times S_t$ が 2 次元複素多様体になるとき、 $t = 0$ にはどのようなリーマン面 S_0 が現れるか？

ということが浮かぶ。具体例での観察から次が分かる。

- S_0 の位相型は一般の S_t , $t \neq 0$ とは異なり、つぶれた（退化した）ものが現れることがある。退化した S_0 を特異ファイバーと呼ぶ。
- 原点のまわりのモノドロミー M が重要である。この M は、 t が原点の廻りを一周するとき、 S_t の標識 Σ_t （すなわち、その基本群の標準生成元系）の取り換えを表現する位相的な対象であり、曲面の写像類群の元に対応している。

そこで、リーマン面の正則族 $\{S_t\}_{t \in D^*}$ に対して、次の問題が考えられる。

- 特異ファイバー S_0 を分類せよ。
- モノドロミー M を特徴付けよ。
- M から正則族 $\{S_t\}_{t \in D}$ を構成せよ（モノドロミーから正則族の再生）。

これらの問題の研究は、小平邦彦先生の楕円曲線の退化の研究を出発点とする。種数 2 の場合は、浪川幸彦氏と上野健爾氏の研究がある。一般の場合は、松本幸夫氏と J. M. Montesinos 氏の共同研究によってなされた。これは金曜日の 2 コマ目のテーマである。また土曜日には、まず 1 コマ目では退化ファイバー芽の持つ不変量について、2 コマ目では分裂族とモース化の話題について、3 コマ目ではタイヒミュラー空間の理論を用いた内容について、そして最後の 4 コマ目ではレフシェッツ・ファイバー空間について、それぞれ考察する。

リーマン面の退化形の位相的分類

松本 幸夫（東大・数理）

複素単位開円板 D 上に、種数 g のコンパクトリーマン面のホロモルフィックな族 $f: M \rightarrow D$ があり、原点 0 の上にだけ特異ファイバーがある、しかも極小である（すなわち、特異ファイバーは (-1) -curve を含まない）という状況を考える。これをリーマン面の退化族という。目標は全ての退化族 (M, f, D) の、ファイバー構造も込めた位相形の分類である。種数 1 の場合は小平先生による楕円曲面の特異ファイバーの分類がある。種数 2 の場合には浪川幸彦氏と上野健爾氏による分類がある。ここでは、種数 g が 2 以上の場合を考える。

もっとも、分類といっても全てを数え上げることを目標にするのではなく（ g が一般では全てを数え上げるのは不可能であろう）、様々な退化形が現れる位相幾何学的根拠を明らかにすることを目標にする。そういう立場で「分類」すると、結果は簡単で、退化族の位相形はそのモノドロミー同相写像の共役類と 1 対 1 に対応する、というものである。ここで、共役類とは写像類群 M_g のなかの共役類のことである。また、モノドロミー同相写像は「右側ねじれの擬周期写像」として特徴付けられる。このように、分類する対象はホロモルフィックであるが、様々な退化形（の複素構造抜き位相形）は全く位相幾何学的な現象として現れていることが分かる。以上の結果の証明の概略を紹介したい。

退化不変量の様々な顔

足利 正（東北学院大・工）

退化を持つリーマン面族の全空間となっているコンパクト複素曲面もしくは実4次元多様体の大域的不变量の「局所版」としての退化ファイバー芽の不变量は、歴史的にはまず種数が2の時に、一般型曲面論の立場から堀川顕二氏（1976）、保形形式的観点から上野健爾氏（1987）、位相幾何的立場より松本幸夫氏（1996）によりそれぞれ提出された。しかしこれらは異なる三種の不变量を与えるのではなく、実は本質的には同一の不变量の互いに相異なる三つの「顔」なのである。

ここ数年、これらの不变量のある意味での高種数への拡張と思えるものが、次々と提案された。一は今野一宏氏、二は吉川謙一氏、三は（遠藤久顕氏、森藤孝之氏のものの拡張と思える）古田幹雄氏によるものである。これらも同じ不变量の相異なる顔なのかもしれないが、その事はまだ証明されておらず、またその性質の探求は今後に託されている。

ここでは、これらを網羅的に紹介するのは筆者の能力の及ぶ所ではないので、ある観点からこの方面の若干の説明を試みたい。

分裂族の織りなす宇宙

高村 茂（京大・理）

私見であるが、リーマン面の「退化」という用語は後ろ向きの感じがする。音はそのまま「大化」というのはどうだろう。ファイバーの形が大きく変化することをピッタリ表わしている感じがするが。

冗談はさておき、リーマン面の退化を摂動すると、もともと一つだった特異ファイバーがいくつかの特異ファイバーに分裂することがある。このような摂動を分裂族と呼んでいる。まったく分裂族をもたない退化もまれに存在し、原子退化と呼ばれる。

分裂族に関する主要な問題としては（1）原子退化の分類、（2）与えられた退化のすべての分裂族を記述すること、などが挙げられる。（1）の分類は種数 5 以下のリーマン面の退化の場合に完成しており、種数 1、2 はそれぞれモイシェゾン氏、堀川氏、種数 3、4、5 は私による。なお、種数 1、2 のときに使われた 2 重分岐被覆法は足利、荒川両氏により超楕円のリーマン面の退化の場合へと発展した。これに対し種数 3 以上のリーマン面は一般に超楕円的ではないが、私は別の手法で特異ファイバーの形が星型でないときは種数にかかわらず、（例外的な場合を除いて）退化は必ず分裂することを示した。さらに、私の開発した「剥がし変形」という分裂族の構成法は、特異ファイバーが星型の場合にも適用できる。種数 3、4、5 の場合の原子退化の分類は、これらの結果を用いて得られる。

（2）のどのような分裂がおこりうるか？という問いから自然に「分裂のモジュライ空間」の構成問題へと導かれる。「分裂のモジュライ空間」の候補として、ある複素解析空間の族を構成したが、そこではベクトル束の対称積をひねったものが活躍する。

将来的には上の複素解析空間の族の「解析的複雑さ」と、退化のモノドロミーの写像類群の元としての「組み合わせ的複雑さ」をつなぐ何らかの原理がみつかり、分裂族の織りなす宇宙の姿が見えてくるのではと期待している。それこそ「大化」の改新である。

タイヒミュラー空間から見たリーマン面の退化と再生

今吉 洋一（大阪市立大・理）

「リーマン面の退化と再生入門」で取り上げた問題を、タイヒミュラー空間 $T_{g,n}$ の理論を用いて考察したい。特に、穴開き円板 $D^* = \{0 < |t| < \delta\}$ 上の正則族 $\{S_t\}_{t \in D^*}$ の原点でのモノドロミー $\mathcal{M}$ の特徴付けを取り上げる。このとき複素解析的な対象である $\{S_t\}_{t \in D^*}$ の性質と、位相的な対象である $\mathcal{M}$ の性質との相互関係に興味がある。

我々の考察にタイヒミュラー空間 $T_{g,n}$ が使われる背景には、 $T_{g,n}$ はモデュライ空間 $M_{g,n}$ の普遍被覆空間に相当し、その普遍被覆変換群が写像類群 $\text{Mod}_{g,n}$ （＝タイヒミュラー・モデュラー群）となることがある。従って、 $M_{g,n} = T_{g,n}/\text{Mod}_{g,n}$ と表わせる。このことから、正則族 $\{S_t\}_{t \in D^*}$ は D から $T_{g,n}$ への正則写像として表現され、 $\mathcal{M}$ も $T_{g,n}$ への作用（自己双正則写像）としてとらえることができる。我々の考察においては、クライン群、（実と複素の）双曲幾何も重要な役割を果たす。

Lefschetz fibration の紹介

松本 幸夫（東大・数理）

リーマン面の退化形のうち、もっとも簡単なものは、そのモノドロミー同相写像が右側ねじれの Dehn twist になっているような特異ファイバーであろう。これが Lefschetz 型の特異ファイバーである。「特異性として唯 1 個のノードだけを持つ特異ファイバー」といっても同じことである。そして、向きのついた実 4 次元閉多様体 M から向きのついた閉曲面 B への滑らかな写像 $f: M \rightarrow B$ が Lefschetz fibration であるとは、それが、有限個の特異ファイバーを除いて、種数 g の閉曲面をファイバーとするファイバー束になっており、特異ファイバーは Lefschetz 型のみであることである。このようなファイバー空間（というより、「ペンシル」）は 1920 年代に S. Lefschetz が代数曲面の位相的研究の補助手段として導入したものであるが、最近、それが 4 次元シンプレクティック多様体に適合した位相的構造であることが証明され（Donaldson、Gompf）、多くの人々の注目するところとなった。いろいろな人がいろいろな研究をしていて、とてもそれらを紹介する能力はないが、面白いと思われるいくつかの結果を紹介したい。