

Método de eliminación Gaussiana

El método de eliminación Gaussiana consiste en reducir el sistema $Ax = b$ a un sistema equivalente (es decir, que tenga la misma solución), de la forma

$$Ux = \tilde{b}, \quad (1)$$

donde U es una matriz triangular superior y \tilde{b} un vector actualizado. Así el sistema resultante se resuelve por sustitución regresiva. Denotemos el sistema original por $A^{(1)}x = b^{(1)}$. El proceso empleado consiste en reemplazar las ecuaciones por combinaciones no triviales de las otras.

Así, consideremos la matriz no singular $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y suponga que el elemento $a_{11}^{(1)}$ es no nulo. Consideremos los multiplicadores

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, \quad i = 2, 3, \dots, n$$

sistema equivalente al anterior

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \dots & a_{nn}^{(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

que lo denotaremos por $A^{(2)}x = b^{(2)}$.

Análogamente, podemos eliminar la incógnita x_2 de las ecuaciones $3, \dots, n$.

Siguiendo con este proceso un número finito de veces se obtiene el sistema

$$A^{(k)}x = b^{(k)}, \quad 1 \leq k \leq n \quad (2)$$

SISTEMA TRIANGULAR INFERIOR

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

donde, en general $a_{ij}^{(1)}$ denota el elemento que está en la fila i y columna j de $A^{(1)}$. Es posible eliminar la incógnita x_1 de las ecuaciones dos en adelante, por simple sustracción a la fila i , $i = 2, 3, \dots, n$ de la primera fila previamente multiplicada por m_{i1} y haciendo lo mismo para el vector b .

Si ahora definimos

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1}a_{1j}^{(1)}, \quad i, j = 2, \dots, n$$

$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1}b_1^{(1)}, \quad i = 2, \dots, n$$

donde $b_i^{(1)}$ denota la componente i -ésima del vector $b^{(1)}$, entonces se obtiene un

Notemos que para $k = n$ obtenemos el sistema triangular superior

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{3n}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{(n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(3)} \\ \vdots \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Los valores $a_{kk}^{(k)}$ son llamados **pivotes** y deben ser valores no nulos para $k = 1, \dots, n - 1$.

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Notemos que

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{pmatrix} = A$$

donde, para $k \geq 2$, la matriz $A^{(k)}$ toma la siguiente forma:

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{3n}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix},$$

para realizar este proceso, hemos asumido que $a_{ii}^{(i)} \neq 0$, para $i = 1, \dots, k - 1$.

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} m_{21} = -2 \\ m_{31} = 4 \\ m_{32} = 3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$$

ALGO DE LU Y MATRICES TRIDIAGONALES

Si $A = LU$, entonces resolver $Ax = b$ es equivalente a:

1. Resolver $Ly = b$, y luego
2. Resolver $Ux = y$.

Como estos sistemas son triangulares (inferior y superior) ellos son fácilmente resueltos.

El teorema (visto) nos dice que, salvo un cambio de filas (ecuaciones), todo sistema lineal del tipo $Ax = b$ (con A no singular) puede ser resuelto aplicando la descomposición LU .

521230

- 10 -

DIM – Universidad de Concepción

ALGORITMO PARA RESOLVER $Ax = b$ USANDO LA DESCOMPOSICION LU

Para $i = 1, 2, \dots, n$

$$y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik} y_k$$
 Fin i

Para $i = n, n-1, \dots, 1$

$$x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n U_{ij} x_j \right)$$
 Fin i

521230

- 12 -

DIM – Universidad de Concepción

TEOREMA

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular. Existen matrices L triangular inferior y U triangular superior tales que

$$A = LU$$

o bien,

$$PA = LU,$$

donde P es una matriz de permutación de filas.

521230

- 9 -

DIM – Universidad de Concepción

ALGORITMO DE DESCOMPOSICION LU

Para $k = 1, 2, \dots, n$
 $L_{kk} = 1$
 Para $j = k, k+1, \dots, n$

$$U_{kj} = A_{kj} - \sum_{p=1}^{k-1} L_{kp} U_{pj}$$

Para $i = k+1, k+2, \dots, n$ ($k \neq n$)

$$L_{ik} = \frac{1}{U_{kk}} \left(A_{ik} - \sum_{p=1}^{k-1} L_{ip} U_{pk} \right)$$
 Fin k

521230

- 11 -

DIM – Universidad de Concepción

ALGORITMO DE DESCOMPOSICION LU

```


$$U_{11} = b_1$$


$$L_{11} = 1$$

Para  $i = 2, 3, \dots, n$ 
    
$$L_{ii} = 1$$

    
$$U_{i-1 i} = c_{i-1}$$

    
$$L_{i i-1} = \frac{a_i}{U_{i-1 i-1}}$$

    
$$U_{ii} = b_i - L_{i i-1} c_{i-1}$$

Fin  $i$ 

```

Los valores que no aparecen en la descomposición valen cero.

Lo interesante de este método es que es $O(8n)$. Lo que es un avance con respecto al $O\left(\frac{2n^3}{3}\right)$ de Gauss o LU .

$$\text{Si } n = 100, \text{ entonces } \begin{cases} \left(\frac{2n^3}{3}\right) \sim 666,666 & (\text{MEG o LU}) \\ 8n \sim 800 & (\text{Thomas}) \end{cases}$$

MATRICES TRIDIAGONALES

En muchas aplicaciones nos encontraremos con matrices tridiagonales invertibles, del tipo:

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

En este caso los algoritmos anteriores quedan:

Usando LU podemos llegar a un algoritmo *barato* para resolver $Ax = d$.

```


$$w_1 = d_1$$

Para  $i = 2, 3, \dots, n$ 
    
$$w_i = d_i - L_{i i-1} w_{i-1}$$

Fin  $i$ 

$$x_n = \frac{w_n}{U_{nn}}$$

Para  $i = n-1, n-2, \dots, 1$ 
    
$$x_i = \frac{w_i - U_{i i+1} x_{i+1}}{U_{ii}}$$

Fin  $i$ 

```

Este algoritmo es conocido como el algoritmo de *Thomas*.

```
>> [L,U,P]=lu(A);
```

La salida es una matriz triangular superior U , una matriz triangular inferior L y una matriz de permutación P tales que, $P*A=L*U$.

EJEMPLO

Consideremos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 7 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

```
>> [L,U,P]=lu(A)
```

L =

```
1.0000    0    0
    0    1.0000    0
0.5714    0.8571    1.0000
```

U =

```
7.0000    2.0000    8.0000
    0    1.0000    3.0000
    0    0    -2.1429
```

P =

```
0    0    1
1    0    0
0    1    0
```

Uso del comando LU

El comando LU es usado para encontrar la descomposición LU de una matriz no singular A .

Este comando acepta básicamente dos sintaxis; la primera es:

```
>> [L,U]=lu(A);
```

La salida es una matriz triangular superior U y una matriz "psicológicamente triangular inferior" (es decir, un producto de una triangular inferior por una matriz de permutación) L , tal que $A=L*U$.

La otra forma de usar este comando es:

```
>> A=[0 1 3;4 2 5;7 2 8];
```

```
>> [L,U]=lu(A)
```

L =

```
0    1.0000    0
0.5714    0.8571    1.0000
1.0000    0    0
```

U =

```
7.0000    2.0000    8.0000
    0    1.0000    3.0000
    0    0    -2.1429
```