

# גריאטריה המטופל והקשיש



© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל





- 65 קשיש אדם מעל גיל
- קשישים מהווים כיום כ- 10% מהאוכלוסייה בישראל
  - 40% צריכת שירותי הבריאות עומדת על •



#### מגן דוד DAVID ADOM IN ISRAEL

## שלבי החיים

### תפקוד המערכות בגוף מדרדר בכ- 5-10% בכל עשור, החל מגיל 30





# שינויים פיזיולוגים בקשיש

- תתכן בעיה תזונתית (חוסר יכולת לעכל תקין)
  - ירידה בחוש הראיה וחוש השמיעה
    - ירידה בניידות
    - חולשת שרירים
    - ירידה בפעילות
- פגיעה ביכולות התפקודיות של המערכות השונות בגוף
- נקודת המוצא: השילוב בין שינויים פיזיולוגים ומחלות חריפות/כרוניות מקשים על ההערכה הקלינית של הקשיש המטופל



#### מגן דוד DAVID ATIO ADOM IN ISRAEL

# קושי בבדיקה

גורמים סוציאליים ורגשיים הם בעלי משמעות רבה על בריאות הקשיש

לעיתים קשה מאוד להעריך את מצבו של המטופל הקשיש וזאת מכיוון:

- הקשיש חושש לאבד את עצמאותו
  - פוחד מסביבת בית חולים
- חושש מהוצאה כלכלית על בריאות



### מערכת הנשימה

- ירידה בגמישות בית החזה
  - החלשות שרירי הנשימה
  - שינויים מבניים בנאדיות
- דלדול השערות בקנה הנשימה

### עליה בשכיחות:

- דלקת ריאות
  - COPD •





# מערכת הלב וכלי הדם

- טרשת עורקים
- ירידה ביכולת הכיווץ של שריר הלב
- ירידה ביכולת להגברת קצב הלב במאמץ
- כתוצאה מכך- ירידה משמעותית בפריפוזיה לאיברים

#### עליה בשכיחות:

- הפרעות קצב
- אי ספיקת לב
  - דום לב



## מערכת השרירים והשלד

- השרירים מתקצרים וסופחים סידן
- כיווץ הדיסקים בחוליות עמוד השדרה
  - ירידה במסת השריר בגוף
  - שינוי במבנה גוף המגביל תנועה





### מצבים אחרים

- ירידה ביכולת שמירה על הומאוסטזיס
  - הפרעות בשיווי המשקל
  - ירידה בתפקוד מערכת הכליות
- בעיות אנדוקריניות (סוכרת, בלוטת התריס)
- בעיות במערכת העיכול: דימומים, עצירת שתן ועצירויות, אי-שליטה על סוגרים
  - סיכון גבוהה יותר להיפותרמיה והיפרתרמיה



### מערכת העצבים המרכזית

- עד גיל 70 יש ירידה של כ- 10% ממשקל המוח
  - מהירות הולכת הגירויים יורדת

#### עליה בשכיחות:

- שבץ מוחי
  - דמנציה
- אלצהיימר
  - דיכאון •
  - פרקינסון



### מצב קיצוני של בלבול וחוסר תודעה של האדם ביחס לסביבתו

#### סימנים:

- הזיות או אי שקט קיצוני
- העדר התמצאות במקום ובזמן
  - דיבור לא ברור
  - ערעור במצב נפשי •





ירידה משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי של האדם במהלך ההזדקנות •

#### סימנים:

- הפרעות זיכרון
- העדר התמצאות במקום ובזמן
  - שינויים באישיות י
  - ליקויים ביכולת השכלית



### אלצהיימר

- צורה מתקדמת של דמנציה, הנגרמת כתוצאה מתהליך התנוונות של המוח
  - תהליך הדרגתי של אובדן זיכרון, בלבול, ותשישות גופנית

#### סימנים:

- ירידה בתפקוד השכלי והתפקודי
- פגיעה ביכולת לבצע פעולות בסיסיות (דיבור, הליכה, אכילה)



# פרקינסון

- מחלה ניוונית של המוח
- המחלה מתפתחת בדרך כלל אחרי גיל 60

#### • סימנים:

- קשיון שרירים
- רעד בחלקי הגוף (לא פרכוס)
- הרעד מוגבר על ידי מתח נפשי ועייפות
  - חולשה



# MAGEN מגן דוד ADOM IN ISRAEL

# דגשים לבדיקה

- הסבר את כל פעולותיך בייחוד בחולים עם ראיה לקויה
- נסה לברר מהו הרקע הרפואי של המטופל (Baseline- קו הבסיס)
  - שמור על פרטיות המטופל
  - גלה ערנות לסימני הזנחה או התעללות
- ייתכן שהמטופל לא ידווח או יכחיש סימפטומים עקב פחד מאשפוז או איבוד עצמאותו
  - נסה להבדיל בין סימפטומים של מחלה כרונית של החולה לעומת הבעיה הרפואית הנוכחית



# אנמנזה במטופל הקשיש

- דורשת זמן רב יותר בהשוואה לחולים צעירים
  - דורשת סבלנות
  - יש להשתמש בשפה המתאימה לחולה
    - הצג את עצמך ואת אנשי הצוות
      - דבר בגובה העיניים
- דאג להמצאות משקפיים, עזרי שמיעה, תותבות בעת הצורך
  - הדלק אור בחדר
    - דבר באיטיות •



### אנמנזה

- הקשב וגלה סבלנות, אדיבות ועדינות
- שמור על כבודו- אל תתייחס אליו כילד
  - שאל שאלות ענייניות ולא כלליות
    - קח בחשבון את הירידה בחושים



# סביבת המטופל

### הערך את סביבת החולה:

- תמיכה סיעודית (מטפל/ת)
  - שימוש בתרופות
- נוכחות של מוצרי מזון/תזונה
  - מצב כללי של הבית
    - היגיינה אישית





### היבטים משפטיים

- זכותו של הקשיש לסרב לטיפול כמו כל חולה/פצוע
- למשפחה אין מעמד חוקי לגבי החלטות רפואיות הקשורות בטיפול בקשיש
  ללא הסכמתו, פרט למקרה של אפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט
  - בכל מקרה של סירוב לפינוי או טיפול יש לדווח למוקד המרחבי



# שאלות?

