

## פגיעות מבעלי חיים







- פגיעות מבעלי חיים שכיחות ברחבי העולם וגורמות לתחלואה ולתמותה מרובים
- במדינת ישראל נפגעים מידי שנה בערך כ- 5000-5000 בני אדם כתוצאה מפגיעת בעלי חיים ארסיים
- בעל חיים ארסי מוגדר כבעל בלוטות מיוחדות שנועדו לייצר ארס ובעל מנגנון
  מיוחד להעברת הארס לחיה אחרת



#### סוגי פגיעות מבעלי חיים

#### נשיכה

- נשיכת כלב
- נשיכת חתול
- נשיכת עכביש

#### עקיצה

- עקיצת עקרב •
- עקיצת דבורה ∙
- עקיצת מדוזה ∙

#### הכשה

• הכשת נחש

#### הכשות



- רוב סוגי הנחשים אינם מסוכנים לבני האדם (10-15% ארסיים)
  - בישראל קיימים כ- 40 מיני נחשים, מתוכם 9 ארסיים
    - שיעור ההכשות גבוה יותר בעונות האביב והקיץ •
- הגורמים המשפיעים על חומרת הפגיעה הם החומרים הרעילים שבארס
  ותגובת הנפגע לארס
  - התגובה הקלינית לרוב נוירולוגית או המטולוגית
  - בטרום בית החולים כל הכשת נחש תחשב להכשת נחש ארסי



#### עקיצות



- עקיצות מבעלי חיים שכיחות בכל העולם ובכל חודשי השנה
  - בישראל קיימים 21 מיני עקרבים מתוכם 5 ארסיים •
- רוב עקיצות העקרב מתרחשות בכפות הידיים או בכפות הרגליים
- הארס עלול לגרום לתגובה מקומית ועד להופעת תסמינים נוירולוגיים
- עקיצת דבורים ומדוזות לרוב אינן מסוכנות פרט למקרים בהם ישנה רגישות
  ידועה, פגיעה בילדים או בקשישים ועקיצות מרובות
  - השפעת הארס נעה בין גירוי עורי ועד למוות באוכלוסיות סיכון





#### נשיכות



- נשיכות בעלי חיים נגרמות לרוב מכלבים (80%-80%) וחתולים (10%)
- ההערכה היא שמחצית מהנשיכות אינן מדווחות ומטופלות עצמאית
  - קורבנות מבוגרים ננשכים בד"כ בגפיים יותר מאשר בראש ובצוואר
- הסכנה העיקרית בנשיכות בעלי חיים הינה הדבקות בכלבת ובזיהומים
  - חשוב לדווח על כל אירוע של נשיכה ללשכת הבריאות המחוזית







#### סימנים מקומיים

#### סימני נשיכה/ עקיצה









סימני נשיכה ביד

סימני עקיצה ביד

סימני הכשה ביד

נפיחות ובצקות

כאב מקומי/ חוסר תחושה

דימומים/ שריטות

המטומות/ שלפוחיות

תחושת נימול



#### סימנים כלליים

מתח/ פחד/ חרדה

בחילות והקאות

כאבי בטן

שלשולים

דופק ונשימה מהירים או איטיים (תלוי בסוג הארס והפגיעה)

הפרעות בקצב הלב

פרכוסים

תגובה אנאפילקטית

שינויים ברמת ההכרה עד לחוסר הכרה



#### סכנות









פגיעה אסטטית •







#### טיפול בהכשה

- הרגעת המטופל והשהייה במנוחה מוחלטת
  - תמיכה ב- ABC
- מתן חמצן באמצעות מסכת העשרה/ הנשמה מסייעת במידת הצורך
  - הסרת בגדים לוחצים ותכשיטים מהאיבר המוכש
    - סימון מקום ההכשה במידת האפשר
      - קיבוע הגפה הפגועה
  - החדרת עירוי נוזלים (לא בגפה הפגועה) במהלך הפינוי
    - הזעקת אט"ן ופינוי דחוף לבית החולים



#### מגן דוד DAVID ADOM IN ISRAEL

## טיפול בעקיצות

- הרגעת המטופל והשהייה במנוחה מוחלטת
  - הוצאת העוקץ בזהירות במידת האפשר
    - תמיכה ב- ABC
- מתן חמצן במסכה/ הנשמה מסייעת במידת הצורך
  - סימון מקום העקיצה במידת האפשר
  - קירור מקום העקיצה במידת האפשר
- בעקיצת מדוזה: שטיפה ראשונית ע"י מי ים ומייד לאחר מכן שטיפה בזרם
  מי ברז ישיר למשך מספר דקות מבלי לשפשף את האזור.
- טיפול באנאפילקסיס במידת הצורך (יש לפעול לפי הפרוטוקול המתאים)
  - הזעקת אט"ן ופינוי דחוף לבית החולים



#### טיפול בנשיכות

- הרגעת המטופל והשהייה במנוחה מוחלטת
- שטיפת הפצע בכמויות גדולות של מים וסבון
  - עצירת דימומים פעילים ע"י לחץ ישיר
    - תמיכה ב- ABC
- מתן חמצן במסכה/ הנשמה מסייעת במידת הצורך
  - פינוי לביה"ח
- דיווח ללשכת הבריאות המחוזית באמצעות המוקד המרחבי



## אנמנזה רלוונטית

- ? סימני זיהוי של בעל החיים הפוגע
- ? משך הזמן שחלף מרגע ההכשה/עקיצה
- תופעות (מקומיות וסיסטמיות) שהופיעו מרגע הפגיעה ומידת החמרתם?
  - האם ידוע על רגישויות?
  - מחלות רקע וטיפול תרופתי כרוני?
  - פעולות שנעשו עד הגעת הצוות למקום?
  - האם טופל בעבר באנטי ונום (נוגדנים ספציפיים)?







- אין לחתוך/ למצוץ/ לצרוב או להקפיא את מקום ההכשה/עקיצה
  - אין לתת לנפגע אוכל או שתיה •
  - אין להניח חסם ורידים או עורקים
    - אין לרדוף אחרי בעל החיים
- יש לשקול עצירת דימומים באמצעות לחץ ישיר- רק במקרה של דימום משמעותי
  - יש למסור סימני זיהוי של בעל החיים הפוגע לצוות ביה"ח •
  - יש למסור דיווח לבית החולים באמצעות המוקד המרחבי




© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל



## פרוטוקול BLS

#### פגיעה מבע"ח ארסי





# שאלות?

