

# Formuleblad Statistiek (2024-2025)

## Statistiek deel 1

**Steekproefgemiddelde (gegeven een steekproef met  $n$  uitkomsten  $x_1, x_2, \dots, x_n$ )**

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

**Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:**

$$s^2 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$$
$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

**Rekenregels kansrekening:**

$$P(A \text{ of } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ en } B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\text{niet } B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \text{ en } B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

**Discrete en continue kansverdelingen:**

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
<b>Uitkomstenruimte:</b>	Eindig / aftelbaar oneindig	Overaftelbaar oneindig
<b>Toepassingen:</b>	Tellen / categoriseren	Metten
<b>Kansbegrip:</b>	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
<b>CDF:</b>	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
<b>Verwachtingswaarde:</b>	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int x \cdot f(x) dx$
<b>Variantie:</b>	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
<b>Standaardafwijking:</b>	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

**Speciale kansverdelingen:**

- $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$ : tellen van aantal successen bij onafhankelijke kansexperimenten met twee uitkomsten (Bernoulli-experimenten): succes / mislukking.

**Parameters:** het aantal Bernoulli-experimenten  $n$  en de succeskans per experiment  $p$ .

- $X \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot t)$ : tellen van aantal “gebeurtenissen” in een “interval” van tijd / ruimte.

**Parameters:** het gemiddelde aantal gebeurtenissen  $\lambda$  per meeteenheid (tijd / ruimte) en het aantal meeteenheden  $t$ .

→ Voorbeeld: bij de meeteenheid van een dag bestaat een week uit  $t = 7$  meeteenheden.

- $T \sim \text{Exponentieel}(\lambda)$ : meten van de tijd / ruimte tot de volgende gebeurtenis.

**Parameter:** het gemiddelde aantal gebeurtenissen  $\lambda$  per meeteenheid (tijd / ruimte).

## Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

Verdeling	Kans(dichtheids)functie	CDF	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
<b>Discreet</b>				
Uniform( $a, b$ )	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ ( $k = a, a+1, \dots, b$ )	$F(k) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{k-a+1}{b-a+1} & a \leq k < b \\ 1 & k \geq b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Binomiaal( $n, p$ )	$p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$	$np$	$np(1-p)$
Poisson( $\lambda$ )	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	$\lambda$	$\lambda$
<b>Continuous</b>				
Uniform( $a, b$ )	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel( $\lambda$ )	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

## Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine

Type vraag	TI-84 Plus	Casio
<b>Continue kansverdeling (willekeurig)</b>		
$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) dx$	$\int_a^b f(x) dx$
$X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$		
$P(X = k)$	binompdf( $n, p, k$ )	BinomialPD( $k, n, p$ )
$P(X \leq k)$	binomcdf( $n, p, k$ )	BinomialCD( $k, n, p$ )
$X \sim N(\mu, \sigma)$		
$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf( $a, b, \mu, \sigma$ )	NormalCD( $a, b, \sigma, \mu$ )
Grenswaarde $g$ zodat $P(X \leq g) = p$ ?	invNorm( $p, \mu, \sigma$ )	InvNormCD(tail=left, $p, \sigma, \mu$ )
$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$		
$P(X = k)$	poissonpdf( $\lambda, k$ )	PoissonPD( $k, \lambda$ )
$P(X \leq k)$	poissoncdf( $\lambda, k$ )	PoissonCD( $k, \lambda$ )

## $z$ -score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

**Centrale limietstelling:** Gegeven  $n$  kansvariabelen  $X_1, X_2, \dots, X_n$  die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling hebben met een verwachtingswaarde  $\mu$  en standaardafwijking  $\sigma$ , dan geldt (bij benadering) dat

- de som  $\sum X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  normaal verdeeld is met verwachtingswaarde  $n \cdot \mu$  en standaardafwijking  $\sqrt{n} \cdot \sigma$ .
- het gemiddelde  $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  normaal verdeeld is met verwachtingswaarde  $\mu$  en standaardafwijking  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ .

---

## Statistiek deel 2:

### Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde $\mu$ ( $\sigma$ bekend)

- $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval (BI) voor  $\mu$ :

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \mu = 0; \sigma = 1)$$

$$\left[ \bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- Minimale steekproefomvang voor  $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -BI als  $\mu$  maximaal  $\pm a$  mag afwijken:

$$n \geq \left( \frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a} \right)^2$$

### Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde $\mu$ ( $\sigma$ onbekend)

- $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval (BI) voor  $\mu$ :

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \text{df} = n - 1)$$

$$\left[ \bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- Minimale steekproefomvang voor  $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -BI als  $\mu$  maximaal  $\pm a$  mag afwijken:

$$\text{GR tabel (voor verschillende } n): \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \text{df} = n - 1) \leq a$$

NB: zodra  $n \geq 30$ , vallen de normale en de  $t$ -verdeling nagenoeg samen. Je mag dan rekenen met de schatting  $s$  in plaats van de daadwerkelijke (onbekende)  $\sigma$ .

- Onderscheidend vermogen (toets met  $H_0 : \mu = \mu_0$  vs.  $H_1 : \mu \neq \mu_0$ , en gegeven  $\mu = \mu_1$ )

$$1 - \beta = P(\bar{X} \text{ neemt waarde aan in het kritieke gebied} \mid \mu = \mu_1)$$

### Betrouwbaarheidsintervallen voor de binomiale succeskans $p$

**Betrouwbaarheidsinterval voor  $p$  (Clopper-Pearson):** Gegeven een binomiale verdeling met  $n$  Bernoulli-experimenten en onbekende  $p$ , en uitkomst  $k$ .

1. Bereken de succeskans  $p_1$  zodat geldt  $P(X \leq k) = \text{binomcdf}(n; p; k) = \alpha/2$
2. Bereken de succeskans  $p_2$  zodat geldt  $P(X \geq k) = 1 - \text{binomcdf}(n; p; k - 1) = \alpha/2$
3. De berekende waarden voor  $p_1$  en  $p_2$  zijn de grenzen van het Clopper-Pearson interval.

## Hypothesetoetsen

### Stappenplan hypothesetoetsen


1. Definieer de nulhypothese  $H_0$  en de alternatieve hypothese  $H_1$ .
2. Bepaal het significantieniveau  $\alpha$  (kans op verwerpen van  $H_0$  terwijl  $H_0$  waar is  $\rightarrow$  type-I fout)
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootte
4. Bereken de toetsingsgrootte
  - Uitgaande van de nulhypothese  $H_0$  maken we aannames over de kansverdeling van de toetsingsgrootte!
5. Geef een conclusie (met behulp van het kritieke gebied /  $p$ -waarde) en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext.

## Drie typen hypothesetoetsen: linkszijdig, tweezijdig, rechtszijdig

### Linkszijdige toets

Kritiek gebied:


$$(-\infty; g]$$



### Tweezijdige toets

Kritiek gebied:


$$(-\infty; g_1] \text{ en } [g_2; \infty)$$



### Rechtszijdige toets

Kritiek gebied:

$$[g; \infty)$$



Kansverdeling (onder $H_0$ )	Linkszijdig	Tweezijdig	Rechtszijdig
$N(\mu; \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha; \mu; \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}; \mu; \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}; \mu; \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha; \mu; \sigma)$
$t(\text{df})$	$g = \text{InvT}(\alpha; \text{df})$	$g_1 = \text{InvT}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}; \text{df})$ $g_2 = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}; \text{df})$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha; \text{df})$
Grenzen die met de solver functie moeten worden opgelost:			
$\chi^2(\text{df})$ (chikwadraat)	$\chi^2\text{cdf}(0; g; \text{df}) = \alpha$	$\chi^2\text{cdf}(0; g_1; \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$ $\chi^2\text{cdf}(g_2; 10^{99}; \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$	$\chi^2\text{cdf}(g; 10^{99}; \text{df}) = \alpha$
$F(\text{df}_A; \text{df}_B)$	$\text{Fcdf}(0; g; \text{df}_A; \text{df}_B) = \alpha$	$\text{Fcdf}(0; g_1; \text{df}_A; \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$ $\text{Fcdf}(g_2; 10^{99}; \text{df}_A; \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$	$\text{Fcdf}(g; 10^{99}; \text{df}_A; \text{df}_B) = \alpha$

**p-waardes uitrekenen (gegeven een theoretische en geobserveerde toetsingsgrootte  $T$  en  $t$ )**


Kansverdeling (onder $H_0$ )	Linkszijdig ( $P(T \leq t)$ )	Rechtszijdig ( $P(T \geq t)$ )
$N(\mu; \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}; t; \mu; \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t; 10^{99}; \mu; \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}; t; \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t; 10^{99}; \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(0; t; \text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(t; 10^{99}; \text{df})$
$F(\text{df}_A; \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0; t; \text{df}_A; \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t; 10^{99}; \text{df}_A; \text{df}_B)$

**NB:** Om met de  $p$ -waarde een conclusie te trekken uit een hypothesetoets vergelijken we de  $p$ -waarde met het significantieniveau  $\alpha$ . Let op: bij tweezijdige toetsen neem je het minimum van de linkszijdige en rechtszijdige  $p$ -waarde en vergelijk je deze met  $\alpha/2$ !

## Soorten toetsen

Soort toets	Toetsingsgrootheid	Kansverdeling (onder $H_0$ )
<b>Toetsen voor het gemiddelde <math>\mu \leq \mu_0</math> of <math>\mu = \mu_0</math> of <math>\mu \geq \mu_0</math></b>		
$z$ -toets ( $\sigma$ bekend)	$\bar{X}$	$N(\mu_0; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
$t$ -toets ( $\sigma$ onbekend)	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	$t(df = n - 1)$
<b>Chikwadraattoetsen (<math>\chi^2</math>)</b>		
Onafhankelijkheid	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2(df = (\#rijen-1) \cdot (\#kolommen-1))$
Aanpassing (goodness-of-fit)	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2(df = (\#categorien-1))$
<b>Verschiltoetsen (op basis van twee populaties <math>A</math> en <math>B</math>)</b>		
$F$ -toets: $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F(df_A, df_B)$
$z$ -toets	$V = \bar{X}_A - \bar{X}_B$	$N\left(\mu_A - \mu_B; \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}\right)$
$t$ -toets ( $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$ )	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n} + \frac{s_P^2}{m}}}$	$t(df = n + m - 2)$
$t$ -toets ( $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$ )	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n} + \frac{s_B^2}{m}}}$	$t(df = \min(n - 1; m - 1))$

## Beslisboom verschiltoetsen



---

## Correlatie en regressie

**Correlatiecoëfficiënt van Pearson:**

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

**Correlatiecoëfficiënt van Spearman:**

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n^3 - n}$$

**Coëfficiënten van de lineaire regressielijn  $Y = a + b \cdot X$ :**

$$b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

**Schatting van de variantie van de storingsterm  $\varepsilon$ :**

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - 2} = \frac{\sum (y_i - (a + b \cdot x_i))^2}{n - 2} = \frac{n}{n - 2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})$$

**$100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde  $Y$  bij een gegeven  $X = x_0$ :**

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \text{df} = n - 2)$$

$$s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_\mu; a + b \cdot x_0 + t \cdot s_\mu]$$

**$100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval voor  $Y$  bij een gegeven  $X = x_0$ :**

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2; \text{df} = n - 2)$$

$$s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_f; a + b \cdot x_0 + t \cdot s_f]$$