

判断自己体重是否达标

来动手算算自己的BMI吧！



体重指数 (BMI)

1. 计算公式：

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重 (千克)}}{\text{身高}^2 \text{ (米)}}$$



2. 中国成年人 BMI 标准：



体重分级	BMI 数值范围	补充健康参考
消瘦	<18.5	超出正常下限，存在健康风险
正常	18.5~23.9	男性推荐正常值 18.5~24， 女性推荐正常值 18.5~23
超重	24.0~27.9	女性 BMI≥23、男性 BMI≥24 即需关注体重管理
轻度肥胖	28.0~29.9	需启动系统性体重与健康管理
中度肥胖	30.0~34.9	已存在明确的健康隐患
重度肥胖	≥35.0	需在医学指导下开展减肥干预

腰 围 (W C)



男性腰围

85cm

90cm

中心性
肥胖前期

中心性
肥胖



女性腰围

80cm

85cm

中心性肥
胖前期

中心性
肥胖

WS/T428-2013 成人体重判定

腰围（WC）：内脏脂肪「报警器」

来动手量一量自己的腰围吧！



是什么：腰部最细处（肚脐上方2cm）
的周长

测量要点：空腹、放松站立、软尺水平绕腰

健康标准（中国成人）：

- 男性 < 90cm
- 女性 < 85cm

超标风险：腰围越大，脂肪肝、糖尿病风险越高！

腰高比 (WHtR)



腰高比 (WHtR) ——中心性肥胖指标

是什么：腰围 ÷ 身高，反映腰腹脂肪占比

计算公式：WHtR = 腰围 (cm) ÷ 身高 (cm)

理想值：<0.5 (例：身高160cm，腰围需<80cm)

研究发现WHtR > 0.5时，心血管风险显著上升

腰 臀 比 (W H R)

腰臀比 (WHR) : 身材「梨形/苹果形」分水岭

是什么: 腰围÷臀围, 判断脂肪堆积部位

测量臀围: 臀部最宽处水平绕一圈

健康范围:

- 男性 < 0.9
- 女性 < 0.85

苹果形 (腰臀比高) :

脂肪集中腹部, 内脏风险高

梨形 (腰臀比低) :

脂肪堆积臀部大腿, 代谢风险相对低