

网络成瘾障碍（ IAD ）与干预策略

概念 · 现状 · 分类 · 干预

网络成瘾障碍（ IAD ）的起源与定义



神经科学视角下，网络成瘾与物质成瘾共享相似的神经机制。当个体过度上网时，大脑奖赏回路中的多巴胺释放模式发生改变，产生强烈的愉悦感，这种神经层面的强化效应是成瘾行为难以戒除的重要生理基础。



概念溯源：从“物质依赖”到行为成瘾

由美国精神科医生率先提出，借鉴药物依赖的临床诊断标准体系，将其界定为一种反复、持续且过度使用网络导致的慢性行为成瘾，具备成瘾行为的核心病理特征。



核心本质：消极应对机制与社会功能受损


本质上是个体应对压力的一种消极心理机制，通过过度沉浸网络来逃避现实焦虑。其直接后果是导致社会功能的全面退化，涵盖学业表现、职业发展、家庭关系及身心健康等多个关键维度。



症状深化：台湾学者周荣、周倩的补充定义

表现为慢性或周期性的强迫性使用状态，伴随显著的耐受性增加、自控能力丧失、戒断反应及强烈的心理渴求，呈现出与物质依赖高度相似的临床病程与戒断困难性。

我国网络成瘾现状（数据）



数据来源：
第 57 次中国互联网络发展状况统计报告

01 网民规模 (2021.6)

10.11 亿

互联网普及率达 **71.6%**，触达全民生活

02 网络性心理障碍患者

>22.5 万人

呈现逐年上升趋势，社会心理干预刻不容缓

03 高危人群画像：青年男性为主力



年龄层：15~45 岁（青中年）

其中 20-30 岁单身男性为最高危群体，该群体面临工作压力、社交焦虑及情感寄托缺失等多重因素叠加。



性别比：男性占绝对主导

男性患者占比高达 **98.5%**，女性仅占 1.5%。男性在游戏、直播等强沉浸内容上的投入度显著更高。

网络成瘾的五大分类

01 网络色情成瘾 (NSA)

表现为强迫性、难以自控地访问各类色情网站与内容，沉溺其中形成依赖，逐渐扭曲性观念，削弱对现实亲密关系的感知与经营能力。

02 网络关系成瘾 (NRA)

过度沉浸于网络社交、虚拟恋爱或角色扮演，将线上互动视为情感核心，逐渐疏远现实中的家人与朋友，导致现实社交能力与情感联结的逐步退化。

03 网络强迫行为 (NCB)

表现为无法自控的冲动性网购、网络赌博或频繁交易，即便造成经济亏损与家庭矛盾仍难以停止，形成反复出现的强迫性行为与心理依赖。

04 信息过载成瘾 (NIA)

陷入强迫性的信息搜索与浏览循环，不断刷新新闻、短视频或资讯，试图获取更多信息却始终无法满足。这不仅引发信息焦虑与认知过载，还会严重分散注意力，使人难以专注于现实中的重要事务与深度思考。

05 计算机成瘾 (CA)

过度沉迷于电脑游戏、编程技术或各类计算机操作，将大量时间与精力投入其中，甚至无视睡眠、饮食与工作学习的基本需求。这种沉迷会严重干扰日常生活节奏，破坏个人的社会功能履行与身心健康平衡。

大学生网络成瘾的成因

**学生：学校每天这么多事情，又是作业
又是考试，怎么可能够时间休息**

半夜2点的学生：



“从满足需求到形成依赖，认知差异是网络成瘾行为固化的深层心理基础。”

大学生网络成瘾的成因（一）——认知差异



01 诱因：需求驱动

大学生处于信息探索与情感成长期，渴求课外知识拓展与深层情感联结。网络以其开放性、即时性和内容的无限性，成为满足这些需求的主要渠道，填补了现实中社交与认知的部分空白，构成了成瘾的初始心理动因。



02 强化：快感循环

初次接触网络时获得的即时反馈、娱乐快感与社交满足，会在大脑中形成强烈的正向强化机制。这种即时的愉悦体验不断刺激奖赏回路，导致对网络的使用频率、时长和沉浸强度迅速攀升，形成难以自控的行为惯性。




03 结果：认知重构

长期沉浸逐渐演变为对网络世界的深度心理依恋，进而构建起以网络为中心的认知框架。个体的价值判断、社交方式与自我认知逐渐向虚拟环境偏移，现实生活的重要性被弱化，最终形成稳定且难以逆转的成瘾行为模式。


“从满足需求到形成依赖，认知差异是网络成瘾行为固化的深层心理基础。”

大学生网络成瘾的成因（二）——心理需求补偿

01 / 驱动成瘾的五大核心心理诉求



02 / 从需求到依赖的心理补偿闭环



 **核心洞察：**现实缺失感与网络补偿效应呈正相关，现实生活越难以满足自我价值与情感需求，网络成瘾的风险系数就越高。

全球屏幕使用时间数据 (2025)



全设备总日均屏幕时间，揭示数字生活的深度渗透

约 7 小时 51 分钟 / 天



智能手机：移动互联的核心

使用占比

53%

日均时长

4h 37m



桌面电脑：生产力的基石

使用占比

47%

日均时长

3h 14m

屏幕时间对健康的影响

01 行为与认知改变

32%

的用户报告出现明显的心理行为异常，表现为注意力涣散、决策力下降及冲动控制减弱。

02 生理健康隐患

肥胖风险
+23%

2 型糖尿病
+15%

心脏病
+12%

中风风险
+10%

03 精神健康冲击

- 睡眠剥夺：屏幕蓝光严重抑制褪黑素分泌，导致入睡困难
- 情绪障碍：抑郁风险增加 6% ，焦虑风险增加 5%
- 社交异化：易产生社交孤立感，增加网络欺凌暴露风险



行动指南：每日社交媒体使用控制在 30 分钟以内

临床研究表明，将社交媒体使用时长限制在每日半小时内，可显著改善抑郁症状，提升睡眠质量，并有效缓解焦虑情绪。这是一种低成本、高收益的自我心理调节方式。

手机依赖干预——环境改造法



01 物理隔绝：制造空间距离

学习时将手机置于视线 50cm 以外，可使解锁欲望下降 60%；配合智能定时锁盒或寄存服务，从物理层面阻断即时干扰，强制培养专注力。



02 情境分离：建立专属场域

严格划分功能区域，书桌仅用于学习和工作，床只作为休息睡眠的场所。让大脑形成清晰的场景条件反射，减少因环境模糊导致的无意识刷手机行为。




03 数字抽屉：睡前边界仪式

每晚睡前执行“手机入盒上锁”的固定仪式，主动关闭数字世界的入口。这不仅能减少蓝光对睡眠的干扰，更是一种心理暗示，帮助身心从工作模式切换到休息模式。

时间切片管理——番茄工作法

番茄钟工作法



01 / 核心执行规则

以 25 分钟专注工作 + 5 分钟休息为一个基础“番茄钟”；每完成 4 个循环，进行 15~30 分钟的深度长休息，让大脑彻底恢复活力，避免陷入低效的疲劳战。

降低启动门槛

将“完成任务”的巨大压力拆解为“只做 25 分钟”的微小目标，极大降低心理抗拒，轻松克服拖延，快速进入心流状态。

符合生理规律

大脑的高效专注周期约为 25-30 分钟，短频的休息节奏能及时阻断精神耗竭，防止注意力分散，保持思维的敏锐度。

即时正向反馈

每完成一个番茄钟即获得一次成就感，刺激多巴胺分泌，将枯燥的坚持转化为正向激励的循环，持续增强行动动力。

专注 APP 辅助 + 学习 - 奖励机制



工具是自律的“助推器”，奖励是坚持的“燃料”。将外部约束与内在激励结合，把枯燥的学习过程转化为可感知的正向反馈循环，让自律成为一种无需意志力强迫的自然习惯。

01 / 打造无干扰的专注环境

Forest 专注森林

用“种树”的游戏化方式，将每一次专注转化为具象的成长，提供可视化的成就感，拒绝半途而废。

番茄 Todo 锁机

设定专注时段后强制锁定娱乐 APP，物理隔绝干扰源，结合番茄工作法，科学规划休息节奏。

系统级极简模式

开启手机“专注模式”或“灰度显示”，从视觉源头减少色彩诱惑，回归纯粹的学习状态。

02 / 建立“付出 - 回报”的正向循环

即时可控的奖励

完成既定目标后，立即给予自己喜欢的奖励（如美食、剧集），让大脑将学习与愉悦感深度绑定。

严守“先苦后甜”

必须先完成学习任务，再兑现奖励。严禁本末倒置，避免短视频等碎片化娱乐破坏专注节奏。

重塑奖赏回路

用延迟满足的高级愉悦，替代即时享乐的廉价多巴胺，逐步修复大脑对深度工作的渴望。

专业干预措施



安全、私密的咨询环境是建立治疗信任的基石。在专业的氛围中，治疗师能够更有效地引导来访者直面问题，为后续的认知重构与行为矫正创造安全的心理空间，确保干预过程的顺利推进。



01 认知行为疗法 (CBT) —— 核心干预手段

通过“控瘾 - 重构 - 巩固”三阶段实施：首先逐步缩减上网时长，切断沉浸依赖；进而修正“网络可补偿现实缺失”的认知偏差；最终建立健康的生活节律，巩固正向行为模式。



02 正念疗法 —— 情绪调节的缓冲剂

作为 CBT 的协同疗法，通过正念冥想提升对当下情绪的觉察与接纳，有效缓解戒断期的焦虑、烦躁与空虚感，增强心理韧性，从情绪层面减少因不适感引发的反复上网冲动。



03 家庭治疗 (萨提亚模式) —— 根源性修复

从家庭生态系统视角切入，修复沟通模式与情感联结缺陷，弥补原生家庭带来的情感缺失。通过重塑家庭支持系统，消除产生补偿性网络依赖的土壤，从根源上降低复发风险。