Dictionnaire des variables

Fichier : donnees_TFE_preeclampsie_Kara.csv – 400 observations (une ligne = une femme enceinte fictive) – 22 variables

Avertissement. Toutes les données de cet atelier sont **entièrement synthétiques (fictives)**, générées par ordinateur à des fins d'enseignement. Elles ne proviennent d'aucune patiente ni d'aucun établissement réel, y compris à Kara. Aucun résultat ne doit être cité comme une donnée réelle.

Comment lire ce dictionnaire

- **Variable quantitative** : un nombre avec lequel on peut calculer (âge, IMC, pression artérielle). On calcule une moyenne et un écart-type.
- **Variable qualitative** : une catégorie (Oui/Non, niveau d'instruction). On compte des effectifs et des pourcentages.
- **NA** (« not available ») : information manquante. Dans le fichier CSV, une case vide du jeu de données est écrite `NA`. Ne pas confondre avec « Non applicable », qui est une vraie modalité (ex. : une femme sans grossesse antérieure ne peut pas avoir d'antécédent de prééclampsie).
- Le fichier utilise le **point-virgule** comme séparateur et la **virgule** comme séparateur décimal (format français) : on le lit avec `read.csv2()`.

Définition de la prééclampsie utilisée pour la simulation

Critères inspirés des recommandations internationales (ACOG 2020, ISSHP 2021), simplifiés pour l'enseignement : **hypertension apparue après 20 SA** (PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 mmHg) **et** soit une **protéinurie ≥ 1+**, soit, **en l'absence de protéinurie**, un **signe d'atteinte d'organe**. La protéinurie n'est donc pas obligatoire. Chez une femme ayant une **HTA chronique**, on parle de **prééclampsie surajoutée**. L'**HTA gestationnelle** correspond à une hypertension après 20 SA sans protéinurie ni signe de gravité.

Variable	Signification	Type statistique	Unité	Codage / modalités	Valeurs manquantes (NA)
`id_patiente`	Identifiant anonymisé de la patiente (fictif)	Qualitative (identifiant)	–	F001 à F400	Aucune
`age_ans`	Âge de la femme à l'inclusion	Quantitative discrète	années	Nombre entier (observé : 17 à 45)	Aucune
`situation_matrimoniale`	Situation matrimoniale	Qualitative nominale	–	Mariée ; Union libre ; Célibataire ; Veuve/divorcée	Aucune
`niveau_instruction`	Plus haut niveau d'études atteint	Qualitative ordinale	–	Aucun ; Primaire ; Secondaire ; Supérieur	6 NA : non renseigné
`profession`	Profession principale	Qualitative nominale	–	Ménagère ; Commerçante ; Agricultrice ; Élève/Étudiante ; Artisane ; Salariée	8 NA : non renseignée

Variable	Signification	Type statistique	Unité	Codage / modalités	Valeurs manquantes (NA)
`milieu_residence`	Milieu de résidence	Qualitative nominale (2 modalités)	–	Urbain ; Rural	Aucune
`gestite`	Nombre total de grossesses, y compris la grossesse actuelle et les pertes (fausses couches, avortements)	Quantitative discrète	nombre	1, 2, 3 … (toujours ≥ parité + 1)	Aucune
`parite`	Nombre d'accouchements antérieurs (≥ 28 SA). La grossesse actuelle n'est pas comptée	Quantitative discrète	nombre	0 = nullipare ; 1, 2, 3 …	Aucune
`atcd_preeclampsie`	Antécédent personnel de prééclampsie lors d'une grossesse précédente	Qualitative nominale	–	Oui ; Non ; Non applicable (aucune grossesse antérieure : parité = 0)	6 NA : information non retrouvée dans le dossier (femmes déjà accouchées)
`atcd_hta_chronique`	HTA connue avant la grossesse (ou avant 20 SA)	Qualitative nominale (2 modalités)	–	Oui ; Non	Aucune
`atcd_familial_hta`	Antécédent familial d'HTA (mère ou sœur)	Qualitative nominale (2 modalités)	–	Oui ; Non	12 NA : non renseigné
`atcd_diabete`	Diabète connu avant la grossesse	Qualitative nominale (2 modalités)	–	Oui ; Non	5 NA : non renseigné
`age_gestationnel_sa`	Âge gestationnel au moment du diagnostic ou de la dernière consultation	Quantitative discrète	semaines d'aménorrhée (SA)	20 à 41	Aucune
`nb_cpn`	Nombre de consultations prénatales (CPN) effectuées	Quantitative discrète	nombre	0 à 10	10 NA : non renseigné
`type_grossesse`	Type de grossesse	Qualitative nominale (2 modalités)	–	Unique ; Multiple	Aucune
`imc`	Indice de masse corporelle à la 1re consultation prénatale	Quantitative continue	kg/m²	Nombre décimal (observé : 16,0 à 36,2)	30 NA : poids ou taille non mesuré
`pas_mmhg`	Pression artérielle systolique retenue pour le diagnostic (valeur confirmée)	Quantitative discrète	mmHg	Nombre entier	Aucune
`pad_mmhg`	Pression artérielle diastolique retenue pour le diagnostic (valeur confirmée)	Quantitative discrète	mmHg	Nombre entier	Aucune
`proteinurie`	Protéinurie à la bandelette urinaire	Qualitative ordinale	–	Négative ; Traces ; 1+ ; 2+ ; 3+ (≥ 1+ = positive)	Aucune

Variable	Signification	Type statistique	Unité	Codage / modalités	Valeurs manquantes (NA)
signes_gravite	Présence d'un signe de gravité : PA ≥ 160/110 mmHg ou signe clinique/biologique d'atteinte d'organe (céphalées persistantes, troubles visuels, douleur épigastrique, etc.)	Qualitative nominale	–	Oui ; Non ; Non applicable (femme sans prééclampsie)	Aucune
type_diagnostic	Diagnostic final retenu (5 catégories exclusives)	Qualitative nominale	–	Normotendue ; HTA gestationnelle ; HTA chronique seule ; Prééclampsie ; Prééclampsie surajoutée	Aucune
preeclampsie	VARIABLE PRINCIPALE. Prééclampsie, toutes formes confondues (= Prééclampsie ou Prééclampsie surajoutée)	Qualitative nominale (2 modalités)	–	Oui ; Non	Aucune