

高中数学 I 习题集

Johnny Tang

DEEP Team

更新：2023 年 3 月 11 日

Chapter 1

集合

1.1 集合及其运算

填空题

问题 1.1 设集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, 映射 $f : M \rightarrow N$, 则对任意的 $x \in M$, 使得 $x + f(x) + xf(x)$ 恒为奇数的映射 f 的个数为_____.

提示 分类讨论.

问题 1.2 称有限集 S 的所有元素的乘积为 S 的“积数”, 给定数集 $M = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{100}\}$, 则集合 M 的所有含偶数个元素的子集的“积数”之和为_____.

提示 举例分析.

解答题

问题 1.3 (2015 高联) 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 4 个有理数, 使得 $\{a_i a_j | 1 \leq i < j \leq 4\} = \{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\}$. 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 的值.

提示 通过大小关系将 $a_1 a_2, a_1 a_3, a_1 a_4, a_2 a_3, a_2 a_4, a_3 a_4$ 与这六个数字对应.

问题 1.4 (2017 清华 THUSSAT) 已知集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 且 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, $a_i \in \mathbb{N}^*$ ($i = 1, 2, 3, 4$). 记 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = S$, 集合 $B = \{(a_i, a_j) : (a_i + a_j) | S, a_i, a_j \in A, i < j\}$ 中的元素个数为 4 个, 求 a_1 的值.

提示 通过大小关系得出不能被 S 整除的两项.

问题 1.5 X 是非空的正整数集合, 满足下列条件: (i) 若 $x \in X$, 则 $4x \in X$; (ii) 若 $x \in X$, 则 $[\sqrt{x}] \in X$. 求证: X 是全体正整数的集合.

提示 将两种关于 X 的性质结合起来看.

问题 1.6 设 S 为非空数集, 且满足: (i) $2 \notin S$; (ii) 若 $a \in S$, 则 $\frac{1}{2-a} \in S$. 证明:
(1) 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 3$, 有 $\frac{n}{n-1} \notin S$; (2) S 或者是单元素集, 或者是无限集.

提示 数学归纳法.

问题 1.7 以某些整数为元素的集合 P 具有下列性质: (i) P 中的元素有正数, 有负数; (ii) P 中的元素有奇数, 有偶数; (iii) $-1 \notin P$; (iv) 若 $x, y \in P$, 则 $x + y \in P$. 试证明:
(1) $0 \in P$; (2) $2 \notin P$.

提示 第一问: 构造; 第二问: 反证法.

问题 1.8 已知数集 A 具有以下性质: (i) $0 \in A, 1 \in A$; (ii) 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$; (iii) 若 $x \in A, x \neq 0$, 则 $\frac{1}{x} \in A$.
求证: 当 $x, y \in A$ 时, 则 $xy \in A$.

提示 只需证明 $\frac{1}{xy} \in A$, 然后构造.

1.2 集合元素的个数

定理 1.1 (容斥原理 1——容斥公式) 设 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为有限集, 则

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

可以使用数学归纳法证明.

定理 1.2 (容斥原理 2——筛法公式) 设 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为全集 I 的子集, 则

$$\left| \bigcap_{i=1}^n \complement_I A_i \right| = |I| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^n \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

可以通过摩根律证明. 这个公式常常用来计算不满足任意给定性质的子集个数.

填空题

问题 1.9 设 $\{b_n\}$ 是集合 $\{2^t + 2^s + 2^r | 0 \leq r < s < t, r, s, t \in \mathbb{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列, 已知 $b_k = 1160$, 则 k 的值为_____.

提示 分段考虑.

问题 1.10 $A = \{z | z^{18} = 1\}$, $B = \{w | w^{48} = 1\}$ 都是 1 的复单位根的集合, $C = \{zw | z \in A, w \in B\}$ 也是 1 的复单位根的集合. 则集合 C 中含有元素的个数为_____.

提示 复数的三角表示.

问题 1.11 已知集合 $\{1, 2, \dots, 3n\}$ 可以分为 n 个互不相交的三元组 $\{x, y, z\}$, 其中 $x + y = 3z$, 则满足上述要求的两个最小的正整数 n 是_____.

提示 从条件 $x + y = 3z$ 入手变形消元.

问题 1.12 集合 $M = \{x | \cos x + \lg \sin x = 1\}$ 中元素的个数是_____.

提示 有没有可能无解?

解答题

问题 1.13 设集合 $M = \{1, 2, \dots, 1995\}$, A 是 M 的子集且满足条件: 当 $x \in A$ 时, $15x \notin A$, 求 A 中元素个数的最大值.

提示 先构造最大值情况, 再证明这是最大值.

问题 1.14 求最大的正整数 n , 使得 n 元集合 S 同时满足: (i) S 中的每个数均为不超过 2002 的正整数; (ii) 对于 S 的两个元素 a 和 b (可以相同), 它们的乘积 ab 不属于 S .

提示 先构造最大值情况, 再证明这是最大值.

问题 1.15 我们称一个正整数的集合 A 是“一致”的, 是指: 删除 A 中任何一个元素之后, 剩余的元素可以分成两个不相交的子集, 而且这两个子集的元素之和相等. 求最小的正整数 $n (n > 1)$, 使得可以找到一个具有 n 的元素的“一致”集合 A .

提示 将 A 中元素分奇偶讨论.

问题 1.16 设 n 是正整数, 我们说集合 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 的一个排列 $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ 具有性质 P , 是指在 $\{1, 2, \dots, 2n-1\}$ 中至少有一个 i , 使得 $|x_i - x_{i+1}| = n$, 求证: 对于任何 n , 具有性质 P 的排列比不具有性质 P 的排列的个数多.

提示 只需证明具有性质 P 的排列个数大于全部排列数的一半. 利用容斥原理放缩.

问题 1.17 设 $S \subsetneq \mathbb{R}$ 是一个非空的有限实数集, 定义 $|S|$ 为 S 中的元素个数,

$$m(S) = \frac{\sum_{x \in S} x}{|S|}$$

已知 S 的任意两个非空子集的元素算术平均值都不相同. 定义

$$\dot{S} = \{m(A) | A \subseteq S, A \neq \emptyset\}$$

证明: $m(\dot{S}) = m(S)$.

提示 贡献法.

1.3 子集的性质

填空题

问题 1.18 设 $S = \{(x, y) | x^2 - y^2 \text{ 为奇数}, x, y \in \mathbb{R}\}$, $T = \{(x, y) | \sin^2(2\pi x^2) - \sin^2(2\pi y^2) = \cos^2(2\pi x^2) - \cos^2(2\pi y^2), x, y \in \mathbb{R}\}$, 则 S 与 T 的关系为_____.

提示 变形.

解答题

问题 1.19 设 S 是集合 $\{1, 2, 3, \dots, 50\}$ 的非空子集, S 中任何两个数之和不能被 7 整除. 求 $\text{card}(S)$ 的最大值.

提示 列举.

问题 1.20 已知集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$. 求集合 A 的具有下列性质的子集个数: 每个子集至少含有 2 个元素, 且每个子集中任何两个元素的差的绝对值大于 1.

提示 递推思想.

问题 1.21 证明: 任何一个有限集的全部子集可以这样地排列顺序, 使任意两个相邻的集相差一个元素.

提示 举例或递推.

问题 1.22 对于整数 n ($n \geq 2$), 如果存在集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集族 A_1, A_2, \dots, A_n 满足:

- (a) $i \notin A_i, i = 1, 2, \dots, n$;
- (b) 若 $i \neq j, i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 则 $i \in A_i$ 当且仅当 $j \notin A_i$;
- (c) $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, A_i \cap A_j \neq \emptyset$.

则称 n 是“好数”. 证明: (1) 7 是“好数”; (2) 当且仅当 $n \geq 7$ 时, n 是“好数”.

提示 举例与构造.

问题 1.23 设 S 是一个有 6 个元素的集合, 能有多少种方法选取 S 的两个 (不必不相同) 子集, 使得这两个子集的并是 S ? 选取的次序无关紧要, 例如, 一对子集 $\{a, c\}, \{b, c, d, e, f\}$ 与一对子集 $\{b, c, d, e, f\}, \{a, c\}$ 表示同一种取法.

提示 对 $\text{card}(A \cap B)$ 进行讨论.

问题 1.24 (2018 山东预赛) 设集合 A, B 满足: $A \cup B = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A \cap B = \emptyset$. 若集合 A 中的元素个数不是 A 中的元素, 集合 B 中的元素个数不是 B 中的元素, 求满足条件的所有不同的集合 A 的个数.

提示 对 $|A|, |B|$ 进行讨论.

问题 1.25 设 k, n 为给定的整数, $n > k \geq 2$, 对任意 n 元的数集 P , 作 P 的所有 k 元子集的元素和, 记这些和组成的集合为 Q , 集合 Q 中元素个数是 C_Q . 求 C_Q 的最大值和最小值.

提示 数学归纳法.

问题 1.26 设集合 $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$. 若 X 是 S_n 的子集, 把 X 中所有数的和为 X 的“容量”(规定空集的容量为 0), 若 X 的容量为奇(偶)数, 则称 X 为 S_n 的奇(偶)子集.

- (1) 证明: S_n 的奇子集与偶子集的个数相等;
- (2) 证明: 当 $n > 2$ 时, S_n 的所有奇子集的容量之和等于所有偶子集的容量之和;
- (3) 当 $n > 2$ 时, 求 S_n 的所有奇子集的容量之和.

提示 贡献法.

Chapter 2

函数

2.1 函数的极值

2.1.1 恒等变形

问题 2.1 求函数 $f(x) = \sqrt{8x - x^2} - \sqrt{14x - x^2 - 48}$ 的最值.

解 先求定义域：因为

$$x(8 - x) \geq 0, \quad (8 - x)(x - 6) \geq 0$$

所以 $6 \leq x \leq 8$. 再看最值：因为

$$f(x) = \sqrt{8 - x} \cdot (\sqrt{x} - \sqrt{x - 6}) = \frac{6\sqrt{8 - x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x - 6}}$$

这个函数在 $[6, 8]$ 上显然单调递减，则 $f(x) \in [0, 2\sqrt{3}]$ ，取等条件分别为 $x = 8, 6$.

问题 2.2 若 $x \neq 0$ ，求

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + x^2 + 1} - \sqrt{x^4 + 1}}{x}$$

的最大值.

解 容易发现， $f(x)$ 是一个奇函数，故最大值只需考虑 $x > 0$ 的情况.

因为

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 1} - \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}}$$

令 $t = x + \frac{1}{x} \geq 2$ ，故 $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2 \geq 2$. 为了将不等号反向，作变换

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 1} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}}} \leq \frac{1}{\sqrt{2 + 1} + \sqrt{2}} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

取等条件为 $x = 1$.

2.1.2 先猜后凑与配方估计

问题 2.3 设 $x \in \mathbb{R}_+$, 求 $y = x^2 + x + \frac{3}{x}$ 的最小值.

解 先估计函数值的下界: 因为

$$y = (x^2 - 2x + 1) + \left(3x + \frac{3}{x} - 2\right) + 5$$

所以

$$y = (x - 1)^2 + 3\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 + 5 \geq 5$$

因为在 $x = 1$ 时这个下界可以取到, 可知 $y \geq 5$.

注 在对 y 进行配凑时, 需要让最后的常数项尽可能大.

问题 2.4 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 则 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - x - y$ 的最小值为_____.

解 令 $x = y$, 则 $f(x, y) = 3x^2 - 2x$, 在 $x = \frac{1}{3}$ 时取最小值.

作如下变形:

$$f(x, y) = \frac{3}{2}\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}(x - y)^2 - \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{3}$$

取等条件为 $x = y = \frac{1}{3}$.

问题 2.5 设 x, y 是实数, 且 $x^2 - 2xy + y^2 - \sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 6 = 0$, 求 $u = x + y$ 的最小值.

解 令 $x = y$, 则 $x = 3\sqrt{2}$. 由于取等条件是 $x = y$, 尝试配凑 $(x - y)^2$.

因为

$$(x - y)^2 = \sqrt{2}u - 6 \geq 0$$

可得 $u \geq 3\sqrt{2}$. 取等条件为 $x = y = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

问题 2.6 已知 x, y 是正实数, 求

$$f(x, y) = \frac{x^4}{y^4} + \frac{y^4}{x^4} - \frac{x^2}{y^2} - \frac{y^2}{x^2} + \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$$

的最小值.

解 令 $x = y$, 可知 $f(x, y) \geq 2$.

作如下变形:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \left(\frac{x^4}{y^4} - 2\frac{x^2}{y^2} + 1 \right) + \left(\frac{y^4}{x^4} - 2\frac{y^2}{x^2} + 1 \right) + \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 2 \right) + \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2 \right) + 2 \\ &= \left(\frac{x^2}{y^2} - 1 \right)^2 + \left(\frac{y^2}{x^2} - 1 \right)^2 + \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} \right)^2 + 2 \\ &\geq 2 \end{aligned}$$

又因为当 $x = y = 1$ 时可以取等, 于是 $f(x, y)$ 的最小值为 2.

问题 2.7 设 x, y 是实数, 求 $u = x^2 + xy + y^2 - x - 2y + 3$ 的最小值.

解 以 x 为主元, 因为

$$\begin{aligned} u &= x^2 + (y-1)x + y^2 - 2y + 3 \\ &= \left(x + \frac{y-1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}(y-1)^2 + 2 \end{aligned}$$

于是 $u \geq 2$, 取等条件为 $x = 0, y = 1$.

2.1.3 利用函数的性质

问题 2.8 设函数

$$f(x) = \frac{(x + \sqrt{2013})^2 + \sin 2013x}{x^2 + 2013}$$

已知其最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m =$ _____.

解 可知

$$f(x) = 1 + \frac{2\sqrt{2013}x + \sin 2013x}{x^2 + 2013}$$

容易发现, $f(x)$ 的后一部分是一个奇函数, 故 $f(x)$ 关于 $(1, 0)$ 对称, 即 $M + m = 2$.

问题 2.9 求函数 $f(x) = \sqrt{2x^2 - 3x + 4} + \sqrt{x^2 - 2x}$ 的最小值.

解 先看定义域: 因为

$$2x^2 - 3x + 4 \geq 0, \quad x^2 - 2x \geq 0$$

可知 $x \in (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$. 由于 $f(x)$ 的两个部分均在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减、在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 可知 $f(x)$ 也在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减、在 $[2, +\infty)$ 上单调递增. 于是

$$f(x) \geq \min\{f(0), f(2)\} = f(0) = 2$$

2.1.4 综合练习

问题 2.10 求函数 $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^2 - 6x + 13} - \sqrt{x^4 - x^2 + 1}$ 的最大值.

解 看到两个如此不规整的根号相加, 想到数形结合, 然而根号下是四次多项式, 不方便直接进行构造. 不过, 注意到 $x^4 - x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 + x^2$, 可以从点 (x, x^2) 入手.

因为

$$f(x) = \sqrt{(x^2 - 2)^2 + (x - 3)^2} - \sqrt{(x^2 - 1)^2 + x^2}$$

这表示抛物线 $y = x^2$ 上的一点 $P(x, x^2)$ 到定点 $A(3, 2)$ 与 $B(0, 1)$ 的距离之差. 因为

$$|PA| - |PB| \leq |AB| = \sqrt{10}$$

于是 $f(x) \leq \sqrt{10}$, 取等条件为 A, B, P 三点共线, 即 $x = \frac{1 - \sqrt{37}}{6}$ 时.

问题 2.11 求函数 $y = x^2 + x\sqrt{x^2 - 1}$ 的值域.

解 注意到, 该函数的定义域为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. 令 $t = \frac{1}{x}$ ($t \in [-1, 0) \cup (0, 1]$), 这样的 x 即可满足定义域要求. 于是 $y = \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} \sqrt{\frac{1-t^2}{t^2}}$.

当 $t > 0$ 时, $y = \frac{1}{t^2} + \frac{\sqrt{1-t^2}}{t^2} = \frac{1}{1 - \sqrt{1-t^2}}$. 由 $\sqrt{1-t^2} \in [0, 1)$, 可知 $y \in [1, +\infty)$.

当 $t < 0$ 时, $y = \frac{1}{t^2} - \frac{\sqrt{1-t^2}}{t^2} = \frac{1}{1 + \sqrt{1-t^2}}$, 同理可得 $y \in (\frac{1}{2}, 1]$.

综上, $y \in (\frac{1}{2}, +\infty)$.

问题 2.12 证明: 函数 $f(x) = 3x^2$ 可以表示为两个单调递增的多项式函数之差.

解 为了使得作差后得到 $3x^2$ 且两个多项式函数均单调递增, 考虑某两个三次函数.

给定两个多项式函数 $\varphi_1(x) = (x+1)^3$ 与 $\varphi_2(x) = x^3 + 3x + 1$. 容易证明, 它们都是单调递增的函数, 且 $f(x) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x)$.

2.2 二次函数相关问题

2.2.1 参变互换

问题 2.13 设二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$), 方程 $f(x) - x = 0$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $0 < x_1 < x_2 < \frac{1}{a}$.

(1) 当 $x \in (0, x_1)$ 时, 证明: $f(x) < x_1$;

(2) 设函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = x_0$ 对称, 证明: $x_0 < \frac{1}{2}x_1$.

解 (1) 因为 $f(x) - x = ax^2 + (b-1)x + c = 0$ 的两根 x_1, x_2 满足

$$x_1 + x_2 = \frac{1-b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) - x_1 &= ax^2 + [1 - a(x_1 + x_2)]x + ax_1 x_2 - x_1 \\ &= a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2] + x - x_1 \\ &= (ax - ax_2 + 1)(x - x_1) \end{aligned}$$

其中, $x - x_1 < 0$, $ax - ax_2 + 1 > 0$, 则 $f(x) - x_1 < 0$, 即 $f(x) < x_1$.

(2) 由 (1), 此时 $x_0 = \frac{b}{-2a} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{1}{2a}$. 由 $x_2 < \frac{1}{a}$, 显然有 $x_0 < \frac{1}{2}x_1$.

问题 2.14 已知函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 $[0, 1]$ 上的函数值的绝对值不超过 1, 求 $|a| + |b| + |c|$ 的最大值.

解 因为 $f(0), f\left(\frac{1}{2}\right), f(1) \in [-1, 1]$, 且

$$a = 2f(1) + 2f(0) - 4f\left(\frac{1}{2}\right), \quad b = 4f\left(\frac{1}{2}\right) - 3f(0) - f(1), \quad c = f(0)$$

所以

$$S_0 = |2f(1) + 2f(0) - 4f\left(\frac{1}{2}\right)| + |4f\left(\frac{1}{2}\right) - 3f(0) - f(1)| + |f(0)|$$

且这个式子在 $f(0), f(1)$ 增大时增大, 在 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 增大时减小. 故

$$S_0 \leq 8 + 8 + 1 = 17$$

取等条件为 $f(1) = 1, f(0) = 1, f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, 即 $f(x) = 8x^2 - 8x + 1$.

问题 2.15 求函数 $y = 2x - 3 + \sqrt{x^2 - 12}$ 的值域.

解 该函数的定义域为 $(-\infty, -2\sqrt{3}] \cup [2\sqrt{3}, +\infty)$. 于是, 关于 x 的方程 $2x - 3 + \sqrt{x^2 - 12} - y = 0$ 在该定义域上有解. 该方程等价于

$$3x^2 - (4y + 12)x + y^2 + 6y + 21 = 0$$

2.2.2 调整

问题 2.16 已知函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > b > c$) 的图像上有两点 $A(m_1, f(m_1))$, $B(m_2, f(m_2))$, 且满足

$$f(1) = 0, \quad a^2 + [f(m_1) + f(m_2)]a + f(m_1)f(m_2) = 0$$

- (1) 求证: $b \geq 0$;
- (2) 求证: $f(x)$ 的图像被 x 轴截得线段长的取值范围是 $[2, 3)$;
- (3) 问能否得出 $f(m_1 + 3), f(m_2 + 3)$ 中至少有一个为正?

解 (1) 由第二个式子, $a = -f(m_1)$ 或 $-f(m_2)$, 也即 $f(x) = -a$ 的两根为 m_1, m_2 . 这告诉我们方程

$$ax^2 + bx + a + c = 0$$

有两个实数解, 即 $\Delta = b^2 - 4a(a + c) \geq 0$.

由 $f(1) = 0$, 有 $b = -a - c$, 故 $(a + c)^2 - 4a(a + c) \geq 0$, 即 $(3a - c)(a + c) \leq 0$. 又因为 $a + b + c = 0$ 中必有一正一负, 且 $a > b > c$, 故 $a > 0 > c$, 于是必有 $a + c \leq 0$, 即 $b \geq 0$.

(2) 由于 $f(1) = 0$, 又 $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$, 可知 $f(x)$ 的零点为 $1, \frac{c}{a}$. 下证 $1 - \frac{c}{a} \in [2, 3)$:

因为 $a > b = -a - c$, 可知 $\frac{c}{a} > -2$; 因为 $b = -a - c \geq 0$, 可知 $\frac{c}{a} \leq -1$. 带入上式, 即 $1 - \frac{c}{a} \in [2, 3)$.

(3) 不妨设 $a = -f(m_1)$, 即 $f(m_1) = a(m_1 - 1)(m_1 - \frac{c}{a}) = -a$, 可得 $(m_1 - 1)(m_1 - \frac{c}{a}) = -1 < 0$, 所以 $\frac{c}{a} < m_1 < 1$, 于是 $\frac{c}{a} + 3 < m_1 + 3 < 4$, 即 $m_1 + 3 > 2$. 又因为 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}(\frac{c}{a} + 1), +\infty)$ 上单调递增, 即 $f(x)$ 一定在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 于是

$$f(m_1 + 3) > f(1) = 0$$

同理, 对于 $a = -f(m_2)$ 的情况, 可以得到 $f(m_2 + 3) > 0$. 原题即证毕.

Chapter 3

三角函数

Chapter 4

平面向量

填空题

问题 4.1 在边长为 8 的正方形 $ABCD$ 中, M 是 BC 的中点, N 是 AD 边上的一点, 且 $DN = 3NA$, 若对于常数 m , 在正方形 $ABCD$ 的边上恰有 6 个不同的点 P , 使 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = m$, 则实数 m 的取值范围为_____.

问题 4.2 已知点 P, Q 在 $\triangle ABC$ 内, 且 $\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{QA} + 3\overrightarrow{QB} + 5\overrightarrow{QC} = \vec{0}$, 则 $\frac{|\overrightarrow{PQ}|}{|\overrightarrow{AB}|}$ 的值为_____.

问题 4.3 已知向量 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 24$. 若 $t \in [0, 1]$, 则 $|\overrightarrow{tAB} - \overrightarrow{AO}| + |\frac{5}{12}\overrightarrow{BO} - (1-t)\overrightarrow{BA}|$ 的最小值为_____.

Chapter 5

复数

Chapter 6

数列

Chapter 7

极限与导数

Chapter 8

不等式

Chapter 9

概率统计与计数

Chapter 10

解析几何

Chapter 11

立体几何