



Vetores, produto interno e produto externo

1. Considere os vetores de \mathbb{R}^3 , $X = (1, -2, 1)$ e $Y = (-1, 1, 0)$.
 - (a) Indique, justificando, se X e Y são vetores perpendiculares. E colineares?
 - (b) Determine o ângulo entre os vetores: i. X e Y ; ii. X e $-Y$; iii. $X + Y$ e $X - Y$.
 - (c) Apresente um vetor unitário com a direção do vetor X .
 - (d) Encontre todos os vetores com a direção de X e comprimento 2. De entre estes, indique os que têm:
i. o sentido de X ; ii. o sentido oposto a X .
 - (e) Escreva o vetor X como soma de um vetor com a direção de Y e um vetor ortogonal a Y .
 - (f) Determine todos os vetores perpendiculares a X e a Y .
 - (g) Encontre todos os vetores perpendiculares a X .
2. Mostre que o triângulo de vértices $P_1(2, 3, -4)$, $P_2(3, 1, 2)$ e $P_3(-3, 0, 4)$ é isósceles.
3. Encontre todos os vetores que fazem um ângulo de $\frac{\pi}{3}$ com $(1, 0, 0)$.
4. Sendo X e Y vetores de \mathbb{R}^n , mostre que
 - (a) $\|X + Y\|^2 + \|X - Y\|^2 = 2(\|X\|^2 + \|Y\|^2)$ (Regra do Paralelogramo);
 - (b) se X e Y são ortogonais, então $\|X + Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$ (Teorema de Pitágoras).
5. Sejam $X = (2, -1, 1)$ e $Y = (0, 2, -1)$ dois vetores em \mathbb{R}^3 .
 - (a) Calcule o produto externo (ou produto vetorial) $X \times Y$.
 - (b) Verifique que o vetor $X \times Y$ é ortogonal quer a X quer a Y .
6. Mostre que, sendo X e Y vetores não nulos de \mathbb{R}^3 ,
 - (a) X e Y são colineares se e só se $X \times Y = (0, 0, 0)$;
 - (b) $\|X \times Y\|^2 + (X \cdot Y)^2 = \|X\|^2 \|Y\|^2$.
7. Considere o paralelogramo (e o triângulo) com lados correspondentes aos vetores X e Y como na figura.



- (a) Verifique que:
 - i. a altura do paralelogramo é igual a $\|Y\| \sin(\theta)$, sendo a base do paralelogramo o lado correspondente ao vetor X e $\theta = \angle(X, Y)$;
 - ii. a área do paralelogramo é $A_{\square} = \|X \times Y\|$;
 - iii. a área do triângulo é $A_{\triangle} = \frac{1}{2} \|X \times Y\|$.
 - (b) Determine a área:
 - i. do paralelogramo de lados dados pelos vetores $(3, -1, -1)$ e $(1, 2, 1)$;
 - ii. do triângulo de vértices $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 2)$;
 - iii. dos vários paralelogramos com vértices em $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ e $(1, 2, 1)$.
8. Sejam $X = (1, 2, 0)$ e $Y = (1, -1, 1)$ dois vetores em \mathbb{R}^3 .
 - (a) Determine todos os vetores ortogonais a X e Y .
 - (b) Calcule a área do paralelogramo de vértice na origem e lados correspondentes aos vetores X e Y .
 9. Considere o paralelepípedo com arestas correspondentes aos vetores X , Y e Z .



- (a) Verifique que:
- o paralelepípedo tem altura igual a $||Z|| |\cos(\theta)|$, considerando como base do paralelepípedo o paralelogramo de lados correspondentes aos vetores X e Y e sendo $\theta = \angle(X \times Y, Z)$;
 - o volume do paralelepípedo é $V = |(X \times Y) \cdot Z|$.
- (b) Calcule o volume do paralelepípedo com um vértice na origem e arestas dadas pelos vetores:
- $(3, -2, 1)$, $(1, 2, 3)$ e $(2, -1, 2)$;
 - $(2, 1, 1)$, $(2, 3, 4)$ e $(1, 0, -1)$.

Retas e planos

10. Determine uma equação vetorial da reta \mathcal{R} definida pelo sistema de equações cartesianas

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ x - y + z = 0 \end{cases},$$

assim como uma equação vetorial e uma equação geral do plano \mathcal{P} que passa pelo ponto $P(2, 2, 1)$ e que contém a reta \mathcal{R} .

11. Determine os pontos de \mathbb{R}^3 equidistantes dos pontos $A(-1, 0, 2)$ e $B(1, -1, 1)$.
12. Considere o ponto $A(3, \frac{1}{2}, -\frac{7}{2})$ e o plano \mathcal{P} de equação geral $y + z = -1$.
- Escreva uma equação vetorial da reta ortogonal ao plano \mathcal{P} que passa pelo ponto A .
 - Calcule a distância do ponto A ao plano \mathcal{P} por dois processos distintos.
13. Considere o ponto $P(-1, 1, 2)$ e a reta \mathcal{R} que passa pelos pontos $A(1, 0, 0)$ e $B(0, 0, 1)$.
- Escreva uma equação geral do plano que contém o ponto P e é perpendicular à reta \mathcal{R} .
 - Calcule a distância do ponto P à reta \mathcal{R} .
14. Considere os planos \mathcal{P} e \mathcal{Q} de equações $x + y + 2z = 3$ e $2x + 2y + 4z = 2$, respectivamente. Determine a distância entre \mathcal{P} e \mathcal{Q} .
15. Determine a distância entre o plano de equação geral $x - y + z = 1$ e a reta definida pelo sistema de equações cartesianas

$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ y + z = 3. \end{cases}$$

16. Considere a reta \mathcal{R} definida por $x = 2y = z - 1$. Determine equações gerais dos planos perpendiculares a \mathcal{R} , cuja distância à origem é 1.
17. Considere a reta \mathcal{R}_1 que passa pelo ponto $(1, 1, -1)$ e tem vetor diretor $(-1, 2, -1)$ e a reta \mathcal{R}_2 que passa pelos pontos $(1, -1, 0)$ e $(0, 1, -1)$. Calcule a distância entre \mathcal{R}_1 e \mathcal{R}_2 .
18. Considere as retas \mathcal{R}_1 e \mathcal{R}_2 de equações vetoriais

$$(x, y, z) = (1, 2, 0) + \alpha(-1, 0, 1), \alpha \in \mathbb{R}, \quad (x, y, z) = (0, 1, 0) + \alpha(0, -1, 1), \alpha \in \mathbb{R}.$$

- Determine o plano que contém \mathcal{R}_2 e é paralelo a \mathcal{R}_1 .
- Calcule a distância e o ângulo entre as retas \mathcal{R}_1 e \mathcal{R}_2 .

19. Considere os planos de equações

$$(x, y, z) = (1, 1, -1) + s(0, 1, -1) + t(4, -1, -1), \quad s, t \in \mathbb{R}$$

e $x + \alpha y + 2z = \beta$. Determine os valores dos parâmetros reais α e β para os quais a distância entre os dois planos é igual a 3.

20. Determine equações cartesianas das retas contidas no plano de equação $x + y = 0$ cuja distância ao plano de equação $x + y + z = 1$ é igual a $\sqrt{3}/3$.

21. Sabendo que $M_1(2, 1, 3)$, $M_2(5, 3, -1)$ e $M_3(3, -4, 0)$ são os pontos médios dos lados do triângulo ABC , determine

- (a) uma equação da reta que contém o lado AB , cujo ponto médio é M_1 ;
- (b) a área do triângulo.

1. (a) Não. Não. (b) i. $\frac{5\pi}{6}$; ii. $\frac{\pi}{6}$; iii. $\arccos(\frac{2}{\sqrt{7}})$. (c) $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$. (d) i. $\frac{2}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$; ii. $-\frac{2}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$.
(e) $X = -\frac{3}{2}(-1, 1, 0) + (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$. (f) $\alpha(1, 1, 1)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. (g) $\alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 2)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. Dois lados do triângulo têm comprimento $\sqrt{41}$.
3. $(\frac{1}{3}\sqrt{3y^2 + 3z^2}, y, z)$, $y, z \in \mathbb{R}$, y e z não simultaneamente nulos.
5. (a) $(-1, 2, 4)$.
7. (b) i. $\sqrt{66}$. ii. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. iii. 2.
8. (a) $\alpha(2, -1, -3)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. (b) $\sqrt{14}$.
9. (b) i. 8. ii. 3.
10. Uma equação vetorial da reta \mathcal{R} é $(x, y, z) = (1, 1, 0) + \alpha(0, 1, 1)$, $\alpha \in \mathbb{R}$; uma equação vetorial do plano \mathcal{P} é $(x, y, z) = (2, 2, 1) + \alpha(0, 1, 1) + \beta(1, 1, 1)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, e uma equação geral de \mathcal{P} é $y - z = 1$.
11. Todos os pontos do plano de equação geral $2x - y - z + 1 = 0$.
12. (a) $(x, y, z) = (3, \frac{1}{2}, -\frac{7}{2}) + \alpha(0, 1, 1)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. (b) $\sqrt{2}$.
13. (a) $x - z + 3 = 0$. (b) 1.
14. $\frac{2}{\sqrt{6}}$
15. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$.
16. $2x + y + 2z = \pm 3$.
17. $\frac{1}{6}\sqrt{30}$.
18. (a) $x + y + z = 1$. (b) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ e $\frac{1}{3}\pi$.
19. $\alpha = 2$ e $(\beta = -8 \text{ ou } \beta = 10)$.
20. $\begin{cases} x + y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ e $\begin{cases} x + y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$.
21. (a) $(x, y, z) = (2, 1, 3) + t(2, 7, -1)$, $t \in \mathbb{R}$. (b) $6\sqrt{110}$.