



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Primer Cuatrimestre 2026-2027

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Funciones Lipschitzianas	6
1.1 Introducción a las funciones Lipschitzianas	6
1.2 Caso no autónomo	11
1.2.1 Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz	16
1.2.2 Teorema local de Cauchy-Lipschitz	20
1.2.3 teorema de unicidad global	24
1.3 Solución maximal de un PVI	25
1.3.1 Existencia de la solución maximal	25
1.4 Comportamiento de la solución maximal y teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz	27
1.4.1 Primer teorema fundamental	27
1.4.2 Segundo teorema fundamental	30
1.4.3 Tercer teorema fundamental	32
1.4.4 Cuarto teorema fundamental	34
1.5 Mirar al pasado (Soluciones hacia atrás en el tiempo)	36
1.6 Ejemplos de aplicación de la teoría	37
II Ejercicios	45
III Apéndice	46
Apéndice A: Agradecimientos	47
A.1 Varios compañeros	47

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Funciones Lipschitzianas	6
1.1	Introducción a las funciones Lipschitzianas	6
1.2	Caso no autónomo	11
1.3	Solución maximal de un PVI	25
1.4	Comportamiento de la solución maximal y teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz	27
1.5	Mirar al pasado (Soluciones hacia atrás en el tiempo)	36
1.6	Ejemplos de aplicación de la teoría	37

Introducción y Estructura del Curso

En este curso daremos un salto cualitativo respecto a la teoría básica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOS). Trabajaremos con problemas de valor inicial (Problemas de Cauchy) definidos por funciones vectoriales de la forma:

$$f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

donde $I = [\alpha, \beta]$ es un intervalo compacto temporal y f es, como mínimo, una función continua. El estudio de estas ecuaciones se dividirá en tres grandes bloques fundamentales:

Parte I: Teoría de Cauchy-Lipschitz (Existencia y Unicidad)

En esta primera parte buscaremos el “escenario ideal”. Estudiaremos el problema de Cauchy general:

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Si la función f cumple la condición de Lipschitz global uniformemente en $t \in I$, es decir, si existe $L > 0$ tal que:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\| \quad \forall t \in I, \forall u, v \in \mathbb{R}^n$$

entonces el teorema de Cauchy-Lipschitz nos asegura que el problema tiene una **única solución global**. A diferencia de los sistemas lineales, al ser f general (posiblemente no lineal), el espacio de soluciones ya no formará un espacio vectorial, lo que nos obligará a usar nuevas herramientas topológicas.

En la práctica, la condición global es muy restrictiva. Por ello, la verdadera potencia de la teoría de Cauchy-Lipschitz radica en su versión **local**: si la condición se cumple solo en una bola alrededor del dato inicial, obtendremos una **única solución local**. A partir de ahí, abordaremos preguntas clave: ¿Hasta dónde podemos extender esta solución en el tiempo? Construiremos la **solución maximal** y veremos que, por lo general, una solución se puede prolongar para todo tiempo a menos que sufra una “explosión” (*blow-up*) y tienda a infinito en un tiempo finito.

Para aplicar esto de forma práctica, demostraremos que todo sistema de clase C^1 :

$$\begin{cases} u'_1 = f_1(t, u_1, \dots, u_n) \\ \vdots \\ u'_n = f_n(t, u_1, \dots, u_n) \end{cases}$$

(donde las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son continuas) es automáticamente localmente Lipschitziano y, por tanto, goza de existencia y unicidad local.

Parte II: Teoría de Peano (Existencia sin Unicidad)

¿Qué ocurre si la función pierde regularidad y es **solamente continua**? Aquí nos olvidamos de la condición de Lipschitz y entramos en el territorio del **Teorema de Peano**. Este resultado nos garantiza que el problema de Cauchy sigue teniendo **al menos una solución local**, pero pagamos un precio muy alto: **perdemos la unicidad**.

El ejemplo clásico que motivará esta sección es el sistema escalar:

$$\begin{cases} u' = u^q & (0 < q < 1) \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

Dado que la derivada qu^{q-1} no está acotada ni es continua en $u = 0$, la teoría de Cauchy-Lipschitz colapsa y aparecen infinitas soluciones que nacen del mismo punto.

Para construir soluciones bajo condiciones tan débiles, recurriremos al **Teorema de Ascoli-Arzelà**, una poderosa herramienta de compacidad que nos permitirá extraer soluciones a partir de aproximaciones sucesivas. Además, estudiaremos la prolongabilidad de estas soluciones maximales y veremos el **Teorema de Kamke**, el cual asegura que si f es continua y globalmente acotada, entonces las soluciones del problema de Cauchy no pueden explotar y, por tanto, son globales.

Parte III: Sistemas Dinámicos y Análisis Cualitativo

En la última parte del curso cambiaremos de filosofía. Si no podemos resolver la ecuación explícitamente (lo cual es lo habitual), ¿podemos al menos predecir su comportamiento futuro? Estudiaremos sistemas dinámicos, centrándonos en el límite cuando el tiempo tiende a infinito ($t \rightarrow \infty$) para saber hacia dónde se dirige el estado $(u(t), v(t))$.

Haremos especial énfasis en **sistemas planos** (autónomos en dimensión 2):

$$\begin{cases} u' = f(u, v) \\ v' = g(u, v) \end{cases} \quad \text{con datos iniciales } u(0) = u_0, v(0) = v_0$$

Clasificaremos estos sistemas en dos grandes familias:

- **Sistemas Conservativos:** Aquellos en los que existe una función integral primera o Hamiltoniano $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $H(u(t), v(t))$ permanece constante a lo largo de las trayectorias (la “energía” se conserva). En este contexto, haremos breves incursiones a ecuaciones espaciales y en derivadas parciales, estudiando operadores como el Laplaciano o la divergencia:

$$\Delta u = f(u), \quad \text{o bien} \quad \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} = f(u)$$

- **Sistemas No Conservativos:** Requerirán técnicas más avanzadas para estudiar hacia dónde converge el sistema. Introduciremos los conceptos de **Estabilidad** y funciones de **Lyapunov** (que actúan como generalizaciones de la energía que se disipa con el tiempo), además de técnicas de **linealización** para estudiar el sistema cerca de sus puntos de equilibrio aproximándolo a un sistema lineal.

1 Funciones Lipschitzianas

1.1 Introducción a las funciones Lipschitzianas

En el estudio introductorio de las ecuaciones diferenciales, el enfoque principal radica en la obtención de soluciones explícitas y el análisis de sus propiedades básicas. Sin embargo, dado que la mayoría de los problemas no admiten una solución analítica cerrada, resulta indispensable adoptar una perspectiva cualitativa para estudiar la existencia, unicidad y el comportamiento de las soluciones.

En este contexto, el concepto de **función Lipschitziana** desempeña un papel central. Como se demostrará mediante el Teorema de Cauchy-Lipschitz, la mera continuidad de una función no es suficiente para garantizar la **unicidad de la solución** de un problema de valor inicial. La condición de Lipschitz proporciona la regularidad necesaria para asegurar dicha unicidad. Asimismo, la distinción entre funciones global y localmente Lipschitzianas es determinante para establecer si una solución está definida globalmente en el tiempo o si, por el contrario, deja de existir en un tiempo finito (fenómeno comúnmente denominado “explosión” o *blow-up*), aspecto que se detallará al abordar el estudio de las soluciones maximales.

Definición 1.1.1 [Función Globalmente Lipschitziana]

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua. Se dice que F es **globalmente Lipschitziana en Ω** si existe una constante $L > 0$ tal que

$$\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\| \quad \forall u, v \in \Omega$$

En espacios de dimensión finita, como $\mathbb{R}^n$, la elección de la norma es irrelevante para la validez de esta propiedad, dado que todas las normas son equivalentes. La constante L recibe el nombre de **constante de Lipschitz** de la función F .

En la práctica, numerosas funciones de interés físico y matemático no satisfacen esta condición en todo el espacio (por ejemplo, los polinomios de grado estrictamente mayor que uno). No obstante, es frecuente que presenten un comportamiento lo suficientemente regular si se restringe su dominio a regiones acotadas.

Definición 1.1.2 [Función Localmente Lipschitziana]

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua. Se dice que F es **localmente Lipschitziana en Ω** cuando para todo $u_0 \in \Omega$ existe un radio $R > 0$ tal que la bola abierta $B(u_0, R)$ está contenida en Ω y F es globalmente Lipschitziana en dicha bola $B(u_0, R)$.

Nota: Para definir la condición global de Lipschitz no se requiere estrictamente que el dominio sea un conjunto abierto; resulta aplicable a un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ arbitrario. Sin embargo, para la condición local, el carácter abierto de Ω es fundamental, ya que garantiza la existencia de entornos (bolas abiertas) alrededor de cualquier punto que permanezcan completamente contenidos en el dominio.

Ejemplo

1. Función afín escalar:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = au + b, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Tomando valores absolutos (la norma habitual en $\mathbb{R}$):

$$|F(u) - F(v)| = |au + b - (av + b)| = |a||u - v|$$

Por consiguiente, F es globalmente Lipschitziana con constante de Lipschitz $L = |a|$.

2. Sistemas lineales (Función afín vectorial):

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad F(u) = Au + b$$

donde A es una matriz de dimensión $n \times n$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Utilizando la definición de norma matricial inducida ($\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$, lo que implica $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$):

$$\|F(u) - F(v)\| = \|Au + b - (Av + b)\| = \|A(u - v)\| \leq \|A\|\|u - v\|$$

Por tanto, F es globalmente Lipschitziana con $L = \|A\|$. Como se estudiará posteriormente, esta propiedad garantiza que los sistemas lineales diferenciales posean siempre una única solución global (definida para todo $t \in \mathbb{R}$).

3. Función trigonométrica:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = \sin(u)$$

Aplicando el Teorema del Valor Medio, existe un ξ entre u y v tal que:

$$|F(u) - F(v)| = |\sin(u) - \sin(v)| = |\cos(\xi)||u - v| \leq 1 \cdot |u - v|$$

En consecuencia, F es globalmente Lipschitziana con $L = 1$.

4. Función de crecimiento superlineal (Cuadrática):

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = u^2$$

Se demuestra fácilmente que esta función **no es globalmente Lipschitziana** en $\mathbb{R}$. Si lo fuera, existiría una constante $L > 0$ tal que:

$$|u^2 - v^2| = |u - v||u + v| \leq L|u - v|, \quad \forall u, v \in \mathbb{R} \implies |u + v| \leq L \quad (\text{para } u \neq v)$$

Esta acotación es imposible para valores arbitrariamente grandes de u y v . Por ejemplo, tomando $u = L$ y $v = L + 1$, se obtiene $|u + v| = 2L + 1 > L$, llegando a una contradicción.

Sin embargo, la función **sí es localmente Lipschitziana**. Fijado un punto $u_0 \in \mathbb{R}$ y un radio $R > 0$, para cualesquiera $u, v \in B(u_0, R)$ se cumple que $|u - u_0| < R$ y $|v - u_0| < R$. Por la desigualdad triangular, $|u| \leq |u - u_0| + |u_0| < R + |u_0|$. En consecuencia:

$$|F(u) - F(v)| = |u - v||u + v| \leq |u - v|(|u| + |v|) \leq |u - v|(2R + 2|u_0|)$$

Por lo tanto, es localmente Lipschitziana en $B(u_0, R)$ con constante $L = 2(R + |u_0|)$. Como se analizará en el estudio de soluciones maximales, el hecho de que una función sea únicamente localmente Lipschitziana permite que un sistema (como $u' = u^2$) admita soluciones que dejen de estar definidas en un tiempo finito.

5. Falta de Lipschitzianidad en el origen:

$$F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = u^q \quad \text{con } q \in (0, 1)$$

Se probará que esta función no es Lipschitziana en ningún intervalo de la forma $[0, \varepsilon)$. Supóngase por reducción al absurdo que sí lo es; entonces existiría $L > 0$ tal que $|u^q - v^q| \leq L|u - v|$ para todo $u, v \in [0, \varepsilon)$. Tomando $v = 0$ y $u > 0$, la desigualdad se reduce a:

$$u^q \leq Lu \implies u^{q-1} \leq L$$

Dado que $q \in (0, 1)$, el exponente $q - 1$ es estrictamente negativo. Al tomar el límite cuando $u \rightarrow 0^+$, el término u^{q-1} tiende a ∞ , lo cual contradice la existencia de una cota superior constante L .

Este ejemplo es fundamental en la teoría: la ecuación diferencial $u' = u^q$ con la condición inicial $u(0) = 0$ no satisface la condición de Lipschitz en el origen (la pendiente de la función tiende a infinito). En la segunda parte del curso (teoría de Peano), se demostrará que, dado que F es continua, el problema de valor inicial admite al menos una solución, pero se pierde la unicidad (existiendo, de hecho, infinitas soluciones).

Verificar la condición de Lipschitz directamente a partir de su definición puede resultar laborioso en la práctica. El siguiente teorema proporciona un criterio analítico basado en el cálculo diferencial, el cual resulta de gran utilidad. En particular, este resultado nos permitirá deducir que toda función de clase C^1 satisface la condición de Lipschitz al menos a nivel local.

Teorema 1.1.1

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y **convexo**, y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase $C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ (es decir, si $F = (F_1, \dots, F_n)$, todas sus derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ existen y son continuas en Ω). Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:

1. F es globalmente Lipschitziana en Ω .
2. Todas las derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ están uniformemente acotadas en Ω . Esto es, existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\sup_{u \in \Omega} \left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| \leq M, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Demostración. En un espacio de dimensión finita como $\mathbb{R}^n$, todas las normas son equivalentes. Esto permite desarrollar la demostración utilizando la norma que resulte más conveniente para las acotaciones algebraicas. En este caso, emplearemos la norma 1, definida como $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, junto con su norma matricial subordinada.

Por hipótesis, el dominio Ω es convexo. Esto garantiza que el segmento de recta que une cualquier par de puntos $u, v \in \Omega$ está íntegramente contenido en el dominio, lo que justifica la parametrización e integración a lo largo de dicho segmento.

- **(2) $\Rightarrow$ (1):** Supongamos que las derivadas parciales están acotadas superiormente por una constante $M > 0$. Dados $u, v \in \Omega$, definimos la curva auxiliar $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ mediante:

$$\varphi(t) = F(u + t(v - u))$$

Por la convexidad de Ω , el argumento $u + t(v - u)$ pertenece a Ω para todo $t \in [0, 1]$, por lo que φ está bien definida. Notemos además que $\varphi(0) = F(u)$ y $\varphi(1) = F(v)$.

Aplicando la regla de la cadena, la derivada de φ respecto al parámetro t es:

$$\varphi'(t) = DF(u + t(v - u)) \cdot (v - u)$$

donde DF denota la matriz jacobiana de F . Empleando el Teorema Fundamental del Cálculo y tomando la norma 1 a ambos lados de la igualdad:

$$\|F(v) - F(u)\|_1 = \|\varphi(1) - \varphi(0)\|_1 = \left\| \int_0^1 \varphi'(t) dt \right\|_1 \leq \int_0^1 \|\varphi'(t)\|_1 dt$$

Sustituyendo $\varphi'(t)$ y aplicando la propiedad de submultiplicatividad de la norma matricial subordinada ($\|A \cdot x\|_1 \leq \|A\|_1 \|x\|_1$):

$$\|F(v) - F(u)\|_1 \leq \int_0^1 \|DF(u + t(v - u))\|_1 \|v - u\|_1 dt = \|v - u\|_1 \int_0^1 \|DF(u + t(v - u))\|_1 dt$$

Por hipótesis, cada derivada parcial está acotada por M . En consecuencia, la norma 1 de la matriz jacobiana (calculada como el máximo de las sumas absolutas por columnas) está acotada por $n \cdot M$. Integrando esta constante obtenemos:

$$\|F(v) - F(u)\|_1 \leq \|v - u\|_1 \int_0^1 (nM) dt = (nM) \|v - u\|_1$$

Por lo tanto, F es globalmente Lipschitziana con constante $L = nM$ respecto a la norma 1. Por la equivalencia topológica de las normas, esta propiedad se mantiene para cualquier otra norma en $\mathbb{R}^n$, ajustando la constante proporcionalmente.

- **(1) $\Rightarrow$ (2):** Supongamos ahora que F es globalmente Lipschitziana con constante L asociada a cierta norma $\|\cdot\|$. Es decir, para todo par $u, v \in \Omega$:

$$\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\|$$

Fijemos $u \in \Omega$ y consideremos una dirección arbitraria dada por un vector $w \in \mathbb{R}^n$ con $\|w\| = 1$. Evaluando la derivada direccional de F en u según la dirección w :

$$DF(u) \cdot w = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(u + hw) - F(u)}{h}$$

Acotando la norma de este límite mediante la condición de Lipschitz:

$$\|DF(u) \cdot w\| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|F(u + hw) - F(u)\|}{|h|} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{L\|hw\|}{|h|} = L\|w\| = L$$

El resultado anterior implica que la norma de operador de la matriz jacobiana está uniformemente acotada por L , ya que:

$$\|DF(u)\| = \max_{\|w\|=1} \|DF(u) \cdot w\| \leq L$$

Finalmente, por la equivalencia de las normas matriciales en dimensión finita, existe una constante de proporcionalidad $C > 0$ que acota la magnitud máxima de cualquier entrada de la matriz en función de su norma de operador. En consecuencia:

$$\left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| \leq C\|DF(u)\| \leq CL, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Queda así demostrado que todas las derivadas parciales se encuentran uniformemente acotadas en Ω . □

Corolario 1.1.1

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase $C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Entonces, F es localmente Lipschitziana en Ω . Además, F es globalmente Lipschitziana en cualquier subconjunto abierto, convexo y acotado $D \subset \Omega$ tal que $\overline{D} \subset \Omega$.

Demostración. Sea $D \subset \Omega$ un subconjunto abierto, convexo y acotado tal que su clausura $\overline{D}$ está contenida en Ω . Al ser $\overline{D}$ un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$, el teorema de Heine-Borel garantiza que es compacto.

Dado que $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, sus derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ son funciones continuas en Ω . Por el teorema de Weierstrass, toda función continua definida sobre un conjunto compacto alcanza un valor máximo absoluto. Por consiguiente, existe una constante $M_{ij} < \infty$ tal que:

$$\max_{u \in \overline{D}} \left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| = M_{ij}, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Definiendo $M = \max_{i,j} \{M_{ij}\}$, se deduce que todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $\overline{D}$, y por tanto en D . Puesto que D es convexo, el teorema anterior permite concluir que F es globalmente Lipschitziana en D .

Finalmente, como para todo punto $u_0 \in \Omega$ existe una bola abierta centrada en u_0 con radio suficientemente pequeño tal que su clausura está contenida en Ω , F resulta ser localmente Lipschitziana en todo el dominio Ω . □

A continuación, se presentan diversos ejemplos prácticos que ilustran la aplicación de este teorema y su corolario para determinar el carácter global o local de la condición de Lipschitz.

Ejemplo

1. **Función con derivada acotada:** Sea $F(u) = \sin(u)$ con $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Su matriz jacobiana se reduce a la derivada ordinaria:

$$DF(u) = \cos(u) \implies \left| \frac{dF}{du}(u) \right| = |\cos(u)| \leq 1, \quad \forall u \in \mathbb{R}$$

Puesto que la derivada está uniformemente acotada en todo $\mathbb{R}$, el teorema garantiza que F es globalmente Lipschitziana con constante $L = 1$.

2. **Aplicación del corolario en conjuntos compactos:** Sea $F(u) = u^2$ con $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Calculando su derivada:

$$DF(u) = 2u \implies \left| \frac{dF}{du}(u) \right| = |2u| \xrightarrow{|u| \rightarrow \infty} \infty$$

Dado que la derivada no está acotada en $\mathbb{R}$, la función no es globalmente Lipschitziana en todo el espacio. Sin embargo, si consideramos un intervalo acotado arbitrario $D = (a, b) \subset \mathbb{R}$, su clausura $\overline{D} = [a, b]$ es compacta. En dicho intervalo, la derivada alcanza un máximo:

$$\max_{u \in [a, b]} |2u| = 2 \max(|a|, |b|) < \infty$$

Por el corolario establecido, F es globalmente Lipschitziana en D . Como esto es válido para cualquier intervalo acotado, la función es localmente Lipschitziana en $\mathbb{R}$.

3. **Función con derivada no acotada en un conjunto abierto:** Sea $F(u) = u^q$ con $q \in (0, 1)$ y $F \in C^\infty((0, \infty), \mathbb{R})$. Su derivada es:

$$DF(u) = qu^{q-1} \implies \left| \frac{dF}{du}(u) \right| = qu^{q-1} \xrightarrow{u \rightarrow 0^+} \infty$$

La derivada no está acotada en el dominio $(0, \infty)$. En particular, tampoco lo está en ningún intervalo abierto de la forma $(0, \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$. En consecuencia, F no es globalmente Lipschitziana en $(0, \varepsilon)$. No obstante, la función sigue siendo localmente Lipschitziana en $(0, \varepsilon)$. Esto se debe a que, para cualquier subconjunto abierto, convexo y acotado D cuya clausura cumpla $\overline{D} \subset (0, \varepsilon)$, se tiene que $0 \notin \overline{D}$. Al ser $\overline{D}$ un conjunto cerrado, existe una distancia estrictamente positiva al origen, lo que garantiza que la derivada se mantenga acotada en todo $\overline{D}$.

4. **Función vectorial con derivadas acotadas:** Sea $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ una matriz real. Definimos:

$$F(u) = A \begin{pmatrix} \sin(u_1) \\ \vdots \\ \sin(u_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \sin(u_1) + \dots + a_{1n} \sin(u_n) \\ \vdots \\ a_{n1} \sin(u_1) + \dots + a_{nn} \sin(u_n) \end{pmatrix}$$

La función verifica $F \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Su matriz jacobiana es:

$$DF(u) = A \cdot \text{diag}(\cos(u_1), \dots, \cos(u_n))$$

Las derivadas parciales toman la forma:

$$\frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) = a_{ij} \cos(u_j), \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Dado que $|\cos(u_j)| \leq 1$ para todo $u_j \in \mathbb{R}$, es posible acotar todas las derivadas parciales por la constante $M = \max_{i,j} |a_{ij}|$. Por lo tanto:

$$\sup_{u \in \mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| \leq M, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

En virtud del teorema, esto demuestra que F es globalmente Lipschitziana en todo $\mathbb{R}^n$.

5. **Función vectorial con derivadas no acotadas:** Sea nuevamente una matriz real $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ y consideremos:

$$F(u) = A \begin{pmatrix} u_1^2 \\ \vdots \\ u_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}u_1^2 + \dots + a_{1n}u_n^2 \\ \vdots \\ a_{n1}u_1^2 + \dots + a_{nn}u_n^2 \end{pmatrix}$$

Se tiene que $F \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. La matriz jacobiana resulta:

$$DF(u) = A \cdot \text{diag}(2u_1, \dots, 2u_n)$$

Las derivadas parciales asociadas son:

$$\frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) = 2a_{ij}u_j, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Si existe un coeficiente $a_{ij} \neq 0$, el término $|2a_{ij}u_j|$ tiende a infinito cuando $|u_j| \rightarrow \infty$. Esto implica que las derivadas parciales no están acotadas en $\mathbb{R}^n$, de modo que F no es globalmente Lipschitziana en el espacio completo. Sin embargo, aplicando el corolario, para cualquier conjunto abierto, convexo y acotado $D \subset \mathbb{R}^n$, la función sí será globalmente Lipschitziana en D , ya que su clausura $\overline{D}$ es compacta y las derivadas parciales alcanzarán un valor máximo finito en dicho conjunto.

1.2 Caso no autónomo

Hasta ahora hemos tratado funciones que dependen exclusivamente de la variable espacial (sistemas autónomos). A continuación, extendemos estos conceptos al caso no autónomo, donde la función vectorial depende también de una variable independiente $t \in J$, habitualmente interpretada como el tiempo. Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo arbitrario que representará dicho dominio temporal:

$$\begin{array}{c} \text{---} \quad | \quad \text{---} \quad | \quad \text{---} \\ \alpha \qquad \qquad \qquad \beta \end{array} \quad \begin{array}{l} (\alpha, \beta), \quad [\alpha, \beta], \quad [\alpha, \beta), \quad (\alpha, \beta], \\ (-\infty, \beta), \quad (-\infty, \beta], \\ (\alpha, +\infty), \quad [\alpha, +\infty), \\ (-\infty, +\infty) = \mathbb{R} \end{array}$$

Dada una función $f : J \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, las nociones de Lipschitzianidad global y local se generalizan exigiendo que la acotación de las variaciones espaciales se cumpla de manera uniforme respecto a la variable temporal t .

Definición 1.2.1 [Función global y localmente Lipschitziana en el caso no autónomo]

Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo arbitrario, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, y sea $f : J \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función dada.

1. Se dice que f es **globalmente Lipschitziana respecto de u en Ω** , uniformemente en $t \in J$, si existe una constante de Lipschitz $L > 0$ tal que:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\|, \quad \forall t \in J, \forall u, v \in \Omega$$

2. Se dice que f es **localmente Lipschitziana respecto de u en Ω** , uniformemente en $t \in J$, si para cada $u_0 \in \Omega$ existen un radio $R > 0$ y una constante $L > 0$ (que puede depender de u_0) tales que la bola $B_R(u_0) \subset \Omega$ y se cumple:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\|, \quad \forall t \in J, \forall u, v \in B_R(u_0)$$

Al igual que en el caso autónomo, verificar esta condición mediante la definición directa puede ser tedioso. El siguiente teorema establece un criterio analítico equivalente basado en la acotación de las derivadas parciales respecto a las variables espaciales.

Teorema 1.2.1 [Criterio de Lipschitzianidad para funciones no autónomas]

Sean $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo arbitrario, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y **convexo**, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^n)$ una función que posee derivadas parciales $f_1, \dots, f_n$ continuas. Es decir:

$$\frac{\partial f_i}{\partial u_j} \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}), \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Entonces, la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$ uniformemente en $t \in J$ si y solo si sus derivadas parciales están acotadas en todo el dominio. Esto se expresa como:

$$f \text{ es globalmente Lipschitz. en } u \iff M = \sup_{(t,u) \in J \times \Omega} \left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u) \right| < +\infty, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Demostración. Demostraremos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$ Supongamos que las derivadas parciales están acotadas por una constante $M < +\infty$. Fijados un instante $t \in J$ y dos puntos $u, v \in \Omega$, definimos la curva auxiliar $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ como:

$$\varphi(s) = f(t, su + (1-s)v), \quad s \in [0, 1]$$

Como Ω es un conjunto convexo, el segmento de recta que une u y v está contenido íntegramente en Ω , garantizando que la función φ esté bien definida para todo $s \in [0, 1]$. Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, obtenemos:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| = \|\varphi(1) - \varphi(0)\| = \left\| \int_0^1 \varphi'(s) ds \right\| \leq \int_0^1 \|\varphi'(s)\| ds$$

La derivada de la curva respecto al parámetro s es $\varphi'(s) = D_u f(t, su + (1-s)v) \cdot (u - v)$, donde $D_u f$ representa la matriz jacobiana respecto a las variables espaciales u . Empleando la definición de la norma de operador matricial $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)}$:

$$\|\varphi'(s)\| = \|D_u f(t, su + (1-s)v) \cdot (u - v)\| \leq \|D_u f(t, su + (1-s)v)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} \|u - v\|$$

En un espacio de dimensión finita todas las normas son equivalentes, por lo que existe una constante $c > 0$ tal que la norma de operador queda acotada por la suma de los valores absolutos de los

elementos de la matriz. Dado que cada derivada parcial está acotada por M :

$$\|D_u f(t, \dots)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} \leq c \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right| \leq c \sum_{i,j=1}^n M = cn^2 M = L$$

Sustituyendo esta constante L en la integral obtenemos:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq \int_0^1 L \|u - v\| ds = L \|u - v\|$$

Esto prueba que f es globalmente Lipschitziana respecto a u , uniformemente en $t \in J$.

$\Rightarrow$ Supongamos ahora que existe una constante $L \geq 0$ tal que:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L \|u - v\|, \quad \forall u, v \in \Omega, \quad \forall t \in J$$

Fijados $t \in J$ y $u \in \Omega$, seleccionamos un vector dirección arbitrario $y \in \mathbb{R}^n$ con norma unidad ($\|y\| = 1$). La derivada direccional de f , equivalente al producto de la matriz jacobiana por dicho vector, viene dada por:

$$D_u f(t, u)y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t, u + hy) - f(t, u)}{h}$$

Utilizando la hipótesis de Lipschitzianidad, acotamos la norma del cociente incremental:

$$\left\| \frac{f(t, u + hy) - f(t, u)}{h} \right\| = \frac{\|f(t, u + hy) - f(t, u)\|}{|h|} \leq \frac{L \|hy\|}{|h|} = \frac{L |h| \|y\|}{|h|} = L$$

Tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, se deduce que $\|D_u f(t, u)y\| \leq L$ para todo vector unitario y . En consecuencia, la norma de operador de la matriz jacobiana satisface:

$$\|D_u f(t, u)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} = \max_{\|y\|=1} \|D_u f(t, u)y\| \leq L$$

Por la equivalencia de normas, el valor absoluto de cada entrada de la matriz está acotado proporcionalmente por su norma de operador. Es decir, existe una constante $C > 0$ tal que:

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u) \right| \leq C \|D_u f(t, u)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)} \leq CL$$

Como esta cota superior es independiente tanto de t como de u , concluimos que el supremo M de las derivadas parciales en $J \times \Omega$ es finito.

□

Corolario 1.2.1

Sean $J = [\alpha, \beta]$ un intervalo cerrado y acotado ($\alpha < \beta$), $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^n)$ una función tal que todas sus derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son continuas en $J \times \Omega$. Entonces, para cada conjunto abierto, convexo y acotado $D \subset \Omega$ cuya clausura cumpla $\overline{D} \subset \Omega$, la función $f(t, u)$ es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in D$, uniformemente en $t \in J$. En particular, f es localmente Lipschitziana respecto a u en Ω , uniformemente en $t \in J$.

Demostración. Sea $D \subset \Omega$ un subconjunto abierto, convexo y acotado con $\overline{D} \subset \Omega$. Por el teorema de Heine-Borel, al ser $\overline{D}$ un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$, es compacto. Puesto que el intervalo J también es compacto, el producto cartesiano $J \times \overline{D}$ resulta ser un conjunto compacto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

Como las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son funciones continuas en el conjunto compacto $J \times \overline{D}$, el teorema de Weierstrass garantiza que alcanzan valores extremos absolutos. En particular, están acotadas superiormente, por lo que existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\sup_{(t,u) \in J \times D} \left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u) \right| \leq M, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

En virtud del teorema anterior, esta acotación uniforme de las derivadas implica que f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in D$, uniformemente en $t \in J$. Dado que todo punto $u_0 \in \Omega$ admite un entorno que satisface las propiedades del conjunto D , se concluye que f es localmente Lipschitziana en todo el dominio Ω . $\square$

Ejemplo

1. Sea la función:

$$f(t, u) = a(t) \sin(u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R})$$

Su derivada parcial respecto a u es:

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t, u) = a(t) \cos(u)$$

Esta derivada es continua. Acotando su valor absoluto para todo $(t, u) \in [\alpha, \beta] \times \mathbb{R}$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial u}(t, u) \right| = |a(t)| |\cos(u)| \leq |a(t)| \leq \max_{t \in [\alpha, \beta]} |a(t)| = M < +\infty$$

El máximo existe porque $a(t)$ es continua en el compacto $[\alpha, \beta]$. Al estar la derivada global y uniformemente acotada, la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.

2. Sea la función con una singularidad temporal en el origen:

$$f(t, u) = \frac{1}{t} \sin(u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad t \in J = (0, \infty)$$

La derivada parcial respecto a u es:

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t, u) = \frac{1}{t} \cos(u)$$

Calculando el supremo respecto a u para un t fijo:

$$\sup_{u \in \mathbb{R}} \left| \frac{\partial f}{\partial u}(t, u) \right| = \frac{1}{t}$$

Al tomar el límite cuando $t \rightarrow 0^+$, este supremo diverge a $+\infty$. Dado que la derivada parcial no está acotada uniformemente en el intervalo J , la función f no es globalmente Lipschitziana respecto a u uniformemente en J .

3. Sea la función con crecimiento polinomial:

$$f(t, u) = a(t)|u|^p, \quad u \in \mathbb{R}, \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R})$$

donde $p > 1$. Su derivada parcial respecto a u para $u \neq 0$ es:

$$\frac{\partial f}{\partial u}(t, u) = a(t)p|u|^{p-1} \operatorname{sgn}(u)$$

(Puesto que $p > 1$, la derivada en $u = 0$ existe y es nula, por lo que la función derivada resulta continua en todo $\mathbb{R}$). Sin embargo, al fijar un instante t donde $a(t) \neq 0$, el término $|u|^{p-1}$ diverge a $+\infty$ cuando $|u| \rightarrow \infty$. Esto implica que la derivada no está acotada globalmente en $\mathbb{R}$. Por consiguiente, f no es globalmente Lipschitziana en el espacio completo. No obstante, por aplicación directa del corolario anterior, la función sí es localmente Lipschitziana respecto a u , uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.

4. Sea la función matricial:

$$f(t, u) = A(t)u + B(t), \quad \begin{cases} A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n} \\ B(t) = (b_i(t))_{1 \leq i \leq n} \\ a_{ij}, b_i \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R}) \end{cases}$$

Ahora nótese que podemos calcular cada f_i como:

$$f_i(t, u) = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)u_k + b_i(t), \quad 1 \leq i \leq n$$

Y además $f \in C([\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ si fijamos $\Omega = \mathbb{R}^n$. Las derivadas parciales respecto a cada u_j son, $\forall t \in [\alpha, \beta], \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u) \right| = |a_{ij}(t)| \leq \max_{t \in [\alpha, \beta]} |a_{ij}(t)| = \|a_{ij}\|_\infty < +\infty$$

Y por lo tanto, todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $[\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n$. En consecuencia, la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.

5. Sea la función matricial:

$$f(t, u) = A(t) \begin{pmatrix} \sin(u_1) \\ \vdots \\ \sin(u_n) \end{pmatrix} + B(t)$$

Donde $A(t)$ y $B(t)$ son continuas en $[\alpha, \beta]$. Cada f_i se puede expresar como:

$$f_i(t, u) = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t) \sin(u_k) + b_i(t), \quad 1 \leq i \leq n$$

Que son además continuas en $[\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n$. Las derivadas parciales respecto a cada u_j son:

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u) \right| = |a_{ij}(t)| |\cos(u_j)| \leq |a_{ij}(t)| \leq \max_{t \in [\alpha, \beta]} |a_{ij}(t)| = \|a_{ij}\|_\infty < +\infty$$

Por lo tanto, todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas en $[\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n$, y la función f es globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.

Si las matrices $A(t)$ y $B(t)$ son continuas en todo $\mathbb{R}$, la función f localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$, ya que en cualquier intervalo compacto de tiempo $[\alpha, \beta]$ se cumple la condición de Lipschitzianidad global, pero puede que no se cumpla la acotación global en todo $\mathbb{R}$.

6. Sea la función:

$$f(t, u) = A(t) \begin{pmatrix} |u_1|^{p_1} \\ \vdots \\ |u_n|^{p_n} \end{pmatrix} + B(t), \quad p_i > 1, \quad 1 \leq i \leq n$$

Con además $A(t)$ y $B(t)$ continuas en $[\alpha, \beta]$. Cada f_i se puede expresar como:

$$f_i(t, u) = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)|u_k|^{p_k} + b_i(t) \in C([\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad 1 \leq i \leq n$$

Que son además continuas en $[\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^n$. Las derivadas parciales respecto a cada u_j son:

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u) \right| = |a_{ij}(t)|p_j|u_j|^{p_j-1}$$

Debido al corolario, es trivial ver que esta función es localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$. Sin embargo, si $A(t) \neq 0$, entonces existen i_0, j_0, t_0 tales que $a_{i_0 j_0}(t_0) \neq 0$. En este caso, la derivada parcial $\frac{\partial f_{i_0}}{\partial u_{j_0}}(t_0, u)$ diverge a $+\infty$:

$$\left| \frac{\partial f_{i_0}}{\partial u_{j_0}}(t_0, u) \right| = |a_{i_0 j_0}(t_0)|p_{j_0}|u_{j_0}|^{p_{j_0}-1} \xrightarrow{|u_{j_0}| \rightarrow \infty} p_{j_0}-1 > 0 + \infty$$

Demostrando que la función no es globalmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^n$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$, al tener una derivada parcial no acotada en el dominio completo.

1.2.1 Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz

Teorema 1.2.2 [Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz]

Sean $N \geq 1$, $\alpha < \beta$, y $f \in C([\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ una función globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$. Es decir, existe una constante $L \geq 0$ tal que:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\|, \quad \forall t \in [\alpha, \beta], \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^N$$

Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{R}^N$, el problema de valor inicial (PVI):

$$(P) \quad \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

el cual denotaremos habitualmente de forma abreviada como $u' = f(t, u)$ con $u(t_0) = u_0$, tiene una única solución globalmente definida en todo el intervalo $[\alpha, \beta]$, la cual se denota por:

$$u(t) = u(t; t_0, u_0), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. El problema de valor inicial (P) consiste en encontrar una función $u \in C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ que satisfaga la ecuación diferencial y la condición inicial.

Como se ha visto en resultados previos de ecuaciones diferenciales, podemos integrar la ecuación $u'(s) = f(s, u(s))$ entre el instante inicial t_0 y un instante arbitrario t :

$$\int_{t_0}^t u'(s)ds = \int_{t_0}^t f(s, u(s))ds \implies u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t f(s, u(s))ds$$

Por lo tanto, una función u es solución de (P) si y solo si $u \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ satisface la ecuación integral de Volterra equivalente:

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s))ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

A partir de esta formulación, definimos el operador integral de Picard $K : C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N) \rightarrow C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ dado por:

$$(Ku)(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds$$

Las soluciones del problema (P) se corresponden exactamente con los puntos fijos del operador K . Para demostrar que existe un único punto fijo, utilizaremos el Teorema del Punto Fijo de Banach.

El espacio vectorial $X = C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ equipado con la norma del supremo es un espacio de Banach. Para facilitar las estimaciones y garantizar que K sea una contracción, introducimos una norma equivalente conocida como la norma de Bielecki. Tomando un parámetro $\gamma > L$, definimos:

$$\|u\|_B = \max_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\gamma|t-t_0|} \|u(t)\|$$

Al ser equivalente a la norma del supremo, el espacio $(X, \|\cdot\|_B)$ sigue siendo un espacio de Banach. Evaluemos la distancia entre las imágenes de dos funciones $u, v \in X$ bajo el operador K . Asumiendo $t \geq t_0$, tenemos:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t (f(s, u(s)) - f(s, v(s))) ds \right\| \leq \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|f(s, u(s)) - f(s, v(s))\| ds$$

Aplicando la condición de Lipschitz global:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq L \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|u(s) - v(s)\| ds$$

Multiplicamos y dividimos el integrando por el factor exponencial $e^{\gamma(s-t_0)}$ para hacer aparecer la estructura de la norma de Bielecki:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq L \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} e^{\gamma(s-t_0)} \left(e^{-\gamma(s-t_0)} \|u(s) - v(s)\| \right) ds$$

Acotando el término entre paréntesis por la norma $\|u - v\|_B$:

$$\|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq L \|u - v\|_B \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} e^{\gamma(s-t_0)} ds = L \|u - v\|_B \left[\frac{e^{\gamma(s-t_0)}}{\gamma} \right]_{t_0}^t \leq \frac{L}{\gamma} e^{\gamma(t-t_0)} \|u - v\|_B$$

Multiplicando ambos lados por $e^{-\gamma(t-t_0)}$ se obtiene:

$$e^{-\gamma|t-t_0|} \|(Ku)(t) - (Kv)(t)\| \leq \frac{L}{\gamma} \|u - v\|_B$$

Un razonamiento simétrico aplicando propiedades de la integral para el caso $t \leq t_0$ conduce a la misma cota. Tomando el máximo sobre todo $t \in [\alpha, \beta]$, concluimos que:

$$\|Ku - Kv\|_B \leq \frac{L}{\gamma} \|u - v\|_B$$

Como hemos elegido $\gamma > L$, se cumple que $\frac{L}{\gamma} < 1$. Por lo tanto, el operador K es una contracción estricta en el espacio de Banach $(X, \|\cdot\|_B)$.

Por el Teorema del Punto Fijo de Banach, el operador K posee un único punto fijo $u \in X$. Esta función es la única solución global del problema de valor inicial en el intervalo $[\alpha, \beta]$. $\square$

Corolario 1.2.2

Como consecuencia directa de la aplicación del Teorema del Punto Fijo en la demostración anterior, para cada función continua $h_0 \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$, la sucesión de funciones definida recursivamente mediante el operador integral:

$$h_n(t) = K(h_{n-1})(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(s, h_{n-1}(s)) ds, \quad n \geq 1$$

converge uniformemente en $[\alpha, \beta]$ hacia la única solución $u(t)$ del problema de valor inicial (P).

A continuación, presentamos dos ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales que satisfacen las hipótesis del teorema y, por consiguiente, poseen una única solución global.

Ejemplo

1. **Sistema lineal no autónomo:** Consideramos el problema de valor inicial dado por:

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t), \quad u(t_0) = u_0 \in \mathbb{R}^N, \quad t_0 \in [\alpha, \beta]$$

donde $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N}$ y $B(t) = (b_i(t))_{1 \leq i \leq N}$, con coeficientes $a_{ij}, b_i \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R})$. Dado que las funciones $a_{ij}(t)$ son continuas en un intervalo compacto, alcanzan un valor máximo y están acotadas. Esto garantiza que la función $f(t, u) = A(t)u + B(t)$ sea globalmente Lipschitziana respecto a u , uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$. Por tanto, el problema tiene una única solución global.

2. **Sistema no lineal con derivadas espaciales acotadas:** Sea el sistema definido por sus componentes:

$$u'_i(t) = \sum_{j=1}^N a_{ij}(t) \sin(u_j(t)) + b_i(t), \quad 1 \leq i \leq N$$

con datos iniciales $u(t_0) = u_0$ y coeficientes $a_{ij}, b_i \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R})$. Las derivadas parciales de la función f respecto a las variables espaciales u_k son $a_{ik}(t) \cos(u_k)$. Como los coeficientes $a_{ik}(t)$ son continuos en el compacto $[\alpha, \beta]$ y el coseno está acotado por 1, todas las derivadas parciales están uniformemente acotadas. Aplicando el criterio de Lipschitzianidad visto anteriormente, f es globalmente Lipschitziana respecto a u , asegurando la existencia de una única solución global en $[\alpha, \beta]$.

Corolario 1.2.3

Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto arbitrario, y $f \in C(J \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ una función globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J$. Entonces, para cada $t_0 \in J$ y cada $u_0 \in \mathbb{R}^N$, el problema de valor inicial:

$$(P) \quad \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución globalmente definida en todo el intervalo J , la cual se denota por:

$$u(t) = u(t; t_0, u_0), \quad t \in J$$

Demostración. Dado que J es un intervalo abierto, existe una sucesión de intervalos cerrados y acotados

$\{J_n\}_{n \geq 1}$ que forman una cadena creciente y cuya unión recubre todo J . Es decir:

$$J_1 \subset J_2 \subset \dots \subset J_n \subset \dots, \quad \bigcup_{n \geq 1} J_n = J$$

Por ejemplo, si $J = (\alpha, \beta)$, basta tomar $J_n = [\alpha + \frac{1}{n}, \beta - \frac{1}{n}]$ para valores de n suficientemente grandes. Construcciones análogas aplican si $J = \mathbb{R}$ tomando $J_n = [-n, n]$, o en intervalos no acotados como $J = (\alpha, \infty)$ tomando $J_n = [\alpha + \frac{1}{n}, n]$.

Fijado el tiempo inicial $t_0 \in J$, existe un índice $n_0 \geq 1$ tal que $t_0 \in J_n$ para todo $n \geq n_0$. Consideremos la restricción del problema de valor inicial a un intervalo compacto genérico J_n (con $n \geq n_0$):

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J_n \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Al cumplir f la condición de Lipschitz uniformemente en todo J , también la cumple en J_n . Por el Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz, para cada $n \geq n_0$ existe una única solución $u_n(t)$ definida en el intervalo J_n .

Si consideramos un índice $m > n$, la función $u_m(t)$ es la solución única en J_m . Su restricción al subintervalo J_n sigue satisfaciendo la ecuación diferencial y el dato inicial, por lo que, debido a la unicidad en J_n , se concluye que $u_m(t) = u_n(t)$ para todo $t \in J_n$. Este hecho permite definir una función $u : J \rightarrow \mathbb{R}^N$ de manera consistente en todo el dominio J :

$$u(t) = u_n(t), \quad \text{donde } n \geq n_0 \text{ es cualquier índice tal que } t \in J_n$$

La función $u(t)$ está bien definida y es solución del problema (P) en J . Para verificar su unicidad, supongamos que existe otra solución $v : J \rightarrow \mathbb{R}^N$. Si ambas difirieran en algún punto $t_1 \in J$, existiría un índice $k \geq n_0$ tal que $t_1 \in J_k$. Sin embargo, al restringir ambas funciones a J_k , tendríamos dos soluciones distintas para el mismo problema de valor inicial en un intervalo compacto, lo cual contradice el teorema fundamental. Por tanto, $u(t) = v(t)$ para todo $t \in J$. $\square$

Observación sobre el relajamiento de hipótesis. Del proceso de construcción mediante compactos exhaustivos (sucesión J_n) empleado en la demostración anterior, se extrae un hecho de gran utilidad práctica. Como el Teorema fundamental global solo se aplica localmente sobre cada compacto J_n , no es necesario que la constante de Lipschitz de la función f sea la misma en todo J .

Basta exigir que f sea globalmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^N$ *uniformemente sobre cada subintervalo compacto* $[\alpha, \beta] \subset J$. Esta condición relajada es suficiente para asegurar la existencia y unicidad en cada J_n , permitiendo extender la solución a todo J y ampliando la clase de problemas que admiten solución global.

Ejemplo

Consideremos el siguiente problema de valor inicial autónomo:

$$\begin{cases} u'(t) = u(t)^2 \\ u(0) = u_0 > 0 \end{cases}$$

La función $f(t, u) = u^2$ es localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}$, uniformemente en $t \in \mathbb{R}$. Sin embargo, como se vio en ejemplos anteriores, su derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial u} = 2u$ no está acotada en todo $\mathbb{R}$, por lo que la función no satisface la condición de Lipschitz global.

Para resolver la ecuación diferencial explícitamente, separamos las variables. Como $u_0 > 0$, la solución será no nula en un entorno de $t = 0$, lo que nos permite dividir la ecuación por u^2 :

$$u^{-2}u' = 1 \implies -\frac{d}{dt}(u^{-1}) = 1$$

Integrando con respecto a la variable temporal t , obtenemos:

$$-\frac{1}{u(t)} = t - c \implies \frac{1}{u(t)} = -t + c$$

Imponiendo la condición inicial $u(0) = u_0$, determinamos la constante de integración c :

$$\frac{1}{u(0)} = c \implies c = \frac{1}{u_0}$$

Sustituyendo el valor de la constante y operando para despejar $u(t)$:

$$\frac{1}{u(t)} = -t + \frac{1}{u_0} = \frac{1 - tu_0}{u_0} \implies u(t) = \frac{u_0}{1 - tu_0}$$

Analizando el dominio de esta solución, observamos que el denominador se anula en el instante $t = 1/u_0$. Dado que $u_0 > 0$, este valor corresponde a un tiempo futuro positivo. Por consiguiente, si consideramos el avance temporal desde $t = 0$, la solución está definida únicamente en el intervalo $[0, 1/u_0)$.

Cuando el tiempo se aproxima al valor $1/u_0$, la solución diverge:

$$\lim_{t \rightarrow (1/u_0)^-} u(t) = +\infty$$

Este comportamiento se conoce como explosión en tiempo finito (*blow-up*). El ejemplo ilustra que, cuando una función carece de la condición de Lipschitz global y solo posee Lipschitzianidad local, no se puede garantizar la existencia global de la solución en todo el intervalo temporal de definición, justificando así la necesidad de las hipótesis del teorema fundamental global.

1.2.2 Teorema local de Cauchy-Lipschitz

Teorema 1.2.3 [Teorema local de Cauchy-Lipschitz]

Sean $t_0 \in \mathbb{R}$, $T > 0$, y consideremos el intervalo temporal $J = [t_0, t_0 + T]$. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$. Entonces, para cada $u_0 \in \Omega$, el problema de valor inicial:

$$(P) \quad \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

admite una única solución local. De manera más precisa:

1. Existe $\delta \in (0, T]$ tal que el problema (P) tiene una única solución $u \in C^1([t_0, t_0 + \delta], \mathbb{R}^N)$.
2. Si consideramos una bola cerrada $\overline{B}_R(u_0) = \{u \in \mathbb{R}^N : \|u - u_0\|_2 \leq R\} \subset \Omega$ tal que f es globalmente Lipschitziana respecto a u en dicha bola (uniformemente en $t \in J$), y definimos la cota del supremo:

$$M = \|f\|_\infty = \max_{(t,u) \in J \times \overline{B}_R(u_0)} \|f(t, u)\|_2$$

junto con el intervalo temporal de validez garantizada:

$$\delta_0 = \min \left\{ T, \frac{R}{M} \right\}$$


entonces el problema (P) tiene una única solución $u \in C^1([t_0, t_0 + \delta_0], \mathbb{R}^N)$.

Además, podemos definir un problema alternativo:

$$(P_F) \quad \begin{cases} u'(t) = F(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Dónde:

$$F(t, u) = \begin{cases} f(t, u), & \text{si } u \in \overline{B}_R(u_0) \\ f(t, \tilde{u}), & \text{si } u \notin \overline{B}_R(u_0) \end{cases} \quad \tilde{u} = u_0 + R \frac{u - u_0}{\|u - u_0\|_2}$$



Demostración. La demostración se estructura en tres etapas lógicas: primero, modificaremos el problema para garantizar una solución global (Etapa 1); luego, demostraremos que cualquier solución local original no escapa de cierta bola, probando así la unicidad (Etapa 2); y finalmente, comprobaremos que la solución global construida se restringe válidamente a nuestro intervalo de interés sin salir de dicha bola, asegurando la existencia (Etapa 3).

Etapa 1

Acometeremos la prueba estableciendo primero un problema modificado con existencia global, para luego demostrar que su solución coincide localmente con la del problema original (P).

Definimos una función auxiliar $F : J \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ que extienda a f fuera de la bola $\overline{B}_R(u_0)$ de forma constante a lo largo de las direcciones radiales:

$$F(t, u) = \begin{cases} f(t, u), & \text{si } \|u - u_0\|_2 \leq R \\ f(t, \tilde{u}), & \text{si } \|u - u_0\|_2 > R \end{cases}$$

donde $\tilde{u} = u_0 + R \frac{u - u_0}{\|u - u_0\|_2}$ es la proyección radial del punto u sobre la frontera de la bola (la esfera de radio R centrada en u_0). Al ser f continua y la proyección también continua, F es una función continua en todo $J \times \mathbb{R}^N$.

Comprobemos que F es globalmente Lipschitziana respecto a u en todo $\mathbb{R}^N$, con la misma constante L que f posee en la bola cerrada. Se presentan tres casos para $u, v \in \mathbb{R}^N$:

1. Si $u, v \in \overline{B}_R(u_0)$, entonces F coincide con f y la desigualdad se verifica directamente:

$$\|F(t, u) - F(t, v)\|_2 = \|f(t, u) - f(t, v)\|_2 \leq L\|u - v\|_2$$

2. Si $\|u - u_0\|_2 \leq R$ pero $\|v - u_0\|_2 > R$, evaluamos F usando la proyección $\tilde{v}$. Puesto que la proyección radial sobre un conjunto convexo es una contracción (es decir, $\|u - \tilde{v}\|_2 \leq \|u - v\|_2$), resulta:

$$\|F(t, u) - F(t, v)\|_2 = \|f(t, u) - f(t, \tilde{v})\|_2 \leq L\|u - \tilde{v}\|_2 \leq L\|u - v\|_2$$

3. Si ambos puntos son exteriores a la bola ($\|u - u_0\|_2 > R$ y $\|v - u_0\|_2 > R$), evaluamos en las proyecciones $\tilde{u}$ y $\tilde{v}$. Por la misma propiedad de contracción de la proyección radial:

$$\|F(t, u) - F(t, v)\|_2 = \|f(t, \tilde{u}) - f(t, \tilde{v})\|_2 \leq L\|\tilde{u} - \tilde{v}\|_2 \leq L\|u - v\|_2$$

Queda probado que F es globalmente Lipschitziana en todo $\mathbb{R}^N$, uniformemente en J . En virtud del Teorema fundamental global de Cauchy-Lipschitz, el problema de valor inicial modificado:

$$(P_F) \quad \begin{cases} U'(t) = F(t, U(t)), & t \in J \\ U(t_0) = u_0 \end{cases}$$

posee una única solución global $U \in C^1(J, \mathbb{R}^N)$.

A continuación, evaluaremos hasta qué instante temporal t esta solución $U(t)$ permanece dentro de la bola $\overline{B}_R(u_0)$. Mientras $U(t) \in \overline{B}_R(u_0)$, la función F coincide idénticamente con f , por lo que $U(t)$ será también solución del problema original (P) .

Tomemos un $t > t_0$ asumiendo que la solución se mantiene en la bola en el intervalo $[t_0, t]$. Aplicando la ecuación integral equivalente al PVI y tomando normas:

$$\|U(t) - u_0\|_2 = \left\| \int_{t_0}^t F(s, U(s)) ds \right\|_2 \leq \int_{t_0}^t \|F(s, U(s))\|_2 ds$$

Como $U(s) \in \overline{B}_R(u_0)$ para $s \in [t_0, t]$, sabemos que $F(s, U(s)) = f(s, U(s))$. Además, la norma de f en la bola está acotada superiormente por $M = \|f\|_\infty$. Sustituyendo esta cota:

$$\|U(t) - u_0\|_2 \leq \int_{t_0}^t M ds = M(t - t_0)$$

Para garantizar que la solución no escape de la bola, debemos asegurar que la distancia al centro no supere R , lo que requiere $M(t - t_0) \leq R$. Despejando, la condición se cumple siempre que:

$$t - t_0 \leq \frac{R}{M}$$

Considerando que el dominio temporal está restringido a longitud T , el intervalo máximo asegurado para la permanencia en la bola viene dado por $\delta_0 = \min\{T, \frac{R}{M}\}$, nótese que si $M = \|f\|_\infty = 0$, entonces tomaríamos $\delta_0 = T$ y la solución permanecería en la bola durante todo el intervalo.

Por consiguiente, para todo $t \in [t_0, t_0 + \delta_0]$, se cumple $\|U(t) - u_0\|_2 \leq R$. En todo este subintervalo, el sistema modificado (P_F) coincide con el sistema original (P) , y la solución $U(t)$ resuelve (P) .

Para concluir la unicidad, sea $u(t)$ cualquier otra solución de (P) definida en $[t_0, t_0 + \delta_0]$. Por continuidad, existe un intervalo maximal donde $u(t) \in \overline{B}_R(u_0)$. Mediante el mismo razonamiento integral previo, el tiempo requerido para que la solución abandone la bola es estrictamente mayor que δ_0 . Así, $u(t)$ nunca abandona la bola en $[t_0, t_0 + \delta_0]$. Como consecuencia, $u(t)$ también es solución de (P_F) en ese intervalo. Dada la unicidad global de las soluciones de (P_F) , deducimos que $u(t) \equiv U(t)$ en $[t_0, t_0 + \delta_0]$.

Etapa 2

Siempre que $u(t)$ sea una solución de (P) en un intervalo $[t_0, t_0 + \delta]$ con $\delta \leq \delta_0$, se cumple que $u(t) \in \overline{B}_R(u_0)$, $\forall t \in [t_0, t_0 + \delta]$.

Por reducción al absurdo, supongamos que $\exists \tilde{t} \in [t_0, t_0 + \delta]$ tal que $\|u(\tilde{t}) - u_0\|_2 > R$, pero esto implicaría:


$$\exists t_1 \in [t_0, \tilde{t}) \text{ tal que } \begin{cases} \|u(t) - u_0\|_2 < R \text{ si } t_0 \leq t < t_1 \\ \|u(t_1) - u_0\|_2 = R \end{cases}$$

Por lo que podemos deducir que:

$$\begin{aligned}
 R = \|u(t_1) - u_0\|_1 &= \left\| \int_{t_0}^{t_1} u'(s) ds \right\|_1 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} f(s, u(s)) ds \right\|_1 \leq \int_{t_0}^{t_1} \|f(s, u(s))\|_1 ds \leq \|f\|_\infty (t_1 - t_0) \implies \\
 \implies t_1 - t_0 &\geq \frac{R}{\|f\|_\infty} \implies t_1 \geq t_0 + \frac{R}{\|f\|_\infty} \geq t_0 + \delta_0 \equiv \boxed{t_1 \geq t_0 + \delta_0!!}
 \end{aligned}$$

Habiendo así reducido al absurdo, se concluye que $\|u(t) - u_0\|_2 \leq R$ para todo $t \in [t_0, t_0 + \delta]$, y por lo tanto $u(t)$ es también solución de (P_F) en ese intervalo. Por la unicidad de la solución de (P_F) , se deduce que $u(t) \equiv U(t)$ en $[t_0, t_0 + \delta]$.

Un dibujo que nos puede ayudar a entender esta demostración es el siguiente:



Etapas 3

En esta tercera etapa queremos ver la existencia de la solución, es decir, que (P) tiene al menos una solución en el intervalo $[t_0, t_0 + \delta_0]$.

Sabemos que $u(t)$ es la solución de (P_F) en el intervalo $[t_0, t_0 + \delta]$. Si $t_0 \leq t \leq t_0 + \delta_0$, entonces $u(t) \in B_R(u_0)$.

Ahora si tenemos un $\tilde{t}$ tal que $\|u(\tilde{t}) - u_0\|_2 > R$, entonces:

$$\exists t_1 \leq \tilde{t} \text{ tal que } \|U(t_1) - u_0\|_2 = R$$

Por lo que podemos deducir que:

$$R = \|U(t_1) - u_0\|_2 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} U'(s) ds \right\|_2 = \left\| \int_{t_0}^{t_1} F(s, U(s)) ds \right\|_2 \leq \int_{t_0}^{t_1} \|F(s, U(s))\|_2 ds$$

Como para todo $s \in [t_0, t_1]$ se cumple que $\|U(s) - u_0\|_2 \leq R$, sabemos por definición que $F(s, U(s)) = f(s, U(s))$. Además, en esa bola la norma 2 de f está acotada por M . Por tanto:

$$\begin{aligned}
 \int_{t_0}^{t_1} \|f(s, U(s))\|_2 ds &\leq \int_{t_0}^{t_1} M ds = M(t_1 - t_0) \implies \\
 \implies t_1 - t_0 &\geq \frac{R}{M} \implies t_1 \geq t_0 + \frac{R}{M} \geq t_0 + \delta_0 \equiv \boxed{t_1 \geq t_0 + \delta_0!!}
 \end{aligned}$$

Lo cual es una flagrante contradicción, ya que habíamos supuesto que $\tilde{t} \in [t_0, t_0 + \delta_0]$ (por lo que $\tilde{t} \leq t_0 + \delta_0$) y que $t_1 \leq \tilde{t}$. Concluimos así que $U(t)$ no escapa de la bola en $[t_0, t_0 + \delta_0]$ y, por tanto, es solución de (P) garantizando la existencia. □

Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo

Sea el siguiente PVI:

$$P = \begin{cases} u'_i = \sum_{j=1}^N a_{ij}(t) |u_j|^{P_{ij}} + b_j(t), & i, j \in \{1, \dots, N\} \ P_{ij} > 1 \ a_{ij}, b_j \in C([t_0, t_0 + T], \mathbb{R}) \\ u(t_0) = u_0 \in \mathbb{R}^N \end{cases}$$

Entonces buscamos $f : [t_0, t_0 + T] \times \underbrace{\mathbb{R}^N}_{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, cuyas derivadas parciales respecto a u son:

$$\frac{\partial f_i}{\partial u_j} = a_{ij}(t) \cdot \text{signo de } (u_j) \cdot P_{ij} |u_j|^{\overbrace{P_{ij}-1}^{>0}} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, N\}$$

Que son continuas en $J \times \mathbb{R}^N$, por lo tanto $f(t, u)$ es localmente Lipschitziana respecto a u en $\mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J = [t_0, t_0 + T]$.

Por el teorema local de Cauchy-Lipschitz, tiene una única solución local $u(t)$ definida en un intervalo $[t_0, t_0 + \delta]$ con $\delta \leq T$.

1.2.3 teorema de unicidad global

Teorema 1.2.4 [Teorema de unicidad global]

Bajo las condiciones del teorema local de Cauchy-Lipschitz, es decir, sean $J = [t_0, t_0 + T]$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $u_0 \in \Omega$, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$.

Entonces en cualquier intervalo de la forma $[t_0, t_0 + h]$, ó $[t_0, t_0 + h)$, donde $h \in (0, T]$, el problema de valor inicial (P) tiene a lo sumo una solución.

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Demostración. Sea el intervalo $[t_0, t_0 + h]$ donde (P) tiene al menos una solución, supongamos que hay dos soluciones $u_1(t)$ y $u_2(t)$ definidas en dicho intervalo, por lo que si son distintas $\exists \tilde{t} \in [t_0, t_0 + h)$ tal que $u_1(\tilde{t}) \neq u_2(\tilde{t})$, reduzcamos al absurdo.

Ahora podemos aplicar el Teorema de Cauchy-Lipschitz local, ya que f es localmente Lipschitziana respecto a u en Ω , uniformemente en $t \in J$. Por lo tanto, existe un $\delta > 0$ tal que el PVI tiene una única solución en el intervalo $[t_0, t_0 + \delta]$, con además $\delta < h$. Definamos el conjunto:

$$D = \{\delta > 0 : u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0, t_0 + \delta]\} \neq \emptyset$$

El cual está acotado superiormente ya que $\delta < h$. Definamos ahora:

$$\delta^* = \sup D \longrightarrow$$

Y por tanto existe una sucesión $\{\delta_n\}_{n \geq 1} \subset D$ creciente que converge a δ^* :

$$\delta_n \nearrow \delta^*$$

Dónde además, al ser δ^* el supremo, se cumple que:

$$u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0, t_0 + \delta_n], \forall n \geq 1 \implies u_1(t_0 + \delta_n) = u_2(t_0 + \delta_n), \forall n \geq 1$$

Ahora, aplicando la continuidad de u_1 y u_2 :

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} u_1 = u_2 \text{ en } \bigcup_{n \geq 1} [t_0, t_0 + \delta_n] = [t_0, t_0 + \delta^*) \\ t_0 + \delta_n \rightarrow t_0 + \delta^* \end{array} \right. &\xRightarrow[\text{por continuidad}]{} u_1(t_0 + \delta^*) = u_2(t_0 + \delta^*) \implies \\ &\implies \boxed{u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0, t_0 + \delta^*]} \end{aligned}$$

Ahora definamos:

$$t_0^* = t_0 + \delta^* \in [t_0, t_0 + h]$$

Sabemos que $u_1(t_0^*) = u_2(t_0^*) \in \Omega$, y por tanto podemos definir el siguiente PVI:

$$(P^*) = \left\{ u'(t) = f(t, u(t)) u(t_0^*) = u_1(t_0^*) = u_2(t_0^*) \in \Omega \right.$$

Ahora aplicando de nuevo el Teorema de Cauchy-Lipschitz local con el mismo argumento, existe un $\delta > 0$ tal que (P^*) tiene una única solución en el intervalo $[t_0^*, t_0^* + \delta]$, sin embargo, como u_1 y u_2 son soluciones de (P^*) en dicho intervalo, se concluye que:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1(t) = u_2(t), \forall t \in [t_0^*, t_0^* + \delta] \\ t_0^* + \delta = t_0 + \delta^* + \delta > t_0 + \delta^* \end{array} \right. \implies \delta^* \neq \sup D!!$$

Lo cual es una contradicción, y por tanto $u_1(t) = u_2(t)$ para todo $t \in [t_0, t_0 + h]$.

□

1.3 Solución maximal de un PVI

En esta sección vamos a analizar la existencia de una solución maximal de un PVI, es decir, una solución que no pueda ser prolongada más allá de su intervalo de definición, y la unicidad de dicha solución maximal.

1.3.1 Existencia de la solución maximal

Antes de ver el teorema de existencia de la solución maximal, debemos definir qué es una **prolongación** ó **extensión** de una solución de un PVI, y además el espacio de soluciones Σ de un PVI.

Definición 1.3.1 [Espacio de soluciones de un PVI]

Sea $J \in \{[t_0, t_0 + T], [t_0, t_0 + T), [t_0, \infty)\}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $u_0 \in \Omega$, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$, en subintervalos

compactos de J . Entonces, el problema de valor inicial:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)), & t \in J \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Con su conjunto de soluciones Σ definido como:

$$\Sigma = \{(I, u_I) : \begin{cases} I = [t_0, t_0 + h], [t_0, t_0 + h) \subset J \\ u_I \in C^1(I, \mathbb{R}^N) \end{cases} \wedge u_I \text{ es solución de } (P) \text{ en } I\}$$

Definición 1.3.2 [Prolongación de una solución]

Sean $(I_1, u_{I_1}), (I_2, u_{I_2}) \in \Sigma$ dos soluciones del PVI (P) .

Diremos que (I_2, u_{I_2}) es una **prolongación** ó **extensión** de (I_1, u_{I_1}) si:

$$I_1 \subset I_2 \quad \text{y} \quad u_{I_2}|_{I_1} = u_{I_1}$$

Y se denotara como:

$$(I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2})$$

Se dice además que esta prolongación es **estricta** si $I_1 \subsetneq I_2$.

Finalmente, cabe observar que debido al Teorema de unicidad global, solo con tener que $I_1 \subset I_2$ se deduce que $u_{I_2}|_{I_1} = u_{I_1}$, es decir, que $(I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2})$.

Por todo esto además, la relación $\leq$ es un orden total en Σ , ya que:

1. Reflexiva:

$$(I, u_I) \leq (I, u_I)$$

Al ser $I \subset I$ y $u_I|_I = u_I$.

2. Antisimétrica:

$$\begin{cases} (I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2}) \\ (I_2, u_{I_2}) \leq (I_1, u_{I_1}) \end{cases} \implies (I_1, u_{I_1}) = (I_2, u_{I_2})$$

Ya que $I_1 \subset I_2$ y $I_2 \subset I_1$ implica $I_1 = I_2$, y por tanto $u_{I_1} = u_{I_2}$ aplicando las restricciones de cada función en el dominio contrario.

3. Transitiva:

$$\begin{cases} (I_1, u_{I_1}) \leq (I_2, u_{I_2}) \\ (I_2, u_{I_2}) \leq (I_3, u_{I_3}) \end{cases} \implies (I_1, u_{I_1}) \leq (I_3, u_{I_3})$$

Ya que $I_1 \subset I_2$ y $I_2 \subset I_3$ implica $I_1 \subset I_3$, y por tanto $u_{I_3}|_{I_1} = u_{I_2}|_{I_1} = u_{I_1}$.

Dejando así el conjunto de soluciones Σ como un conjunto totalmente ordenado por la relación $\leq$.

Una vez definidas estas nociones, podemos enunciar el teorema de existencia de la solución maximal.

Teorema 1.3.1 [Teorema de existencia de la solución maximal]

bajo las condiciones generales, es decir, sea $J \in \{[t_0, t_0 + T], [t_0, t_0 + T), [t_0, \infty)\}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $u_0 \in \Omega$, y $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en $t \in J$, en subintervalos compactos de J . Entonces, el problema de valor inicial:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Con espacio de soluciones Σ tiene una única solución maximal, es decir, no prolongable estrictamente a su derecha denotada por:

$$(I^*, u^*) \in \Sigma$$

Demostración. El intervalo maximal I^* se propone como:

$$I^* = \bigcup_{(I, u_I) \in \Sigma} I$$

Y la función u^* se define como:

$$u^*(t) = u_I(t) \quad \text{para todo } t \in I$$

donde $(I, u_I) \in \Sigma$ es cualquier solución que contenga a t , esta solución está bien definida ya que si $t \in I_1 \cap I_2$ para dos soluciones $(I_1, u_{I_1}), (I_2, u_{I_2}) \in \Sigma$, entonces por el Teorema de unicidad global se cumple que $u_{I_1}(t) = u_{I_2}(t)$, y por tanto $u^*(t)$ no depende de la elección de la solución que contenga a t . $\square$

Tras haber visto este resultado, sabemos que cualquier PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Bajo las condiciones generales, tiene una única solución maximal $(I^*, u^*) \in \Sigma$, que no es prolongable estrictamente a su derecha.

1.4 Comportamiento de la solución maximal y teoremas fundamentales de la teoría de Cauchy-Lipschitz

1.4.1 Primer teorema fundamental

Teorema 1.4.1 [Primer teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, t_0 + T]$, $f \in C(J \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J$, $u_0 \in \mathbb{R}^N$, y sea (I, u) la solución maximal del PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces se debe cumplir una y solo una de las siguientes alternativas:

1. $I = J$, en cuyo caso la solución maximal está **globalmente definida** en todo el intervalo J .

2. $I = [t_0, T_{\max})$, con $T_{\max} \leq t_0 + T$, y en tal caso:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

En cuto caso se dice que la solución maximal (I, u) **explota** en tiempo $T_{\max}$.
Nótese que el limite debe ser superior, ya que si no, la afirmación es **falsa**.

Observación 1.4.1

Nótese que:


$$\exists t_n \nearrow T_{\max} \text{ tal que } \lim_{n \rightarrow \infty} \|u(t_n)\| = +\infty$$

Pero puede ser que por ejemplo, si $N = 2$, se cumpla que:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} |u_1(t_n)| = +\infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |u_2(t_n)| \leq C \forall t \in [t_0, T_{\max}) \end{cases} \implies \lim_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

Por lo que debe ser un límite superior.

Otro motivo para usar este límite, es tener una solución que alterne entre explotar y no explotar, pero donde sí exista esa sucesión de puntos dónde explota, observese en la siguiente gráfica:



Probemos ahora el teorema.

Demostración. Como hemos visto, tenemos 2 posibles casos.

En el **primer caso**, si $I = J$, entonces la solución maximal está globalmente definida en todo el intervalo J , y por el Teorema de unicidad global, es la única solución de (P) en J .

Veamos ahora el **segundo caso**, que es más interesante, a priori tenemos dos posibilidades:

$$\begin{cases} I = [t_0, T_{\max}], \text{ con } T_{\max} < t_0 + T \\ I = [t_0, T_{\max}), \text{ con } T_{\max} \leq t_0 + T \end{cases}$$

Probemos que la primera posibilidad es imposible, y después probemos la segunda

1. Supongamos que $I = [t_0, T_{\max}]$, con $T_{\max} < t_0 + T$.
2. Sabemos por RELLENAR, $\exists \delta > 0$ tal que el PVI tiene una única solución en el intervalo $[T_{\max}, T_{\max} + \delta]$, y por tanto podemos prolongar estrictamente la solución maximal (I, u) a su derecha, lo cual es una contradicción de que (I, u) sea maximal. Por lo tanto, la primera posibilidad es imposible.

Si se quisiera extender la solución maximal a su derecha, se podría hacer definiendo la función:

$$\tilde{u}(t) = \begin{cases} u(t), & t \in [t_0, T_{\max}] \\ w(t), & t \in [T_{\max}, T_{\max} + \delta] \end{cases}$$

Donde $w(t)$ es la solución del PVI:

$$\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(T_{\max}) = u(T_{\max}) \end{cases}$$

Y por el Teorema de unicidad global, $w(t)$ es la única solución de este PVI en el intervalo $[T_{\max}, T_{\max} + \delta]$, y además $\tilde{u}(t)$ es continua y derivable en todo el intervalo $[t_0, T_{\max} + \delta]$, por lo que $\tilde{u}(t)$ es una prolongación estricta de la solución maximal (I, u) a su derecha, lo cual es una contradicción.

3. Ahora veamos el segundo caso, que es el más interesante.
Supongamos que $I = [t_0, T_{\max})$, con $T_{\max} \leq t_0 + T$.

Definamos además el conjunto:

$$\Gamma = \{u(t) : t \in I\} \text{ denominado órbita de } (I, u)$$

Veremos más adelante la prueba de un lema que nos dice que si Γ es no acotada, entonces la solución maximal (I, u) explota en tiempo $T_{\max}$.

Ahora razonemos por reducción al absurdo. Supongamos que Γ es acotada entonces $\bar{\Gamma}$ es compacto, y por tanto $J \times \bar{\Gamma}$ es compacto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$.

Sea ahora:

$$\|f\|_{\infty} = \max_{\|f(t,x)\|: (t,x) \in J \times \bar{\Gamma}}$$

Y sea la sucesión:

$$t_n = T_{\max} - \frac{1}{n} \nearrow T_{\max}$$

Ahora como Γ es acotada, la sucesión $\{u(t_n)\}_{n \geq 1}$ es acotada, y por, al ser una sucesión acotada en un compacto, podemos aplicar el teorema de Bolzano-Weierstrass, y por tanto existe una subsucesión convergente:

$$\exists \mu(t_{n_m}) \rightarrow u^* \in \mathbb{R}^N$$

Y por lo tanto también se cumple que:

$$t_{n_m} \rightarrow T_{\max} \implies u(t_{n_m}) \rightarrow u^* \in \mathbb{R}^N$$

Ahora podemos desarrollar:

$$\|u(t_{n_m}) - u(t)\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} u'(s) ds \right\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} f(s, u(s)) ds \right\| \leq \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u(s))\| ds \leq \|f\|_{\infty} |t_{n_m} - t|$$

Y por lo tanto, tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$:

$$\|u^* - u(t)\| = \|f\|_\infty |T_{\max} - t|$$

Prolongando así:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = u^* \in \mathbb{R}^N$$

Pero esto contradice que la solución maximal (I, u) no es prolongable estrictamente a su derecha, ya que habríamos prolongado la solución un punto.

Nótese además que la derivada está bien definida en $T_{\max}$, ya que:

$$u'(t) = f(t, u(t)) \rightarrow f(T_{\max}, u^*) \in \mathbb{R}^N$$

Por tanto sabemos que Γ es no acotada, pero falta ver que el punto de explosión es $T_{\max}$.

Sea una sucesión $t_n \in I$ tal que $\|u(t_n)\| \geq n$, como t_n es acotada en un compacto hay una subsucesión convergente $t_{n_m} \rightarrow t^* \in [t_0, T_{\max}]$, dónde:

$$\|u(t_{n_m})\| \geq n_m \rightarrow +\infty \implies \lim_{m \rightarrow \infty} \|u(t_{n_m})\| = +\infty$$

Pero ahora debemos probar que $t^* = T_{\max}$, para que así se cumpla que:

$$\overline{\lim}_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

Y así concluir que la solución maximal (I, u) explota en tiempo $T_{\max}$.

RELLENAR ESTA PARTE

□

1.4.2 Segundo teorema fundamental

Teorema 1.4.2 [Segundo teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, +\infty)$, $f \in C(J \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en subintervalos compactos de J , y sea (I, u) la solución maximal del PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces $I = [t_0, T_{\max})$, con $T_{\max} \in (t_0, +\infty]$, y en tal caso:

$$\overline{\lim}_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty \quad (\text{si } T_{\max} < +\infty)$$

Demostración. Si $T_{\max} = +\infty$, entonces $I = J = [t_0, +\infty)$, y la solución maximal está globalmente definida en todo el intervalo J . En este caso no hay explosión en tiempo finito.

Supongamos que $I \subsetneq J$, es decir, $T_{\max} < +\infty$. En principio, el intervalo maximal I podría tener dos formas:

$$\begin{cases} I = [t_0, T_{\max}], \text{ con } T_{\max} < +\infty \\ I = [t_0, T_{\max}), \text{ con } T_{\max} < +\infty \end{cases}$$

Pero el primer caso es imposible. Si $I = [t_0, T_{\max}]$, el valor $u(T_{\max}) \in \mathbb{R}^N$ estaría bien definido. Como f satisface las hipótesis del teorema de existencia y unicidad local (Picard-Lindelöf), podríamos considerar un nuevo PVI tomando como instante inicial $T_{\max}$:

$$\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(T_{\max}) = u(T_{\max}) \end{cases}$$

Esto nos garantizaría la existencia de una solución local w definida en un intervalo $[T_{\max}, T_{\max} + \delta)$ con $\delta > 0$. Concatenando u con w , obtendríamos una solución al problema original definida en $[t_0, T_{\max} + \delta)$, lo cual contradice directamente la maximalidad del intervalo I . Por lo tanto, el intervalo debe ser necesariamente abierto por la derecha: $I = [t_0, T_{\max})$.

Tenemos que comprobar ahora que la solución $u(t)$ explota al acercarse a $T_{\max}$, es decir, que la órbita:

$$\Gamma = \{u(t) : t \in [t_0, T_{\max})\} \text{ es no acotada}$$

Supongamos por reducción al absurdo que Γ es acotada. Entonces, su clausura $\bar{\Gamma}$ es un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^N$, y por el Teorema de Heine-Borel, es compacto. Definimos el cilindro compacto $K = [t_0, T_{\max}] \times \bar{\Gamma} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$.

Como f es continua en K , alcanza un máximo por el teorema de Weierstrass. Podemos acotar su norma:

$$\|f\|_{\infty} = \max_{(t,x) \in K} \|f(t, x)\| < +\infty$$

Tomemos una sucesión de tiempos $t_n = T_{\max} - \frac{1}{n}$ de manera que $t_n \nearrow T_{\max}$. La sucesión de puntos correspondientes $\{u(t_n)\}_{n \geq 1} \subset \Gamma$ es acotada por hipótesis. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente:

$$\exists u(t_{n_m}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u^* \in \mathbb{R}^N$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, para cualquier $t \in I$ y para nuestro t_{n_m} , se cumple que:

$$u(t_{n_m}) - u(t) = \int_t^{t_{n_m}} u'(s) ds = \int_t^{t_{n_m}} f(s, u(s)) ds$$

Tomando normas e introduciendo el valor absoluto en los límites de integración para asegurar que el intervalo es positivo, acotamos usando el supremo de f :

$$\|u(t_{n_m}) - u(t)\| \leq \left| \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u(s))\| ds \right| \leq \|f\|_{\infty} |t_{n_m} - t|$$

Fijando t y tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad, dado que $t_{n_m} \rightarrow T_{\max}$ y $u(t_{n_m}) \rightarrow u^*$, obtenemos:

$$\|u^* - u(t)\| \leq \|f\|_{\infty} |T_{\max} - t|, \quad \forall t \in I$$

Si ahora tomamos el límite cuando $t \nearrow T_{\max}$, la parte derecha de la desigualdad tiende a 0, lo que implica que:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = u^* \in \mathbb{R}^N$$

Como el límite de $u(t)$ existe y es finito, podemos definir $u(T_{\max}) = u^*$. Esto extiende la solución de forma continua al intervalo cerrado $[t_0, T_{\max}]$, lo cual ya probamos en la primera parte que es imposible porque contradice la maximalidad de la solución.

Esta contradicción proviene de suponer que Γ es acotada. Por lo tanto, la órbita debe ser no acotada, concluyendo la demostración:

$$\overline{\lim}_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

□

$$n \geq 1, \quad t_n \in T = [t_0, T_{\max}), \quad \|u(t_n)\| \geq n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u(t_n)\| = +\infty, \quad \{t_n\}_{n \geq 1} \text{ es acotada}$$

por Bolzano-Weierstrass, $\exists t_{n_m} \rightarrow t^* \in [t_0, T_{\max}]$.

$$\begin{cases} t^* < T_{\max} \\ t^* = T_{\max} \end{cases}$$

$$\|u(t_{n_m})\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \|u(t^*)\|$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|u(t_{n_m})\| = \|u(t^*)\| \quad \text{contradicción}$$

$$t^* = T_{\max}, \quad t_{n_m} \nearrow T_{\max} = t^*$$

$$\|u(t_{n_m})\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty, \quad \limsup_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

1.4.3 Tercer teorema fundamental

Teorema 1.4.3 [Tercer teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, +\infty)$, $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, $f \in C(J \times \Omega, \mathbb{R}^N)$ una función localmente Lipschitziana respecto a $u \in \Omega$, uniformemente en subintervalos compactos de J , y sea (I, u) la solución maximal del PVI:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces $I = [t_0, T_{\max})$ para algún $T_{\max} \in (t_0, +\infty]$. Además, cuando $T_{\max} < +\infty$, se cumple al menos una de las siguientes alternativas:

1. Explosión en tiempo $T_{\max}$:

$$\overline{\lim}_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty$$

2. $\exists \{t_n\}_{n \geq 1} \subset I$ y $u_\omega \in \partial\Omega$ tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u(t_n) = u_\omega \in \partial\Omega$$

(la solución se acerca a la frontera del conjunto abierto Ω)

Demostración. Si $I = J = [t_0, +\infty)$, entonces la solución maximal está globalmente definida en todo el intervalo J . En este caso no hay explosión en tiempo finito ni acercamiento a la frontera de Ω . Supongamos que $I \subsetneq J$, entonces $I = [t_0, T_{\max})$ o $I = [t_0, T_{\max}]$ para algún $T_{\max} < +\infty$. Como ya probamos en el teorema anterior, el caso $I = [t_0, T_{\max}]$ es imposible, por lo que necesariamente $I = [t_0, T_{\max})$.

$$\Gamma = \{u(t) : t \in [t_0, T_{\max})\}$$

entonces

$$\begin{cases} \Gamma \text{ es no acotada} \implies \overline{\lim}_{t \nearrow T_{\max}} \|u(t)\| = +\infty \\ \Gamma \text{ es acotada} \implies \bar{\Gamma} \subset \bar{\Omega} \end{cases}$$

- O bien $\bar{\Gamma} \subset \Omega$
- O bien $\bar{\Gamma} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$

Veamos el primer caso. Supongamos que $\bar{\Gamma} \subset \Omega$. Entonces,

$$\|f\|_{\infty} = \max_{(t,x) \in [t_0, T_{\max}] \times \bar{\Gamma}} \|f(t, x)\| < +\infty$$

es importante que $\bar{\Gamma} \subset \Omega$ ya que f puede no estar definida en $\partial\Omega$.

Tomamos una sucesión de tiempos $t_n = T_{\max} - \frac{1}{n}$ de manera que $t_n \nearrow T_{\max}$. La sucesión de puntos correspondientes $\{u(t_n)\}_{n \geq 1} \subset \Gamma$ es acotada (porque $\bar{\Gamma}$ es compacto). Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente:

$$\exists u(t_{n_m}) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} u^* \in \bar{\Gamma} \subset \Omega$$

$$\|u(t_{n_m}) - u(t)\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} \underbrace{f(s, u(s))}_{u'(s)} ds \right\| \leq \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u(s))\| ds \leq \|f\|_{\infty} |t_{n_m} - t|$$

En el límite cuando $m \rightarrow \infty$:

$$\|u^* - u(t)\| \leq \|f\|_{\infty} |T_{\max} - t|, \quad \forall t \in I$$

Tomando el límite cuando $t \nearrow T_{\max}$, obtenemos:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u(t) = u^* \in \Omega$$

Esto contradice que la solución maximal (I, u) no es prolongable estrictamente a su derecha, ya que habríamos prolongado la solución un punto. Por lo tanto, el primer caso es imposible.

Por lo tanto, necesariamente se cumple que $\bar{\Gamma} \cap \partial\Omega \neq \emptyset$, es decir, la solución se acerca a la frontera del conjunto abierto Ω .

$$\exists u_{\omega} \in \partial\Omega \cap \bar{\Gamma}$$

$$u(t_n) \in \Gamma, \quad t_n \in I = [t_0, T_{\max}), \quad u(t_n) \rightarrow u_{\omega} \in \partial\Omega$$

$$\{t_n\}_{n \geq 1} \text{ acotada}$$

por el teorema de Bolzano-Weierstrass, $\exists t_{n_m} \rightarrow t^* \in [t_0, T_{\max}]$.

Veamos que $t^* = T_{\max}$. Supongamos que $t^* < T_{\max}$. Entonces, por continuidad de $u(t)$ en $[t_0, T_{\max})$:

$$u(t_{n_m}) \rightarrow u(t^*) \in \Omega$$


Pero esto contradice que $u(t_{n_m}) \rightarrow u_{\omega} \in \partial\Omega$. Por lo tanto, necesariamente $t^* = T_{\max}$, y así se cumple que:

$$u(t_n) \rightarrow u_{\omega} \in \partial\Omega, \quad t_n \nearrow T_{\max}$$

□

Ejemplo

$\Omega \longrightarrow$



$$u(s_n), n \geq 1 \quad \|u(s_n)\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

$$u(t_n), n \geq 1 \quad u(t_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u_\omega \in \Omega$$

1.4.4 Cuarto teorema fundamental

Teorema 1.4.4 [Cuarto teorema fundamental de la teoría de Cauchy-Lipschitz]

Sean $J = [t_0, t_0 + T]$, $\Omega = B_R(q)$, $f \in C(J \times \bar{\Omega}, \mathbb{R}^N)$ una función globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \bar{\Omega}$, uniformemente en $t \in J$. Entonces para cada $u_0 \in \Omega$, el Problema de Valor Inicial (PVI):

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución maximal $(I_{\max}, u_{\max})$. Además, el intervalo maximal de existencia cumple que o bien $I_{\max} = J$, o bien $I_{\max} = [t_0, T_{\max}]$ con $T_{\max} < t_0 + T$. En este último caso, cuando la solución no alcanza todo el intervalo J , se cumple necesariamente que:

$$u_{\max}(T_{\max}) \in \partial\Omega$$

Demostración. Sea Σ el conjunto de todas las soluciones locales del PVI (P). Es decir, Σ está formado por los pares (I, u_I) tales que $I \subset J$ es un intervalo con $t_0 \in I$, $u_I(t_0) = u_0$, $u_I(t) \in \bar{\Omega}$ para todo $t \in I$, y cumplen la ecuación diferencial:

$$u_I'(t) = f(t, u_I(t)), \quad \forall t \in I$$

Por el teorema de Cauchy-Lipschitz (o Picard-Lindelöf) local, dado que f es continua y Lipschitziana, existe al menos una solución local, por lo que $\Sigma \neq \emptyset$.

Para garantizar un buen comportamiento en la frontera, podemos considerar una función $F : J \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ que extiende a f . Dado que $\bar{\Omega}$ es un conjunto convexo (una bola cerrada), podemos definir F proyectando los puntos fuera de $\bar{\Omega}$ hacia la frontera $\partial\Omega$. De este modo, F coincide con f en su dominio original:

$$F|_{J \times \bar{\Omega}} = f$$

y resulta ser globalmente Lipschitziana respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J$. Toda solución que se mantenga en $\bar{\Omega}$ será solución del problema original.

Definimos el intervalo maximal de existencia $I_{\max}$ como la unión de todos los dominios de las soluciones en Σ :

$$I_{\max} = \bigcup_{(I, u_I) \in \Sigma} I$$

y definimos la solución maximal como $u_{\max}(t) = u_I(t)$ para $t \in I$. Por la unicidad de soluciones, $u_{\max}$ está bien definida independientemente de la solución local u_I elegida.

A priori, el intervalo $I_{\max}$ puede ser cerrado o semiabierto por la derecha:

$$I_{\max} = \begin{cases} [t_0, T_{\max}) \\ [t_0, T_{\max}] \end{cases}$$

Supongamos por reducción al absurdo que $I_{\max} = [t_0, T_{\max})$. Consideremos la trayectoria de la solución:

$$\Gamma = \{u_{\max}(t) : t \in I_{\max}\} \subset \bar{\Omega} = \bar{B}_R(q)$$

Como f es continua y $\bar{\Omega}$ es un conjunto compacto, f está uniformemente acotada en $J \times \bar{\Omega}$, digamos por $\|f\|_{\infty}$.

Tomemos una sucesión $t_n = T_{\max} - \frac{1}{n}$ tal que $t_n \nearrow T_{\max}$. La sucesión $\{u_{\max}(t_n)\}_{n \geq 1}$ está contenida en Γ , que es acotada. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente:

$$u_{\max}(t_{n_m}) \rightarrow u^* \in \bar{\Gamma} \subset \bar{\Omega}$$

Para cualquier $t \in [t_0, T_{\max})$, podemos estimar la distancia utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\begin{aligned} \|u_{\max}(t_{n_m}) - u_{\max}(t)\| &= \left\| \int_t^{t_{n_m}} u'_{\max}(s) ds \right\| = \left\| \int_t^{t_{n_m}} f(s, u_{\max}(s)) ds \right\| \leq \int_t^{t_{n_m}} \|f(s, u_{\max}(s))\| ds \\ &\leq \|f\|_{\infty} |t_{n_m} - t|, \quad \forall m \geq 1 \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\|u^* - u_{\max}(t)\| \leq \|f\|_{\infty} |T_{\max} - t|$$

Esto implica que el límite lateral existe y está en el dominio:

$$\lim_{t \nearrow T_{\max}} u_{\max}(t) = u^* \in \bar{\Omega}$$

Al existir el límite, la solución se puede extender de forma continua hasta $T_{\max}$, contradiciendo que el intervalo maximal sea semiabierto. Por lo tanto, el intervalo maximal debe ser cerrado:

$$I_{\max} = [t_0, T_{\max}], \quad \text{con } T_{\max} \leq t_0 + T$$

Finalmente, supongamos que la solución no abarca todo el intervalo J , es decir, $T_{\max} < t_0 + T$. Sabemos que $u_{\max}(T_{\max}) \in \bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$. Tenemos dos posibilidades:

$$\begin{cases} u_{\max}(T_{\max}) \in \Omega \\ u_{\max}(T_{\max}) \in \partial\Omega \end{cases}$$

Si ocurriera que $u_{\max}(T_{\max}) \in \Omega$, podríamos plantear un nuevo problema de valor inicial partiendo de este punto:

$$\begin{cases} w'(t) = f(t, w(t)) \\ w(T_{\max}) = u_{\max}(T_{\max}) \in \Omega \end{cases}$$

Dado que $u_{\max}(T_{\max})$ está en el interior del dominio Ω , el teorema de existencia local garantizaría la existencia de una solución $w(t)$ en un intervalo $[T_{\max}, T_{\max} + \delta]$ para algún $\delta > 0$. Concatenando $u_{\max}$ con w , la solución podría prolongarse estrictamente a la derecha de $T_{\max}$, lo cual contradice que $(I_{\max}, u_{\max})$ sea la solución maximal.

Por lo tanto, la única posibilidad compatible con la maximalidad de la solución es que alcance la frontera del dominio espacial:

$$u_{\max}(T_{\max}) \in \partial\Omega$$

□

Observación 1.4.2

Hemos pedido originalmente que Ω sea una bola abierta para poder definir fácilmente una extensión globalmente Lipschitziana de f a todo el espacio $\mathbb{R}^N$ (por ejemplo, mediante una proyección sobre la bola). Sin embargo, en general, el resultado sigue siendo válido si requerimos únicamente que Ω sea un conjunto abierto y acotado, lo cual nos garantiza que su clausura $\bar{\Omega}$ sea un conjunto compacto.

Es importante hacer una precisión sobre la extensión de la función: mientras que el teorema de Tietze-Urysohn nos garantiza la existencia de una extensión continua a todo el espacio para funciones continuas definidas en un cerrado, para preservar la condición de Lipschitz global (que es fundamental para aplicar el teorema de Cauchy-Lipschitz), se debe recurrir a resultados más específicos, como el teorema de extensión de McShane-Whitney (o de Kirszbraun). Estos teoremas nos aseguran que toda función Lipschitziana definida en un subconjunto puede extenderse a todo el espacio conservando su constante de Lipschitz.

1.5 Mirar al pasado (Soluciones hacia atrás en el tiempo)

Hasta ahora hemos analizado el comportamiento de las soluciones hacia el futuro, es decir, para tiempos $t \geq t_0$. Sin embargo, en muchas ocasiones nos interesa conocer el estado del sistema en instantes anteriores. Consideremos el Problema de Valor Inicial (PVI) definido en un intervalo de tiempo hacia el pasado $J = [t_0 - T, t_0]$:

$$(P) = \begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Para resolver este problema, podemos transformarlo en un PVI equivalente que avance hacia el futuro mediante un cambio de variable temporal. Definimos un nuevo tiempo s como la reflexión de t respecto al instante inicial t_0 :

$$s = 2t_0 - t$$

De este modo, cuando t recorre el intervalo al pasado $t_0 - T \leq t \leq t_0$, podemos ver cómo se transforma el rango de s . Multiplicando por -1 e sumando $2t_0$ obtenemos:

$$-t_0 + T \geq -t \geq -t_0 \implies t_0 + T \geq 2t_0 - t \geq t_0$$

Por lo tanto, la nueva variable temporal se mueve hacia el futuro:

$$s \in [t_0, t_0 + T]$$

Ahora, definimos una nueva función incógnita $v(s)$ que representa a $u(t)$ en el nuevo sistema de referencia temporal:

$$v(s) = u(t) = u(2t_0 - s)$$

Aplicando la regla de la cadena, derivamos v respecto a s :

$$v'(s) = u'(2t_0 - s) \cdot \frac{d}{ds}(2t_0 - s) = -u'(t)$$

Sustituyendo $u'(t)$ por la ecuación diferencial original, tenemos:

$$v'(s) = -f(t, u(t)) = -f(2t_0 - s, v(s))$$

Si definimos una nueva función para el campo vectorial $g(s, v) = -f(2t_0 - s, v)$, obtenemos la siguiente ecuación diferencial para v :

$$v'(s) = g(s, v(s)), \quad \text{para } s \in [t_0, t_0 + T]$$

En el instante inicial $s = t_0$, tenemos que $v(t_0) = u(t_0) = u_0$. Por lo tanto, el problema hacia el pasado se ha transformado en el siguiente PVI hacia el futuro:

$$\begin{cases} v'(s) = g(s, v(s)) \\ v(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Como g conserva las propiedades de regularidad de f (continuidad y condición de Lipschitz), este nuevo problema es equivalente al PVI (P) original "mirando al pasado". En consecuencia, todos los teoremas de existencia, unicidad y maximalidad que hemos probado para el futuro se cumplen de manera análoga para el pasado.

1.6 Ejemplos de aplicación de la teoría

Veamos algunos ejemplos que ilustran la aplicación de los teoremas fundamentales de Cauchy-Lipschitz a problemas concretos.

Ejemplo

Como aplicación de estos conceptos, consideremos la ecuación logística, que modela el crecimiento de una población con recursos limitados. El PVI está dado por:

$$\begin{cases} u'(t) = \lambda u(t) - au^2(t) \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

con parámetros $\lambda > 0$ (tasa de crecimiento intrínseco) y $a > 0$ (tasa de competencia interespecífica). Este es un problema donde la función $f(t, u) = \lambda u - au^2$ es localmente Lipschitziana respecto a u , lo que nos permite aplicar la teoría desarrollada para estudiar tanto el comportamiento futuro de la población como su historia pasada.

Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo del problema generalizado Volterra-Lotka, que describe la interacción entre dos especies: una presa y un depredador. El sistema de ecuaciones diferenciales está dado por:

$$P = \begin{cases} u'(t) = \lambda(t)u - a(t)u^2 - b(t)uv \\ v'(t) = \mu(t)v - d(t)v^2 - c(t)uv \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}, \quad v(0) = v_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \lambda, \mu, a, b, c, d \in C([0, +\infty), \mathbb{R})$$

Teniendo por tanto $J = [0, +\infty)$, $\Omega = \mathbb{R}^2$ y $t_0 = 0$. La función vectorial $f(t, u, v)$ que define el sistema es:

$$f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda(t)u - a(t)u^2 - b(t)uv \\ \mu(t)v - d(t)v^2 - c(t)uv \end{pmatrix}$$

Que es continua, calculemos sus derivadas:

$$D_{(u,v)}f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda(t) - 2a(t)u - b(t)v & -b(t)u \\ -c(t)v & \mu(t) - 2d(t)v - c(t)u \end{pmatrix}$$

Como todos los coeficientes son funciones continuas en $J \times \Omega$, por lo que según el corolario del teorema de Cauchy-Lipschitz, f es localmente Lipschitziana respecto a $(u, v) \in \Omega$ uniformemente en subintervalos compactos de J de la forma $[0, M]$ con $M > 0$.

No es globalmente Lipschitziana ya que podemos ver que las derivadas parciales no están acotadas:

$$\left\| \frac{f_1}{\partial v} \right\| = |-b(t)u| = |b(t)||u| \leq \|b(t)\|_{\infty} R$$

Pero como no podemos garantizar que $\|b(t)\|_\infty$ sea finito para todo $t \in [0, +\infty)$, la función no es globalmente Lipschitziana (aunque sí está acotada en cualquier intervalo compacto de tiempo, por continuidad). Finalmente:

1. Por el teorema de Cauchy–Lipschitz, como f es continua y localmente Lipschitziana respecto a (u, v) , el PVI admite una única solución local que satisface $(u(0), v(0)) = (u_0, v_0)$.
2. Por el teorema de unicidad global, la solución es única allá donde esté definida.
3. Por el teorema de existencia de soluciones maximales, esta solución única se prolonga a una solución maximal (I, u, v) .
4. Por el 2º teorema fundamental, $I = [0, T_{max})$ para algún $T_{max} \leq \infty$, y además $\lim_{t \nearrow T_{max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$ si $T_{max} < \infty$.

Ejemplo

Veamos ahora el ejemplo del sistema de Kolmogorov, que describe el caso de competición. El sistema está dado por:

$$P = \begin{cases} u'(t) = (\lambda - au - bv)u \\ v'(t) = (\mu - du - cv)v \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}, \quad v(0) = v_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \lambda, \mu, a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Teniendo por tanto $J = [0, +\infty)$, $\Omega = \mathbb{R}^2$ y $t_0 = 0$. Ahora podemos escribirlo así:

$$\begin{cases} A(t) = \lambda(t) - a(t)u(t) - b(t)v(t) \\ B(t) = \mu(t) - d(t)u(t) - c(t)v(t) \end{cases} \implies P = \begin{cases} u'(t) = A(t)u(t) \\ v'(t) = B(t)v(t) \end{cases}$$

Por lo tanto las soluciones son, en $I = [t_0, T_{max})$:

$$u(t) = u_0 \exp \left(\int_0^t A(s) ds \right), \quad \begin{cases} u_0 > 0 \implies u(t) > 0, & \forall t \in I \\ u_0 = 0 \implies u(t) = 0, & \forall t \in I \\ u_0 < 0 \implies u(t) < 0, & \forall t \in I \end{cases}$$

$$v(t) = v_0 \exp \left(\int_0^t B(s) ds \right), \quad \begin{cases} v_0 > 0 \implies v(t) > 0, & \forall t \in I \\ v_0 = 0 \implies v(t) = 0, & \forall t \in I \\ v_0 < 0 \implies v(t) < 0, & \forall t \in I \end{cases}$$

Por lo tanto si se cumple que estudiamos el caso particular del problema de competición, es decir, que $u_0, v_0 > 0$, y $a, b, c, d \geq 0$ entonces:

$$\begin{cases} u(t) > 0 \quad \forall t \in I \implies A(t) \leq \lambda \quad \forall t \in I \implies 0 < u(t) = u_0 \exp \left(\int_0^t A(s) ds \right) \leq u_0 e^{\lambda t} \\ v(t) > 0 \quad \forall t \in I \implies B(t) \leq \mu \quad \forall t \in I \implies 0 < v(t) = v_0 \exp \left(\int_0^t B(s) ds \right) \leq v_0 e^{\mu t} \end{cases}$$

Si ahora $T_{max} < +\infty$, entonces:

$$\begin{cases} u_0 e^{\lambda T_{max}} \leq u_0 e^{\max_{t \in I} \lambda t} < +\infty \\ v_0 e^{\mu T_{max}} \leq v_0 e^{\max_{t \in I} \mu t} < +\infty \end{cases}$$

Por lo tanto, u, v estarían acotadas en I , y por lo tanto no se cumpliría la condición de explosión en tiempo finito, contradiciendo el 2º teorema fundamental de la teoría de Cauchy–Lipschitz. Por lo tanto, necesariamente $T_{max} = +\infty$, y la solución maximal está definida globalmente en todo el intervalo $J = [0, +\infty)$.

Ejemplo

Podemos estudiar ahora un caso particular del sistema de Kolmogorov, donde $v_0 = 0 \implies v(t) = 0$, $\lambda = 0$, $a = 1$, dejando el sistema:

$$P = \begin{cases} u'(t) = -u^2(t) \\ v'(t) = 0 \\ u(0) = u_0 > 0, \quad v(0) = 0 \end{cases}$$

La solución de este sistema es:

$$u^{-2}u' = -1 \implies \left(\frac{1}{u}\right)' = -1 \implies \frac{1}{u(t)} = -t + \frac{1}{u_0} \implies u(t) = \frac{u_0}{1 - u_0 t},$$

Que si $u_0 > 0$, explota en tiempo finito en $T_{max} = \frac{1}{u_0}$, dejando el intervalo de solución $I = [0, \frac{1}{u_0})$. Por lo tanto, la solución maximal no está definida globalmente en todo el intervalo $J = [0, +\infty)$, y se cumple la condición de explosión en tiempo finito.

Ejemplo**1. Caso general:**

Sea ahora el problema:

$$P = \begin{cases} u' = a(t)u + b(t)\frac{u^n}{1+u^n} \\ u(0) = 1 > 0 \end{cases}$$

Con $a, b \in C([0, +\infty), \mathbb{R})$, particularmente $a \geq 0$ y $b > 0 \forall t \in [0, +\infty)$, y $n \in \mathbb{N}$. Así:

$$f(t, u) = a(t)u + b(t)\frac{u^n}{1+u^n} \quad t \in [0, +\infty), u \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \implies \begin{cases} \Omega = (-1, +\infty) \\ J = [0, +\infty) \end{cases}$$

Ahora calculando su derivada:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = a(t) + b(t)\frac{nu^{n-1}(1+u^n) - u^n}{(1+u^n)^2} = a(t) + b(t)\frac{nu^{n-1} + (n-1)u^n}{(1+u^n)^2}$$

Que es continua en $[0, +\infty) \times \Omega$, por lo que como $u_0 = 1 \in (-1, +\infty)$, y como es localmente Lipschitziana respecto de u y uniformemente en t en subintervalos compactos de J , hay una solución maximal única (I, u) , en cualquier intervalo compacto $t \in [0, M]$ con $M > 0$. Por lo tanto, la solución maximal está definida en un intervalo $I = [0, T_{max})$ con $T_{max} \leq +\infty$, aplicando el Teorema de Cauchy-Lipschitz.

Nótese que si $u_0 \in (-\infty, -1)$, entonces la solución maximal estaría definida en otro intervalo hacia la izquierda.

De acuerdo con el tercer teorema fundamental, $I = [0, T_{max})$ con $T_{max} \leq +\infty$, y si $T_{max} < +\infty$, entonces necesariamente:

$$\limsup_{t \nearrow T_{max}} |u(t)| = \infty \quad \text{ó} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u(t_n) = -1 \in \partial\Omega = \{-1\}$$

Ahora:

$$f(t, u) = u' = a(t)u + b(t)\frac{u^n}{1+u^n} = \left(a(t) + b(t)\frac{u^{n-1}}{1+u^n}\right)u = A(t)u$$

Por lo que podemos sacar la solución explícita:

$$u(t) = u_0 e^{\left(\int_0^t A(s) ds\right)} = e^{\left(\int_0^t a(s) + b(s)\frac{u^{n-1}(s)}{1+u^n(s)} ds\right)} > 0 \quad \forall t \in I$$

Descartando así la segunda posibilidad, ya que al ser la solución siempre positiva, no puede acercarse a -1 . Además, como $a(t) \geq 0$ y $b(t) > 0$, se cumple que $u'(t) > 0$ para todo $t \in I$, por lo que la solución es estrictamente creciente. Por lo tanto, si $T_{max} < +\infty$, necesariamente:

$$\limsup_{t \nearrow T_{max}} |u(t)| = +\infty$$

2. Casos $n = 1, 2$ (Existencia global en sistemas de Kolmogorov):

Los casos $n = 1, 2$ son los llamados sistemas de Kolmogorov, donde:

$$u' = A(t)u(t) \quad t \in I = [0, T_{max})$$

Y donde:

$$A(t) = a(t) + b(t) \frac{u^{n-1}(t)}{1 + u^n(t)} = \begin{cases} n = 1 \implies a(t) + b(t) \frac{1}{1+u(t)} \leq a(t) + b(t) \\ n = 2 \implies a(t) + b(t) \frac{u(t)}{1+u^2(t)} \leq a(t) + b(t) \end{cases}$$

Si ahora el tiempo $T_{max} < +\infty$, entonces:

$$0 < u(t) = u_0 e^{\left(\int_0^t A(s) ds\right)} \leq u_0 e^{\left(\int_0^t a(s) + b(s) ds\right)} \leq u_0 e^{\left(\int_0^{T_{max}} a + b ds\right)} \leq C$$

Donde C es una constante positiva, y a, b son cotas superiores de $a(t)$ y $b(t)$ en el intervalo $[0, T_{max}]$. Por lo tanto, la solución estaría acotada, contradiciendo la condición de explosión en tiempo finito del tercer teorema fundamental. Por lo tanto, necesariamente $T_{max} = +\infty$, y la solución maximal está definida globalmente en todo el intervalo $J = [0, +\infty)$.

3. Caso $n \geq 4$ (Explosión en tiempo finito):

Ahora nos podemos fijar en el caso $n \geq 4$:

$$P = \begin{cases} u' = a(t)u(t) + b(t) \frac{u(t)}{1+u(t)} u^2(t) \\ u(0) = 1 > 0 \end{cases}$$

Ahora, podemos usar la función:

$$g(x) = \frac{x}{1+x} \quad \text{para } x \geq 1 \implies g'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$$

Por lo que g es estrictamente creciente, por lo que $g(x) \geq g(1) = \frac{1}{2}$ para todo $x \geq 1$. Por lo tanto, si $u(t) \geq 1$ para todo $t \in I$, entonces:

$$u'(t) \geq a(t)u(t) + \frac{b(t)}{2}u^2(t) \quad \forall t \in I$$

Y en particular, si $a(t) \geq 0$ y $b(t) > 0$, entonces:

$$u'(t) \geq \frac{b(t)}{2}u^2(t) \quad \forall t \in I \implies u'u^{-2} \geq \frac{b(t)}{2} \implies (-u^{-1})' \geq \frac{b(t)}{2} \implies \left(\frac{1}{u(t)}\right)' \leq -\frac{b(t)}{2} \implies$$

$$\frac{1}{u(t)} - \frac{1}{u_0} \leq -\frac{1}{2} \int_0^t b(s) ds \implies \frac{1}{u(t)} \leq 1 - \frac{1}{2} \int_0^t b(s) ds \implies$$

$$\implies \boxed{u(t) \geq \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \int_0^t b(s) ds} = \frac{2}{2 - \int_0^t b(s) ds}}$$

Ahora por tanto debemos analizar lo que le ocurre a $\int_0^\infty b(s) ds$. Si $\inf_{t \in [0, +\infty)} b(t) = \omega > 0$, entonces debe $\exists T > 0$ tal que $\int_0^T b(s) ds = 2$, y por lo tanto la solución $u(t)$ explota en tiempo finito, con $T_{max} \leq T$.

Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo de un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas:

$$P = \begin{cases} u' = |v|^p \\ v' = |u|^q \\ u(0) = 1, \quad v(0) = 1 \end{cases} \quad p \geq q > 1$$

Ahora podemos definir la función $f(t, u, v)$:

$$f(t, u, v) = \begin{pmatrix} |v|^p \\ |u|^q \end{pmatrix} \quad \begin{cases} t \in \mathbb{R} = J \\ (u, v) \in \mathbb{R}^2 = \Omega \end{cases}$$

Esta función es continua en $J \times \Omega$, y su matriz Jacobiana es:

$$D_{(u,v)}f(t, u, v) = \begin{pmatrix} 0 & p|v|^{p-1}\text{signo}(v) \\ q|u|^{q-1}\text{signo}(u) & 0 \end{pmatrix}$$

Que como es continua en $(t, u, v) \in J \times \Omega$, nos garantiza que f es localmente Lipschitziana respecto a $(u, v) \in \mathbb{R}^2 = \Omega$ uniformemente en $t \in \mathbb{R} = J$, que tiene una única solución maximal (I, u, v) definida en un intervalo $I = [0, T_{max})$ con $T_{max} \leq +\infty$, por el teorema de Cauchy-Lipschitz. Ahora si fijamos $J = [0, +\infty)$, entonces según el 2º teorema fundamental, $I = [0, T_{max})$ con $T_{max} \leq +\infty$, y si $T_{max} < +\infty$, entonces necesariamente:

$$\limsup_{t \nearrow T_{max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$$

DESPUES DEL TEOREMA DE DEPENDENCIA LIPCHICIANA Y DEL TEOREMA DE DEPENDENCIA LIPCHICIANA CON RESPECTO DE CONDICIONES INICIALES

Teorema 1.6.1 [Teorema de dependencia Lipschitziana con respecto de f]

Sean $J = [t_0, t_0 + T]$, $f, g \in C(J \times \mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, y supongamos que f y g son globalmente Lipschitzianas respecto a $u \in \mathbb{R}^N$, uniformemente en $t \in J$, en cualquier bola de $\mathbb{R}^N$ y $u_0 \in \mathbb{R}^N$.

Sea $h \in \{f, g\}$, denotaremos por $u(t; h)$ a la única solución del PVI:

$$\begin{cases} u'(t) = h(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Supongamos que $u(t; f)$ está definida en $[t_0, t_0 + \tau]$ con $\tau \in (0, T]$.

Sean además $\Gamma_f = \{u(t; f) : t \in [t_0, t_0 + \tau]\}$ la órbita de $u(t; f)$ para $t \in [t_0, t_0 + \tau]$, $R > 0$ tal que $\Gamma_f \subset B_R(u_0)$, y sea L la constante de Lipschitz de f en $\bar{B}_R(u_0)$ uniformemente en $t \in [t_0, t_0 + \tau]$.


Entonces, $\exists \epsilon > 0$ tal que si:

$$\|f - g\|_\infty \equiv \max_{t \in J, \|u - u_0\| \leq R} \|f(t, u) - g(t, u)\| \leq \epsilon$$

Entonces la solución $u(t; g)$ también está definida en $[t_0, t_0 + \tau]$, y además:

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \epsilon \quad \forall t \in [t_0, t_0 + \tau] \leq$$

Demostración. Antes de iniciar esta demostración, obserbese este dibujo para entender geoméricamente los conceptos (donde K_η no llega a tocar la frontera de la bola $B_R(u_0)$):



Sabemos que $\Gamma_f \subset B_R(u_0)$, por lo que su intersección con la frontera es $\Gamma_f \cap \partial B_R(u_0) = \emptyset$. Por lo tanto, tiene sentido definir:

$$0 < \text{dist}(\Gamma_f, \partial B_R(u_0)) = 2\eta \implies \boxed{\epsilon = \frac{L}{e^{L\tau} - 1} \eta}$$

Ahora, si $\|f - g\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \leq \epsilon$, entonces si denotamos por $u(t; g)$ a la solución del PVI con $h = g$, tenemos que $I_g = J$, $I_g = [t_0, T_{max})$ con $T_{max} \leq t_0 + T$, y además:

$$\lim_{t \nearrow T_{max}} \|u(t; g)\| = +\infty$$

Y está definida en $[t_0, t_0 + \tau]$.

Ahora reduzcamos al absurdo. Supongamos que tenemos el intervalo $[t_0, T_{max})$ con $T_{max} \leq t_0 + T$, y supongamos que explota en T_{max} , entonces si tomamos $t_1 \in (t_0, T_{max})$ entonces:

$$\begin{cases} u(t; g) \in B_R(u_0) & \forall t \in [t_0, t_1) \\ u(t_1; g) \in \partial B_R(u_0) \end{cases}$$

Ahora podemos definir:

$$\begin{cases} u_1(t) \equiv u(t; f) \\ u_2(t) \equiv u(t; g) \end{cases} \quad t \in [t_0, t_1] \implies u(t; f), u(t; g) \in \overline{B}_R(u_0) \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Ahora aplicando el teorema de dependencia Lipschitziana abstracto tenemos que:

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq e^{L(t-t_0)} \delta_0 + \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} (\delta_1 + \delta_2)$$

Donde:

$$\begin{cases} \delta_0 = \|u(t_0; f) - u(t_0; g)\| = \|u_0 - u_0\| = 0 \\ \delta_1 = \max_{t \in [t_0, t_1]} \|u'_1(t) - f(t, u_1(t))\| = 0 \\ \delta_2 = \max_{t \in [t_0, t_1]} \|u'_2(t) - f(t, u_2(t))\| \end{cases}$$

Para probar la última cota aplicaremos la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} \|u'_2(t) - f(t, u_2(t))\| &\leq \|u'_2(t) - g(t, u_2(t))\| + \|g(t, u_2(t)) - f(t, u_2(t))\| = \|g(t, u_2(t)) - f(t, u_2(t))\| \leq \\ &\leq \|g - f\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \leq \epsilon \end{aligned}$$

Dejando así la diferencia:

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \leq \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} \epsilon \leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \underbrace{\frac{L}{e^{L\tau} - 1}}_{\epsilon} \eta = \eta$$

Por lo tanto, sabemos que la órbita de g esta a distancia η de la órbita de f , y por lo tanto:

$$\Gamma_g \subset K_\eta = \Gamma_f + \overline{B}_\eta(0) \subset B_R(u_0)$$

Por lo tanto, $u(t_1; g) \in B_R(u_0)$, contradiciendo la hipótesis de que $u(t_1; g) \in \partial B_R(u_0)$. Por lo tanto, necesariamente $T_{max} > t_0 + \tau$, y por lo tanto $u(t; g)$ está definida en $[t_0, t_0 + \tau]$, y además $u(t; g) \in \overline{B}_R(u_0) \forall t \in [t_0, t_0 + \tau]$. Por tanto, $u(t; g)$ está bien definida en el intervalo $[t_0, t_0 + \tau]$.

Además, se cumple la desigualdad:

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \quad \forall t \in [t_0, t_0 + \tau]$$

Ahora supongamos que g toca la frontera de la bola $B_R(u_0)$ en un tiempo $t_1 \in [t_0, t_0 + \tau]$, entonces:

$$\|u(t_1; f) - u(t_1; g)\| \geq \text{dist}(\Gamma_f, \partial B_R(u_0)) = 2\eta$$

Lo cual contradice la desigualdad anterior, ya que:

$$\|u(t_1; f) - u(t_1; g)\| \leq \frac{e^{L(t_1-t_0)} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \leq \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \epsilon = \frac{e^{L\tau} - 1}{L} \frac{L}{e^{L\tau} - 1} \eta = \eta < 2\eta$$

Así finalmente, $u(t; g)$ no puede tocar la frontera de la bola $B_R(u_0)$ en el intervalo $[t_0, t_0 + \tau]$, y por lo tanto la solución $u(t; g)$ está definida en $[t_0, t_0 + \tau]$, y además:

$$\|u(t; f) - u(t; g)\| \leq \frac{e^{L(t-t_0)} - 1}{L} \|f - g\|_{\infty J \times \overline{B}_R(u_0)} \quad \forall t \in [t_0, t_0 + \tau]$$

□


Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo con el problema logístico:

$$P = \begin{cases} u' = \lambda u - au^2 \\ u(0) = x \end{cases}$$

Recordemos que este problema tenia de equilibrios $u = 0$ y $u = \frac{\lambda}{a}$, e iban de manera continua de

un equilibrio al otro, pero si las condiciones iniciales eran negativas, la solución explotaba en tiempo finito, y si eran mayores a $\frac{\lambda}{a}$, la solución también explotaba en tiempo finito pero en el pasado.



Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos	47
A.1 Varios compañeros	47

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

