

Nome: VINICIUS SATHLER GARCIA<sup>AAAA</sup>  
Data de Nascimento: 22/02/1977  
Data do Exame: 27/11/2022

### **CATETERISMO CARDÍACO**

Puncionamos a artéria ulnar direita e posicionamos introdutor Slender 5/6F. Através deste introduzimos cateteres específicos, utilizando-se uma corda guia 0,035" e realizamos cateterismo cardíaco esquerdo.

#### **Laudos:**

Artéria coronária esquerda apresenta um tronco de bom calibre, curto, trifurcado, calcificado e isento de obstruções significativas.

A artéria descendente anterior (DA) exibe stents prévios envolvendo terços proximal e médio. O primeiro ramo diagonal é importante, origina-se do segmento de DA recoberto por stent, e exibe lesão calcificada de 80% no terço proximal envolvendo as origens dos seus subramos.

A artéria circunflexa exibe discretas irregularidades parietais. Primeiro ramo marginal importante exibe stent pérvio no terço proximal. Segundo ramo marginal de moderada importância exibe lesão de 80% no terço proximal e lesão de 99% no terço médio.

Ramo diagonalis de moderada importância exibe lesão de 40% no terço proximal.

Artéria coronária direita dominante exibe stent pérvio no terço proximal ( hiperplasia neointimal difusa e discreta no seu interior ) e discretas irregularidades parietais nos demais segmentos. Ramo descendente posterior importante exibe stent pérvio no terço proximal. Ramo ventricular posterior importante exibe stent pérvio no terço médio.


#### **Conclusão:**

- 1 Coronariopatia obstrutiva grave.
- 2 Stents previamente implantados com resultados mantidos.
- 3 Angina instável.

### **ANGIOPLASTIA CORONARIA**

Puncionamos a artéria ulnar direita e posicionamos introdutor Slender 5/6F. A

continua...



Nome: VINICIUS SATHLER GARCIA<sup>AAAA</sup>  
Data de Nascimento: 22/02/1977  
Data do Exame: 27/11/2022

seguir introduzimos cateter guia XB com corda guia 0,035" e realizamos cinecoronariografia esquerda pré ATC nas diversas projeções oblíquas:

Segundo ramo marginal da artéria circunflexa é de moderada importância exibe lesão de 80% no terço proximal e lesão de 99% no terço médio. Ultrapassamos as lesões com duas cordas guia 0,014", realizamos pré-dilatações sequenciais com balões coronários 1,20 x 15 mm e 1,5 x 15 mm e balão NC 2,0 x 12 mm. Em seguida, liberamos dois stents farmacológicos ( Xience Alpine 2.0 x 28 mm e Ultimaster Tansei 2.5 x 24 mm ), com sobreposição de suas hastes, seguido de pós-dilatação com balão do próprio stent, à 18 ATM de pressão.

A cinecoronariografia esquerda pós ATC revelou bom resultado final com ausência de lesão residual e fluxo arterial TIMI III.

Retiramos o material e fizemos curativo compressivo local.

#### CONCLUSÃO:

- 1 Angioplastia coronária realizada com sucesso.
- 2 Implante de dois stents farmacológicos no segundo ramo marginal da artéria coronária circunflexa.



Dr. Leandro Zacarias F. de Freitas  
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista  
CRM-GO 14853

