

Étude du groupe de Lie $SO(n)$ dans le cadre de l'analyse de formes

Rapport de stage recherche

Antonin Lecocq

Sous la direction de Rayane Mouhli

Licence 2 Mathématiques-Informatique

Année universitaire 2025–2026

Description du stage

Contexte Scientifique

L'analyse de formes est un domaine à l'intersection de la géométrie différentielle, de la mécanique géométrique et du traitement d'image. Son objectif principal est de quantifier et de modéliser les déformations de formes telles que des images, courbes, surfaces, etc. [9]. Un problème qui nous intéresse particulièrement est celui du recalage, c'est-à-dire, étant donné une forme source et une forme cible, comment modéliser la déformation optimale permettant de transformer l'une en l'autre.

Une méthode classique pour traiter ce problème est le cadre *Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping* (LDDMM, [1]), qui modélise les déformations comme des flots générés par des champs de vecteurs. Ce stage propose d'aborder les bases de cette théorie en s'intéressant au cas particulier des rotations, modélisées par le groupe $SO(n)$. Ce groupe est fondamental dans l'analyse des formes car avec les translations, il permet de modéliser l'entière des déformations possibles pour des corps solides [2].

Objectifs du stage

- Revue de la littérature pour comprendre les bases du modèle *Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping* (LDDMM).
- Étude du groupe de rotations $SO(n)$ et de son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$.
- Étude de l'équation différentielle linéaire $\dot{x}(t) = Ax(t)$ avec $A \in \mathfrak{so}(n)$.
- Cas particuliers de $SO(2)$ et $SO(3)$.
- Implémentation en Python de modèles de recalage avec $SO(n)$.

Table des matières

Description du stage	1
Introduction	2
1 Le modèle de recalage LDDMM	3
1.1 Déformations et Difféomorphismes	3
1.2 Espace des formes, tangent et cotangent	4
1.3 Problème variationnel LDDMM	5
1.4 Formulation Hamiltonienne	6
1.4.1 Hamiltonien réduit	6
1.4.2 Équations géodésiques	7
2 Le groupe $SO(n)$ et son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$	8
2.1 Le groupe de Lie $SO(n)$	8
2.1.1 Propriétés de l'action du groupe $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$	10
2.1.2 Propriétés topologiques de $SO(n)$	13
2.2 L'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$	14
2.3 L'application exponentielle	17
3 Étude de l'équation différentielle linéaire $\dot{x}(t) = Ax(t)$	19
3.1 Obtenir l'équation différentielle $\dot{x}(t) = Ax(t)$	19
3.2 Solution de $\dot{x}(t) = Ax(t)$	20
4 Formulation Hamiltonienne du recalage sur $SO(n)$	21
4.1 Espaces tangent et cotangent des points repères	21
4.2 Hamiltonien sur $SO(n)$	22
4.3 Équations géodésiques	22
5 Cas particuliers de $SO(2)$ et $SO(3)$	24
5.1 $SO(2)$, Les rotations en dimension 2	24
5.2 $SO(3)$, Les rotations en dimension 3	26
6 Implémentation algorithmique	27
6.1 Approche directe - Discrétiser puis Optimiser	27
6.1.1 Recalage rigide sur $SO(2)$	27
6.2 Approche hamiltonienne - Tir géodésique	31
Conclusion	32
Références	33

A	Code Python	34
B	Figures supplémentaires	35

Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un stage consacré à l'étude mathématique et numérique d'un problème de recalage de formes. Le recalage consiste à déterminer une transformation permettant d'aligner une forme dite source sur une forme dite cible. Ce type de problème apparaît dans de nombreux domaines, par exemple en imagerie médicale ou encore en analyse morphologique, lorsqu'il s'agit de comparer des objets géométriques tout en tenant compte de leurs déformations possibles.

Le cadre général dans lequel s'inscrit ce stage est celui du *Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*, ou LDDMM. Cette approche sera détaillée dans le **Chapitre 1**. L'intérêt principal de cette méthode est de garantir que les transformations obtenues préservent la structure topologique des objets étudiés : il n'y a ni déchirure ni apparition de nouvelles formes.

Cependant, le modèle LDDMM complet est mathématiquement et numériquement riche. Dans ce stage, nous avons choisi d'en étudier une restriction plus simple : le cas où les transformations admissibles sont uniquement des rotations. Cette restriction conduit naturellement à l'étude du groupe spécial orthogonal $SO(n)$ et de son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$. Elle permet de comprendre, dans un cadre en dimension finie, comment une transformation continue peut être engendrée par une équation différentielle.

L'objectif du rapport est d'une part, de présenter les outils théoriques nécessaires : groupes de Lie, algèbres de Lie, exponentielle de matrice et équations différentielles linéaires. D'autre part, il s'agit d'illustrer ces notions par une implémentation numérique en Python, appliquée à des exemples simples de recalage par rotation dans le plan.

(Annonce des chapitres à rajouter) A faire ...

1 Le modèle de recalage LDDMM

Parmi les nombreuses approches de recalage, nous nous concentrerons sur le *Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*¹. Sa force réside dans sa capacité à modéliser des déformations tout en garantissant que la transformation obtenue est un *difféomorphisme* - c'est-à-dire une application bijective, lisse et d'inverse lisse. Cette propriété est cruciale pour préserver la topologie des structures (anatomiques par exemple) : des ensembles connexes restent connexes, des surfaces lisses restent lisses, et il n'y a pas de nouvelles pliures ou de déchirures. Le cadre de *Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping* fournit une formulation variationnelle du problème de recalage, où la transformation recherchée est obtenue comme solution d'un problème de minimisation d'énergie.

L'objectif de ce chapitre est de présenter le modèle LDDMM.

1.1 Déformations et Difféomorphismes

En analyse de formes, on cherche à transformer une forme source I_0 vers une forme cible I_1 . Pour pouvoir effectuer cette transformation, on veut comparer ces deux formes en prenant en compte leurs propriétés géométriques. Et pour préserver la topologie de la forme, on ne déforme pas l'objet directement, mais l'espace ambiant via un flot de difféomorphisme $t \mapsto \varphi_t$ qui envoie la source sur la cible [6]. Cette approche permet d'obtenir naturellement un difféomorphisme de tout l'espace.

Définition 1.1 (Flot de difféomorphismes).

On considère une famille de difféomorphismes

$$\varphi_t : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad t \in [0, 1],$$

engendrée par un champ de vitesse dépendant du temps $v_t : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$.

Le flot est défini comme la solution de l'équation différentielle :

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_t = v_t \circ \varphi_t, \\ \varphi_0 = Id. \end{cases}$$

Cette équation décrit le transport des points de l'espace sous l'action du champ de vitesse v_t .

La déformation à l'instant t est donnée par l'action du difféomorphisme sur la forme : $I_1 = \varphi_t \cdot I_0$. Cette action dépend de la nature géométrique de la forme étudiée.

- **Points repères (Landmarks)** : Si $I_0 = (x_1, \dots, x_N) \in (\mathbb{R}^d)^N$, l'action est l'évaluation ponctuelle : $\varphi \cdot I_0 := \varphi(I_0)$.

1. Que l'on appellera LDDMM par la suite

- **Courbes paramétrées** : Si $q \in \mathcal{C}^1(I; \mathbb{R}^d)$, l'action est la composition à gauche : $\varphi \cdot q := \varphi \circ q$.
- **Images** : Si $I_0 \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathbb{R})$, l'action est la composition avec l'inverse (pour préserver l'intensité) : $\varphi \cdot I_0 := I_0 \circ \varphi^{-1}$.

Exemple 1.2. Voyons un exemple de recalage rigide avec une forme source x_S et une autre forme cible x_T séparées par une rotation (cet exemple (6.2) sera détaillé plus loin). La forme source, à laquelle on a appliqué une rotation, recouvre parfaitement la forme cible :




FIGURE 1.1 – Recalage sur les rotations $SO(2)$ d'un coq.

1.2 Espace des formes, tangent et cotangent

Dans la formulation géométrique du recalage, on considère un espace de champ de vecteurs $V \hookrightarrow C_0^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ et un espace de formes Q . Cet espace peut être, selon le problème étudié, un espace d'images, de courbes, de surfaces ou encore un espace de points repères. Dans le cas des points repères, l'espace des formes est

$$Q = (\mathbb{R}^d)^N.$$

Cet espace s'identifie naturellement à $\mathbb{R}^{dN}$. C'est donc un espace vectoriel normé de dimension finie où N désigne le nombre de points et d la dimension de l'espace ambiant. Comme tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet, $\mathbb{R}^{dN}$ est un espace de Banach. Ainsi, Q peut être vu comme une variété de Banach².

Pour décrire l'évolution des formes, on a besoin d'introduire les espaces tangents et cotangents.

Remarque 1.3 (Espace tangent de Q).

Puisque Q est une variété (de Banach), on peut lui associer en tout point q un espace tangent $T_q Q$, au sens de la définition générale (2.2). On note

$$TQ = \bigcup_{q \in Q} T_q Q = \{(q, v) \mid q \in Q, v \in T_q Q\}.$$

2. Variété de Banach : Espace localement semblable à un espace de Banach

Définition 1.4 (Espace cotangent).

On définit son dual, l'espace cotangent T_q^*Q , qui est l'ensemble des formes linéaires sur T_qQ . On le définit par

$$T^*Q = \bigcup_{q \in Q} T_q^*Q = \{(q, p) \mid q \in Q, p \in T_q^*Q\}.$$

L'élément $p \in T_q^*Q$ est appelé un covecteur. Dans le cadre hamiltonien, il correspond à un moment.

1.3 Problème variationnel LDDMM

Le problème de recalage consiste à déterminer le champ de vitesse v_t qui minimise une énergie composée de deux termes :

- Un terme de régularité contrôlant le “coût” de la déformation (à gauche de l'addition),
- Un terme d'attache aux données mesurant la similarité entre l'image transformée et la cible (à droite).

Le premier terme favorise des déformations douces, tandis que le second impose que la forme finale reste proche de la cible.

Le problème s'écrit :

$$\begin{aligned} \min_{v \in L^2([0,1], V)} J(v) &= \frac{1}{2} \int_0^1 \|v_t\|_V^2 dt + \|I_0 \circ \varphi_1^{-1} - I_1\|_{L^2} \\ \text{tel que } &\begin{cases} \dot{\varphi}_t = v_t \circ \varphi_t \\ \varphi_0 = Id \end{cases} \end{aligned}$$

Théorème 1.5. *Notre équation ci-dessus admet un minimum.*

Preuve. Admis.

Piste de preuve : On utilise une méthode de calcul variationnel [5], “Direct method in the calculus of variations” pour montrer que l'équation de minimisation admet un minimum. $\square$

Dans une écriture plus géométrique, on note $q_t \in Q$ la forme à l'instant t . L'action du champ de vecteurs v_t sur la forme est notée

$$v_t \circ q_t.$$

La dynamique du problème de recalage s'écrit alors

$$\dot{q}_t = v_t \circ q_t.$$

Le problème variationnel peut donc aussi s'écrire sous la forme

$$\begin{aligned} \min_{v \in L^2([0,1], V)} &\int_0^1 \|v_t\|_V^2 dt + \mathcal{D}(q_1, q_T) \\ \text{tel que } &\begin{cases} \dot{q}_t = v_t \circ q_t \\ q_0 = q_S \end{cases} \end{aligned}$$

avec $\mathcal{D}$ une métrique adaptée aux données.
Ici, q_S désigne la forme source et q_T la forme cible. Le terme

$$\int_0^1 \|v_t\|_V^2 dt$$

mesure l'énergie de la déformation, tandis que le terme

$$\|q_1 - q_T\|$$

mesure l'écart final entre la forme transportée q_1 et la cible q_T .

Remarque 1.6. Pour appliquer la méthode LDDMM, on n'a besoin que de l'action du groupe des difféomorphismes sur l'espace de formes. La formulation du problème de minimisation repose uniquement sur l'application du groupe à cet espace via $I_0 \mapsto I_0 \circ \varphi^{-1}$.

1.4 Formulation Hamiltonienne

On peut interpréter le problème LDDMM comme un problème de contrôle optimal [8]. Dans ce cadre, le champ de vecteurs v_t est le contrôle, tandis que la forme q_t représente l'état du système. Son évolution est donnée par

$$\dot{q}_t = v_t \circ q_t.$$

Pour traiter ce problème contraint, on introduit un covecteur $p_t \in T_{q_t}^* Q$, appelé moment. Le Hamiltonien de contrôle est

$$H : T^*Q \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

par

$$H(q, p, v) = (p \mid v \circ q) - \frac{1}{2} \|v\|_V^2.$$

Le premier terme mesure l'interaction entre le moment p et la vitesse de déformation $v \circ q$, tandis que le second représente le coût énergétique du champ de vecteurs v .

1.4.1 Hamiltonien réduit

Le principe du maximum de Pontryagin [10] impose que le contrôle optimal maximise ce Hamiltonien par rapport à v . Pour obtenir cet Hamiltonien réduit en fonction de q et p , on cherche d'abord le champ de vecteurs optimal v^* . Celui-ci est obtenu en annulant la dérivée de H par rapport à la variable de contrôle v :

$$\partial_v H(q, p, v) = 0.$$

On obtient ainsi une vitesse optimale

$$v^* = v^*(q, p).$$

On remplace ensuite cette expression dans le hamiltonien initial pour définir le hamiltonien réduit

$$H_r(q, p) = H(q, p, v^*(q, p)).$$

Cette réduction permet de transformer le problème de contrôle optimal en un système d'équations différentielles sur T^*Q .

1.4.2 Équations géodésiques

Les trajectoires optimales, aussi appelées géodésiques, sont alors données par les équations géodésiques (appelées aussi équations hamiltoniennes).

$$\dot{q}_t = \partial_p H_r(q_t, p_t),$$

$$\dot{p}_t = -\partial_q H_r(q_t, p_t).$$

La première équation décrit l'évolution de la forme. La seconde décrit l'évolution du moment associé. Dans le cadre LDDMM, la première équation redonne la dynamique

$$\dot{q}_t = v_t \circ q_t.$$

Remarque 1.7. L'intérêt principal de la formulation hamiltonienne est qu'elle permet de remplacer l'optimisation sur le champ de vitesse v_t , qui appartient à un espace de dimension infinie, par l'étude d'un système différentiel portant sur les variables (q_t, p_t) . Dans le cas des points repères, ces variables sont en nombre fini : les positions $q_i(t)$ et les moments $p_i(t)$. Ainsi, le problème LDDMM se ramène à un problème en dimension finie, plus simple à analyser et à résoudre numériquement.

Ce chapitre a posé les fondements nécessaires à l'étude des cas particuliers, comme celui des rotations $SO(2)$ et $SO(3)$, qui seront abordés dans les chapitres suivants. En effet, dans ce rapport nous ne traitons pas le modèle LDDMM complet. Nous étudions une restriction de ce cadre au cas où les transformations sont uniquement des rotations en dimension finie. Cette restriction permet d'obtenir un modèle plus simple que le modèle LDDMM complet qui repose sur l'action du groupe des difféomorphismes en dimension infinie.

2 Le groupe $SO(n)$ et son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux particularités du groupe $SO(n)$ et de son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$ pour $n \geq 2$. Voici quelques définitions pour commencer.

Définition 2.1 (Variété différentielle).

Une **variété différentielle** est un espace qui est localement assimilable¹ à un espace euclidien [3].

Considérons G une variété différentielle.

Définition 2.2 (Espace tangent).

On appelle **espace tangent** en g à G , que l'on note $T_g G$, l'ensemble des vecteurs tangents en g .

2.1 Le groupe de Lie $SO(n)$

Le **groupe spécial orthogonal** $SO(n)$ est un sous-groupe du **groupe orthogonal** $O(n)$. C'est le groupe des matrices de rotation à n dimensions. On peut l'écrire :

$$SO(n) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1 ; A^\top A = I_n\}$$

Définition 2.3 (Groupe de Lie).

Un **groupe de Lie** est une variété différentielle qui est également un groupe, de telle sorte que l'opération de composition du groupe et l'opération d'inversion sont des applications lisses² [3].

Théorème 2.4 (Théorème de submersion).

Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ et $G := f^{-1}(e)$ où $e \in \mathbb{R}^m$.

Si f est une submersion (i.e. si $Df(x)$ est surjective en tout point x de G), alors G est une sous-variété de l'espace $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - m$.

Preuve. Admis □

Proposition 2.5. $SO(n)$ est un groupe de Lie

Preuve. Nous montrons d'abord que $SO(n)$ est un groupe (1), puis qu'il possède une structure de variété différentielle compatible avec les opérations de groupe (2).

1. On pourrait aussi dire : localement homéomorphe à $\mathbb{R}^n$

2. Lisse : de classe $\mathcal{C}^\infty$

(1) $SO(n)$ est un groupe pour le produit matriciel.

Soient $A, B \in SO(n)$, montrons que le produit est stable :

$$(AB)^\top (AB) = B^\top A^\top AB = B^\top B = I_n \quad \text{et} \quad \det(AB) = \det(A) \det(B) = 1.$$

Ainsi $AB \in SO(n)$.

L'associativité est celle du produit matriciel.

L'élément neutre est la matrice identité I_n , qui appartient à $SO(n)$ puisque

$$I_n^\top I_n = I_n \quad \text{et} \quad \det(I_n) = 1.$$

Enfin, si $A \in SO(n)$, alors

$$A^\top A = I_n,$$

d'où

$$A^{-1} = A^\top.$$

Comme

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = 1,$$

on obtient $A^{-1} \in SO(n)$.

Ainsi $SO(n)$ est un groupe et le produit matriciel est bien une loi de composition interne sur l'ensemble $SO(n)$.

(2) $SO(n)$ est une variété différentielle.

Montrons que $SO(n)$ est muni d'une structure de variété différentielle, comme sous-variété de l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Considérons l'application

$$\begin{aligned} f: \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ X &\longmapsto X^\top X \end{aligned}$$

où $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ désigne l'espace des matrices symétriques.

On remarque que

$$O(n) = f^{-1}(I_n).$$

Calculons la différentielle de f .

Soient $X \in O(n)$, et $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} f(X + H) &= (X + H)^\top (X + H) \\ &= X^\top X + X^\top H + H^\top X + H^\top H \\ &= f(X) + X^\top H + H^\top X + H^\top H \end{aligned}$$

Comme la norme subordonnée est sous-multiplicative

$$\|H^\top H\| \leq \|H^\top\| \|H\| = \|H\|^2,$$

on a

$$\begin{aligned} f(X + H) &= f(X) + X^\top H + H^\top X + O(\|H\|^2) \\ &= f(X) + Df(X)H + O(\|H\|^2) \end{aligned}$$

La différentielle de f en X est donc donnée par la partie linéaire en H ,

$$Df(X)H = X^\top H + H^\top X.$$

Il reste à montrer que f est une submersion en tout point de $O(n)$, donc que $Df(X)$ est surjective :

Soit $Y \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, déterminons H

$$Df(X)H = Y \Leftrightarrow X^\top H + H^\top X = Y.$$

Posons $H = \frac{1}{2}XY$ de telle sorte que pour $X \in O(n)$

$$\begin{aligned} Df(X)\frac{1}{2}XY = Y &\Leftrightarrow X^\top \frac{1}{2}XY + (\frac{1}{2}XY)^\top X = Y \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2}X^\top XY + \frac{1}{2}Y^\top X^\top X = Y \end{aligned}$$

or $X^\top X = I_n$ et $Y^\top = Y$, donc

$$Df(X)\frac{1}{2}XY = \frac{1}{2}I_n Y + \frac{1}{2}Y I_n = Y.$$

On a trouvé pour n'importe quel Y , qu'il y a un antécédent H . Ainsi, Df est surjective et donc $O(n)$ est bien une sous-variété de l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (par le *Théorème de submersion 2.4*).

Posons $U = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det A > 0\}$ un ouvert (le déterminant est continu et U est l'image réciproque d'un ouvert par le déterminant).

L'intersection d'une sous-variété avec un ouvert de l'espace ambiant est encore une sous-variété. Comme $SO(n) = O(n) \cap U$, alors $SO(n)$ est une sous-variété. $\square$

Remarque 2.6. $SO(n)$ hérite aussi localement de toutes les propriétés de $O(n)$, comme sa dimension ou encore son espace tangent.

$$\begin{aligned} \dim(SO(n)) &= \dim(\text{Espace de départ}) - \dim(\text{Espace d'arrivée}) \\ &= n^2 - \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n-1)}{2} \end{aligned}$$

2.1.1 Propriétés de l'action du groupe $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$

Soient G un groupe et X un ensemble.

Définition 2.7 (Action de groupe).

On dit que G agit à gauche sur X s'il existe une application $u: G \times X \longrightarrow X$ vérifiant

- $u(e, x) = x$ pour tout $x \in X$ avec e l'élément neutre de G ,
- pour tout $g, g' \in G$ et $x \in X$

$$u(g, u(g', x)) = u(gg', x).$$

Remarque 2.8. On définit de même l'action à droite par la propriété $v(g, v(g', x)) = v(g'g, x)$.

Proposition 2.9. *L'action naturelle du groupe $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ est donnée par la multiplication matricielle :*

$$\begin{aligned} u: SO(n) \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (R, x) &\longmapsto Rx \end{aligned}$$

Preuve. Soient $R, R' \in SO(n)$ et $x \in \mathbb{R}^n$,

$$u(I_n, x) = I_n x = x.$$

Et

$$u(R, u(R', x)) = u(R, R'x) = RR'x = u(RR', x).$$

La multiplication matricielle u est une action de groupe. □

Proposition 2.10. *L'action du groupe $SO(n)$ dans $\mathbb{R}^n$ est fidèle mais pas libre et pas transitive.*

Preuve. L'action de $SO(n)$ dans $\mathbb{R}^n$ est **fidèle** :

Si l'action est fidèle, alors si $R \in SO(n)$ tel que $u(R, x) = x, \forall x \in \mathbb{R}^n$ alors $R = I_n$.

Supposons que $R \in SO(n)$ vérifie $Rx = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. Alors, pour tout vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n : (e_1, \dots, e_n)$, on a

$$Re_i = e_i \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

Ainsi, les colonnes de R sont celles de l'identité, donc $R = I_n$. L'action est fidèle.

L'action de $SO(n)$ dans $\mathbb{R}^n$ n'est **pas libre** :

Si l'action est libre, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, si $x \neq 0$ et $R \neq I_n$ alors $Rx \neq x$.

Prenons $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$ une matrice par bloc de $SO(n)$ où $S \in SO(n-1)$ différente de l'identité et $x = (1, 0, \dots, 0)$.

Alors $u(R, x) = Rx = x$ car x est dans la direction de la première colonne de R .

Donc l'action de $SO(n)$ dans $\mathbb{R}^n$ n'est pas libre.

L'action de $SO(n)$ dans $\mathbb{R}^n$ n'est **pas transitive** :

Si l'action est transitive, alors $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \exists R \in SO(n)$ tel que $u(R, x) = y$.

Prenons $x = 0$ et $y = (1, 0, \dots, 0)$.

Alors $\forall R \in SO(n), u(R, x) = Rx = R \cdot 0 = 0 \neq y$.

Donc l'action de $SO(n)$ dans $\mathbb{R}^n$ n'est pas transitive. □

Proposition 2.11. *L'action de $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ est isométrique. C'est-à-dire :*

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall R \in SO(n), \langle Rx, Ry \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Preuve. Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $R \in SO(n)$

$$\langle Rx, Ry \rangle = \langle x, R^\top Ry \rangle.$$

Or $R^\top R = I_n$ car $R \in SO(n)$, donc

$$\begin{aligned} \langle Rx, Ry \rangle &= \langle x, I_n y \rangle \\ &= \langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

L'action de $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ est isométrique, elle préserve bien la distance. □

Définition 2.12 (Orbite d'une action).

On appelle **orbite de x** la partie de l'ensemble X définie par

$$Orb(x) = \{u(g, x) \mid g \in G\}.$$

Proposition 2.13. *Les orbites de l'action naturelle de $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ sont les sphères centrées en l'origine. Plus précisément, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,*

$$\text{Orb}(x) = \{Rx \mid R \in SO(n)\} = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y\| = \|x\|\}.$$

En particulier, si $x = 0$, alors

$$\text{Orb}(0) = \{0\}.$$

Preuve. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Montrons par double inclusion :

$\text{Orb}(x) \subset \{z \in \mathbb{R}^n \mid \|z\| = \|x\|\}$: Soit $y \in \text{Orb}(x)$. Alors il existe $R \in SO(n)$ tel que

$$y = Rx.$$

Comme l'action de $SO(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ est isométrique, on a

$$\|y\| = \|Rx\| = \|x\|.$$

Donc

$$y \in \{z \in \mathbb{R}^n \mid \|z\| = \|x\|\}.$$

Ainsi,

$$\text{Orb}(x) \subset \{z \in \mathbb{R}^n \mid \|z\| = \|x\|\}.$$

$\text{Orb}(x) \supset \{z \in \mathbb{R}^n \mid \|z\| = \|x\|\}$: Soit maintenant $y \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\|y\| = \|x\|.$$

Si $x = 0$, alors $\|y\| = 0$, donc $y = 0$. On a donc bien

$$\text{Orb}(0) = \{0\}.$$

Supposons maintenant que $x \neq 0$. Alors $y \neq 0$ également. Les vecteurs

$$\frac{x}{\|x\|} \quad \text{et} \quad \frac{y}{\|y\|}$$

sont deux vecteurs unitaires de $\mathbb{R}^n$. On peut compléter chacun d'eux en une base ortho-normée directe de $\mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{B}_x = \left(\frac{x}{\|x\|}, e_2, \dots, e_n \right), \quad \mathcal{B}_y = \left(\frac{y}{\|y\|}, f_2, \dots, f_n \right).$$

Il existe alors une matrice $R \in SO(n)$ envoyant la base $\mathcal{B}_x$ sur la base $\mathcal{B}_y$. En particulier,

$$R \left(\frac{x}{\|x\|} \right) = \frac{y}{\|y\|}.$$

Comme $\|x\| = \|y\|$, on obtient

$$Rx = y.$$

Donc $y \in \text{Orb}(x)$.

Ainsi,

$$\{z \in \mathbb{R}^n \mid \|z\| = \|x\|\} \subset \text{Orb}(x).$$

Finalement, les deux inclusions donnent $\text{Orb}(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y\| = \|x\|\}$. □

2.1.2 Propriétés topologiques de $SO(n)$

Théorème 2.14 (Compacité en dimension finie).

Soient $(X, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $E \subset X$ une partie de X . Alors E est compacte si et seulement si E est fermée et bornée.

Preuve. $\Rightarrow$ Une partie compacte est aussi fermée et bornée. Cette implication est donc vraie dans n'importe quel espace et n'a rien à voir avec le cadre de la dimension finie!

$\Leftarrow$ C'est une conséquence du Théorème de Bolzano-Weierstrass. $\square$

Proposition 2.15. $SO(n)$ est un groupe compact.

Preuve. On a $SO(n) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est en dimension finie.

Montrons que $SO(n)$ est fermé (1) et borné (2) :

(1) $SO(n)$ **fermé**.

Soient f et g deux applications continues.

$$\begin{aligned} f: \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} & g: \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ X &\longmapsto \det(X) & X &\longmapsto X^\top X \end{aligned}$$

On pose $\{1\} \subset \mathbb{R}$ et $\{Id\} \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, deux fermés (car ce sont des singletons).

Alors $SO(n) = f^{-1}(\{1\}) \cap g^{-1}(\{Id\})$, comme l'intersection de deux fermés (images réciproques de fermés par des applications continues). Ainsi $SO(n)$ est fermé.

(2) $SO(n)$ **borné**.

Soit $A \in SO(n)$, alors $\|A\|_F^2 = \text{Tr}(A^\top A) = \text{Tr}(Id) = n$.

On a donc : $\forall A \in SO(n), \exists M = \sqrt{n}$ tel que $\|A\| \leq M$ (toutes les normes sont équivalentes en dimension finie).

On retrouve que $SO(n)$ est borné car $SO(n) \subset B(0, M)$.

Finalement, $SO(n)$ fermé et borné donc (par le *Théorème de compacité en dimension finie 2.14*) $SO(n)$ est compact. $\square$

Proposition 2.16. $SO(n)$ est un groupe connexe par arcs.

Preuve. On procède par récurrence sur $n \geq 1$ en utilisant l'action naturelle de $SO(n)$ sur la sphère $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} u: SO(n) \times S^{n-1} &\longrightarrow S^{n-1} \\ (A, x) &\longmapsto Ax \end{aligned}$$

Pour $n = 1$, le groupe $SO(1) = \{1\}$ est un singleton, il est donc trivialement connexe par arcs.

Vérifions que le fixateur du vecteur $e_n = (0, \dots, 0, 1)^\top$ s'identifie à $SO(n-1)$.

Une matrice $A \in SO(n)$ vérifie $Ae_n = e_n$ si et seulement si sa dernière colonne est e_n . Étant orthogonale, ses lignes et colonnes forment des familles orthonormées, ce qui impose à A d'avoir une structure de bloc de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

où $B \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R})$. Les conditions $A^\top A = I_n$ et $\det(A) = 1$ sont aussi vérifiées sur le bloc B .

Donc, $B \in SO(n-1)$. L'application $B \mapsto \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ définit un isomorphisme qui permet d'identifier le fixateur de e_n à $SO(n-1)$.

Montrons que l'application $SO(n)/SO(n-1) \longrightarrow S^{n-1}$ ainsi obtenue est un homéomorphisme.

L'action de $SO(n)$ sur S^{n-1} est transitive pour tout $n \geq 2$ (tout vecteur unitaire peut être complété en une base orthonormée). L'application associée à e_n est donc surjective :

$$\begin{aligned} \varphi: SO(n) &\longrightarrow S^{n-1} \\ A &\longmapsto Ae_n \end{aligned}$$

Par passage au quotient, φ induit une bijection continue :

$$\varphi': SO(n)/SO(n-1) \longrightarrow S^{n-1}$$

Le groupe $SO(n)$ étant compact (2.15), toute bijection continue d'un espace compact vers un espace séparé est un homéomorphisme.

On en déduit que $SO(n)/SO(n-1) \simeq S^{n-1}$.

Montrons que si H est un sous-groupe fermé connexe de G , l'application quotient induit une bijection $\pi_0(G) \simeq \pi_0(G/H)$.

En effet, soit $f: G \rightarrow \{0, 1\}$ une application continue. Pour tout $g \in G$, la restriction de f à la classe gH est continue. Comme H est connexe, la fibre³ gH est connexe, donc f est constante. Donc, f passe au quotient en une application continue $\bar{f}$. Si G/H est connexe, $\bar{f}$ est constante, impliquant que f est constante sur G .

G est donc connexe.

On en déduit la connexité de $SO(n)$ par récurrence.

Supposons que $SO(n-1)$ est connexe. On applique l'égalité précédente à $G = SO(n)$ et $H = SO(n-1)$.

Par hypothèse, H est connexe. De plus, pour $n \geq 2$, l'espace quotient $SO(n)/SO(n-1) \simeq S^{n-1}$ est connexe.

$SO(n)$ est donc connexe.

Et $SO(n)$ est connexe par arcs car c'est une variété différentielle (2.5) localement connexe par arcs et compacte (2.15). $\square$

2.2 L'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$

L'outil principal qui nous permettra d'étudier les groupes de Lie est leur algèbre de Lie. Définissons cette structure pour les rotations et intéressons-nous aux propriétés différentielles des groupes de Lie. Prenons G un groupe de Lie et $e \in G$ son élément neutre.

Définition 2.17 (Algèbre de Lie).

Une **algèbre de Lie**, notée $\mathfrak{g} = T_e G$, est un espace vectoriel muni d'un produit appelé commutateur (ou crochet de Lie), qui est une application bilinéaire antisymétrique [3]

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

3. En topologie, la fibre d'un point par une application désigne simplement sa préimage

et qui satisfait l'identité de Jacobi :

$$[\xi, [\eta, \zeta]] + [\eta, [\zeta, \xi]] + [\zeta, [\xi, \eta]] = 0, \quad \text{pour } (\xi, \eta, \zeta) \in \mathfrak{g}^3.$$

Définition 2.18 (Crochet de Lie dans $\mathfrak{so}(n)$).

Le commutateur de $\mathfrak{so}(n)$ est, pour $A, B \in \mathfrak{so}(n)$:

$$([\cdot, \cdot]) : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g} \\ (A, B) \mapsto AB - BA$$

Proposition 2.19. *Les algèbres de Lie des groupes $SO(n)$ et $O(n)$ coïncident :*

$$\mathfrak{so}(n) = \mathfrak{o}(n)$$

Preuve. Montrons par double inclusion :

$\mathfrak{so}(n) \subset \mathfrak{o}(n)$: Comme $SO(n) \subset O(n)$, tout vecteur tangent à $SO(n)$ en l'identité est aussi tangent à $O(n)$.

$$T_{Id}SO(n) \subset T_{Id}O(n), \text{ donc } \mathfrak{so}(n) \subset \mathfrak{o}(n).$$

$\mathfrak{so}(n) \supset \mathfrak{o}(n)$: On utilise le fait que $SO(n)$ est la composante connexe de l'identité dans $O(n)$ (2.16).

Au voisinage de I_n , la condition $\det X = 1$ dans $O(n)$ est automatiquement satisfaite sur la composante où $\det X > 0$. Comme le déterminant est continu et vaut 1 en I_n , il existe un voisinage de I_n dans lequel tout élément de $O(n)$ a un déterminant positif, donc égal à 1 puisqu'un élément de $O(n)$ a un déterminant ± 1 . Ainsi, $O(n)$ et $SO(n)$ coïncident localement au voisinage de I_n . Ils ont donc le même espace tangent en I_n .

Finalement, on a $\underline{\mathfrak{so}(n) = \mathfrak{o}(n)}$. □

Proposition 2.20. $T_{Id}SO(n) = \{H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid H^\top = -H\}$ est l'algèbre de Lie de $SO(n)$. Plus précisément : $\mathfrak{so}(n) = T_{Id}SO(n)$.

Preuve. $SO(n)$ est un groupe de Lie (2.5). L'algèbre de Lie d'un groupe de Lie est définie comme son espace tangent en l'identité (ici Id), que l'on trouve en différenciant f^4 en l'identité avec

$$f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ X \longmapsto X^\top X$$

Par la preuve de la *proposition* (2.5), on a

$$Df(X)H = X^\top H + H^\top X.$$

On l'évalue en l'identité

$$Df(Id)H = I_n^\top H + H^\top I_n = H + H^\top.$$

Enfin,

$$T_{Id}SO(n) = \ker(Df(Id)) = \{H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid H^\top = -H\}$$

Par définition, l'algèbre de Lie de $SO(n)$ est l'espace tangent en l'identité.

Ainsi, l'algèbre de Lie du groupe des rotations de dimension n est l'ensemble des matrices antisymétriques.

$$\mathfrak{so}(n) = \{H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid H^\top = -H\}$$

□

4. En effet, on peut ignorer la condition sur le déterminant car on a déjà montré que les algèbres de Lie de $SO(n)$ et $O(n)$ coïncident (2.19)

Proposition 2.21. Si $A, B \in \mathfrak{so}(n)$, Alors $[A, B] \in \mathfrak{so}(n)$

Preuve. Soient $A, B \in \mathfrak{so}(n)$, calculons la transposée de $[A, B]$

$$\begin{aligned} [A, B]^\top &= (AB - BA)^\top \\ &= (AB)^\top - (BA)^\top \\ &= B^\top A^\top - A^\top B^\top. \end{aligned}$$

On utilise l'antisymétrie de A et B

$$\begin{aligned} [A, B]^\top &= (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= -(AB - BA) = -[A, B] \end{aligned}$$

On a bien $[A, B]$ antisymétrique, donc $[A, B] \in \mathfrak{so}(n)$. □

Définition 2.22 (Translation à droite).

Soit $g \in G$. On note **translation à droite** l'application :

$$\begin{aligned} R_g : G &\longrightarrow G \\ h &\longmapsto hg \end{aligned}$$

Proposition 2.23. La translation à droite sur le groupe $SO(n)$ est une application lisse.

Preuve. Soit R_M une translation à droite sur $SO(n)$. On peut définir cette translation comme :

$$\begin{aligned} R_M : SO(n) &\longrightarrow SO(n) \\ X &\longmapsto u \times v = XM \end{aligned}$$

avec u l'application identité et v une application constante sur $SO(n)$. Par produit d'applications lisses (avec le produit matriciel), on a que R_M est une application lisse sur $SO(n)$. □

Proposition 2.24. L'espace $T_M SO(n)$ est isomorphe à $T_{Id} SO(n)$ pour tout $M \in SO(n)$

Preuve. Soit $M \in SO(n)$. On considère la translation à droite (2.22) sur $SO(n)$ définie par

$$\begin{aligned} R_M : SO(n) &\longrightarrow SO(n) \\ X &\longmapsto XM \end{aligned}$$

Cette application est lisse (2.23), et son inverse est $R_{M^{-1}}$. Ainsi, R_M est un difféomorphisme de $SO(n)$.

En particulier, sa différentielle en tout point est un isomorphisme linéaire. En évaluant en l'identité, on obtient

$$T_{Id} R_M : T_{Id} SO(n) \longrightarrow T_M SO(n),$$

qui est un isomorphisme. Son inverse est donné par

$$T_M R_{M^{-1}} : T_M SO(n) \longrightarrow T_{Id} SO(n),$$

et par théorème de dérivation des fonctions composées, on a

$$T_M R_{M^{-1}} \circ T_{Id} R_M = T_{Id} (R_{M^{-1}} \circ R_M) = \text{Id}_{T_{Id} SO(n)}.$$

On en déduit que $T_M SO(n)$ et $T_{Id} SO(n)$ sont isomorphes. □

Remarque 2.25. La translation à droite permet de “passer”⁵ d'un espace tangent à un autre, reliant l'espace tangent en un point quelconque et l'espace tangent à l'identité (2.24).

5. Passer : transporter de manière isomorphe les structures

2.3 L'application exponentielle

Définition 2.26 (Exponentielle de matrice).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle exponentielle de la matrice A , notée e^A , la somme de la série :

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}, \quad A^0 = I_n, \quad \exp(0) = I_n.$$

Proposition 2.27. Si $A \in \mathfrak{so}(n)$, Alors $e^A \in SO(n)$.

Preuve. Montrons que $\det(e^A) = 1$ et $(e^A)^\top e^A = I_n$, et donc que $e^A \in SO(n)$.

Soit $A \in \mathfrak{so}(n)$, A est une matrice antisymétrique.

On sait que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$\det(e^M) = e^{\text{Tr}(M)}.$$

Par antisymétrie de A , $\text{Tr}(A) = 0$.

Et donc

$$\det(e^A) = e^{\text{Tr}(A)} = e^0 = 1.$$

Maintenant, montrons que $(e^A)^\top e^A = I_n$.

Pour la même matrice A ,

$$\begin{aligned} (e^A)^\top &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right)^\top = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A^k)^\top}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A^\top)^k}{k!} = e^{(A^\top)}. \end{aligned}$$

Or $A^\top = -A$,

$$(e^A)^\top (e^A) = (e^{-A})(e^A) = e^0 = I_n.$$

Ainsi, e^A vérifie $\det(e^A) = 1$ et $(e^A)^\top e^A = I_n$.

On a bien $e^A \in SO(n)$. □

Exemple 2.28. Exemple d'exponentielle d'une matrice 2×2 antisymétrique :

Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(2)$. Calculons e^A :

On observe que

$$A^2 = \begin{pmatrix} -\theta^2 & 0 \\ 0 & -\theta^2 \end{pmatrix} = -\theta^2 I_2,$$

et par récurrence,

$$A^{2k} = (-1)^k \theta^{2k} I_2, \quad A^{2k+1} = (-1)^k \theta^{2k+1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{aligned} e^A &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} \right) I_2 + \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On reconnaît les séries du cosinus et du sinus :

$$\cos \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Ainsi,

$$e^A = \cos \theta I_2 + \sin \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

qui est bien une matrice de rotation, donc $e^A \in SO(2)$.

Proposition 2.29. *L'application exponentielle $\exp: \mathfrak{so}(n) \longrightarrow SO(n)$ est surjective.*

Preuve. Soit $R \in SO(n)$. Par le théorème spectral, il existe une base orthonormée dans laquelle la matrice de R est diagonale par blocs, les blocs diagonaux étant soit des blocs de rotation :

$$R(\theta_k) = \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix},$$

soit des blocs (1) et (-1) .

Comme $\det R = 1$, les valeurs propres (-1) apparaissent en nombre pair ; on les regroupe donc deux à deux pour former des blocs

$$-I_2 = R(\pi).$$

On obtient ainsi une décomposition

$$R = P \operatorname{diag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_r), 1, \dots, 1) P^{-1},$$

où P est orthogonale.

Pour chaque bloc de rotation d'angle θ_k , on construit explicitement

$$A_k = \begin{pmatrix} 0 & -\theta_k \\ \theta_k & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(2),$$

de sorte que

$$e^{A_k} = R(\theta_k).$$

On pose alors

$$A = P \operatorname{diag}(A_1, \dots, A_r, 0, \dots, 0) P^{-1}.$$

Comme $\mathfrak{so}(n)$ est stable par conjugaison orthogonale, on a $A \in \mathfrak{so}(n)$.

Finalement,

$$e^A = P \operatorname{diag}(e^{A_1}, \dots, e^{A_r}, 1, \dots, 1) P^{-1} = R.$$

Ainsi, on retrouve que $e^A = R$, et donc que pour tout $R \in SO(n)$, il existe $A \in \mathfrak{so}(n)$ tel que $e^A = R$. L'exponentielle est surjective de l'algèbre de Lie de $SO(n)$ dans son groupe de Lie. $\square$

3 Étude de l'équation différentielle linéaire $\dot{x}(t) = Ax(t)$

Dans ce chapitre, nous verrons comment cette équation différentielle linéaire apparaît naturellement sur le groupe spécial orthogonal $SO(n)$, l'importance de ce résultat, ainsi que sa résolution. Commençons avec le groupe de Lie $SO(n)$.

3.1 Obtenir l'équation différentielle $\dot{x}(t) = Ax(t)$

Cherchons à exprimer la différentielle de la translation à droite afin de lier le groupe $SO(n)$ à son algèbre de Lie. Remarquons une égalité que l'on utilisera juste après.

Remarque 3.1. On sait que $\forall X \in SO(n): X^\top X = I_n$, et donc $X^{-1} = X^\top$.

Trouvons l'équation.

Prenons la translation à droite sur $SO(n)$ avec $M \in SO(n)$:

$$\begin{aligned} R_M: SO(n) &\longrightarrow SO(n) \\ X &\longmapsto XM \end{aligned}$$

Différencions cette application, soient $X \in SO(n)$ et $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} R_M(X + H) &= (X + H)M \\ &= XM + HM \\ &= R_M(X) + DR_M(X)H + o(\|H\|) \end{aligned}$$

La différentielle de R_M en X est donc donnée par la partie linéaire en H ,

$$\begin{aligned} D(R_M)_X: T_X SO(n) &\longrightarrow T_{XM} SO(n) \\ H &\longmapsto HM \end{aligned}$$

Car

$$DR_M: SO(n) \longrightarrow \mathcal{L}(T_X SO(n), T_{XM} SO(n))$$

est à valeurs dans les applications linéaires d'un espace tangent dans un autre, qui sont isomorphes (2.24).

Considérons maintenant une courbe différentiable $x(t) \in SO(n)$,

$$x(t) = M_t x_0$$

que l'on différencie par rapport au temps,

$$\dot{x}(t) = \dot{M}_t x_0.$$

En posant $A(t) = \dot{x}(t)x(t)^{-1}$, on a $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$. Montrons que $A(t)$ est antisymétrique : en dérivant l'identité (3.1) $x(t)^\top x(t) = I_n$ par rapport au temps,

$$\dot{x}(t)^\top x(t) + x(t)^\top \dot{x}(t) = 0.$$

Comme $x(t)^{-1} = x(t)^\top$, on a $A(t) = \dot{x}(t)x(t)^\top$, et l'égalité ci-dessus donne $A(t)^\top + A(t) = 0$. Ainsi $A(t) \in T_{I_n}SO(n) = \mathfrak{so}(n)$ (l'algèbre de Lie des matrices antisymétriques).

Donc si on suppose que ce vecteur est constant en fonction du temps $A(t) = A$,

$$\dot{x}(t) = AM_t x_0$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

Remarque 3.2. La solution de l'équation différentielle linéaire ci-dessus permet, à partir d'un seul élément A de l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$, de créer un mouvement sur tout le groupe $SO(n)$ à partir d'applications de translations à droite.

3.2 Solution de $\dot{x}(t) = Ax(t)$

Pour garantir l'existence et l'unicité des trajectoires sur le groupe, revenons au cas général avec le théorème suivant.

Théorème 3.3 (Théorème de Cauchy-Lipschitz).

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ et $F: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^d$. Supposons que :

- F est continue sur Ω .
- F est localement Lipschitzienne par rapport à x .

Alors, pour tout $(t_0, x_0) \in \Omega$, le problème de Cauchy :

$$(E) \begin{cases} Z'(t) = F(t, Z(t)) \\ Z(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet une unique solution maximale (J, x) .

Preuve. Admis □

Proposition 3.4. La solution de l'équation différentielle linéaire $\dot{x}(t) = Ax(t)$ est :

$$x(t) = e^{tA}x_0$$

Preuve. Dans notre cas, en associant $\mathbb{R}^d$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'application $F(t, X) = AX$ est linéaire par rapport à X , donc globalement lipschitzienne.

Le *Théorème de Cauchy-Lipschitz 3.3* s'applique et assure l'existence d'une unique solution maximale définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, dont la forme explicite fait intervenir l'exponentielle de matrice.

Vérifions que notre unique solution est $x(t) = e^{tA}x_0$:

x étant lisse, on peut écrire :

$$x(t) = e^{tA}x_0$$

$$\dot{x}(t) = (e^{tA})'x_0$$

On dérive en fonction de t .

$$= Ae^{tA}x_0$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

Avec

$$x(0) = I_n x_0 = x_0$$

Ainsi, l'unique solution de l'équation différentielle est $x(t) = e^{tA}x_0$. □

4 Formulation Hamiltonienne du recalage sur $SO(n)$

Avant de nous restreindre aux cas explicites $SO(2)$ et $SO(3)$, reprenons le cadre hamiltonien introduit au **Chapitre 1**. Étudions le cas où le groupe de transformations est $SO(n)$ et que la forme étudiée est un ensemble de points repères.

4.1 Espaces tangent et cotangent des points repères

Dans ce cadre, le champ de vecteurs v_t n'est plus un difféomorphisme quelconque : il est engendré par une matrice antisymétrique. On travaille donc dans l'espace

$$V = Skew_n = \mathfrak{so}(n),$$

où $Skew_n$ désigne l'espace des matrices antisymétriques de taille $n \geq 2$.

La forme étudiée est un ensemble de N points repères. L'espace des formes est

$$Q = (\mathbb{R}^n)^N,$$

qui est un espace vectoriel de dimension finie. Un espace vectoriel étant son propre tangent en chacun de ses points, on a donc

$$T_q Q = (\mathbb{R}^n)^N = Q \quad \text{pour tout } q \in Q.$$

Pour définir l'espace cotangent $T_q^* Q$, on cherche l'ensemble des formes linéaires sur $T_q Q$, c'est-à-dire les applications qui prennent un élément de $T_q Q = (\mathbb{R}^n)^N$ et renvoient un scalaire dans $\mathbb{R}$.

Soit $p \in T_q^* Q = (\mathbb{R}^n)^N$ et $\delta q \in T_q Q = (\mathbb{R}^n)^N$. On cherche une application telle que $p(\delta q) = (p \mid \delta q) \in \mathbb{R}$. On pose $Q = (\mathbb{R}^n)^N, \langle \cdot, \cdot \rangle$ muni de son produit scalaire canonique, et donc on obtient une application bilinéaire de $T_q^* Q$ dans les réels qui convient :

$$(p \mid \delta q) = \langle p, \delta q \rangle = p^\top \delta q.$$

Remarque 4.1. Cette identification de $T_q^* Q$ avec $T_q Q$ est spécifique au cas des points repères, où l'espace des formes est de dimension finie. C'est précisément cette propriété qui rend le problème plus simple que le modèle LDDMM complet, dans lequel l'espace des formes est de dimension infinie.

4.2 Hamiltonien sur $SO(n)$

Reprenons le Hamiltonien de contrôle introduit au **Chapitre 1**. Le contrôle est ici la matrice antisymétrique $A \in V = Skew_n$, et l'action du champ de vecteurs sur la forme est donnée par la multiplication matricielle $A \cdot q = Aq$. Le Hamiltonien s'écrit

$$H: T^*Q \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(q, p, A) \longmapsto (p \mid Aq) - \frac{1}{2}\|A\|^2.$$

En utilisant l'expression vue juste au-dessus et la norme de Frobenius $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^\top A)$, on obtient :

$$H(q, p, A) = (p \mid Aq) - \frac{1}{2}\|A\|^2$$

$$= p^\top(Aq) - \frac{1}{2}\text{tr}(A^\top A)$$

Le premier terme mesure l'interaction entre le moment p et la vitesse de déformation Aq , tandis que le second représente le coût énergétique du champ de vecteurs.

Le problème variationnel s'écrit alors, avec q_S la forme source et q_T la forme cible :

$$\min_{A \in L^2([0,1], V)} \frac{1}{2} \int_0^1 \|A_t\|_V^2 dt + \|q_1 - q_T\|$$

$$\text{tel que } \begin{cases} \dot{q}_t = A_t q_t \\ q_0 = q_S \end{cases}$$

4.3 Équations géodésiques

Le principe du maximum de Pontryagin [10] impose que le contrôle optimal maximise le Hamiltonien par rapport à A . Les trajectoires optimales sont alors solutions des équations hamiltoniennes

$$\dot{q}_t = \partial_p H(q_t, p_t, A_t),$$

$$\dot{p}_t = -\partial_q H(q_t, p_t, A_t).$$

La condition pour optimiser A et obtenir le Hamiltonien réduit se trouve en annulant la dérivée du Hamiltonien par rapport à A :

$$\partial_A H(q, p, A) = 0.$$

Calculons cette différentielle

Le premier terme $p^\top(Aq)$ est linéaire en A , il s'écrit

$$p^\top(Aq) = \text{Tr}(p^\top Aq) = \text{Tr}(qp^\top A),$$

d'où,

$$\nabla(p^\top(Aq)) = pq^\top.$$

Le second terme : $-\frac{1}{2}\text{Tr}(A^\top A)$ a pour différentielle $-A$. En effet, soit

$$f(A) = -\frac{1}{2} \text{Tr}(A^\top A).$$

Pour toute variation H ,

$$\begin{aligned} f(A+H) &= -\frac{1}{2} \operatorname{Tr}((A+H)^\top (A+H)) \\ &= f(A) - \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(A^\top H + H^\top A) + o(\|H\|) \\ &= f(A) - \operatorname{Tr}(A^\top H) + o(\|H\|), \end{aligned}$$

car $\operatorname{Tr}(H^\top A) = \operatorname{Tr}(A^\top H)$.

Ainsi,

$$Df(A)H = -\operatorname{Tr}(A^\top H) = \langle -A, H \rangle,$$

où $\langle X, Y \rangle = \operatorname{Tr}(X^\top Y)$ est le produit scalaire de Frobenius. Par conséquent,

$$\nabla f(A) = -A.$$

On obtient donc

$$\nabla H(q, p, A) = pq^\top - A.$$

Or A est contraint d'appartenir à $Skew_n$. La condition s'écrit

$$\langle pq^\top - A, H \rangle = 0, \quad \forall H \in Skew_n,$$

c'est-à-dire

$$A^* = \operatorname{Proj}_{Skew_n}(pq^\top).$$

Comme la projection orthogonale sur $Skew_n$ est donnée par

$$\operatorname{Proj}_{Skew_n}(M) = \frac{1}{2}(M - M^\top),$$

on obtient

$$A^* = \frac{1}{2}(pq^\top - (pq^\top)^\top) = \frac{1}{2}(pq^\top - qp^\top).$$

donc $A^* \in Skew_n = \mathfrak{so}(n)$.

On définit alors l'Hamiltonien réduit en remplaçant le contrôle optimal dans le Hamiltonien initial :

$$H_r(q, p) = H(q, p, A^*).$$

Le problème de contrôle optimal se ramène ainsi à un système d'équations différentielles sur T^*Q , avec pour seule condition la donnée du moment initial p_0 :

$$\min_{p_0} \frac{1}{2} \int_0^1 \|A_t\|_V^2 dt + \|q_1 - q_T\|$$

tel que les équations hamiltoniennes sont satisfaites.

Remarque 4.2. Sur le groupe des difféomorphismes, on aurait $G = \operatorname{Diff}(\mathbb{R}^n)$ et $\mathfrak{g} = C_0^k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, un espace de dimension infinie. Ici, dans le cas des points repères, on a $p \in T^*Q$ avec $\dim(T^*Q) = \dim(Q) = nN$ fini. L'optimisation ne porte plus sur le champ de vitesse en dimension infinie, mais uniquement sur le moment initial p_0 , un objet de dimension finie.

5 Cas particuliers de $SO(2)$ et $SO(3)$

Dans ce chapitre, nous sortirons un peu de la théorie en nous intéressant à des cas simples : les groupes de rotations $SO(2)$ et $SO(3)$.

Ces deux groupes vont nous donner un aperçu plus concret du cadre *LDDMM*.

5.1 $SO(2)$, Les rotations en dimension 2

Le groupe $SO(2)$ est très simple, il décrit les rotations du plan autour de l'origine en dimension 2.

Proposition 5.1. *Soit R une matrice de $SO(2)$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que*

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Preuve. Soit

$$R = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SO(2).$$

Comme $R^\top R = I_2$, les colonnes de R forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. On a donc

$$a^2 + c^2 = 1.$$

Il existe alors $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$a = \cos \theta, \quad c = \sin \theta.$$

La seconde colonne doit être un vecteur unitaire orthogonal à $(a, c)^\top$. Elle est égale à

$$(-\sin \theta, \cos \theta)^\top,$$

ou à

$$(\sin \theta, -\cos \theta)^\top.$$

Or $\det(R) = 1$, ce qui élimine la seconde possibilité. Ainsi

$$b = -\sin \theta, \quad d = \cos \theta.$$

Ainsi,

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

□

Étude de l'équation $\dot{R}(t) = AR(t)$ dans $SO(2)$.

L'inconnue est une rotation que l'on va nommer ici R . On remarque que $A \in \mathfrak{so}(2)$ pour que la solution appartienne à $SO(2)$.

Alors on peut écrire A sous la forme

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}, \text{ avec } \omega \in \mathbb{R}.$$

On a vu que la solution d'une équation différentielle linéaire de ce type est $e^{tA}x_0$ (3.4). Dans notre cas, on a donc

$$R(t) = e^{tA}R_0.$$

Or l'exponentielle d'une matrice de $\mathfrak{so}(n)$ est à valeur dans $SO(n)$ (2.27).

Sachant que $tA \in \mathfrak{so}(2)$, donc $e^{tA} \in SO(2)$ et e^{tA} peut s'écrire (5.1) comme

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \text{ avec } \theta \in \mathbb{R} \text{ dépendant de } t.$$

Après résolution, on trouve

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

Par conséquent,

$$R(t) = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} R_0.$$

Comme toute matrice de $SO(2)$ est une rotation, il existe $\theta_0 \in \mathbb{R}$ tel que

$$R_0 = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 & -\sin \theta_0 \\ \sin \theta_0 & \cos \theta_0 \end{pmatrix}.$$

On obtient alors

$$R(t) = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta_0) & -\sin(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) \end{pmatrix}.$$

En effectuant le produit matriciel et en utilisant les formules d'addition du sinus et du cosinus, on trouve

$$R(t) = \begin{pmatrix} \cos(\theta_0 + \omega t) & -\sin(\theta_0 + \omega t) \\ \sin(\theta_0 + \omega t) & \cos(\theta_0 + \omega t) \end{pmatrix}. (*)$$

Ainsi, la solution est une rotation dont l'angle évolue linéairement avec le temps.

Application au modèle de recalage.

Soit x_S notre forme source et x_T notre forme cible. Rappelons notre équation de minimisation dans le cas général [7] pour I_0 la forme source et I_1 la forme cible :

$$\begin{aligned} \min_{v \in L^2([0,1], V)} J(v) &= \frac{1}{2} \int_0^1 \|v_t\|_V^2 dt + \|I_0 \circ \varphi_1^{-1} - I_1\| \\ \text{tel que } &\begin{cases} \dot{\varphi}_t = v_t \circ \varphi_t \\ \varphi_0 = Id \end{cases} \end{aligned}$$

Dans $SO(2)$, l'espace des transformations est réduit aux rotations du plan. On cherche la meilleure rotation, où x_1 désigne la forme transformée, vérifiant

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_t x(t) \\ x_0 = x_S \end{cases}$$

Alors, on résout l'équation différentielle ci-dessus en utilisant la solution (*)

$$x(t) = R(t)x_S.$$

On obtient ainsi une description explicite de l'évolution de la forme source sous l'action d'une rotation. Le résultat x_1 apparaît quand la rotation est totalement appliquée à notre forme source.

Maintenant, regardons l'énergie cinétique dans le cas des rotations de dimension 2. Avec le produit matriciel en loi de composition, on retrouve naturellement

$$v_t = A_t, \quad A \in \mathfrak{so}(2).$$

Ainsi, notre minimisation ressemble maintenant à ça (où $Skew_2$ désigne l'espace des matrices antisymétriques) :

$$\begin{aligned} \min_{A \in L^2([0,1], Skew_2)} & \frac{1}{2} \int_0^1 \|A_t\|_{Skew_2}^2 dt + \|x_1 - x_T\| \\ \text{tel que } & \begin{cases} \dot{x}(t) = A_t x(t) \\ x_0 = x_S \end{cases} \end{aligned}$$

Or A est antisymétrique, donc sous la forme $A_t = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_t \\ \omega_t & 0 \end{pmatrix}$ pour un certain $\omega_t \in \mathbb{R}$.

On peut simplifier notre minimisation, et utiliser la valeur absolue au lieu d'une norme qui convient :

$$\begin{aligned} \min_{\omega_t \in \mathbb{R}} & \frac{1}{2} \int_0^1 |\omega_t|^2 dt + \|x_1 - x_T\| \\ \text{tel que } & \begin{cases} \dot{x}(t) = A_t x(t) \\ x_0 = x_S \end{cases} \end{aligned}$$

Si l'on cherche une géodésique¹, on pose $\omega_t = \omega$ pour tout t . Le problème se réduit à l'optimisation d'un seul scalaire paramétrique $\omega \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \min_{\omega \in \mathbb{R}} J(\omega) &= \frac{1}{2} |\omega|^2 + \|x_1(\omega) - x_T\| \\ \text{tel que } & \begin{cases} \dot{x}(t) = A_t x(t) \\ x_0 = x_S \end{cases} \end{aligned}$$

Autrement dit, dans le cas de $SO(2)$, le problème de recalage consiste à rechercher une vitesse d'angle² optimale permettant de faire coïncider au mieux la forme source avec la forme cible tout en "optimisant"³ la rotation.

5.2 $SO(3)$, Les rotations en dimension 3

Le cas de la dimension 3 introduit une géométrie supérieure à celle de la dimension 2, notamment en raison de la *non-commutativité* du groupe $SO(3)$. A faire ...

-
1. La rotation "la plus naturelle", sans accélération, à vitesse angulaire constante
 2. Vitesse d'angle ou vitesse angulaire : un angle qui évolue en fonction du temps
 3. Optimiser : minimiser le coût énergétique

6 Implémentation algorithmique

Nous détaillons ici deux stratégies de résolution numérique du problème de recalage restreint aux rotations, ainsi que l'analyse des résultats expérimentaux obtenus sur différentes formes tests.

6.1 Approche directe - Discrétiser puis Optimiser

Pour résoudre ce problème numériquement, on utilise un algorithme itératif :

— **Initialisation** : On choisit une vitesse angulaire de départ, par exemple

$$\omega^{(0)} = 0.$$

— **Boucle d'optimisation** (pour chaque itération k) :

1. *Intégration du flot* (méthode d'Euler explicite) : On discrétise le temps physique $t \in [0, 1]$ en N sous-intervalles de pas Δt . En partant de la position initiale $x_{t=0} = x_S$, on intègre la dynamique pas à pas :

$$x_{t+\Delta t} = x_t + \Delta t A(\omega^{(k)}) x_t.$$

On obtient ainsi la position déformée finale x_{finale} , correspondant à l'instant $t = 1$.

2. *Évaluation de l'énergie* : On calcule le coût global

$$J(\omega^{(k)}).$$

3. *Mise à jour* (descente de gradient) : On calcule le gradient de l'énergie $\nabla J(\omega^{(k)})$ et on actualise la vitesse angulaire avec un taux d'apprentissage α :

$$\omega^{(k+1)} = \omega^{(k)} - \alpha \nabla J(\omega^{(k)}).$$

La descente de gradient peut être réalisée à l'aide de l'algorithme L-BFGS de PyTorch.

6.1.1 Recalage rigide sur $SO(2)$

On souhaite toujours minimiser le problème suivant :

$$\begin{aligned} \min_{v \in L^2([0,1], V)} J(v) &= \frac{1}{2} \int_0^1 \|v_t\|_V^2 dt + \|I_0 \circ \varphi_1^{-1} - I_1\| \\ \text{tel que } &\begin{cases} \dot{\varphi}_t = v_t \circ \varphi_t \\ \varphi_0 = Id \end{cases} \end{aligned}$$

On remplace le champ de vitesse LDDMM par un champ rigide

$$\dot{x} = A(\omega)x,$$

avec

$$A(\omega) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(2).$$

Le paramètre $\omega \in \mathbb{R}$ est la vitesse angulaire.

On retrouve alors le problème présenté dans le chapitre **5 Cas particuliers de $SO(2)$ et $SO(3)$** , avec x_S notre forme source et x_T notre forme cible :

$$\begin{aligned} \min_{\omega \in \mathbb{R}} J(\omega) &= \frac{1}{2}|\omega|^2 + \|x_1(\omega) - x_T\| \\ \text{tel que } &\begin{cases} \dot{x} = A(\omega)x \\ x_{t=0} = x_S \end{cases} \end{aligned}$$

Méthode pour le recalage rigide sur $SO(2)$.

Étape 1 : Intégration du flot

La fonction `Euler` (A.1) intègre le flot rigide par la méthode d'Euler explicite sur $t \in [0, 1]$.

Étape 2 : Évaluation de l'énergie

La fonction `rotation_loss` (A.2) calcule l'énergie totale $J(\omega) = \frac{1}{2}|\omega|^2 + \|x_1(\omega) - x_T\|$.

Étape 3 : Mise à jour (descente de gradient)

La fonction `opti_rotation` (A.3) optimise de la vitesse angulaire ω par descente de gradient.

Exemple 6.1 (Application de la méthode et calcul de la première itération).

On initialise le paramètre de rotation à :

$$\omega^{(0)} = 0$$

Cette valeur correspond à une rotation nulle. On évalue alors la fonction coût associée au recalage :

$$J(\omega^{(0)}) = J(0) = 9.488581$$

*Cette valeur mesure l'écart entre la forme de référence et la forme transformée lorsque aucune rotation n'est appliquée. La valeur ici provient de l'exemple **Figure (6.1)**.*

Calcul du gradient

Le gradient de la fonction coût en $\omega^{(0)}$ est :

$$\nabla J(\omega^{(0)}) = 23.035329$$

Ce gradient est positif, ce qui signifie que la fonction coût augmente lorsque ω augmente localement. Pour diminuer la fonction coût, il faut donc se déplacer dans la direction opposée au gradient.

Application de la descente de gradient

La formule de mise à jour est :

$$\omega^{(k+1)} = \omega^{(k)} - \alpha \nabla J(\omega^{(k)})$$

avec :

$$\alpha = 10^{-3}$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$\omega^{(1)} = 0 - 10^{-3} \times 23.035329$$

On calcule d'abord le déplacement

$$10^{-3} \times 23.035329 = 0.023035329$$

Puis

$$\omega^{(1)} = 0 - 0.023035329$$

d'où

$$\boxed{\omega^{(1)} = -0.023035329}$$

Vérification de l'amélioration

Après cette mise à jour, on réévalue la fonction coût :

$$J(\omega^{(1)}) = 8.950083$$

Comme

$$8.950083 < 9.488581,$$

la fonction coût a diminué. La première étape de la descente de gradient améliore donc le recalage en rapprochant les deux formes.

Résumé de l'itération :

$$\omega^{(0)} = 0$$

$$\nabla J(\omega^{(0)}) = 23.035329$$

$$\Delta\omega = -\alpha \nabla J(\omega^{(0)}) = -0.023035329$$

$$\omega^{(1)} = -0.023035329$$

$$J(\omega^{(0)}) = 9.488581 \quad \rightarrow \quad J(\omega^{(1)}) = 8.950083$$




FIGURE 6.1 – Première et 50^{ième} étape du recalage sur les rotations $SO(2)$.

Exemple 6.2 (Recalons Lecocq).

Voyons des exemples de recalage par rotation sur $SO(2)$ avec des formes plus complexes.

Dans la **Figure (6.2)**, on applique une rotation à un coq x_S pour le faire “matcher” avec la forme cible x_T qui est sensiblement le même coq légèrement tourné. On voit que la figure source et cible se superposent assez bien. La géométrie du coq est préservée tout au long de la déformation, le cadre LDDMM restreint aux rotations est efficace lorsque la transformation est seulement une rotation.




FIGURE 6.2 – Recalage sur les rotations $SO(2)$ d'un coq.

La **Figure (6.3)** présentent deux cas où la forme cible x_T diffère de la forme source x_S non seulement par une rotation, mais aussi par une déformation (des coq légèrement différents séparés de x_S par une transformation non rigide). Dans ces situations, le modèle restreint à $SO(2)$ montre ses limites : en cherchant uniquement une rotation optimale, l'algorithme ne peut pas capturer les déformations non rigides. La forme transformée x_1 ne coïncide alors que partiellement et voire même pas du tout avec la cible x_T , et le terme d'attache aux données $\|x_1 - x_T\|$ reste élevé malgré la convergence de l'optimisation.




FIGURE 6.3 – Recalage sur les rotations $SO(2)$ de différents coqs.

6.2 Approche hamiltonienne - Tir géodésique

On reprend maintenant la formulation hamiltonienne établie au **Chapitre 4** dans le cas de N points repères, et on en déduit un algorithme de résolution par *tir géodésique* (*geodesic shooting*) [4], où la seule variable d'optimisation est le moment initial p_0 .

A faire ...

Conclusion

Ce stage a permis d'étudier un cas particulier du recalage de formes dans lequel les transformations sont restreintes aux rotations. Après avoir rappelé le cadre général LDDMM, nous avons décrit le groupe de Lie $SO(n)$, son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(n)$ et le rôle de l'application exponentielle pour les rotations finies.

A faire ...

Références

- [1] Mirza Faisal Beg, Michael Miller, Alain Trouvé, and Laurent Younes. *Computing Large Deformation Metric Mappings via Geodesic Flows of Diffeomorphisms*. International Journal of Computer Vision, 2005.
- [2] Darryl Holm. *Geometric mechanics - Part I : Dynamics and symmetry*. World Scientific, 2011.
- [3] Darryl D. Holm. 31 lectures on geometric mechanics, 2024.
- [4] Michael Miller, Alain Trouvé, and Laurent Younes. Geodesic shooting for computational anatomy. *Journal of mathematical imaging and vision*, 2006.
- [5] Rayane Mouhli and Thomas Pierron. *Decoupling actions of finite-dimensional Lie groups and of groups of diffeomorphisms in the large deformation framework*, 2025.
- [6] Thomas Pierron. Right-invariant sub-riemannian geometry in the banach setting and applications to large deformations models in shape analysis. *ESAIM : Proceedings and Surveys*, 2025.
- [7] Thomas Polzin. *Large deformation diffeomorphic metric mappings : Theory, numerics, and applications*. PhD thesis, Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck, 2018.
- [8] Emmanuel Trélat and Fanny Bastien. *Théorie du contrôle optimal et applications aux missions spatiales*, 2016.
- [9] Laurent Younes. *Shapes and diffeomorphisms*. Springer, 2010.
- [10] Irigo Edouard Zibo. *Contrôle optimal : méthodes géométriques et numériques et applications au modèle de Bloch, et intégrabilité des géodésiques sous-riemanniennes*. Theses, Normandie Université, 2021.

A Code Python

Tout le code sera disponible sur [ce dépôt](#) GitHub.

```
1 def Euler(q0, omega, nt):
2     dt = 1.0 / (nt - 1)
3     q = q0.clone()
4     A = skew_matrix(omega)
5
6     Q = torch.zeros((q0.shape[0], q0.shape[1], nt), dtype=q0.dtype,
7 device=q0.device)
8     Q[:, :, 0] = q
9
10    for t in range(1, nt):
11        q = q + dt * (q @ A.T)
12        Q[:, :, t] = q
13
14    return q, Q
```

Code A.1 – Fonction Euler

```
1 def rotation_loss(data_loss_fnc, nt):
2     def loss(q0, omega):
3         q_final, _ = Euler(q0, omega, nt)
4         dloss = data_loss_fnc(q_final)
5         reg = 0.5 * (omega ** 2)
6         return reg + dloss
7     return loss
```

Code A.2 – Fonction rotation_loss

```
1 def opti_rotation(q0, loss_fnc, n_iter, eta):
2     omega = torch.zeros(1, dtype=q0.dtype, device=q0.device,
3 requires_grad=True)
4     optimizer = torch.optim.LBFGS([omega], lr=eta, line_search_fn='
5 strong_wolfe')
6     losses = []
7
8     def closure():
9         optimizer.zero_grad()
10        L = loss_fnc(q0, omega)
11        L.backward()
12        return L
13
14    for i in range(n_iter):
15        L = optimizer.step(closure)
16        losses.append(L.item())
17
18    return omega.detach(), losses
```

Code A.3 – Fonction opti_rotation

B Figures supplémentaires

Quelques figures supplémentaires.




FIGURE B.1 – Complète l'exemple (1.2)




FIGURE B.2 – Complète l'exemple (1.2)




FIGURE B.3 – Complète l'exemple (6.1)




FIGURE B.4 – Complète l'exemple (6.2)




FIGURE B.5 – Complète l'exemple (6.2)




FIGURE B.6 – Complète l'exemple (6.2)




FIGURE B.7 – Complète l'exemple (6.2)




FIGURE B.8 – Complète l'exemple (6.2)




FIGURE B.9 – Complète l'exemple (6.2)