

# 분석적 사고

전종준  
서울시립대학교 통계학과

December 7, 2018

## Abstract

키워드: 선형대수, 미적분학, 회귀분석, 탐색적 자료분석

- 1 자료와 집합
- 2 벡터와 벡터공간
- 3 행렬과 데이터
- 4 선형변환과 이차형식
- 5 미분과 적분
- 6 벡터미분
- 7 확률과 기대값

## 8 경험을 통한 학습

### 8.1 자료의 중심찾기

일차원 자료  $X$ 의 중심을 찾는 문제를 생각해보자. 만약 분포  $F$ 를 (혹은 pdf  $f$ 를) 알고 있다면 다음과 같은 방법을 생각해볼 수 있을 것이다.

- $\mu \in \mathbb{R}$ : 예상하는 중심의 위치
- $(X - \mu)^2$ : 자료와 예상한 위치가 떨어진 크기
- $E(X - \mu)^2 = \int (x - \mu)^2 f(x) dx$ : 자료와 예상한 위치가 떨어진 크기의 평균(기대값)

우리는 아마도  $E(X - \mu)^2$ 를 가장 최소화 하는 값을 선택할 것이다.

위 내용과 관련된 용어는 다음과 같다.

- $\mu = \delta(x) \in \mathbb{R}$  의사결정 (Decision function)
- $l(\mu, x) = (x - \mu)^2$ : 손실함수 (loss function)
- $R(\mu) = E(l(\mu, X))$ : 위험함수 (Risk function)

위 예에 대한 답을 살펴보자. 위험함수는  $\mu$ 에 대한 함수이며 항상 양수 값을 가질 것이다. 이 함수를  $\mu$ 에 대해 미분하면

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \left( \int (x - \mu)^2 f(x) dx \right) = \int 2(\mu - x) f(x) dx$$

이고 미분값이 0 이되는  $\mu^*$ 를 찾으면

$$\mu^* = \int x f(x) dx$$

가 나온다.

실제 문제에서는 분포함수가 알려져 있지 않으므로 이  $\mu^*$ 는 이론적으로만 알 수 있는 값이다. 만약 어떤 분포  $F$  일차원 자료  $X_i$  for  $i = 1, \dots, n$  가 있을 때  $\mu$ 를 어떻게 알아낼 수 있을까? 유한한 자료하에서 진짜  $\mu$ 를 알아낼 수는 없겠지만, 다음과 같은 방법으로  $\mu$ 를 근사할 수 있을 것이다.

- $R(\mu)$  대신

$$\hat{R}(\mu) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

을 사용한다.

- $\hat{R}(\mu)$ 를 최소화 하는  $\hat{\mu}$ 를 사용한다. (계산을 통해 아래 결과가 나옴을 확인하여라)

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

여기서  $\hat{R}(\mu)$ 를 경험적 위험함수라고 부르고  $\hat{\mu}$ 를  $\mu^*$ 의 추정량이라고 부른다.

- $\hat{\mu}$ 는 정말로  $\mu^*$ 의 근사인가?

$$\hat{\mu} \rightarrow \mu^*$$

as  $n \rightarrow \infty$ .

## 8.2 회귀모형

- 조건부 기대값과 예: 어떤 입력 변수  $X = (X_1, \dots, X_p)^T$ 가 주어졌을 때, 반응변수  $Y$ 의 평균이  $X$ 에 의존하는 모형 (예를 들어보자). 특별히 선형모형에 대한 식을 나타내면 다음과 같다.

$$E(Y|X) = g(X)$$

(여기서  $Y \in \mathbb{R}$ ,  $X \in \mathbb{R}^p$  인 확률변수)

조건부 기대값을  $X \in \mathbb{R}$ 에 의존하는 어떤 함수로 볼 수 있다.

많은 경우 다음과  $(Y, X)$ 에 대한 생성모형을 다음과 같이 정의한다.

$$Y = g(X) + \epsilon,$$

where  $\epsilon \sim (0, \sigma^2)$ . (여기서 생성모형이란 데이터가 생성되는 구조를 기술하는 확률모형을 말한다.)

- 의사결정 함수:  $\delta : \mathbb{R}^p \mapsto \mathbb{R}$
- 손실함수  $l(y, z) = (y - z)^2$
- 위험함수  $R(\delta) = E(l(Y, \delta(X))) = E((Y - \delta(X))^2)$  (여기서  $\delta$ 가 함수임을 유의!)

어떤 함수( $\delta : \mathbb{R}^p \mapsto \mathbb{R}$ ) 이 위에서 정의한 위험함수를 최소화 할까?

$$\begin{aligned}
 E(Y - \delta(X))^2 &= E(Y - E(Y|X) + E(Y|X) - \delta(X))^2 \\
 &= (E(Y - E(Y|X))^2) + \underbrace{E(Y - E(Y|X)(E(Y|X) - \delta(X)))}_{=0} \\
 &\quad + \underbrace{E((E(Y|X) - \delta(X))^2)}_{\geq 0}
 \end{aligned}$$

$\delta(X) = E(Y|X)$ 로 주어질 때 위험함수는 최소화 된다. 만약  $g(X) = X^T \beta$ 라고 가정해보자.  
(p차원 parametrization)

- $\delta(X) = X^T \beta$
- $R(\beta) = E(Y - X^T \beta)^2$

경험적 위험함수의 최소값은 다음과 같이 주어진다.

$$\beta^* = E(XX^T)^{-1}E(XY).$$

### 조건부 평균의 추정

선형모형의 경우에 조건부 평균의 추정 문제를 다룬다.

$$EY|X = X^T \beta$$

경우에 따라서는  $Y$ 의 조건부 평균값의 범위를 제한해야 하는 경우도 있다. 다음 경우에 해당하는 예를 들어 보아라.

- $Y$ 가 0 혹은 1 의 값을 가지는 경우
- $Y$ 가 0이상의 양의 정수만을 갖는 경우

위와 같은 경우  $EY|X$ 의 범위가 제한됨을 쉽게 알 수 있다. 하지만,  $EY|X = X^T\beta$ 의 방식으로 모형화를 하면 좌변과 우변의 범위가 다르게 나타나, 자연스러운 모형에서 벗어난다고 생각할 수 있다. 따라서 다음과 같이 조건부 평균의 변환된 값을 이용하여 모형화를 하기도 한다.

- $0 < E(Y|x) < 1$  for all  $x$  이면,

$$g(E(Y|x)) = x^T\beta$$

where  $g(z) = \log(z/1-z)$  for  $z \in (0, 1)$ ,

- $E(Y|x) > 0$  for all  $x$  이면,

$$g(E(Y|x)) = x^T\beta,$$

where  $g(z) = \log(z)$  for  $z > 0$ .

사실 위의 경우 조건부 평균과 설명변수에 의한 모형의 범위를 맞춰주는 것 이상의 가정이 모형에 반영된다. 첫 번째의 경우 조건부 평균의 모형이 다음과 같이 쓰여지게 된다.

$$E(Y|x) = \frac{e^{x^T\beta}}{1 + e^{x^T\beta}}$$

두 번째 모형의 경우에는 다음과 같이 쓰여질 것이다.

$$E(Y|x) = e^{x^T\beta}$$

조건부 추정의 문제는 앞 서 살펴본 위험함수를 사용할 수 있다. (어떻게 하면 될까?)

- 위험함수 중에서는 제공으로 만들어진 함수 외에도 우도함수가 개발되어 있다. (수리 통계학에서 학습)

### 8.3 자료의 분위수 찾기

일차원 자료  $X$ 의 중심이 아니라 상위 25%, 혹은 하위 10%등 자료의 분위수에 관심이 있는 경우가 있다. 이 때 사용할 수 있는 모형에 대해서 알아보자. 여기서는 상위 25%에 대한 추정을 알아보도록 하자.

- $\mu^* \in \mathbb{R}$ : 예상하는  $\tau$ 의 위치 ( $\Pr(X \leq \mu^*) = \tau, \tau \in (0, 1)$ ) 라고 하자. 아래는 어떤  $\tau$ 가 주어졌을때,  $\mu^*$ 를 찾는 방법에 대한 설명이다.
- $\tau(X - \mu)_+ + (1 - \tau)(\mu - X)_+$ : 데이터와  $\mu$ 가 떨어진 크기를 제곱합수가 아닌 다음 함수로서 표현하자. ( $z_+ = \max(z, 0)$  )
- $E(\tau(X - \mu)_+ + (1 - \tau)(\mu - X)_+)$ 를 최소화 하는  $\mu$ 값은

$$\frac{\partial}{\partial \mu} (E(\tau(X - \mu)_+ + (1 - \tau)(\mu - X)_+)) = 0$$

를 만족하는  $\mu$ 를 찾으면 된다.

$$\frac{\partial}{\partial \mu} (E(\tau(X - \mu)_+ + (1 - \tau)(\mu - X)_+)) = -\tau \Pr(X - \mu > 0) + (1 - \tau) \Pr(X - \mu \leq 0)$$

이므로 정리하면

$$\tau = \Pr(x \leq \mu)$$

즉,

$$\min_{\mu} (E(\tau(X - \mu)_+ + (1 - \tau)(\mu - X)_+))$$

를 이용하면,  $\mu^*$ 를 찾을 수 있다. ( 조건부 평균과 조건부 분위수를 찾는 방법을 비교해보자.  
)