

7. razred - Sile zadatci s rješenjima

Duje Jerić- Miloš

28. veljače 2024.

Prisjetimo se formula koje ćemo koristiti u nastavku:

1. Izraz za elastičnu silu (Hookeov zakon): $F_{el} = k\Delta l$
2. Izraz za silu težu/težinu: $F_g = mg$
3. Izraz za silu trenja na vodoravnoj podlozi: $F_{tr} = \mu F_g$
4. Izraz za polugu u ravnoteži: $F_1 k_1 = F_2 k_2$
5. Izraz za tlak: $P = \frac{F}{A}$

Zadatak 1. Oprugu konstante 200N/m rastežemo silom od 15N. Koliko će se ta opruga produljiti?

Rješenje. Imamo silu koja rasteže oprugu. Kada držimo oprugu rastegnutu (tako da miruje), to je ujedno i elastična sila koja vraća oprugu u prvobitni oblik. Kako za elastične deformacije vrijedi $F_{el} = k\Delta l$, tako $\Delta l = \frac{F_{el}}{k}$. Dakle:

$$\Delta l = \frac{F_{el}}{k} = \frac{15\text{N}}{200\text{N/m}} = \frac{3}{40}\text{m}$$

□

Zadatak 2. Na oprugu konstante 150N/m smo stavili teret od 5kg. Koliko se opruga rastegnula (rješenje iskaži u cm!).

Rješenje. Kao i u prošlom zadatku možemo zaključiti da je sila koja rasteže oprugu jednaka elastičnoj sili koja oprugu vraća u prvobitni oblik. U ovom

slučaju ta sila je težina obješenog tereta. Kako tijelo ima masu 5kg , težina mu je 50N pa imamo:

$$\Delta l = \frac{F_{el}}{k} = \frac{G}{k} = \frac{50\text{N}}{150\text{N/m}} = \frac{1}{3}\text{m} = 0.33\text{m} = 33\text{cm}$$

□

Zadatak 3. Odlučili ste izmjeriti konstantu opruge. Objesili ste o oprugu uteg od 10kg te se pritom opruga rastegnula za 20cm . kolika je konstanta opruge (rješenje smiješ iskazati u N/cm ili N/m)?

Rješenje. Objesili smo teret od 10kg , što znači da taj teret rasteže oprugu silom od 100N (= težina tijela). Kao i u prethodna dva zadatka zaključujemo da je to elastična sila koja vraća oprugu u prvobitni oblik. Opruga se rastegnula za 20cm ($=0.2\text{m}$), a $F_{el} = k\Delta l$, stoga je konstanta elastičnosti:

$$k = \frac{F_{el}}{\Delta l} = \frac{100\text{N}}{20\text{cm}} = 5\text{N/cm}$$

Ovo nam kaže da je opruga takva da treba primijeniti silu od 5N ne bi li se ona rastegnula za 1cm . Želimo li rezultat iskazati u N/m , dobit ćemo:

$$k = \frac{F_{el}}{\Delta l} = \frac{100\text{N}}{0.2\text{cm}} = 500\text{N/cm}$$

Ovo nam kaže da je opruga takva da treba primijeniti silu od 500N ne bi li se opruga rastegnula za 1m .

Pritom valja imati na umu da je ovo sve pod pretpostavkom da je produljenje elastično. Naime, možda je produljenje od 1m preveliko za našu oprugu, odnosno da možda izlazi iz njenog elastičnog režima (pa se opruga neće vratiti u prvobitni oblik i zapravo nije opisana Hookeovim zakonom).

□

Zadatak 4. Imate vagu koja je baždarena (kalibrirana) za mjerenje težine na Zemlji. Dakle, ako vagu pritišćete silom od 500N , ona će pokazati 50kg . Tu vagu je astronaut mase 80kg ponio na Mjesec te se tamo izvagao. Koliku "masu" pokazuje vaga ako je na mjesecu $g = 1.6\frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

Rješenje. Moramo izračunati težinu astronauta na Mjesecu jer je to sila kojom će astronaut pritiskati vagu. Težina je

$$F_g = m \cdot g = 80\text{kg} \cdot 1.6\frac{\text{N}}{\text{kg}} = 128\text{N}.$$

Kako vagu pritišćemo silom od otprilike 130N, ona će pokazati 13kg (deset puta manji broj jer ne baždarena za Zemlju, a ne Mjesec). \square

Zadatak 5. Vučete teret mase 80kg po ledu. Ako znate da je faktor trenja između podloge i vašeg (drvenog) tereta 0.05, kolika je sila trenja koja se odupire gibanju? Kolikom silom morate povući teret da bi se on jednoliko gibao?

Rješenje. Masa tereta je 80kg, što znači da mu je težina $G = 800\text{N}$. Sila trenja je dana izrazom:

$$F_{tr} = \mu G = 0.05 \cdot 800\text{N} = 40\text{N}.$$

To je sila kojom se teret odupire gibanju kada ga povlačimo po ledu. To je ujedno i sila kojom moramo vući teret da bi se on gibao jednoliko (sjeti se Newtonovog 1. zakona, kada je suma sila na tijelo 0 onda se tijelo giba jednoliko). Ako ga vučemo manjom silom, teret će usporavati i u konačnici se zaustaviti. Ako ga vučemo većom silom teret će ubrzavati. \square

Zadatak 6. Konj vuče teret mase 200kg jednoliko (bez da teret ubrzava) po podlozi. Zainteresirani za faktor trenja, dinamometrom ste izmjerili da konj vuče teret silom od 2000N. Koliki je faktor trenja?

Rješenje. Konj vuče teret silom od 2000N, što mora biti jednako sili trenja. Naime, kako teret ne ubrzava, sila kojom konj vuče teret točno je jednaka sili trenja kojom se teret odupire gibanju (koliko teret zapinje toliko ga konj jako vuče - inače bi teret usporavao ili ubrzavao). S druge strane, poznajemo masu tereta 200kg, što daje težinu $G = 2000\text{N}$. Sada iz $F_{tr} = \mu \cdot G$ slijedi $\mu = \frac{F_{tr}}{G}$ pa imamo:

$$\mu = \frac{F_{tr}}{G} = \frac{2000\text{N}}{2000\text{N}} = 1$$

\square

Zadatak 7. Imate polugu od 1m. Polugu ste postavili tako da je oslonac udaljen od kraja poluge (i vaše ruke) za 80cm. Kojom najmanjom silom morate gurnuti polugu da biste dignuli teret od 60kg? Pretpostavite da je teret obješen na drugi kraj opruge.

Rješenje. Poluga je s osloncem podijeljena na dva dijela duljina 20cm i 80cm. Teret je obješen o kraj udaljen 20cm od oslonca, a mi guramo drugi kraj

poluge nekom silom F_2 . Dakle, krak sile za težinu tereta je $k_1 = 20\text{cm} = 0.2\text{m}$, a krak sile za našu silu je $k_2 = 80\text{cm} = 0.8\text{m}$. Teret je težine $F_1 = mg = 60\text{kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 600\text{N}$. Da bi poluga bila u ravnoteži treba vrijediti:

$$F_1 \cdot k_1 = F_2 \cdot k_2$$

Drugim riječima:

$$600\text{N} \cdot 0.2\text{m} = F_2 \cdot 0.8\text{m}$$

Zaključujemo da je

$$\frac{600\text{N} \cdot 0.2\text{m}}{0.8\text{m}} = F_2.$$

Odnosno:

$$F_2 = 150\text{N}.$$

Ovo je sila kojom moramo djelovati da bi poluga bila u ravnoteži. Ako djelujemo većom silom teret ćemo podignuti, a ako djelujemo manjom silom teret će spustiti polugu na svoju stranu. \square

Zadatak 8. Na igralištu se nalazi klackalica čiji oslonac (mjesto oko kojeg se klackalica okreće) nije na središtu klackalice. Jedno sjedalo se nalazi 2 metra udaljeno od oslonca, a drugo sjedalo 3 metra. Ana ima 40kg, a Bruno 50kg. Ako Ana sjedne na udaljeniji kraj (3m) od oslonca. Koliki teret Bruno mora staviti na sebe da, jednom kada on sjedne na drugi kraj, klackalica bude u ravnoteži.

Rješenje. Izraz za polugu u ravnoteži je

$$F_1 k_1 = F_2 k_2$$

U našem slučaju su F_1 i F_2 težine kojima Ana i Bruno pritišću svaki svoj kraj klackalice (s tim da bi Bruno trebao još na sebe staviti utege tako da mu je masa veća od 50kg). Dakle, $F_1 = m_A \cdot g = 40\text{kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 400\text{N}$. Stoga, izraz za ravnotežu postane:

$$400\text{N} \cdot 3\text{m} = F_2 \cdot 2\text{m}$$

$$1200\text{Nm} = 2\text{m}F_2$$

Zaključujemo da je $F_2 = 600\text{N}$ (dva F_2 iznose 1200 pa jedan iznosi 600). Ako niste uvjereni, matematički bismo podijelili obje strane s 2m , što daje:

$$\frac{1200\text{Nm}}{2\text{m}} = F_2$$

$$600\text{N} = F_2$$

Ovo nam govori da Bruno mora težiti 600N (odnosno mora imati 60kg) ne bi li klackalica bila u ravnoteži. Kako Bruno ima 50kg , treba na sebe staviti uteg od 10kg . \square

Zadatak 9. Pod Dorom na tlu je smrtonosna zamka koja će se aktivirati ako je na nekom mjestu pritišće tlak veći od 25000Pa . Ako Dora ima 40kg , a površina (jednog) stopala joj je 100cm^2 , je li ovo posljednji put da Dora istražuje? Obrazloži odgovor.

Rješenje. Trebamo izračunati tlak kojim Dora pritišće tlo. Izrazimo rezultat u Pa. Dakle, treba površinu stopala preračunati u m^2 . Kako je $1\text{cm} = \frac{1}{100}\text{m}$, imamo:

$$100\text{cm}^2 = 100 \cdot \text{cm} \cdot \text{cm} = 100 \cdot \frac{1}{100}\text{m} \cdot \frac{1}{100}\text{m} = \frac{1}{100}\text{m}^2 = 0.01\text{m}^2$$

Dora stoji s obje noge na tlu pa je ukupna površina $2 \cdot 0.01\text{m}^2 = 0.02\text{m}^2$. Dorina težina je $F = mg = 400\text{N}$ pa je tlak

$$P = \frac{F}{A} = \frac{400\text{N}}{0.02\text{m}^2} = 20000\text{Pa}$$

Kako je tlak kojim Dora pritišće tlo manji od tlaka za koji će se zamka aktivirati, Dora će ipak preživjeti (sve dok ne učini jedan korak MWAHA-HAHAHA). \square