



Estatística Inferencial
Verossimilhança e estimação pontual

Componentes dos modelos probabilísticos

1. Para cada uma das distribuições de probabilidade abaixo escreva a função de probabilidade ou densidade probabilidade, identifique o suporte, a esperança, a variância, os parâmetros e o espaço paramétrico.
 - a) Distribuição Poisson de parâmetro λ .
 - b) Distribuição binomial de parâmetros n e p .
 - c) Distribuição exponencial de parâmetro λ .
 - d) Distribuição normal de parâmetros μ e σ^2 .
 - e) Distribuição gama de parâmetros α e β .
 - f) Distribuição uniforme de parâmetros a e b .
 - g) Distribuição binomial negativa de parâmetros μ e ϕ .
 - h) Distribuição log-normal de parâmetros μ e σ^2 .
 - i) Distribuição inversa Gaussiana de parâmetros μ e σ^2 .
 - j) Distribuição Tweedie de parâmetros μ , ϕ e p .

Especificação de modelos

2. Para cada uma das situações abaixo proponha uma distribuição de probabilidade adequada e justifique sua escolha baseado em aspectos do fenômeno aleatório e características da distribuição. Descreva quais aspectos da inferência estatística podem estar associados com cada uma das situações mencionadas.
 - a) Itens em uma linha de produção são classificados quanto a sua adequação aos padrões de produção. Apenas as condições conforme ou não-conforme são possíveis.
 - b) Uma pesquisa de mercado visa identificar o potencial de um novo negócio em uma cidade. Para isto um questionário com perguntas em uma escala likert de cinco níveis foi construído e aplicado a uma amostra de tamanho n da população de interesse.
 - c) Número de carros que chegam a um caixa automático de um banco durante um período de uma hora nas manhãs de fins de semana.
 - d) Ocorrência de defeitos relevantes em uma rodovia um mês após sua construção.
 - e) Medidas antropométricas (peso e altura) são tomadas em crianças do nono ano de escolas públicas brasileiras. Deseja-se caracterizar tais medidas para auxiliar na construção de equipamentos escolares de tamanho adequado.
 - f) Deseja-se estudar a distribuição do número de horas que um equipamento eletrônico funciona antes de apresentar defeitos com o objetivo de estabelecer um prazo razoável de garantia.
 - g) Número de quilômetros rodados que um novo pneu é capaz de rodar antes de apresentar defeitos.

Propriedades de estimadores

3. Seja $Y_i \sim B(n, p)$ para $i = 1, \dots, n$ iid. Considere o estimador $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ para p .
 - a) Mostre que \hat{p} é não-viciado para p .
 - b) Encontre a variância de \hat{p} .
 - c) Encontre o erro quadrático médio de \hat{p} .

Verossimilhança e estimação pontual

- d) Mostre que \hat{p} é médio quadrático consistente.
 - e) Mostre que \hat{p} é consistente em probabilidade.
4. Seja $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ para $i = 1, \dots, n$ iid. Considere o estimador $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ para μ .
- a) Mostre que $\hat{\mu}$ é não-viciado para μ .
 - b) Encontre a variância de $\hat{\mu}$.
 - c) Encontre o erro quadrático médio de $\hat{\mu}$.
 - d) Mostre que $\hat{\mu}$ é médio quadrático consistente.
 - e) Mostre que $\hat{\mu}$ é consistente em probabilidade.
5. Seja $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ para $i = 1, \dots, n$ iid. Considere o estimador $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu)^2$ para μ . Note que μ é fixo e assumido como conhecido.
- a) $\hat{\sigma}^2$ é viciado para σ^2 ?
 - b) Encontre a variância de $\hat{\sigma}^2$.
 - c) Encontre o erro quadrático médio de $\hat{\sigma}^2$.
 - d) Mostre que $\hat{\sigma}^2$ é médio quadrático consistente.
 - e) Mostre que $\hat{\sigma}^2$ é consistente em probabilidade.
6. Seja $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ para $i = 1, \dots, n$ iid. Considere o estimador $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\mu})^2$ para σ^2 .
- a) Mostre que $\hat{\sigma}^2$ é não-viciado para σ^2 .
 - b) Encontre a variância de $\hat{\sigma}^2$.
 - c) Encontre o erro quadrático médio de $\hat{\sigma}^2$.
 - d) Mostre que $\hat{\sigma}^2$ é médio quadrático consistente.
 - e) Mostre que $\hat{\sigma}^2$ é consistente em probabilidade.
7. Sejam $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, para $i = 1, \dots, n$.
- a) Mostre que o estimador $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ é não viciado para μ .
 - b) Mostre que o estimador $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\mu})^2$ é viciado para σ^2 e determine o seu viés.
 - c) Mostre que o estimador $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\mu})^2$ é não viciado para σ^2 .
 - d) Compare os estimadores para σ^2 em b) e c) em termos assintóticos. O que você pode concluir?
8. Mostre que a média das duas primeiras observações de um conjunto de n observações independentes é não-viciado mas não é consistente, para estimar a média populacional.
9. Determine a condição dos coeficientes a_i , de tal forma que a combinação linear $\sum a_i Y_i$ seja não viciada para $E(Y)$.
10. Mostre que se T é uma estimativa não viciada para θ , então $aT + b$ é uma estimativa não-viciada de $a\theta + b$. E T^2 é uma estimativa não-viciada para θ^2 ? Justifique.
11. Seja Y o número de sucessos em n ensaios Bernoulli com parâmetro p . Determine o erro quadrático médio na estimação de p por cada um dos estimadores $T_1 = Y/n$ e $T_2 = (Y + 1)/(n + 2)$. Um estimador é melhor do que outro?

Verossimilhança e estimação pontual

12. Para cada uma das distribuições de probabilidade abaixo escreva a função de verossimilhança e log-verossimilhança.
- a) Distribuição Poisson de parâmetro λ .
 - b) Distribuição binomial de parâmetros n e p .
 - c) Distribuição exponencial de parâmetro λ .
 - d) Distribuição normal de parâmetros μ e σ^2 .
 - e) Distribuição gama de parâmetros α e β .
 - f) Distribuição uniforme de parâmetros a e b .
 - g) Distribuição binomial negativa de parâmetros μ e ϕ .
 - h) Distribuição log-normal de parâmetros μ e σ^2 .

- i) Distribuição inversa Gaussiana de parâmetros μ e σ^2 .
 - j) Distribuição Tweedie de parâmetros μ , ϕ e p .
13. Para cada uma das situações abaixo encontre o estimador de máxima verossimilhança.
- a) Distribuição Poisson de parâmetro λ .
 - b) Distribuição binomial de parâmetros n (conhecido) e p .
 - c) Distribuição exponencial de parâmetro λ .
 - d) Distribuição normal de parâmetros μ e σ^2 (conhecido).
 - e) Distribuição normal de parâmetros μ (conhecido) e σ^2 .
 - f) Distribuição gama de parâmetros α (conhecido) e β .
 - g) Distribuição gama de parâmetros α e β (conhecido).
 - h) Distribuição gama de parâmetros α e β (conhecido).
 - i) Distribuição binomial negativa de parâmetros μ e ϕ (conhecido).
 - j) Distribuição log-normal de parâmetros μ e σ^2 .

No caso de distribuição com mais de um parâmetro espere até a semana 9