

Les graphes : structure de données


Chapitre 15,1

Table des matières

1 Un peu d'histoire : Les Ponts de Königsberg	1
Comment Euler a-t-il résolu le problème en 1735 ?	2
2 Graphes	2
3 Graphes non orientés	2
3.1 Définitions	2
3.2 Vocabulaire	3
3.3 Qu'est-ce qu'un arbre ?	4
3.4 Matrice sommet-sommet pour un graphe non orienté : matrice d'adjacence	5
3.5 Liste d'adjacence	5
3.6 Exercices	6
4 Graphes orientés	7
4.1 Définitions	7
4.2 Vocabulaire	8
4.3 Qu'est-ce qu'une arborescence ?	9

1 Un peu d'histoire : Les Ponts de Königsberg

La ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad en Russie) est construite autour de deux îles situées sur le Pregel et reliées entre elles par un pont. Six autres ponts relient les rives de la rivière à l'une ou l'autre des deux îles.




- 1) Existe-t-il une promenade dans les rues de Königsberg permettant, à partir d'un point de départ au choix, de *passer une et une seule fois par chaque pont*, et de *revenir à son point de départ*, étant entendu qu'on ne peut traverser le Pregel qu'en passant sur les ponts ?

- Non. Si une telle promenade existait, chaque quartier devrait être relié à un nombre pair de ponts : un premier pour arriver dans le quartier, un second pour quitter le quartier.
- 2) Existe-t-il une promenade dans les rues de Königsberg permettant, à partir d'un point de départ au choix, de *passer une et une seule fois par chaque pont* ?
- Non. Si une telle promenade existait, les quartiers, à l'exception des quartiers de départ et d'arrivée, devraient être reliés à un nombre pair de ponts : un premier pour arriver dans le quartier, un second pour quitter le quartier.

Comment Euler a-t-il résolu le problème en 1735 ?

Il a représenté les quartiers par des nœuds et les ponts par des arêtes et cherché si un parcours passant par toutes les arêtes une et une seule fois existait.



2 Graphes

Un **graphe** est un objet abstrait composé d'**éléments** — les *sommets* — et de **relations entre ces éléments** — les *arêtes* (graphes non orientés) ou les *arcs* (graphes orientés).

Un graphe permet de représenter des liens d'amitié entre des personnes, des lignes aériennes entre des villes, des câbles entre des ordinateurs, des références entre des pages web, etc. Ce concept est utilisé dans l'industrie (informatique, recherche opérationnelle, etc) mais dans la recherche (étude de réseaux sociaux, biologie, mathématiques, etc.)

Un graphe peut être :


- **orienté** ou **non orienté** ;
- **pondéré** ou **non pondéré**.

3 Graphes non orientés

3.1 Définitions

Définition. (Graphe non orienté) Un graphe non orienté G est défini par un couple $G=(V, E)$, où V est un **ensemble de sommets** et E un **ensemble d'arêtes**.


Exemple 1.



3) Pour le graphe de l'exemple 1, donner l'ensemble V des nœuds, puis l'ensemble E des arêtes.

► Ensemble des nœuds : $V = \{1, 2, 3, 4\}$; ensemble des arêtes : $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{2, 4\}\}$.


4) Soit le graphe $G = (V, E)$ tel que $V = \{a, b, c, d, e\}$ et $E = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{a, c\}\}$. Représenter G .



Définition. Soit $G = (V, E)$ un graphe non orienté.

- Une **boucle** est une arête $\{u, u\}$ avec $u \in V$;
- Une arête $e = \{u, v\}$ est **multiple** s'il existe au moins deux arêtes $\{u, v\}$ dans E .

Exemple 2.



Définition. Un graphe non orienté **simple** G est un graphe sans boucle ni arête multiple.


Dans ce cours, on suppose a priori que tous les graphes non orientés sont simples.

3.2 Vocabulaire

Définition. Tous les **sommets voisins** v_i d'un sommet u , c'est à dire liés à u par la formation d'une arête, $\{u, v_i\}$ constituent l'ensemble des **sommets adjacents** à u .

On appelle **degré** d'un sommet le nombre de sommets adjacents à ce sommet.


5) Pour le graphe de l'exemple 1,



indiquer l'ensemble des sommets adjacents au sommet 4 ainsi que son degré.
Même question pour le sommet 1.
Même question pour le sommet 2.

- Pour le sommet 4 : l'ensemble des sommets adjacents est $\{2, 3\}$, le degré du sommet 4 est donc 2.
Pour le sommet 1 : l'ensemble des sommets adjacents est $\{2\}$, le degré du sommet 1 est donc 1.
Pour le sommet 2 : l'ensemble des sommets adjacents est $\{1, 3, 4\}$, le degré du sommet 2 est donc 3.

6) Pour le graphe




indiquer l'ensemble des sommets adjacents au sommet c et son degré.

- Ensemble des sommets adjacents : $\{a, d, e\}$, degré de c : 3.

Théorème. Pour tout graphe $G=(V, E)$ non orienté la somme des degrés de tous les sommets est égale à deux fois le nombre d'arêtes.

Définition. (Chaîne) Une chaîne (walk) est une séquence de sommets et d'arêtes $v=v_1 e_1 v_2 e_2 \dots v_n e_n v_{n+1}$ avec $v_i \in V$ pour $i \in \{1, \dots, n+1\}$ et $e_i = \{v_i, v_{i+1}\} \in E$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$.

7) Pour le graphe de l'exemple 1,



donner trois chaînes différentes.

- $v_1 = 1, 2, 3$ ou $v_2 = 2, 3, 4$ ou $v_3 = 1, 2, 3, 4$ ou $v_4 = 1, 2, 3, 4, 2, 1$ ou $v_5 = 2, 4, 3, 2$.

Définition. (Chaîne élémentaire) Une *chaîne élémentaire* (path) est une chaîne qui ne passe pas deux fois par le même sommet

Définition. (Cycle) Un *cycle* est une chaîne fermée (i.e. telle que $v_{n+1} = v_1$).


8) Le graphe de l'exemple 1 contient un cycle. Indiquer ce cycle.

► $v = 2, 3, 4, 2$


Proposition. Si $G = (V, E)$ est un graphe sans cycle élémentaire, alors $m \leq n - 1$ avec m le nombre d'arêtes et n le nombre de sommets.

Définition. (Graphe connexe) Un graphe non orienté connexe est tel que, pour tout couple $(u, v) \in V^2$, il existe une chaîne élémentaire entre u et v .

9) Les deux graphes suivants sont-ils connexes ?



a)




b)

► a) oui et b) non

3.3 Qu'est-ce qu'un arbre ?

Définition. Soit $T = (V, E)$ un graphe non orienté. T est un **arbre** si T est **connexe sans cycle élémentaire**.

Exemple 3.




Proposition. Un arbre T est un graphe $T = (V, E)$ connexe pour lequel $m = n - 1$ avec m le nombre d'arêtes et n le nombre de sommets. La réciproque est vraie.

3.4 Matrice sommet-sommet pour un graphe non orienté : matrice d'adjacence

Définition. Une matrice est un tableau de nombres à deux dimensions qui indique la relation qui existe entre deux vecteurs.

Exemple 4. On considère le graphe non orienté suivant :



10) Compléter le tableau à deux dimensions suivant :

	a	b	c	d
a				
b				
c				
d				

- Indiquer par un 1 si les sommets sont adjacents, par un 0 s'ils ne le sont pas ;
- Un sommet n'est adjacent avec lui-même que s'il existe une boucle.

►

	a	b	c	d
a	0	1	0	1
b	1	0	1	1
c	0	1	0	1
d	1	1	1	0

11) Écrire la matrice sommet-sommet ou matrice d'adjacence de ce graphe.

►

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Théorème. La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique par rapport à la diagonale.

3.5 Listes d'adjacence

Définition. La liste d'adjacence d'un graphe $G=(V, E)$ non orienté est la liste des sommets adjacents à chaque sommet.

12) Donner la liste d'adjacence du graphe de l'exemple 4.

► $L[0] = [b, d]$; $L[1] = [a, c, d]$; $L[2] = [b, d]$; $L[3] = [a, b, c]$


3.6 Exercices

Exercice 1. Dans cet exercice, on considère le graphe non orienté $G_0 = (V_0, E_0)$, avec $V_0 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $E_0 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{4, 5\}, \{5, 6\}\}$. On pose n_0 le nombre de sommets et m_0 le nombre d'arêtes.

1. Représenter le graphe G_0 .
2. Donner les valeurs de n_0 et m_0 .
3. Quels sont les sommets adjacents au sommet 3 ?
4. Quelles sont les arêtes incidentes au sommet 3 ?
5. Quel est le degré de chacun des sommets de G_0 ?
Vérifier la validité du théorème qui dit que pour un graphe non orienté la somme des degrés de tous les sommets est égale à deux fois le nombre de sommets.
6. Donner une chaîne élémentaire de G_0 et un cycle élémentaire de G_0 . Préciser dans chaque cas leurs longueurs respectives (en nombre d'arêtes).
7. Le graphe G_0 est-il connexe ? Justifier la réponse.

Solution.

1.



2. $n_0 = 6$ et $m_0 = 5$.
3. Les sommets adjacents au sommet 3 sont les sommets 1 et 2.
4. Les arêtes incidentes au sommet 3 sont les arêtes $\{2, 3\}$ et $\{1, 3\}$.


Remarque. On peut aussi écrire $\{3, 2\}$ et/ou $\{3, 1\}$ puisqu'il s'agit d'arêtes.

5. $d(1) = 2$, $d(2) = 2$, $d(3) = 2$, $d(4) = 1$, $d(5) = 2$ et $d(6) = 1$.
 $\sum_{v \in V_0} d(v) = 10$ et $2m_0 = 10$.
6. Exemple de chaîne : $(1, 2, 3)$ de longueur 2. Autre chaîne possible : $()$ de longueur 0. Dernier exemple de chaîne (il en existe d'autres) : $(6, 5)$ de longueur 1.
Exemple de cycle élémentaire : $(1, 2, 3, 1)$ de longueur 3.

Remarque. $(1, 2, 3, 1, 2, 3, 1)$ est un cycle mais pas un cycle élémentaire.

7. Un graphe est connexe pour tout couple $(u, v) \in V_0$, il existe une chaîne élémentaire entre u et v . Ici, il n'existe par exemple aucune chaîne entre les sommets 1 et 4 ; le graphe n'est donc pas connexe.

Exercice 2. Est-ce que les graphes non orientés suivants sont des arbres ? Justifiez vos réponses. Dans la négative, quelle(s) arête(s) doit on enlever/rajouter pour obtenir un arbre ?



Solution.


- a) Le graphe est connexe et sans cycle élémentaire, c'est donc un arbre.
- b) Le graphe est connexe mais possède un cycle élémentaire, ce n'est donc pas un arbre. Il suffit de retirer l'une des arêtes du cycle pour transformer le graphe en un arbre.
- c) Le graphe n'est pas connexe, ce n'est donc pas un arbre. Il faut ajouter une arête entre l'un des sommets de l'ensemble $\{1, 2, 4\}$ et l'un des sommets de l'ensemble $\{3, 5, 6\}$ pour transformer le graphe en arbre (puisque le nouveau graphe créé serait alors connexe et sans cycle).

Exercice 3. Donnez tous les arbres différents à 1, 2, 3, 4 ou 5 sommets.

Solution.

- Pour un nombre de sommets $n \in \{1, 2, 3\}$, le seul arbre possible de n sommets est la chaîne élémentaire contenant ces n sommets. Il y a alors $n - 1$ arêtes.

–



Exercice 4.

1. Soit le graphe $G_1 = (V_1, E_1)$ tel que $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E_1 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}, \{1, 3\}\}$.

a. Représenter G_1 .

b. Donner la matrice d'adjacence de G_1 .

c. Donner la liste d'adjacence de G_1 .

2. Mêmes questions pour le graphe défini par la matrice d'adjacence

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Mêmes questions pour le graphe défini par la liste d'adjacence


$$L_3 = \begin{cases} 1 \rightarrow [2] \\ 2 \rightarrow [1, 3] \\ 3 \rightarrow [2, 4, 5] \\ 4 \rightarrow [3] \\ 5 \rightarrow [3] \end{cases}$$

4. Mêmes questions pour le graphe défini par la matrice d'adjacence

$$M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution.

1.




b. $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

c. $L_1 = \begin{cases} 1 \rightarrow [2, 3, 4] \\ 2 \rightarrow [1, 3] \\ 3 \rightarrow [1, 2, 4] \\ 4 \rightarrow [1, 3] \end{cases}$

2.


a. $G_2 = (V_2, E_2)$ avec $V_2 = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E_2 = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{3, 4\}\}$



c. $L_2 = \begin{cases} 1 \rightarrow [2, 3, 4] \\ 2 \rightarrow [1] \\ 3 \rightarrow [1, 4] \\ 4 \rightarrow [1, 3] \end{cases}$

3.


a. $G_3 = (V_3, E_3)$ avec $V_3 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $E_3 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}\}$



c. $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

4.

a. $G_4 = \{V_4, E_4\}$ avec $V_4 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $E_4 = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$



$$\text{c. } L_4 = \begin{cases} 1 \rightarrow [2, 3, 4] \\ 2 \rightarrow [1, 3] \\ 3 \rightarrow [1, 2, 5] \\ 4 \rightarrow [1, 5] \\ 5 \rightarrow [3, 4] \end{cases}$$

Exercice 5. Que doit vérifier une matrice carrée M pour être la matrice sommet-sommet d'un graphe non orienté ?


Solution.

- M est à valeur dans $\{0, 1\}$.
- M est symétrique par rapport à sa première diagonale car toute arête est représentée deux fois ($M[i, j] = M[j, i]$ pour tout couple $(i, j) \in V^2$).
- Comme il n'y a pas de boucle, la première diagonale n'est formée que de 0.

4 Graphes orientés

4.1 Définitions

Définition. Un graphe orienté G est défini par un couple $G = (V, A)$, où V est un *ensemble de sommets* et A un *ensemble d'arcs*.



$G = (V, A)$ avec $V = \{1, 2, 3, 4\}$
et $A = \{(2, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2)\}$

Avertissement. Pour un graphe non orienté, on parle d'arêtes $\{u, v\}$, pour un graphe orienté on parle d'arcs (u, v) .

$$\{u, v\} = \{v, u\} \text{ (évident) mais } (u, v) \neq (v, u)$$

Définition. Un graphe orienté est connexe si le graphe non orienté obtenue en remplaçant chaque arc par une arête est connexe.

13) Le graphe G ci-dessus est-il connexe ?

- Le graphe non orienté obtenu en remplaçant chaque arc par une arête dans G est connexe. G est donc connexe.

4.2 Vocabulaire

Définition. (Successeurs) Pour tout sommet $u \in V$, l'ensemble des sommets $\{v \in V, (u, v) \in A\}$ tels qu'il existe un arc (u, v) constitue l'ensemble des successeurs de u .

- 14) Pour le graphe G ci-dessus, donner l'ensemble des successeurs du sommet 4 puis l'ensemble des successeurs du sommet 1.

► 4: $\{1, 2\}$ et 1: $\{\}$

Définition. (Prédécesseurs) Pour tout sommet $u \in V$, l'ensemble des sommets $\{v \in V, (v, u) \in A\}$ tels qu'il existe un arc (v, u) constitue l'ensemble des prédécesseurs de u .

- 15) Pour le graphe G ci-dessus, donner l'ensemble des prédécesseurs du sommet 4 puis l'ensemble des prédécesseurs du sommet 1.

► 4: $\{3\}$ et 1: $\{4\}$

Avertissement. Pour un graphe non orienté on parle de **sommets adjacents**, pour un graphe orienté on distingue les **sommets successeurs et prédécesseurs**.

Définition. (Chemin) Un chemin est une séquence de sommets et d'arcs $\nu = v_1 e_1 v_2 e_2 \dots v_n e_n v_{n+1}$ avec $v_i \in V$ et $e_i = (v_i, v_{i+1}) \in A$.

Avertissement. Pour un graphe non orienté on parle de **chaîne**, pour un graphe orienté on parle de **chemin**.

- 16) Pour le graphe G ci-dessus, donner trois chemins différents.

► Par exemple : $(2, 3)$, $(2, 3, 4, 2)$ et $(2, 3, 4, 1)$.

Définition. (Chemin élémentaire) Un chemin est dit élémentaire s'il ne passe pas deux fois par le même sommet.

- 17) Pour le graphe G ci-dessus, donner un chemin qui n'est pas élémentaire.

► Par exemple, $(4, 2, 3, 4, 1)$.

Définition. (Circuit) Un circuit est un chemin élémentaire ν tel que $v_{n+1} = v_1$.
Un circuit élémentaire est un chemin élémentaire tel que $v_{n+1} = v_1$.

Avertissement. Pour un graphe non orienté on parle de **cycle**, pour un graphe orienté on parle de **circuit**.

- 18) Pour le graphe G ci-dessus, donner un circuit. Ce circuit est-il élémentaire ?



► Par exemple, $(2, 3, 4, 2)$. Ce circuit est élémentaire.

4.3 Qu'est-ce qu'une arborescence ?

Définition. (Arborescence) Une arborescence est un graphe orienté $G_r=(V, A)$ construit à partir d'un arbre $T=(V, E)$ et d'un sommet $r \in V$.


1. G_r et T ont les mêmes sommets ;
2. Les arcs de G_r correspondent aux arêtes de T orientés du sommet r vers les feuilles.

r est la racine de G_r . Il s'agit de l'unique sommet de G_r sans prédécesseur.



4.4 Matrice sommet-sommet pour un graphe orienté

19) Soit le graphe orienté G tel que



Donner la matrice sommet-sommet R pour ce graphe.

Les règles de construction sont les suivantes :

- Les seules valeurs possibles dans cette matrice appartiennent à l'ensemble $\{0, 1\}$, donc

$$R[i, j] \in \{0, 1\}$$

- La valeur 1 est utilisée si le second sommet est successeur du premier sommet, donc


$$R[i, j] = 1 \text{ si/si } (i, j) \in A$$

►

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.5 Listes de successeurs

20) Soit le graphe orienté G tel que




Pour $i \in V$, $L[i]$ est la liste des sommets successeurs de i . Donner la liste L .

►

$$L = \begin{cases} 1 \rightarrow [] \\ 2 \rightarrow [3] \\ 3 \rightarrow [1, 4] \\ 4 \rightarrow [1, 2] \end{cases}$$

4.6 Listes de prédécesseurs

21) Soit le graphe orienté G tel que



Pour $i \in V$, $P[i]$ est la liste des sommets prédécesseurs de i . Donner la liste P .

►

$$P = \begin{cases} 1 \rightarrow [3, 4] \\ 2 \rightarrow [4] \\ 3 \rightarrow [2] \\ 4 \rightarrow [3] \end{cases}$$

4.7 Exercices

Exercice 6. Dans cet exercice, on considère le graphe orienté $G_0 = (V_0, A_0)$, avec $V_0 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ et $A_0 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (2, 4), (3, 4), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 4), (6, 7)\}$.

On pose n_0 le nombre de sommets et m_0 le nombre d'arcs.

1. Dessiner le graphe G_0 . Que valent n_0 et m_0 ?
2. Pour chaque sommet v de G_0 , donner l'ensemble des successeurs de v et l'ensemble des prédécesseurs de v .

3. Donner un chemin élémentaire de G_0 et un circuit élémentaire de G_0 , ainsi que leurs longueurs (en nombre d'arcs) respectives.
4. Représenter le graphe non orienté G'_0 associé à G_0 en enlevant l'orientation des arcs. Le graphe G_0 est-il connexe ? Justifier la réponse.

Exercice 7.

1. Soit le graphe $G_1 = (V_1, A_1)$ tel que $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ et $A_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (2, 4), (3, 4)\}$.
 - a. Représenter le graphe G_1 .
 - b. Donner la matrice sommet-somme R_1 .
 - c. Donner la liste des successeurs de chaque sommet de G_1 .

2. Donner toutes les informations pour le graphe G_2 défini par la matrice sommet-somme suivante

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Donner toutes les informations pour le graphe G_3 défini par la matrice sommet-somme suivante

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Donner toutes les informations pour le graphe G_4 défini par la liste des successeurs suivante

$$L_4 = \begin{cases} 1 \rightarrow [4, 5] \\ 2 \rightarrow [3] \\ 3 \rightarrow [2] \\ 4 \rightarrow [] \\ 5 \rightarrow [] \end{cases}$$