

Décroissance radioactive

Chapitre 15,3

1 Loi de décroissance

1.1 Évolution du nombre de noyaux d'un échantillon de noyaux radioactifs

Soit un échantillon contenant des atomes radioactifs susceptibles de se désintégrer selon l'un des modes définis dans le document Chap. 15,1.

- 1) Écrire l'équation de désintégration du césium 137, émetteur β^- .

Cette désintégration est de nature probabiliste : c'est un **phénomène aléatoire** ; à chaque instant, il y existe une certaine probabilité pour qu'un noyau se désintègre entre deux dates infiniment voisines t et $t + dt$. On note cette probabilité $\lambda \cdot dt$ où λ est une **constante radioactive caractéristique du noyau considéré et indépendante du temps**.

Note. Pour traduire le fait que λ ne varie pas en fonction de l'âge des noyaux, on dit souvent, de manière imagée, que *les noyaux meurent sans vieillir* : pour les « jeunes », ou pour les « vieux », la probabilité de se désintégrer est identique.

Si on considère l'ensemble des noyaux radioactifs (*radionucléides*) d'un échantillon, un détecteur peut compter le nombre de particules émises (par exemple les électrons) pendant une durée Δt . On peut alors déterminer expérimentalement le nombre ΔN de noyaux qui se désintègrent pendant Δt . **Ce nombre est, en fait, aléatoire, fluctuant autour d'une valeur moyenne.** Aussi, on ne peut pas définir avec certitude le nombre $N(t)$ de noyaux existant à une date t . Par contre, on peut évaluer une **valeur moyenne** de $N(t)$ que nous noterons $\bar{N}(t)$.

Intuitivement, on peut alors admettre qu'entre les dates t et $t + dt$ la variation $d\bar{N}(t)$ du nombre moyen de noyaux est proportionnelle :

- au nombre moyen $\bar{N}(t)$ de noyaux présents à la date t ;
- à la probabilité de désintégration entre les dates t et $t + dt$ c'est-à-dire : $\lambda \cdot dt$.

- 2) Donner l'expression du nombre moyen $|\bar{N}(t)|$ de noyaux qui se désintègrent entre les dates t et $t + dt$.

- 3) Donner l'expression de la variation $d\bar{N}(t)$ du nombre moyen de noyaux dans l'échantillon entre les dates t et $t + dt$.

- 4) En déduire l'équation différentielle du premier ordre qui donne l'évolution du nombre de noyaux dans l'échantillon radioactif.

- 5) Résoudre l'équation différentielle en considérant qu'il existait, dans l'échantillon, N_0 noyaux à la date $t = 0$.

- 6) Quelle est la dimension de la constante λ ? Que représente-t-elle ?

1.2 Demi-vie radioactive

Définition. On appelle *demi-vie radioactive* $t_{1/2}$ la durée au bout de laquelle le nombre moyen de noyaux radioactifs d'un échantillon a été divisé par 2 :

$$\bar{N}(t + t_{1/2}) = \frac{\bar{N}(t)}{2}$$

- 7) Exprimer $t_{1/2}$ en fonction de λ . La demi-vie radioactive dépend-elle du temps ?

8) Justifier que $t_{1/2}$ et λ soient inverses l'une de l'autre.

9) Donner la relation qui existe entre le nombre moyen $\bar{N}(n t_{1/2})$ de noyaux qui restent dans un échantillon à la date $n t_{1/2}$ et N_0 , le nombre initial de noyaux.

En déduire une méthode rapide de tracé d'une décroissance exponentielle à l'aide de $t_{1/2}$.

Note. La demi-vie radioactive $t_{1/2}$, comme la constante radioactive λ , est une *caractéristique de la famille de noyaux radioactifs*. Celle du polonium 210 est 138 jours, tandis que celle du bismuth 210 ne dépasse pas 5 jours. La période du thorium 232 est de $1,41 \cdot 10^{10}$ années, alors que celle du thorium 224 ne vaut que 1,05 s. On classe habituellement les noyaux en trois catégories :

- les noyaux stables ;
- les noyaux dont la demi-vie radioactive est de l'ordre de grandeur de l'âge de la Terre ($5 \cdot 10^9$ ans) et qui, depuis leur formation, n'ont pas eu le temps de tous disparaître ;
- les noyaux de demi-vie radioactive plus courte pour lesquels $t_{1/2}$ varie de quelques années à quelques microsecondes.

2 Activité d'un échantillon de noyaux radioactifs

10) Rappeler ce que l'on appelle **activité** A d'un échantillon de noyaux radioactifs.

Note. L'unité de l'activité est le becquerel (symbole Bq) ; elle correspond à une désintégration par seconde.

$$1 \text{ Bq} = 1 \text{ désintégration/s}$$

11) Pourquoi l'activité est-elle une grandeur importante ?

12) Donner l'expression de l'activité $A(t)$ en fonction de $\bar{N}(t)$. En déduire que l'activité décroît exponentiellement

L'activité est proportionnelle au nombre moyen de noyaux susceptibles de se désintégrer à la date t . Elle est d'autant plus grande que la constante radioactive λ est grande, c'est à dire que la demi-vie radioactive est petite. Elle décroît très rapidement en début d'émission et voit sa variation diminuer au cours du temps.

La mesure de l'activité à deux dates différentes permet de déterminer λ puis d'en déduire $t_{1/2}$. On trace généralement

$$\ln A(t) = \ln A_0 - \lambda t$$