附件 7

维吾尔医敷贴疗法技术操作规范

敷贴（孜马地 زىماد）疗法技术是在维吾尔医理论指导下，采用草药粉碎成的敷贴剂贴敷于局部病变部位，通过药物吸收剂的渗透作用渗入皮下组织，经血液循环到达局部病灶，调节局部的气质失调、散沉质与增强驱力、消肿，达到清除局部的异常体液质为目的的外治技术。适用于体液质型气质失调类疾病与形状改变类疾病。

根据治疗部位和适用疾病范围的不同分为半头痛（偏头痛）敷贴、养心敷贴、通气肚脐敷贴、皮肤病敷贴、养胃敷贴、背部敷贴、小腹敷贴、关节敷贴（腰关节肿敷贴、腕关节肿敷贴、膝关节肿敷贴、肘关节肿敷贴、踝关节肿敷贴）、腹部敷贴以及乳房敷贴等。

第一节 半头痛（偏头痛）敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

绷带、护理衬垫（纸棉）、不锈钢药碗、调和板、一次性中单、粉碎机。

（二）常用药物

蜀葵花散：蜀葵花、甘松、龙葵果、芫荽子、天山堇菜、野苜蓿，混合粉碎成蜀葵花散；

洋甘菊散：洋甘菊、阿勃勒、亚麻子、蜀葵子、野苜蓿，混合粉碎成洋甘菊散。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情选用蜀葵花散或洋甘菊散，如气质偏热者使用蜀葵花散敷贴剂，如气质偏寒者洋甘菊散敷贴剂，约 50 g 放到换药碗里倒入约 40 ℃ 的 50 mL温开水用调和板均匀混合，制成膏药；

2.一般在患者晚间让患者仰卧体位，为避免污染衣物和枕头，患者头部下垫一次性中单；

3.将准备好的敷贴剂药物即时用调和板适量厚度(约 0.5～1 cm）贴敷在额部（贴敷时药物温度约 35 ℃），贴敷的膏药上先覆盖一层纸棉后用绷带适当松紧绑定与额部；

4.贴敷 6～8 小时后揭开绷带，取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，膏药停留时间需 6～8 小时，10～15 天天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症；

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程；

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况，注意绷带松紧度；

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

7.包扎药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

8.经期停止治疗。

二、治则

改善局部血液循环、解除痉挛、改善血管弹性，扩张血管，降血压，安神、健脑，止痛，改善睡眠。

三、适应症

治疗头痛、半头痛（偏头疼）、焦急病（焦虑症）、神经弱症（神经衰弱）、血浪症（高血压）和各种原因引起的无眠（失眠）、头晕各种关节炎、 颈椎病、腰椎病、骨质增生、腹胀等症状。

四、禁忌症

头部外伤、脑出血患者禁用。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请皮肤科科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第二节 养心敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

护理衬垫（纸棉）、不锈钢药碗、调和板、一次性中单、粉碎机。

（二）常用药物

1.檀香贴敷药：檀香、甘松混合粉碎，玫瑰花露;

2.郁金贴敷药：郁金、香青兰、甘松混合粉碎，玫瑰花露。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情选用檀香散或郁金散，如气质偏热者用檀香散，气质偏凉者用郁金散，50 g 散剂放到换药碗里倒入 50 mL 玫瑰花露剂用调和板均匀混合，制成膏药;

2.患者仰卧体位，揭开衣服暴露心前区，为避免污染衣物和被单患者左侧胸部下垫一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷于心前区（范围约 15×20 cm，女性患者乳房下弧形贴敷），贴敷的膏药上先覆盖一层护理衬垫，再覆盖一次性治疗巾，最后覆盖被子;

4.贴敷 30～60 分钟后，取出药物，用纸棉擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1日1次，每次30~60分钟，10~15天天为1个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，禁用刺激性强的食物;

6.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

7.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

8.经期停止治疗。

二、治则

调节局部气质、安神、改善局部血液循环、解除痉挛、止痛等。

三、适应症

冠心病稳定型心痛病（心绞痛）、陈旧性心阻梗病（心肌梗死）、缓慢型心悸（心律失常）、心脏神经官能综合症、缺血性心脏病、心弱症（心力衰竭新功能I、II级）等心脉病症（心血管疾病）症状。

四、禁忌症

急性心阻梗病（心梗）、急性冠脉综合症、胸部外伤、休

克以及心痛病（心绞痛）发作者禁用。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第三节 养胃敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、一次性中单、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

通便散：天山堇菜、葫芦巴、亚麻籽、甘松等混合粉碎，制成通便散。

温胃散：孜然、水菖蒲混合粉碎，制成温胃散。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情将贴敷药（通便散或温胃散）50～100 g放到换药碗里倒入等量温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.患者仰卧体位，揭开衣服暴露胃区，为避免污染衣物和被单患腹部垫一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷于胃区（范围约 15 cm×20 cm），用特定电磁波治疗仪加热 30 分钟;

4.贴敷的膏药上先覆盖一层纸棉，再覆盖一次性治疗巾，最后覆盖被子;

5.贴敷 30 分钟后，取出药物，用护理衬垫擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，每次 30 分钟，10～15 天天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，禁用刺激性强的食物;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

9.经期停止治疗。

二、治则

改善局部气质环境，协助调节局部异常体液质，散沉质，助消化驱力，平衡以上脏器的驱力、形和精气，散气，消肿。

三、适应症

1.肝脏疾病:

肝弱症（肝功能不全）、肝肿（肝炎）、肝脂溢（脂肪肝）、肝枯萎（肝硬化）。

2.脾脏疾病:

脾弱症（脾功能不全或相当于中医脾虚）、脾亢症（脾功能亢进）、脾枯萎（脾萎缩）、脾肿（脾炎）等;

3.胃肠道疾病:

胃弱症（消化不良）、胃肿（胃炎）、胃溃疮（胃溃疡）、胃蟹病（胃癌）、十二指肠肿（二指肠炎）二指肠溃疮（二指肠溃疡）等;

4.胰腺疾病:

糖尿症（糖尿病）、慢性胰腺炎等。

四、禁忌症

急性睡腺肿（胰腺炎）、急腹症、腹部外伤、黄病（黄疸）患者禁用。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第四节 通气肚脐敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

芝麻油、护理衬垫（纸棉）、不锈钢药碗、调和板、一次性中单特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

处方 1：麝香、菖蒲、孜然等混合粉碎，制成散剂。

处方 2：欧细辛、白芥子、蔓菁子（芜菁子）、丁香、肉桂、阿拉伯胶等混合粉碎，制成散剂。

处方 3：麝香;

制作：已制成为粉状散剂倒入不锈钢碗里与适量芝麻油混合成敷贴剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情选用以上散剂上述制成敷贴剂重量约1~10g;

2.将患者揭开衣物暴露脐部，仰卧位，为避免污染衣物和被单，将患者腰部垫一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷在脐部;

4.约 30～60 分钟后，取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，每次 30～60 分钟，10～15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.包扎药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

9.经期停止治疗。

二、治则

调整局部气质、开通阻滞、消肿、止痛、散气,排气、排便、增强胃动力作用、增加肺活量;

三、适应症

适用于各种疾病引起的气短、腹胀、便滞（便秘）等症状;上气道堵阻（上呼吸道阻塞）、肺弱症（慢性阻塞性疾病）、肺胀心病（肺心病）、气道扩症（支气管扩张）、急慢性气道肿（支气管炎）、气道高反应、喘病（哮喘）等气管疾病。

四、禁忌症

急腹症、腹部外伤、尿中毒症（尿毒症）患者及怀孕、月

经期禁用。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理。

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第五节 小腹敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、一次性中单、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

肉豆蔻衣、蜀葵子、天山堇菜、锦灯笼、胡芦巴、洋甘菊、龙葵果等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情制成敷贴剂约 50～100 g 放到换药碗里倒入等温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.患者仰卧体位，揭开衣物暴露下腹部，为避免污染衣物和被单将患者下腹部垫一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷于下腹部（范围约 15×25 cm）;

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约 30 分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，10～15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

9.经期停止治疗。

二、治则

改善局部血液循环、驱寒、消炎、止痛。

三、适应症

前列腺肿（前列腺炎）、慢性尿路感染、膀胱肿（膀胱炎）、附件炎等。

四、禁忌症

尿径积石（尿路结石）、尿中毒症（尿毒症）、膀胱蟹病（膀胱肿瘤）禁用。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理。

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科

及皮肤科专科会诊。

第六节 背部敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、一次性中单、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

可选用以下两种组方:

1.消肿散: 蜀葵子、大麦、洋甘菊、天山堇菜、葫芦巴子、莳萝子、亚麻籽（根据病情可适当酌情加减药物和剂量）等混合粉碎，制成散剂;

2.润肺散敷: 天山堇菜、蜀葵子、莳萝子、洋甘菊、大麦、葫芦巴子、野苜蓿（根据病情可适当酌情加减药物和剂量）等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情选用消肿散或润肺散约 50～100 g 放入换药碗里倒入温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.将患者揭开衣物暴露背部，反卧体位，为避免污染衣物和被单将患者胸部垫一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷

在两侧肩胛骨中间（范围约 15×20 cm）；

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约 30 分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，每次 30 分钟，10~15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

9.经期停止治疗。

二、治则

清除局部的异常体液质，发挥调整局部气质、祛湿散寒、滋润湿肺、化痰止咳，消肿止痛等作用，防治气质失调类，形状改变类呼吸道疾病。

三、适应症

适用于上呼吸道感染引起的咳症（咳嗽）、支气管喘病（哮喘）、气道高反应、急慢性气道肿（支气管炎）、肺弱症（慢性阻塞性肺疾病）、气道扩症（支气管扩张）症、急慢性肺肿（肺炎）、肺胀心病（肺心病）、慢性呼吸衰弱（呼吸衰竭）、肺积气（肺气肿）、胸膜肿（胸膜炎）、肺不张、肺栓赛、肺蟹病（肺癌）、肺溃病（结核）稳定期、间质性肺肿（肺炎）、肺纤维化等各种肺部疾病及肋间神经痛、睡眠呼吸暂停综合征以及胸背部痛等疾病。

四、禁忌症

疾病急性期，对此药物有皮肤过敏反应、局部皮肤缺损、皮疹、炎症等患者暂不能用此技术。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第七节 腰椎病敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、一次性中单、特定电磁波治疗仪、

粉碎机。

（二）常用药物

1.阿纳其根散：湖蛙、秋水仙、没食子、蜀葵子、黄连、阿纳其根、大戟脂等混合粉碎，制成散剂;

2.复方秋水仙散：肉豆蔻、莪术、阿纳其根、野苜蓿、蜀葵子、水菖蒲、秋水仙、洋甘菊、门冬等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情将阿纳其根散或复方秋水仙散剂约 50～100 g 放到换药碗里倒入等温开水均匀混合，制成膏药;

2.将患者揭开衣物暴露腰部，反卧体位，为避免污染衣物和被单患者腰部垫一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷在两侧腰部（范围约 15×20 cm）;

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约 30 分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，每次 30 分钟，10～15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，

对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

9.经期停止治疗。

二、治则

促进消炎，消除或减轻肿胀、疼痛。

三、适应症

腰膨脱（腰椎间盘膨出）、腰突病（腰椎间盘突出）和其他各种原因引起的腰痛、腰酸等症状。

四、禁忌症

疾病急性期，对此药物有皮肤过敏反应，局部皮肤缺损、皮疹、炎症等患者不能用此技术。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第八节 肘关节肿敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

1.阿纳其根散：湖蛙、秋水仙、没食子、蜀葵子、黄连、阿纳其根、大戟脂等混合粉碎，制成散剂。

2.复方秋水仙散：肉豆蔻、莪术、阿纳其根、野苜蓿、蜀葵子、水菖蒲、秋水仙、洋甘菊、门冬等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情将阿纳其根散或复方秋水仙散约50～100 g放到换药碗里倒入温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.将患者揭开衣物暴露肘部，坐位;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约0.5～1 cm）贴敷在两侧肘部（范围约10×15 cm）;

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约30分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

一日1次，每次30分钟，10～15天为1个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.包扎药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理。

二、治则

促进炎症消散，消除或减轻肿胀、疼痛、防止关节僵硬。

三、适应症

肘关节肿（关节炎）、肘关节痛、大关节肿（风湿性关节炎）、小关节肿（类风湿性关节炎）等。

四、禁忌症

疾病急性期，对此药物有皮肤过敏反应，局部皮肤缺损、皮疹、炎症等患者不能用此技术。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第九节 膝关节肿敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、一次性中单、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

1.阿纳其根散：湖蛙、秋水仙、没食子、蜀葵子、黄连、阿纳其根、大戟脂等混合粉碎，制成散剂;

2.复方秋水仙散：肉豆蔻、莪术、阿纳其根、野苜蓿、蜀葵子、水菖蒲、秋水仙、洋甘菊、门冬等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情将阿纳其根散或复方秋水仙散约 50～100 g 放到换药碗里倒入温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.将患者揭开衣物暴露双膝关节，并方平，膝盖下放一次性中单;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷在两侧膝关节（范围约 10×15 cm）;

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约 30 分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

一日 1 次，每次 30 分钟，10～15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况，注意绷带松紧度;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理。

二、治则

促进消炎，消除或减轻肿胀、疼痛、防止关节僵硬。

三、适应症

双膝关节肿（关节炎）、双膝关节痛、大关节肿（风湿性关节炎）、小关节肿（类风湿性关节炎）等。

四、禁忌症

疾病急性期、对此药物有皮肤过敏反应、局部皮肤缺损、皮疹、炎症等患者暂不能用此技术。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请

相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第十节 踝关节肿敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、调和板、一次性中单、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

1.阿纳其根散：湖蛙、秋水仙、没食子、蜀葵子、黄连、阿纳其根、大戟脂等混合粉碎，制成散剂;

2.复方秋水仙散：肉豆蔻、莪术、阿纳其根、野苜蓿、蜀葵子、水菖蒲、秋水仙、洋甘菊、门冬等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情将阿纳其根散或复方秋水仙散约 50～100 g 放到换药碗里倒入温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.揭开患者衣物暴露踝关节，脚放在一次性中单上;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷在两侧踝关节（范围约 10 cm×15 cm）;

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约 30 分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

一日 1 次，每次 30 分钟，10～15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

二、治则

促进消炎，消除或减轻肿胀、疼痛、防止关节僵硬。

三、适应症

踝关节肿（关节炎）、踝关节痛、大关节肿（风湿性炎）、小关节肿（类风湿性关节炎）等。

四、禁忌症

疾病急性期，对此药物有皮肤过敏反应，局部皮肤缺损、皮疹、炎症等患者不能用此技术。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第十一节 腕关节肿敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

不锈钢药碗、一次性中单、特定电磁波治疗仪、粉碎机。

（二）常用药物

1.阿纳其根散：湖蛙、秋水仙、没食子、蜀葵子、黄连、阿纳其根、大戟脂等混合粉碎，制成散剂;

2.复方秋水仙散：肉豆蔻、莪术、阿纳其根、野苜蓿、蜀葵子、水菖蒲、秋水仙、洋甘菊、门冬等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.根据患者病情将阿纳其根散或复方秋水仙散约 50～100 g 放到换药碗里倒入温开水用调和板均匀混合，制成膏药;

2.揭开患者衣物暴露腕关节手放在一次性中单上;

3.将准备好的膏药用调和板适量厚度（约 0.5～1 cm）贴敷在两侧腕关节（范围约 10×15 cm）;

4.贴敷的膏药上照特定电磁波治疗仪约 30 分钟;

5.取出药物，擦干净。

（四）治疗时间和疗程

1 日 1 次，每次 30 分钟，10～15 天为 1 个疗程。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意特定电磁波治疗仪与用药部位距离不得小于 20 cm;

7.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

8.药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理。

二、治则

促进炎症消散，消除或减轻肿胀、疼痛、防止关节僵硬。

三、适应症

腕关节肿（关节炎）、腕关节痛、大关节肿（风湿性关节炎）、小关节肿（类风湿性关节炎）等。

四、禁忌症

疾病急性期，对此药物有皮肤过敏反应，局部皮肤缺损、

皮疹、炎症等患者不能用此技术。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第十二节 乳房敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

20目筛子、80目筛子、10 cm宽绷带、30 cm宽绷带固定护理衬垫（纸棉）、不锈钢药碗、一次性手套、粉碎机。

（二）常用药物

洋甘菊、野苜蓿、药蜀葵籽、胡萝卜籽、桔梗籽、龙葵籽、穆库没药等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.按处方称取药用粉碎机混合粉碎，过20目筛子，换粉粹机筛子再次粉碎过80目筛子，制成40 g细粉散剂;

2.称取100 g茴香，取1000 mL蒸露水泡4~5小时，底火煎煮1~2小时，过滤，制成80 mL茴香水;

3.操作者及助手戴乳胶手套。

4.取已准备好的研细末 40 g，茴香水 80 mL 温度为 35 ℃左右，放碗里均匀搅拌扮成稀糊状;

5.患者取站立位、坐位或侧卧位，充分暴露患处;

6.操作者站在患者前方，患处涂上将调成稀糊状的药，厚 0.5 cm，外敷患处，后用 30 cm×110 cm 的绷带，自前向后包扎，环状、缠绕胸部三层，助手再用 10 cm 宽度的绷带固定，松紧适度。

（四）治疗时间和疗程

每日 1 次，5~6 小时后去掉。10 次为 1 个疗程。每疗程间应休息二至三天、治疗 3 个月。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况，注意绷带松紧度;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

7.包扎药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

8.经期停止治疗。

二、治则

通过局部皮肤的吸收作用使药作用于乳房组织从而达到消炎、消肿、消增、止痛等目的。

三、适应症

单纯型乳房结肿（乳腺增生）、乳房蟹病（乳腺癌）术后、乳痛症、乳房肿（乳腺炎）、乳腺导管扩张症。

四、禁忌症

1.乳腺囊性增生、溃病（结核）、蟹病（肿瘤）患者;

2.合并严重的心功能缺陷（功能不全）、肝、肾、造血系统等严重危机生命的原发性疾病以及精智病(精神病)患者(注:肝功能 A LT、AST、超过正常值范围上限 2 倍，Cr 超出正常值上限范围）;

3.过敏体质（对 2 种以上食物或药物过敏者），或对本诊疗方案药物成分过敏者;

4.半年内使用激素类制剂者;

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。

第十三节 妇科下腹部敷贴技术

一、常用器具、药物及基本操作方法

（一）常用器具

20目筛子、80目筛子、绷带、护理衬垫（纸棉）、10 cm宽绷带、30 cm宽绷带、不锈钢药碗、调和板、一次性中单、一次性手套、粉碎机。

（二）常用药物

洋茴香、野苜蓿、天山堇菜、蜀葵花、龙葵果、蜀葵子、葫芦巴-+等混合粉碎，制成散剂。

（三）基本操作方法

1.按处方称取药，用粉碎机粉碎，研药末过20目筛子，药末再用粉粹机粉碎研成细粉过80目筛子，制成研细末;

2.操作者及助手戴乳胶手套;

3.取已准备好的研细末50 g，放碗里用调和板均匀搅拌扮成稀糊状;

4.患者取站立位、坐位或侧卧位，充分暴露腹部，下放一次性中单;

5.操作者站在患者前方，患处上涂上将调成稀糊状的药，用调和板厚0.5 cm，外敷患处，后用30×110 cm的绷带，自前向后包扎，环状、缠绕下腹部三层，助手再用10 cm宽度的绷带固定，松紧适度。

（四）治疗时间和疗程

每日 1 次，5～6 小时后去掉。10 次为 1 个疗程。每疗程间应休息二至三天，治疗 3 个月。

（五）注意事项

1.维吾尔医辨证分型要准确，要符合适应症;

2.要严格遵守操作程序、治疗时间及疗程;

3.注意操作程序，紧密观察肤色状况，注意绷带松紧度;

4.若出现药物过敏现象或发现异常改变，立即停止治疗，对症处理;

5.治疗前后注意穿棉质宽松内衣，刺激性强的食物禁用;

6.注意患者衣服、被卧和床单的卫生;

7.包扎药物取下后皮肤若有发红、瘙痒、皮疹等症状，嘱患者避免搔抓，遵医嘱给予对症处理;

8.经期停止治疗。

二、治则

通过透皮吸收，渗透作用，使药物通过皮肤进入血液循环，通过血液循环到达促进盆腔脏器血液循环，消炎、消瘤，增强盆腔结缔组织张力，止血。

三、适应症

慢性盆腔膜肿（盆腔炎）、宫瘤病（子宫肌瘤）、卵管包肿（输卵管囊肿）、附件炎无严重合并症者。

四、禁忌症

1.恶性蟹病（肿瘤）、溃病（结核）患者;

2.尿妊娠试验阳性、妊娠期、计划妊娠或哺乳期妇女;

3.合并严重的心功能缺陷（功能不全），肝、肾、造血系统等严重危机生命的原发性疾病以及精智病(精神病)患者(注:肝功能 A LT、AST、超过正常值范围上限 2 倍，Cr 超出正常值上限范围）;

4.过敏体质（对 2 种以上食物或药物过敏者），或对本诊疗方案药物成分过敏者;

5.半年内使用激素类制剂者。

五、异常情况及处理措施

1.出现皮疹时立即停止治疗，局部涂玫瑰花油。必要时请相关科室会诊相应的处理;

2.局部烫伤应立即停止治疗，在局部涂擦烫伤膏，请外科及皮肤科专科会诊。