Ordinatio

Antihomotoxica et Materia Medica

Praktisches Lehrbuch der Antihomotoxischen Therapie

Herausgegeben vom Aurelia-Verlag in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Homotoxikologie e.V. Wir danken der Firma Heel für die freundliche Überlassung der Fachinformationen zu den Arzneimitteln.

AURELIA-VERLAG

Inhalt

Ordinatio antihomotoxica et materia medica

1 VORWORT 10

2 INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR HOMOTOXIKOLOGIE 12

3 GRUNDBEGRIFFE DER HOMOTOXIKOLOGIE 13

4 THERAPIE MIT BIOTHERAPEUTIKA-ANTIHOMOTOXIKA-HEEL 19

5 BIOTHERAPEUTIKA-ANTIHOMOTOXIKA, IHR STOFFLICHER AUFBAU UND IHRE MEDIZINISCH-THERAPEUTISCHE WIRKUNGSWEISE 30

6 DIE AUTO-SANGUIS-STUFENTHERAPIE NACH RECKEWEG 33

7 DEDIFFERENZIERUNGSPHASEN 37

8 SCHMERZBEHANDLUNGEN 39

9 SCHADSTOFFBELASTUNG 41

10 AMALGAM-AUSLEITUNG 42

11 MIKROBIOLOGISCHE THERAPIE: EIN THERAPIEKONZEPT ZUR IMMUNMODULATION 43

12 ALLGEMEINE REGELN ZUM PRAKTISCHEN VORGEHEN BEIM THERAPEUTISCHEN EINSATZ DER HEEL-PRÄPARATE 45

13 EINLEITUNG ZUM THERAPEUTISCHEN INDEX 48

14 THERAPEUTISCHER INDEX 49

Inhalt

Fachinformation für Therapeuten und Apotheker

1 KOMBINATIONSPRÄPARATE 171

2 LISTE DER EINZELBESTANDTEILE IN KOMBINATIONSPRÄPARATEN 233

3 HOMÖOPATHISCHE EINZELMITTEL IN POTENZENACC 238

4 LISTE DER NEUEN BEZEICHNUNGEN FÜR HOMÖOPATHISCHE WIRKSTOFFE 369

5 BESTELLUNG VON ARZNEIMITTELN 371

6 HALTBARKEIT DER HEEL-PRÄPARATE 371

7 PHARMAZENTRALNUMMERN UND APOTHEKENVERKAUFSPREISE. 372

Ordinatio

Antihomotoxica et Materia Medica

Praktisches Lehrbuch der Antihomotoxischen Therapie

Herausgegeben vom Aurelia-Verlag in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Homotoxikologie e.V. Wir danken der Firma Heel für die freundliche Überlassung der Fachinformationen zu den Arzneimitteln.

Inhalt

Ordinatio antihomotoxica et materia medica

1 VORWORT 10

2 INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR HOMOTOXIKOLOGIE 12

3 GRUNDBEGRIFFE DER HOMOTOXIKOLOGIE 13

4 THERAPIE MIT BIOTHERAPEUTIKA-ANTIHOMOTOXIKA-HEEL 19

5 BIOTHERAPEUTIKA-ANTIHOMOTOXIKA, IHR STOFFLICHER AUFBAU UND IHRE MEDIZINISCH-THERAPEUTISCHE WIRKUNGSWEISE 30

6 DIE AUTO-SANGUIS-STUFENTHERAPIE NACH RECKEWEG 33

7 DEDIFFERENZIERUNGSPHASEN 37

8 SCHMERZBEHANDLUNGEN 39

9 SCHADSTOFFBELASTUNG 41

10 AMALGAM-AUSLEITUNG 42

11 MIKROBIOLOGISCHE THERAPIE: EIN THERAPIEKONZEPT ZUR IMMUNMODULATION 43

12 ALLGEMEINE REGELN ZUM PRAKTISCHEN VORGEHEN BEIM THERAPEUTISCHEN EINSATZ DER HEEL-PRÄPARATE 45

13 EINLEITUNG ZUM THERAPEUTISCHEN INDEX 48

14 THERAPEUTISCHER INDEX 49

1 Vorwort der Herausgeber

Viele Monate haben viele Sachverständige an diesem für die Antihomotoxische Therapie grundlegenden Werk intensiv gearbeitet.

Besonderer Dank gilt:
Herrn Dr. med. Hermann Ammerschläger, Aschaffenburg,
Herrn Dr.med. Günther Bauer, Timmendorfer Strand
Herrn Dr. med. Werner Frase, Baden-Baden
Herrn Prof.Dr.rer.nat.med.habil. Hartmut Heine, Neuhausen
Frau Dr. med. Gabriele Herzberger, Stutensee
Herrn Dr. med. Franz-Anselm Graf von Ingelheim, Geisenheim
Frau Dr.med. Dagmar Lanninger-Bolling, Bad Soden
Herrn Dr. med. Wolfgang Kern, Karlsruhe
Herrn Dr. med. Klaus Küstermann, Baden-Baden
Herrn Dr.med. Gerhard Reiß, Thüngen
Herrn Dr.rer.nat. Wilfried Stock, Sinzheim

Sie haben den Therapeutischen Abschnitt dieses Buches durch ihre praktische und ärztliche Therapieerfahrung bereichert und damit wesentlich dazu beigetragen, daß dieses Buch die Erfahrungen aus der Praxis für die Praxis widerspiegeln kann.

Danken möchten wir auch Frau Sonja Bürkle, Frau Jennifer Teifel und Frau Anja Zepfel für die schnelle und verläßliche Erledigung der erforderlichen Schreibarbeiten. Die ständig erforderlichen Änderungen von Texten und Listen, sowie deren weitere Umsetzung wurde von ihnen mit großer Gewissenhaftigkeit und Flexibilität durchgeführt. Frau Marja Alasuvanto gilt unser Dank für die hervorragende Lektoratsarbeit.

Wir wünschen uns, daß dieses Buch viele Freunde finden möge und hoffen, daß es zu einem unentbehrlichen praktischen Ratgeber in Ihrer täglichen Praxis wird.

Sollten wir unser hochgestecktes Ziel mit unserem Werk erreichen, könnten wir dem Vermächtnis von Herrn Dr. Hans-Heinrich Reckeweg, welcher die Homotoxikologie begründet und entwickelt hat, gerecht werden. Er trat Zeit seines Lebens unermüdlich für eine möglichst schonende medikamentöse Therapie im wohlverstandenen, ganzheitlich-medizinischen Sinne ein.

Baden-Baden, im April 2001

Geleitwort

„Möge das vorliegende Werk klare Richtlinien und Sicherheit bieten für die Anwendung einer modernen und wissenschaftlich fundierten Behandlungsmethodik“ schloss das Vorwort der ersten Ausgabe dieser Ordinatio vor fünfzig Jahren.

Schon damals bekannten sich die Herausgeber der Ordinatio zu einer neuen Qualität der Homöopathie – transformierten den Hahnemann-Ansatz in die Neuzeit. Die Aufgabe, die sie sich stellten, war, die empirischen Grundlagen der Homöopathie mit naturwissenschaftlicher Methodik zu belegen. Die Voraussetzung dazu hatte Dr. Hans Heinrich-Reckeweg (1905-1985) mit der Homotoxikologie geschaffen. Sie ist eine moderne und „beforschbare“ Krankheitslehre und zugleich Basis für das Wirkmodell aller homöopathischen Arzneimittel, die in der Ordinatio gelistet sind.

Der Reckewegsche Impuls, umgesetzt in kontinuierliche und systematische Forschung, trägt jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts Früchte. Erkenntnisse zu den immunologischen Wirkmechanismen liegen ebenso vor wie Ergebnisse klinischer Studien zu wesentlichen Indikationen. Die Homotoxikologie erweist sich damit als ein lebendiges Therapie-System, das ständig aktualisiert wird. Alle Anwender der Homotoxikologie können davon ausgehen, innerhalb des Systems „State-of-the-Art“ zu sein. Diese Gewißheit hat dazu geführt, dass die entsprechenden Arzneimittel heute in den meisten Praxen zum Standard-Repertoire gehören

Zum Erfolg beigetragen hat ein konsequentes Fortbildungskonzept für Fachgruppen. Symposien und Seminare zum Thema „Homotoxikologie“ können bundesweit besucht werden. Eine weltweit aktive Fachgesellschaft fördert und unterstützt alle Aktivitäten. Sie schreibt auch den mit 30.000 DM dotierten Hans-Heinrich-Reckeweg-Forschungspreis aus, der jährlich für eine besondere wissenschaftliche Leistung vergeben wird. Die Fachgesellschaft ist ebenfalls Herausgeberin dieser Ordinatio.

Von allen Facetten der Homotoxikologie ist in der Ordinatio das Wesentliche vereint: ein nach Indikationen geordneter therapeutischer Teil, eine alphabetische Präparate-Übersicht, eine Zusammenfassung der aktuellen Ergebnisse der Präparate- und Grundlagenforschung und eine Anleitung für die generelle Umsetzung des Therapiekonzeptes. Damit haben Sie ein für die tägliche Praxis nutzbares Handbuch, das Sie schnell und fundiert informiert.

Dr. rer.pol. Klaus-Dieter Petersson
Vorsitzender der Geschäftsführung
Biologische Heilmittel Heel GmbH

2 Internationale Gesellschaft für Homotoxikologie e.V.

Die „Internationale Gesellschaft für Homotoxikologie e.V.“ ist eine Gesellschaft, der approbierte Ärzte aller Fachrichtungen der Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Apotheker angehören.

Die Gründung der „Internationalen Gesellschaft für Homotoxikologie e.V.“ fand am 24. Juni 1961 in Baden-Baden statt, wo sich seither auch ihr Sitz befindet. Sie wurde von dem deutschen Arzt Dr. H.-H. Reckeweg ins Leben gerufen, der auch die Grundlagen der „Homotoxikologie – Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin“ im Jahre 1955 schuf. Das therapeutische Konzept hat sich in Klinik und Praxis bewährt.

Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Pflege und Förderung der Homotoxinlehre und der Homotoxinforschung, sowie der auf der Homotoxikologie basierenden antihomotoxischen Therapie im In- und Ausland zu vertreten. Zu diesem Zweck wurde 1992 die „Akademie für Homotoxikologie“ gegründet. Ihre wesentliche Aufgabe ist die Durchführung von Seminaren mit dem Ziel der ärztlichen Fortbildung und Weiterbildung. Auf diesen Veranstaltungen werden Forschungsergebnisse aus Klinik und Praxis diskutiert und ihre Anwendung in der Praxis verdeutlicht.

In folgenden Ländern wurden bereits weitere Gesellschaften gegründet:

Belgien
Belgische Vereniging voor Homotoxicologie en antihomotoxische Therapie v.z.w. bzw. Association Belge d'Homotoxicologie et de Thérapie Antihomotoxique a.s.b.l.
P.B./B.P. 14, B-1730 Asse

Brasilien
Sociedade Brasileira de Homotoxicologia e Terapieas Antihomótoxicas,
Av. Francisco Matarazzo, 175, 05001-050 São Paulo

Chile
Fundación de Homotoxicología Heel Chile,
Guardia Vieja 255, Oficina 411, Providencia/Santiago

Ecuador
Sociedad Médica de Homotoxicología y Terapia Antihomotóxica del Ecuador,
P.O. Box 414, Sucursal 17, Quito

El Salvador
Asociación de Homotoxicologia y Terapia Antihomotóxica de El Salvador,
Apartado Postal No. 3 San Salvador C.A.

Georgien
Society of Biological Medicine and Homotoxicology,
A. Kazbegi Ave. 33, Tbilisi 38007

Griechenland
Ellenike Etrairiaomotoxikolopas,
Emm. Pappa 10, 55134 Thessaloniki

Großbritannien
The Society for Homotoxicology & Anti-Homotoxic Therapy – GB,
c/o P.O. Box 217, Ashford, Kent TN23 6ZU

Guatemala
Asociacion Médica de Homotoxicologia de Guatemala (AMHOGUA),
10 calle 1-74 Z.I. Guatemala, Ciudad

Italien
Associazione Italiana di Omotossicologia,
Via Durini, 9, I-20121 Milano

Kanada
The Society of Homotoxicology of North America,
7961 Vauban, Montreal, Quebec, Canada H1J2V1

Kolumbien
Centro de Medicina Biológica,
Carrera 26 # 2-38, Cali, Colombia

Litauen
Homotoksikologijos ir Antihomotoksinės Terapijos Asociacija,
Partizanų g. 198-5, 3041 Kaunas, Lietuva

Österreich
Österreichische Ärztegesellschaft für Homotoxikologie und Antihomotoxische Therapie,
Postfach 64, A-1232 Wien

Polen
Polskie Towarzystwo Homotoksykologii i Terapii Antyhomotoksycznej,
ul. Pulawska 52/38, 02-559 Warszawa

Portugal
Sociedade Médica Portuguesa de Homotoxicologia,
Rua de Correeiros 41 - 3Ro, Lisboa

Schweiz
Schweizerische Gesellschaft für Homotoxikologie und regulative Therapieverfahren,
Paracelsus Klinik, CH-9062 Lustmühle b. St. Gallen

Slowakei
Slovenská spoločnosť pre homotoxicológiu a antihomotoxickú terapiu,
Grösslingova 58, 811 09 Bratislava

Spanien
Sociedad Española de Homotoxicología y Terapia Antihomotóxica,
Apartado de correos 161, E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Südafrika
South African Society of Homotoxicology and Antihomotoxic Therapy,
P.O. Box 890558, Lyndhurst 2106, Johannesburg

Tschechien
Česká lékařska společnost pro homotoxicologii a antihomotoxickou terapii,
Čestmírova 1, 140 00 Praha 4

USA
SOHNA – Society of Homotoxicology of North America,
P.O. Box 2689, Edgewood, NM 87015

Venezuela
Asociaciõn Médica Venezolana de Homotoxicolocía,
Calle 10 y 5, Edificio Walpirema, Zdo. Piso, La Urbina, Caracas

Aus der angesehenen Zeitschrift „Biologische Medizin“ wurden weitere Fachzeitschriften ins Leben gerufen, z.B.

Journal of Biomedical Therapy – Integrating Homotoxicology and Mainstream Medicine (USA)
Medicina Biológica (Spanien)
La Medicina Biologica Rivista Italiana Di Omotossicologia (Italien)
Biologinė Medicina (Littauen)
Medycyna Biologiczna (Polen)
Биологическая Медицина (Biologische Medizin - Russland)
Биологическая Терапиа (Biologische Therapie - Ukraine)
Dansk Journal for Biomedicinsk Forskning og Terapi, BM (Dänemark)

Ferner gehört die Internationale Gesellschaft für Homotoxikologie e.V. als Mitgliedsverband folgenden Organisationen an:

Dem Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren e.V.
Der Hufelandgesellschaft für Gesamtmedizin e.V.
ECPM = European Council Of Doctors For Plurality In Medicine, Bruxelles (= Europäische Vereinigung der Ärzteverbände der besonderen Therapierichtungen Brüssel).

Bei der Entwicklung und Pflege der Homotoxinlehre haben sich folgende Präsidenten und Ehrenpräsidenten verdient gemacht:

Ehrenpräsidenten
Herr Dr. med. Hans-Heinrich Reckeweg, Baden-Baden
Herr Dr. med. Manfred Vosgerau, Hamburg
Herr Dr. med. Johannes John, Baden-Baden

Präsidenten

1961 - 1975	Herr Dr. med. Manfred Vosgerau, Hamburg
1975 - 1983	Herr Dr. med. Helmut Winterberg, Mannheim
1984 - 1989	Herr Dr. med. Johannes John, Baden-Baden
seit 1989	Herr Dr. med. Franz-Anselm Graf von Ingelheim, Geisenheim

Personen, die sich für die Internationale Gesellschaft für Homotoxikologie e.V. interessieren, Literatur, Forschungsschriften oder Information zu Seminaren der Homotoxinlehre wünschen, wenden sich bitte an folgende Adresse:

Internationale Gesellschaft für Homotoxikologie e.V.
Postfach 100 264, 76483 Baden-Baden
Bahnackerstraße 16, 76532 Baden-Baden
Telefon (0 72 21) 6 32 52
Telefax (0 72 21) 50 1-4 90

Institut für Antihomotoxische Medizin und Grundregulationsforschung
Bahnackerstraße 16
76532 Baden-Baden

3 Grundbegriffe der Homotoxikologie

Die klassische Homöopathie nach Hahnemann (1811) orientiert sich zur Therapiefindung am sogenannten. Arzneimittelbild. Es besagt, daß sich Krankheitssymptome spiegelbildlich zu solchen Arzneisymptomen verhalten, die gesunde Probanden nach Einnahme einer Urtinktur oder Potenz entwickeln. Das daraus ableitbare Wirkprinzip ist die *Simile-Regel* (Similia similibus curentur = Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden): Das bei einem Kranken auftretende Krankheitsbild kann durch eine künstlich erzeugte, ähnliche Krankheit ausgelöscht werden. Es kann auch nach einem Aequale-Prinzip (*Isopathie* = Gleiches soll durch Gleiches geheilt werden) vorgegangen werden, wie dies mit potenzierten allopathischen Substanzen oder zum Teil Nosoden in der Antihomotoxischen Medizin erfolgt bzw. mit Vakzinen oder Impfstoffen in der konventionellen Medizin durchgeführt wird.

Die klassische Homöopathie arbeitet mit Einzelmitteln, die jedoch nur zum Teil echte Einzelmittel sind (z.B. Schwefel, Quecksilber, Arsen usw.), sonst jedoch als Auszüge einzelner Pflanzen ein hochkomplexes Gemisch zahlreicher Inhaltsstoffe darstellen. Repertorien (Auflistung von Arzneimittelbildern) erleichtern dem Homöopathen die Zuordnung zu dem jeweils individuellen Krankheitsbild.

In der Antihomotoxischen Medizin wird meist indikationsbezogen (Orientierung an objektiven Symptomen) vorgegangen. Die Antihomotoxischen Arzneimittel stellen überwiegend Substanzgemische niedriger bis mittlerer Potenzen dar.

Bei der praktischen Anwendung des homöopathischen Heilprinzips ergab sich von selbst, daß die Anwendung von sehr kräftigen oder giftigen Urtinkturen dem Kranken schaden können und daher nur in homöopathischen Verdünnungen, d.h. Potenzierungen, verwendet werden dürfen. Diese Praxis wurde wissenschaftlich von Rudolf Arndt (Psychiater, 1835–1900) und Hugo Schulz (Pharmakologe, 1853-1932) durch eine quantitative Differenzierung der Arzneimittelwirkung auf Biosysteme untermauert und hat als *Arndt-Schulz-Regel* (biologisches Grundgesetz) nach wie vor Gültigkeit. Es besagt:

Schwache Reize regen die Lebensfunktionen an (Umkehreffekt homöopathischer Präparate)
mittelstarke Reize verhalten sich neutral starke wirken hemmend,
stärkste heben die Lebensfunktionen auf.

Da bei Entwicklung einer Krankheit zumeist mehrere gewebeunverträgliche Substanzen beteiligt sind, ist die gleichzeitige Anwendung mehrerer potenzierter „Gegengifte“, wie sie in den Antihomotoxischen Präparaten vorliegen, gerechtfertigt.

Die Homotoxikologie wurde von Hans-Heinrich Reckeweg begründet (Reckeweg, 1976):
„Nach der Homotoxinlehre sind alle jene Vorgänge, Zustandsbilder und Erscheinungen, die wir als Krankheiten bezeichnen, der Ausdruck dessen, daß der Körper mit Giften kämpft und daß er diese Gifte unschädlich machen und ausscheiden will. Entweder gewinnt dabei der Körper oder er verliert den Kampf. Stets aber handelt es sich bei jenen Vorgängen, die wir als Krankheiten bezeichnen, um biologische, d.h. naturgerechte Zweckmäßigkeitsvorgänge, die der Giftabwehr und Entgiftung dienen.“

Die körpereigene zelluläre Abwehr enthält eine unspezifische Komponente (zusammengefaßt als das retikuloendotheliale System [RES]; Makrophagen, neutrophile Granulozyten, kapilläre Endothelzellen mit der Eigenschaft von Makrophagen, z.B. in Leber, Knochenmark, Milz) und eine spezifische (T- und B-Lymphozyten) Komponente. Eine allgemeine Barrierefunktion gegenüber einer Vielzahl antigener Substanzen üben Epithelien und Gefäßendothelien aus. Das gleiche gilt für die Molekularsiebfunktion der extrazellulären Matrix.

3.1 Homotoxine

Unter dem Begriff Homotoxine wurden von Reckeweg alle für den Menschen schädlichen Stoffe zusammengefaßt (Reckeweg, 1957). Denn nicht alle Schadstoffe und Gifte wirken bei allen Lebewesen gleich oder sind überhaupt giftig. Homotoxine können von außen zugeführt werden (exogene Homotoxine) oder im Körper selbst durch physiologische oder pathologische Reaktionen entstehen (endogene Homotoxine). Entsprechend der zunehmenden Zahl künstlicher organischer Verbindungen in allen Lebensbereichen, steigt auch die Bedeutung der Homotoxine.

3.2 Phasenlehre, biologischer Schnitt, Vikariationsprinzip

Es ist das Verdienst Reckewegs, die Reaktionen des Körpers gegen ihn bedrohende Schadstoffe (Homotoxine) in ein morphologisch-zeitliches Gefüge von sechs abgestuften Phasen gegliedert zu haben

1. Exkretionsphase
2. Inflammationsphase
3. Depositionsphase
4. Imprägnationsphase
5. Degenerationsphase
6. Dedifferenzierungsphase

Abb. 1 Phasentabelle



Als übergeordnetes Prinzip läßt sich eine funktionelle Dreiteilung in *humorale Phasen* (1 und 2), *Matrixphasen* (3 und 4) und *zelluläre Phasen* (5 und 6) erkennen (Abb. 1)

Der biologische Schnitt liegt zwischen den Matrixphasen 3 und 4. Dies hebt die Bedeutung der Matrix als Mittlerin zwischen humoralen und zellulären Phasen besonders hervor.

Der biologische Schnitt markiert letztlich die Grenze ganzheitlicher Regulation eines Organismus mit der Gefahr des Übergangs in eine zunehmende regulatorische Entkopplung seiner Subsysteme, z.B. Verlust der regulatorischen Kopplung zwischen Hormon- und Immunsystem (chronische Krankheiten) bis hin zur Entkopplung von Zellfunktionen (z.B. Aufheben des genetisch programmierten Zelltods [Apoptose] bei Tumoren).

Der biologische Schnitt ist auch für das Verständnis des *Vikariationsprinzips* der Antihomotoxischen Medizin unerläßlich. Das Prinzip besagt, daß ein Krankheitsbild sich unter einer Therapie dann bessert oder als geheilt gelten kann, wenn die einzelnen Phasen rückläufig bis einschließlich der Exkretionsphase durchschritten worden sind (*regressive Vikariation*), ein Verharren in einzelnen Phasen ist dabei möglich. Eine *progressive Vikariation* bedeutet dagegen Verschlechterung des Zustandes.

3.3 Antihomotoxische Arzneimittel

Es lassen sich vier Gruppen Antihomotoxischer Arzneimittel unterscheiden:

Kombinationspräparate, bestehend aus mehreren potenzierten Einzelmitteln und Einzelsubstanzen (Niedrig- bis Hochpotenzen)

Potenzenaccorde verschiedener homöopathischer Einzelmittel (Potenzenaccorde tragen den Zusatz „Injeel“ und „forte“). Sie enthalten höhere und Hochpotenzen, um mögliche Erstreaktionen abzudämpfen.

Homaccorde. Sie werden durch Kombination von Potenzenaccorden verschiedener homöopathischer Einzelmittel hergestellt, die zu einem fixen Kombinationspräparat vereint sind.

Einzelpotenzen von verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln.

Die Darreichungsformen sind Injektionslösungen, Tabletten, Tropfen, Zäpfchen und Salben.

3.4 Wirkprinzipien der Antihomotoxischen Medizin

Jeder Organismus benötigt zur Aufrechterhaltung seiner vitalen Funktionen Energie, die durch den Stoffwechsel fortlaufend bereitgestellt werden muß. Störungen des Energiestoffwechsels beeinträchtigen deshalb stets auch die Energieversorgung, die von der endogenen Regulation gesteuert wird.

Der Organismus ist ein energetisch offenes System – geeignete Energie muß (in Form von Nahrungsmitteln) zugeführt, ungeeignete abgeführt werden. Auf diese Weise läßt sich ein labiler Ordnungszustand, fernab von einem thermodynamischen Gleichgewicht, über längere Zeit („Lebensspanne“) erhalten.

Alle Reaktionen von Organismen laufen im wässrigen Milieu bei relativ niedriger Temperatur ab, deshalb müssen sie beschleunigt, d.h. katalysiert werden.

• SYSTEM DER GRUNDREGULATION

Voraussetzung für eine effektive Katalyse sind geeignete Substrate zwischen und in den Zellen. Da der Extrazellulärraum den Zellen vorgeschaltet ist, können die Zellen nur so reagieren, wie sie über den Extrazellulärraum informiert werden. Die dynamische Struktur des Extrazellulärraumes und dessen Regelung („Grundregulation“) entscheidet daher über die Effektivität extra- und intrazellulärer Katalysen. Dies hängt von der Struktur der Grundsubstanz (extrazelluläre Matrix bzw. Matrix) ab. Sie stellt in allen Zellen und Zellverbänden ein Molekularsieb aus Matrixkomponenten dar, wie hochpolymere Zuckerprotein- und Zuckerkomplexe (Proteglykane-Glykosaminoglykane, PG/GAGs), Strukturproteine (Kollagen, Elastin) und Vernetzungsglykoproteine (z.B. Fibronektin) (Abb. 2). Die PG/GAGs sind elektro-

negativ geladen und daher zur Wasserbindung, aber auch Ionenaustausch befähigt. Sie sind daher die Garanten für Isoionie, Isoosmie und Isotonie in der Matrix.
Über die blind in der Matrix endigenden vegetativen Nervenfasern erfolgt der Anschluß an das Zentralnervensystem, über die die Matrix durchsetzende Endstrombahn an das System der innersekretorischen Drüsen (Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren u.a.m.). Beide Systeme sind im Gehirnstamm miteinander verbunden und an übergeordnete Zentren des Gehirns angeschlossen (Abb. 2). Auf diese Weise wird in der Matrix nicht nur vor Ort, sondern auch stets unter dem Einfluß übergeordneter Steuergebiete geregelt. Regelzentrum in der Matrix ist der Fibroblast (im Zentralnervensystem entspricht ihm die Gliazelle). Auf alle eingehenden Informationen (Hormone, Neurosubstanzen, Metaboliten, Kataboliten, pH-Wert-Änderungen u.a.m.) reagiert er sofort mit einer situationsgerechten Synthese von Matrixkomponenten. Dabei unterscheidet er nicht zwischen „guter“ oder „böser“ Information. Auf diese Weise kann jedes Zuviel oder Zuwenig in individueller Abhängigkeit in einen Circulus vitiosus mit u.U. deletären Folgen für das Gesamtsystem führen.

Wichtig dabei ist, daß aufgrund der Sieb- wie auch Bindungseigenschaften der PG/GAGs immer auch die Gefahr der Verschlackung der Matrix besteht, mit Entwicklung einer latenten Gewebsazidose, Anstieg freier Radikale und Aktivierung des proteolytischen Systems mit Übergang in eine proinflammatorische Situation. Letztlich können Schädigungen aller humoralen und zellulären Elemente auftreten, mit Fortschreiten von zunächst anhaltenden Befindensstörungen zu chronischen Krankheiten und malignem Geschehen.



Abb. 2 Schema der Grundregulation

Wechselseitige Beziehungen (Pfeile) zwischen Endstrombahn (Kapillaren, Lymphgefäße), Grundsubstanz, terminalen vegetativen Axonen, Bindegewebszellen (Mastzellen, Abwehrzellen, Fibroblasen usw.) und Organparenchymzellen. Epitheliale und endotheliale Zellverbände sind von einer zur Grundsubstanz vermittelnden Basalmembran unterlagert. Jede Zelloberfläche trägt einen mit der Grundsubstanz verbundenen Glykoprotein- und -lipidfilm (gepunktete Linie), wozu auch die Histokompatibilitätskomplexe (MHC) gehören. Die Grundsubstanz ist über die Endstrombahn an das Endokrinium, über die Axone an das ZNS angeschlossen. Der Fibroblast ist das stoffwechselaktive Zentrum. (aus 3)

3.5 Literatur

(1) Hahnemann S, Reine Arzneimittellehre. Dresden, 1811; ders.: Kleine med. Schriften, ges. und herausgegeben von D. Ernst Stapf, Dresden und Leipzig, 1829; ders.: Unterricht für Wundärzte. Leipzig, 1789; ders.: Die chronischen Krankheiten. Dresden und Leipzig, 1835; ders.: Organon der Heilkunst. Dresden und Leipzig, 1829.

(2) Harisch H, Dittmann J. Untersuchungen zur Wirkung von Ubichinon Injeel und Injeel forte mit zellfreien Systemen. Biol Med 1997; 26(3):99-104

(3) Heine H. Lehrbuch der biologischen Medizin. 2. Auflage Stuttgart: Hippokrates 1997a

(4) Reckeweg H.-H. Homotoxikologie. Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin. Baden-Baden: Aurelia, 1976

(5) Reckeweg H.-H. Materia medica: homeopathia antihomotoxica. 3rd rev. English ed. Baden-Baden: Aurelia-Verlag, 1996.

3.6 Forschung in der Homotoxikologie

Entscheidende Beiträge zur wissenschaftlichen Fundamentierung der Homöopathie leistet die Firma Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden. Im Fokus einer starken Forschungsabteilung und internationalen Kooperationen mit Instituten und Experten stehen bei Heel vorrangig zwei Ziele:

1. Nachweis der Präparate-Wirksamkeit

2.Entschlüsselung der Wirkmechanismen durchGrundlagenforschung

Aus beiden Feldern gibt es laufend neue Ergebnisse, die regelmäßig publiziert werden. Sie liefern gesicherte Argumente in der Diskussion um die Belegbarkeit der Homöopathie – systematisch und aktuell.

Von Hahnemann zu moderner Forschung
Die Simile-Regel von Hahnemann besagt, dass eine Substanz bestimmte Symptome beim Gesunden hervorrufen kann, die in „Verdünnung" (Potenzierung) gegeben, bei Kranken „ähnliche" Symptome kurieren kann.

Grundlage jeder homöopathischen Therapie sind deshalb Arzneimittelbilder der Einzelmittel, die ausführliche Sammlungen von Symptomen darstellen. In dieser klar definierten Form war die Arzneimittelprüfung am Gesunden zu Hahnemanns Zeit revolutionär und hatte als wissenschaftliches Experiment bereits Grundzüge der heutigen Arzneimittelforschung.

Auch heute, nach über 200 Jahren Therapiegeschichte in der Homöopathie, fühlt sich die Homotoxikologie dieser Grundlage verpflichtet. Allerdings ebenso unter Einbeziehung der modernen Pharmazie und Medizin.

Homöopathische Arzneimittelprüfungen sind keine undefinierten Versuche, sondern klinische Prüfungen an gesunden Probanden. Sie entsprechen internationalen Vorschriften wie EU-Directives und CPMP/ICH-Guidelines, der Deklaration von Helsinki, der Berufsordnung der Ärzte sowie dem arzneimittelrechtlichen Vorgehen.

Die klinischen Studien entsprechen den Good Clinical Practice Guidelines. Sie regeln für klinische Prüfungen Planung, Durchführung und Dokumentation und stellen die Glaubwürdigkeit der Daten sowie die Rechte der Probanden und Patienten sicher.

Ziel der Forschung ist, neue Perspektiven in die Medizin zu bringen. So werden Wirksamkeitsstudien durchgeführt, in denen die Homöopathika mit allopathischen Arzneimitteln verglichen werden. Der wissenschaftliche Nachweis der Ersetzbarkeit chemischer Substanzen durch Homöopathika ist in der Homotoxikologie ein großes Anliegen (und schon mehrfach gelungen). Zweiter Ansatz der Generierung neuer Sichtbilder in der Medizin ist die Grundlagenforschung. Auch hier ist Heel seit Jahren aktiv und liefert wegweisende Ergebnisse – für die erfolgreiche und sichere Therapie.

Wirksamkeitsnachweise

Die Antihomotoxischen Kombinationsarzneimittel sind auf die Gesetzmäßigkeiten der Homotoxikologie zugeschnitten. Charakteristisch für diese Arzneimittel ist ein Effekt in drei Bereichen, der in der Summe die therapeutische Wirksamkeit ausmacht. Das sind:

1. Matrix entgiftendes Potential („Homotoxin-Ausleitung")

2. organstärkendes Potential

3. immunmodulierendes Potential

Das Matrix entgiftende Potential bedingte historisch die Sammelbezeichnung „Antihomotoxika". Die wissenschaftliche Verifizierung aller drei bislang empirisch ermittelten Effekte ist Gegenstand der Grundlagenforschung.

Für den Nachweis der klinischen Wirksamkeit werden neben den homöopathischen Arzneimittelprüfungen eine Vielzahl von Studien durchgeführt. Fragestellungen der Studien sind die bewährten Indikationen. Zwei Arten von Untersuchungen sind von besonderer Bedeutung:

Anwendungsbeobachtung (AWB): Bei diesem Studientyp werden große Fallzahlen (hundert bis zigtausend Patienten) erfasst und mit Hilfe statistischer Methoden deskriptiv ausgewertet. Ziel ist, statistisch valide Aussagen zu bestimmten Merkmalen wie Verträglichkeit oder Sicherheit zu bekommen. Auch Ereignisse, die erst eine Langzeituntersuchung an den Tag bringt, sind die Spezialität der AWB.

Klinische Studie: Sie ist eine von der Schulmedizin anerkannte wissenschaftliche Methode, die unter kontrollierten Bedingungen die Wirksamkeit eines Präparates nachweisen kann. In der Antihomotoxischen Medizin wurden in den letzten 10 Jahren eine Reihe von klinischen Studien zu verschiedenen Präparaten durchgeführt und publiziert.

ERGEBNISSE AKTUELLER KLINISCHER STUDIEN:

Im folgenden werden aktuelle Studien, die Ergebnisse und vor allem deren große Bedeutung für die Therapie beschrieben:

Euphorbium compositum-Nasentropfen S erfolgreich gegen chronische Sinusitis

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S bei chronischer Sinusitis.

Design: Randomisierte, plazebokontrollierte Doppelblindstudie über fünf Monate.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 173 Patienten mit gesicherter chronisch-rezidivierender Sinusitis. 155 konnten in die Auswertung einbezogen werden. Die Patienten erhielten 4x2 Sprühstöße Verum bzw. Plazebo in jedes Nasenloch täglich. Ausgeschlossen waren Raucher, Patienten mit Polyposis, nicht-sanierten Wurzelgranulomen, infektiöser Rhinitis, odontogener Genese der Sinusitis und chirurgische Sanierung im letzten halben Jahr.

Ergebnisse: Verglichen wurde ein Summenscore zu den drei Bereichen „Subjektive Beschwerden (Tag/Nacht)",„Vordere Rhinoskopie" und „Ultraschalluntersuchung der Nasennebenhöhle". Der statistische Vergleich der Behandlungsgruppen zeigte eine signifikante Überlegenheit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S.

Die deutlichsten Verbesserungen traten bei Atembehinderung, Druckgefühl und Kopfschmerz auf. Die Verträglichkeit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S war gut.

Schlußfolgerung: Die Studie belegt die Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S bei chronischer Sinusitis. – und zwar auf höchstem Methodenstandard (doppelblind, placebokontrolliert)!

* Weiser M, Clasen BPE: Randomisierte plazebokontrollierte Doppelblindstudie zur Untersuchung der klinischen Wirksamkeit der homöopathischen „Euphorbium compositum-Nasentropfen S" bei chronischer Sinusitis. Forsch Komplementärmed 1994; 1: 251-259

Vertigoheel überzeugend im Vergleich mit Betahistin bei Schwindel

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Vertigoheel im Vergleich zu Betahistin bei Schwindel verschiedener Genese.

Design: Randomisierte, doppelblinde Äquivalenzstudie über 6 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 119 Patienten mit Schwindel verschiedener Genese (105 wurden statistisch ausgewertet). Gemessen wurden Frequenz, Stärke und Dauer der Schwindelattacken (Wei-Lachin- bzw. Mann-Whitney-Test). Eingesetzt wurde entweder Vertigoheel oder Betahistin in 3x tgl. 15 Tropfen bzw. 18 mg tgl. in 3 geteilter Dosis (jeweils Verum/Placebo bzw. umgekehrt in double-dummy-Technik).

Ergebnisse: Beide Gruppen zeigten eine statistisch signifikante und klinische relevante Reduktion von Frequenz, Stärke und Dauer der Schwindelattacken. Die Verträglichkeit der Prüfpräparate war gut.

Schlussfolgerung: Die Studie bestätigt eindrucksvoll, was schon längst in der Praxis umgesetzt wird: Vertigoheel ist ein wirksames Arzneimittel gegen Schwindel – aus gutem Grund das am meisten verordnete Präparat in dieser Indikation !

* Weiser M, Strösser W, Klein P: Homeopathic vs Conventional Treatment of Vertigo – A Randomized Double-blind Controlled Clinical Study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg/Vol 124, Aug 1998: 879-885

Luffeel comp. Heuschnupfenspray ebenso wirksam wie Cromoglicinsäure bei allergischer Rhinitis

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Luffa comp.-Heel Nasentropfen bei Heuschnupfen im Vergleich zur intranasalen Therapie mit Cromoglicinsäure.

Design: Randomisierte, doppelblinde Äquivalenzstudie über 6 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 146 Patienten mit Heuschnupfen. Luffa comp.-Heel Nasentropfen bzw. Cromoglicinsäure wurden 4mal täglich eingesetzt. Zielkriterium der Wirksamkeit war die

Lebensqualität, erfasst mittels des Rhinokonjunktivitis-Lebensqualitäts-Fragebogens (RQLQ). Die Verträglichkeit der Prüfmedikation wurde mittels Globalbeurteilung, Rhinoskopie, Erfassung unerwünschter Ereignisse und mit Hilfe von Vital- und Laborparameter erfasst.

Ergebnisse: Erzielt wurde ein rascher und nachhaltiger Effekt, der unabhängig vom applizierten Präparat zur fast vollständigen Remission der Heuschnupfensymptome führte. Der RQLQ-Gesamtscore verbesserte sich signifikant, wobei therapeutische Äquivalenz zwischen beiden Arzneimitteln vorlag. Unerwünschte systemische Wirkungen traten nicht auf.

Schlußfolgerung: Für den Heuschnupfen gibt es ein nachgewiesen verlässliches Nasenspray auf homöopathischer Basis. Ebenso wirksam wie die herkömmliche Therapie mit Cromoglicinsäure und sehr gut verträglich.

* Weiser M, Gegenheimer LH, Klein P: A Randomized Equivalence Trial Comparing the Efficacy and Safety of Luffa comp.-Heel Nasal Spray with Cromolyn Sodium Spray in the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis. Forsch Komplementärmed 1999; 6:142-148.

Zeel comp. so effektiv wie Hyaluronsäure bei Kniearthrose

Fragestellung: Untersuchung der Wirksamkeit von Zeel comp. im Vergleich zu Hyaloronsäure bei mittelschwerer Kniearthrose.

Design: Randomisierte, einfachblinde klinische Äquivalenzstudie über 5 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 121 Patienten mit mittelschwerer Kniearthrose. 114 Patienten kamen in die statistische Auswertung. Sie erhielten entweder Zeel comp. (2 ml 2x wöchentlich oder Hyaluronsäure (2 ml 1x wöchentlich) als intraartikuläre Injektion.

Ergebnisse: Gemessen wurde das subjektive Schmerzempfinden mittels standardisierter visueller Analogskala (VAS) als primäres Zielkriterium. Die arthrotischen Beschwerden nahmen in beiden Gruppen deutlich ab. Die therapeutische Wirksamkeit von Zeel comp. und Hyalart erwies sich als äquivalent. Nebenwirkungen (lokale Reizerscheinungen) traten in 6 (Zeel) bzw. 13 (Hyaluronsäure) Fällen auf.

Schlußfolgerung: Die Ergebnisse belegen die Gleichwertigkeit von Zeel comp. mit Hyaluronsäure. Besonders interessant war, dass die Wirksamkeit von Zeel comp. auch bei starken Schmerzen mit jener von Hyaluronsäure gleichzusetzen ist.

* Nahler G, Metelmann H, Sperber H: Behandlung der Gonarthrose mit Zeel comp. – Ergebnisse einer randomisierten, kontrollierten klinischen Prüfung im Vergleich zu Hyaluronsäure. Orthopäd Prax 1996; 5: 354-359

Zeel comp. sensationell gut im Vergleich mit Diclofenac bei Kniearthrose

Fragestellung: Untersuchung der Wirksamkeit von Zeel comp. im Vergleich zu Diclofenac bei leichter bis mittelschwerer Kniearthrose.

Design: Randomisierte, doppelblinde Äquivalenzstudie über 10 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 121 Patienten mit leichter bis mittelschwerer Kniearthrose. Sie erhielten entweder Zeel comp. oder Diclofenac 25 (je 3x1 Tablette/Tag).

Ergebnisse: Die Reduktion des als Hauptzielgröße definierten WOMAC-Arthroseindex nach 6 Wochen Therapie betrug im Mittel 26% unter Zeel comp. und 35% unter Diclofenac (auf Analogskala). Der konfirmatorische Test auf Gleichheit ergab äquivalente Wirksamkeit beider Präparate. Für die globale Beurteilung der Wirksamkeit durch Arzt und Patient am Ende der Studie bestand ebenfalls Gleichheit. Die Verträglichkeit der Prüfpräparate war gut.

Schlußfolgerung: Ein herausragendes Ergebnis: Zeel comp. hat die gleiche Wirksamkeit wie Diclofenac in der beschriebenen Indikation. Damit ist die Behandlung der Gonarthrose auf einer neuen Basis möglich.

* Maronna U, Weiser M, Klein P: Orale Behandlung der Gonarthrose mit Zeel comp. – Ergebnisse einer doppelblinden Äquivalenzstudie versus Diclofenac. Orthopäd Prax 2000; 36 (5):285-291

Traumeel S senkt deutlich Begleitfolgen von Chemotherapie

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Traumeel S bei Chemotherapie-induzierter Stomatitis bei Kindern.

Design: Radomisierte, plazebokontrollierte Studie über 4 Wochen.

Patienten/Methode: 32 Patienten (3-25 Jahre) erhielten nach der Stammzelltransplantation entweder Traumeel S oder Plazebo (5x tgl. für mindestens 14 Tage bei oraler Anwendung). Der Stomatitis-Score wurde gemäß der WHO-Einteilung für Mukositis vorgenommen.

Ergebnisse: Bei 33% der Traumeel-Patienten konnte eine Stomatitis verhindert werden, im Gegensatz zu 7% in der Placebo-Gruppe. Eine schwere Stomatitis trat bei 93% der Mitglieder in der Plazebo-Gruppe auf, während es bei Traumeel-Gabe nur 47% waren. Der Stomatitis-Score war mit 10.4 bei Traumeel S gegenüber 24.3 bei Plazebo signifikant besser.

Schlussfolgerung: Mit Traumeel S können Häufigkeit und Schwere der bei Chemotherapie auftretenden Stomatiden deutlich vermindert werden. Ein Riesenplus für die Lebensqualität – vor allem auch bei Kindern.

* Oberbaum M et al: The Homeopathic Medication Traumeel S as a Treatment for Chemotherapy-induced Stomatitis. Publikation in Vorbereitung

Grundlagenforschung:

Im folgenden werden Studien und Erkenntnissen auf den Gebiet der homöopathischen Grundlagenforschung vorgestellt:

Regulationsstörungen auf der Spur

Ein Thema – auch für die Homöopathie – ist die Frage nach den Wirkmechanismen. Heel bearbeitet dieses Thema vor allem für Tief- und Mittelpotenzen, d.h. dem in den Antihomotoxika vorkommenden Bereich. Vom Ansatz her bieten sich dazu die klassischen Methoden der pharmakologischen Grundlagenforschung an. Sie sind zudem wissenschaftlich etabliert und die Ergebnisse werden allgemein anerkannt.

Ein Großteil der Erkrankungen „zivilisatorischen" Ursprungs sind chronisch-entzündliche Prozesse. Ursache ist meist eine Störung der Regulation des Immunsystems. Die Regulation erfolgt hauptsächlich durch die Zellen des Immunsystems selbst. Und zwar durch Freisetzung einer Vielzahl von Mediatoren bzw. Cytokinen. Insgesamt steht für die Regulation ein komplexes durch Cytokin-Signale auf verschiedenen Zellebenen rückgekoppeltes Netzwerk zur Verfügung.

Antihomotoxika zeigen bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen oft besonders günstige Therapierfolge. Es lag daher nahe, zu vermuten, dass ein Wirkmechanismus der Präparate auf der Korrektur von Dysbalancen im Cytokin-Netzwerk beruht.

Zur wissenschaftlichen Klärung der Hypothese wurde das Immunsystem genutzt. Es bietet zur Erforschung derartiger Mechanismen gute Bedingungen. So ist seine hohe Sensitivität Voraussetzung für die Reaktion auf sehr gering konzentrierte Stoffe, wie sie z.B. in den Antihomotoxika vorkommen (niedrige bis mittlere Potenzen).

Der zweite Vorteil ist, dass sich durch einfache Blutentnahme ein repräsentativer Teil des Immunsystems gewinnen und unter weitgehend physiologischen Kulturbedingungen züchten lässt. In Zellkulturen lassen sich Bedingungen schaffen, wie sie während Immunabwehr-Reaktionen auch zu finden sind. Gibt man hierzu die zu prüfenden Arzneimittel, so können damit Hinweise für den Wirkmechanismus im Bereich des Immunsystems gewonnen werden.

Wirkung auf das Immunsystem

Ergebnisse aus Labor-Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass in vielen Fällen das Immunsystem Ziel der therapeutischen Wirkung Antihomotoxischer Medikamente bzw. deren Inhaltsstoffe ist. Antihomotoxika führen offenbar zu einer Modulation unterschiedlicher Regulationsschleifen zwischen verschiedenen Arten von Leukozyten. Ob die über Cytokine übermittelten Signale bereits auf der Ebene ihrer Entstehung abgeschwächt oder verstärkt werden ist abhängig davon, um welche Inhaltsstoffe es sich handelt.

Die beobachteten Wirkungen weisen je nach Spender (individuelle Wirkungsentfaltung, wie von der klassischen Homöopathie postuliert) und Ausgangszustand des Immunsystems deutliche Unterschiede auf. Aufgrund der Vielzahl von Untersuchungen können zwei Eigenschaften der Inhaltsstoffe Antihomotoxischer Arzneimittel als grundlegend für ihre Wirkung angesehen werden:

1. Antihomotoxika besitzen verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur von Regulationsvorgängen
2. und können auf die Gegebenheiten des zu beeinflussenden Systems individuell reagieren.

Damit unterscheiden sich Antihomotoxische Präparate gravierend von chemisch definierten Präparaten, die gegen entzündliche Prozesse eingesetzt werden. Eine in-vivo-Untersuchung konnte die im Labor ermittelten Ergebnisse bestätigten. So wurde gezeigt, dass Traumeel S

die Freisetzung von immunregulativen Botenstoffen im Gesamtorganismus* beeinflusst. Ein Resultat, das glänzend die therapeutische Leistungen von Traumeel S z.B. im Bereich Sportverletzungen oder Arthritis (mit)erklärt.

* Conforti A et al: Experimentelle Untersuchungen zur entzündungshemmenden Wirkung eines homöopathischen Kombinationspräparates. Deut Zeitschrft f Sportmed 1997; 10:400-401

Immunmodulation

1998 wurde von Heine die Theorie entwickelt, dass Antihomotoxika über die beschriebene Immunmodulation hinaus einen von Weiner beschriebenen Regulationsmechanismus, die sog. Bystander-Reaction, anstoßen. Der Mechanismus soll auf Th3-Lymphozyten, zurückgehen, die gewebespezifisch den hemmenden Botenstoff TGF-ß freisetzen und damit Entzündungsabläufe herunter regulieren. Der Gewebespezifität käme bei gezielter therapeutischer Nutzung dieses Prinzips der Entzündungshemmung große Bedeutung zu.

Bis heute konnten viele Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass die Freisetzung von TGF-ß durch Inhaltsstoffe von Antihomotoxika gesteigert werden kann*. Weitere Untersuchungen werden derzeit durchgeführt, um zu prüfen, ob dies einer Induktion der Bystander-Reaction entspricht und wie diese sinnvoll in therapeutische Konzepte eingepasst werden kann.

Alle bisherigen Befunde sprechen dafür, dass die Immunmodulation eines der wesentlichen therapeutischen Prinzipien in der Antihomotoxischen Therapie** ist. Erste Bestätigung für das Funktionieren in vivo konnten 1999 in einer Pilot-Studie gewonnen werden (perorale Verabreichung eines Antihomotoxikums an gesunde Probanden). Eine klinische Studie konnte die Hypothesen aus den Pilotstudien bestätigen und statistisch absichern***.

* Heine H, Schmolz M: Immunologische Beistandsreaktion durch pflanzliche Extrakte. Biol Med 1998; 27 (4):12-27

** Heine H, Schmolz M: Immunoregulation via „bystander suppression" needs minute amounts of substances – a basic for homeopathic therapy? Med Hypoth 2000; 54 (3):392-393

*** Heine H, Schmolz M: Influence of herbal homeopathic extracts on the synthesis of TGF-ß1 in human whole blood cultures. Zur Publikation eingereicht

Virushemmende Eigenschaft

Untersuchungen über grundlegende Wirkeffekte können auch von vornherein eine sehr therapeutische Orientierung haben. So z.B. eine Studie mit Euphorbium compositum Nasentropfen S. Das Nasenspray wird erfolgreich bei viralen Infekten der Atemwege eingesetzt. Neben nachgewiesenen immunmodulatorischen* Eigenschaften wurde deshalb geprüft, ob das Präparat zusätzlich die Vermehrung von Viren des Respirationstrakts hemmen kann. Das konnte in Untersuchungen mit Infektionsmodellen an Zellkulturen bestätigt werden**.

Damit wird klar, dass sich im Präparat unterschiedliche Wirkungen auf der Nasenschleimhaut zu einem sinnvollen Gesamtkonzept ergänzen. Angesichts der Vielfalt an positiven Effekten kann angenommen werden, dass Tests in anderen Systemen, beispielsweise an Kulturen von Schleimhautzellen, weitere therapierelevante Effekte zeigen.

Vorstellbar ist, dass sich das entgiftende Potential der Antihomotoxika auf zelluläre Schutzmechanismen erkrankter Gewebe zurückführen lässt. Für die Schleimhaut könnte dies eine gesteigerte Produktion von Sekreten oder Schutzfaktoren (z.B. IgA) sein.

* Schmolz M, Metelmann H: Einzelkomponenten eine homöopathischen Komplexmittels zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen der Nase modulieren die Zytokinsyntheses menschlicher Leukozyten. Biol Med 1998; 27 (4):155-158

** Metelmann H, Glatthaar-Saalmüller B: Die antivirale Wirkung von Euphorbium compositum S. Biol Med 1999; 28 (3):142-146

Wirkung auf molekularer Ebene

Eine grundlegende Ebene zur Untersuchung der Wirkmechanismen homöopathisch zubereiteter Arzneimittel ist der Molekülbereich. Zwei grundlegende Fragen waren hier im Mittelpunkt von Untersuchungen:

1. Lassen sich Unterschiede zwischen Potenzierungen und nur einfach verdünnten Wirksubstanzen nachweisen?
2. Lassen sich Wirkunterschiede zwischen verschiedenen Potenzen nachweisen.

Antworten dazu gab es aus der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover von Harisch und Dittmann, die für die Homöopathie von ausschlaggebendem Interesse sind.

So war eindeutig belegbar, dass Potenz und konzentrationsgleiche Verdünnung auf Enzym- und molekularer Strukturebene unterschiedliche Wirkung besitzen.

Zum zweiten wurde der Nachweis erbracht, dass Homöopathika die katalytische Aktivität bestimmter Enzyme beeinflussen. Besonders interessant war, dass sich keine lineare Abhängigkeit zwischen verschiedenen Potenzen und ihrem Wirkeffekt ergab. Was bedeutet, dass jede Potenz einen individuellen Einfluss hat.

Fast als revolutionäre Neusicht der Homöopathie sind diese Ergenisse bewertet worden – vor allem im Bereich der Schulmedizin.

Heel ist seit 1997 Kooperationspartner und Auftraggeber von Grundlagenforschung in Hannover – unter speziellen Fragestellungen. So wurde für Antihomotoxische Arzneimittel der Wirkunterschied zwischen Urtinktur und homöopathischer Dilution (Potenz) untersucht. Wieder wurden einzelne Enzyme mit Inhaltssubstanzen von Antihomotoxika inkubiert und das Ausmaß der enzymatischen Aktivität als Maß für den Wirkungsgrad der Probe herangezogen.

Es zeigten sich in diesen Experimenten unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem ob die Urtinktur des Einzelmittels lediglich verdünnt wurde oder als homöopathische Dilution vorlag*.

Eine besondere Sorte Antihomotoxischer Arzneimittel sind die Potenzenaccorde. Sie enthalten mehrere unterschiedlich hohe homöopathische Potenzen desselben Grundmittels in gleichen Teilen. Der Vorteil der Potenzenaccorde gegenüber ihren Einzelpotenzen wurde schon vor einiger Zeit durch in-vivo-Studien nachgewiesen**. Hervorzuheben ist die Wirksamkeit, die zu einen länger anhaltenden Therapieerfolg führt. Zudem sind Potenzenaccorde noch verträglicher als homöopathische Einzelmittel, da sie Erstverschlimmerungen verhindern können.

Zur Klärung der Frage, ob diese Überlegenheit der Potenzenakkorde gegenüber ihren Einzelpotenzen auch durch experimentelle Daten belegt werden kann, wurden Untersuchungen durchgeführt, die als in-vitro-Studien konzipiert waren***. Als Wirksubstanzen wurden c-AMP und Ubichinon verwendet.

Die besondere Wirkungsqualität der Potenzenaccorde wurde mit folgenden Einzelergebnissen bestätigt:

1. Potenzenaccorde besitzen ein eingeständiges Wirkungsprofil, das sie von ihren Einzelpotenzen unterscheidet.
2. Potenzenaccorde sind in ihrer inhibitorischen Wirkung ihren Einzelpotenzen überlegen.
3. Die Wirkung von Potenzenaccorden ist nicht mit der Summe der Wirkungen ihrer Einzelpotenzen identisch.

Besonders der zweite und dritte Punkt sind ein starkes Argument für den bevorzugten Einsatz von homöopathischen Kombinationen vor allem in der Praxis des niedergelassen Arztes.

* Harisch G, Dittmann J: In Vivo and in Vitro Studies on the Efficiency of Potenzied and Non Potentized Substances BT 1997; 15 (2):40-46

** Harisch G, Dittmann J: Untersuchungen zur Wirkung von Ubichinon Injeel und Injeel forte mit zellfreien Systemen. Biol. Med 1997 27 (3):99-104

*** Harisch G, Dittmann J: Wirkungsunterschiede zwischen Potenzenaccorden und ihren Einzelpotenzen. Biol Med 2000; 27 (1):18-23

Weitere Aussichten

Die Kernhypothesen der Homotoxikologie sind Gegenstand der Grundlagenforschung. Derzeit werden Modelle erarbeitet, die die wissenschaftliche Beweisführung für die postulierten Pathomechanismen ermöglichen können. Insbesondere sollen untersucht werden:

1. Mechanismus der negativen Matrixbeeinflussung durch Homotoxine („Verschlackung")
2. Mechanismus der positiven Matrixbeeinflussung durch Antihomotoxika (Homotoxin-Ausleitung)
3. Quantifizierung der Homotoxin-Ausleitung
4. Pathogenetische Phasenfolgen an Organsystemen
5. Pathohistologische Grundlagen der Phasenwechsel

Die Homotoxikologie ist eine regulativ auf den Organismus einwirkende Therapieform. Die konsequente Aufdeckung der dabei greifenden Mechanismen ist das Ziel der Grundlagenforschung. Endgültig soll erarbeitet werden, wie die verschiedenen Mechanismen im System Homotoxikologie ineinander greifen und welchen Stellenwert die Homotoxikologie damit für die Regulationsmedizin hat.

4 Therapie mit Biotherapeutika-Antihomotoxika-Heel

4.1 Differenzierung der antihomotoxischen Arzneimittel



Abb. 3 Das System der großen Abwehr (Reckeweg)

Im Mittelpunkt steht der unspezifisch reagierende Makrophage (Monozyt). Über Zellbotenstoffe, vor allem Zytokine und Wachstumsfaktoren erfolgt eine gegenseitige informative Rückkopplung zwischen der unspezifischen und spezifischen Komponente des Immunsystems (mit seinen zellulären T-Zell- und humoralen B-Zellsystem).
Eine vermittelnde Position nehmen die vor allem auf Antihomotoxika ansprechenden TH3-Lymphozyten ein („immunologische Beistandsreaktion“).
CSF koloniestimulierender Faktor, IFN-γ Interferon-gamma, IL Interleukine, TGF-β Transforming Growth Factor-beta, TH T-Helferzelle.

Die Firma Heel stellt für die antihomotoxische Therapie nach Dr. H.-H. Reckeweg folgende Arzneimittel zur Verfügung:

Kombinationspräparate
Spezialpräparate (z.B. Cralonin, Vertigoheel, Traumeel S etc.)
Homaccorde (z.B. Aconitum-Homaccord)
Composita-Präparate (z.B. Echinacea compositum SN)

Homöopathische Einzelmittel
Homöopathisierte Allopathika (z.B. Penicillin-Injeel)
Katalysatoren (z.B. Ubichinon-Injeel) inkl. der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Nosoden (z.B. Sinusitis-Nosode-Injeel)
Suis-Organpräparate (z.B. Cerebrum suis-Injeel)

4.2 Kombinationspräparate

• 4.2.1 SPEZIALPRÄPARATE

Die Spezialpräparate werden heute in jeder Praxis eingesetzt, unabhängig davon, ob sie naturheilkundlich ausgerichtet ist oder nicht. Auch Universitätskliniken greifen auf diesen Arzneimittelschatz zurück (z.B. Vertigoheel, Traumeel S).

Die nachfolgende Tabelle kann nur eine subjektive Auswahl aus dem reichhaltigen Sortiment der verfügbaren Spezialpräparate darstellen.

Abb. 4 Auswahl von Spezialpräparaten

Präparat	Hauptindikationen
Cralonin	Altersherz, Cor nervosum
Engystol	Grippe, fieberhafte Virusinfekte
Gripp-Heel	grippale Infekte
Lymphomyosot N	Lymphödem, Tonsilitis, Infektanfälligkeit
Rheuma-Heel	Weichteilrheumatismus
Spascupreel (S)	Koliken, Myogelosen
Spigelon	Kopfschmerzen
Traumeel S	Arthritis, Arthrosis, Sportverletzungen
Vertigoheel	Schwindel verschiedener Genese
Viburcol N	Fieber, banale Infekte, Unruhezustände
Ypsiloheel N	vegetative Dystonie, Globus hystericus
Zeel comp. N	Arthrose, Polyarthrose

• 4.2.2 HOMACCORDE

Homaccorde stehen sowohl als Dilution zur oralen Applikation als auch in Ampullenform zur Injektion zur Verfügung. Da die Homaccorde neben den Tiefpotenzen auch die Hochpotenzen der verwendeten Mittel als Potenzenakkord enthalten, werden sie insbesondere auch in der Therapie chronischer Erkrankungen eingesetzt.

Die Potenzen der einzelnen Bestandteile liegen bei den Ampullen im allgemeinen zwei bis drei Potenzen höher als bei den Liquidum-Formen der Homaccorde. Durch die hohen Potenzen im Homaccord werden mögliche Erstreaktionen abgedämpft, d.h. Erstverschlimmerungen sind eine Seltenheit.

• 4.2.3 COMPOSITA-PRÄPARATE

Um einerseits ein hochwirksames Präparat zur Verfügung zu haben, das andererseits risiko- und nebenwirkungsarm ist, war es erforderlich, zahlreiche homöopathische Einzelmittel, homöopathisierte Allopathika (siehe unten), intermediäre Katalysatoren (siehe unten) und evtl. Suis-Organpräparate (siehe unten) in einem Kombinationspräparat zu vereinigen.

Die Vielzahl der in den Composita-Präparaten enthaltenen Inhaltsstoffe bewirkt eine tiefe Breitenwirkung, da diese Therapeutika an verschiedenen Angriffspunkten ihre Wirkung entfalten.

4.3 Homöopathische Einzelmittel

Die homöopathischen Einzelmittel als Injeel (Injectiones Heel) und auch als Einzelpotenzen können i.v., i.m., s.c. oder i.c. (Segmenttherapie) injiziert werden. Alle Einzelmittel und Injeele können auch als Trinkampullen (siehe S. 47) verwendet werden, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern in Wasser oder Tee gegeben werden.

Bei den Injeelen sind in einer Ampulle mehrere Potenzen desselben Grundmittels nebeneinander als Potenzenaccord enthalten. Injeele enthalten meist als Basispotenz D10 oder D12, dazu gemischt zu gleichen Teilen D30 und D200. Injeele forte enthalten im allgemeinen (D4), D6, D12, D30 und D200, evtl. auch D1000 zu gleichen Teilen. Die bei Injeelen verwendete Potenzen (D4 bzw. D6 in der forte-Form und D10 bzw. D12 und höhere Potenzen im Potenzenaccord bei der normalen Injeel-Form) entsprechen gerade jenen Wirkungsbereichen, mit denen eine Steigerung der Giftabwehr erreicht werden kann. Bei diesen Potenzenaccorden wird der therapeutische Effekt der Basispotenz ausgenutzt, gleichzeitig wird durch die höheren Potenzen eine überschießende Wirkung verhindert und eine größere Breiten- und Tiefenwirkung erreicht.

Das Prinzip des Potenzenaccordes ist, daß evtl. durch tiefere Potenzen ausgelöste Arzneireaktionen durch die gleichzeitige Verabreichung höherer Potenzen gemildert und abgebaut werden können (Umkehrwirkung der Hochpotenzen).

Prinzipiell gilt, eine Behandlung mit einer gleichzeitigen Verabreichung von Einzelmittel-Injeelen, Katalysatoren und Spezialpräparaten zu beginnen. Die forte-Formen finden ihre Anwendung bei akuten und bereits organisch faßbaren Erkrankungen.

• 4.3.1 HOMÖOPATHISIERTE ALLOPATHIKA

Diese Präparate (siehe nachfolgende Tabelle) werden zur Behebung von Therapieschäden eingesetzt (isopathisches Prinzip). Ein Therapeutikum das zum Therapieschaden geführt hat, wird in höherer Verdünnung als Gegenmittel zur Behebung des Therapieschadens appliziert (isotherapeutisches Prinzip). Die homöopathisierten Allopathika werden mit ihrem „generic name“ bezeichnet.

Die homöopathisierten Allopathika können auch nach dem „Ähnlichkeits-Prinzip“ angewendet werden: Die Rezeptoren des Systems der Großen Abwehr sind durch das bereits Schäden hervorrufende Präparat schon besetzt und sprechen auf Präparate nach dem „Gleichheits-Prinzip“ nicht mehr an. Nach dem Simile-Gesetz (Ähnlichkeitsregel) werden mit dem Antihomotoxikum (= Simillimum) ähnliche, in Reserve liegende, zusätzliche Abwehrmechanismen angeregt.

Neben dem zum Therapieschaden führenden Präparat in homöopathisierter Form sollten auch noch andere ähnliche Wirkfaktoren eingesetzt werden: kann man Schäden, die z.B. durch Penicillin gesetzt wurden, nicht durch Penicillin-Injeel ausgleichen, wird man Streptomycin-Injeel forte oder Sulfonamid-Injeel forte versuchen.

Abb. 9 Liste der homöopathisierten Allopathika

Acetylsalicylsäure-Injeel	Gamma-Globulin-Injeel
Apomorphinum hydrochloricum-Injeel	Penicillin-Injeel + forte
Chloramphenicol-Injeel	Streptomycin-Injeel forte
Doxycyclin-Injeel	Sulfonamid-Injeel forte
Erythromycin-Injeel	Tetracyclin-Injeel forte

• 4.3.2 KATALYSATOREN

Der Einsatz von Katalysatoren des intermediären Stoffwechsels ist eine Besonderheit der antihomotoxischen Therapie. Die als intermediäre Katalysatoren bezeichneten Substanzen sind physiologische Bestandteile im Rahmen der Zellatmung und Energiegewinnung (Zitronensäurezyklus, Redoxsysteme). Zum Teil handelt es sich dabei auch um Substanzen, die bei sonstigen enzymatischen Umsetzungen gebildet werden bzw. bei solchen Vorgängen katalytisch wirksam werden.

Schädigungen von Enzymsystemen sind häufig iatrogener Natur, da vielen konventionellen Pharmaka die Beeinflussung von Enzymen als Wirkprinzip zugrunde liegt. Daneben werden gerade Enzyme in ihrer Wirkung durch die zunehmende Belastung aus der Umwelt (z.B. durch Schwermetalle oder Pestizide) beeinträchtigt. Durch den Ausfall einer Enzymfunktion kommt es sowohl zu einem Stau der vor der betreffenden enzymatischen Reaktion bereits vorhandenen Metaboliten als auch zu einem Mangel der nach dieser Reaktion zu verstoffwechselnden Substrate.

Die Verabreichung der entsprechenden Katalysatoren in homöopathischer Aufbereitung geschieht aus der Vorstellung heraus, daß dadurch das Stoffwechselgeschehen aktiviert wird sowie blockierte Zell- oder Enzymfunktionen wieder in Gang gesetzt werden. Da sich Enzymschäden vor allem als chronische bzw. degenerative Erkrankungen äußern, kommt der Einsatz dieser Präparategruppen deshalb in erster Linie auch bei solchen Erkrankungen in Betracht.

Katalysatoren sind Stoffe, die die Gleichgewichtseinstellung chemischer Reaktionen beschleunigen, ohne jedoch selbst in die Bilanz des Vorgangs einzugehen. Der Umfang, in welchem ein Katalysator eine Reaktion zu beschleunigen vermag, ist oftmals sehr eindrucksvoll. Nicht ungewöhnlich ist eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit um sechs Zehnerpotenzen, da ein einziges Enzymmolekül häufig mehr als 10 000 Substratmoleküle pro Sekunde umzusetzen vermag. Am Ende einer Reaktion stehen die Katalysatoren unverändert wieder zur Verfügung, um die gleiche Reaktion sofort am nächsten Molekül zu katalysieren. Der genannte Vorgang selbst wird als Katalyse bezeichnet. Sofern die Reaktionen in Biosystemen stattfinden, spricht man deshalb auch von „Biokatalysatoren“.

Die Katalyse kann durch Aktivatoren noch zusätzlich gesteigert, durch „Gifte“ (Homotoxine) aber auch herabgesetzt oder blockiert werden. Als intermediäre Katalysatoren werden häufig auch die Induktoren und Aktivatoren im Bereich des Intermediärstoffwechsels bezeichnet.

Die Drehscheibe des Stoffwechsels ist der Zitronensäurezyklus, er stellt den Hauptweg des katabolen Stoffwechsels des Pyruvats bzw. Acetyl-Coenzym A dar. Er ist ein grundlegender, bei Menschen, Tieren und Pflanzen in allen Zellen vorkommender, in sich geschlossener Reaktionsweg; in ihn münden die Spaltprodukte des Kohlenhydratstoffwechsels, des oxidativen Fettsäureabbaues und – nach Transaminierung – die des Eiweißstoffwechsels. Weiterhin liefert er wichtige Bausteine für Synthesen des Organismus. In Verbindung mit der Atmungskette ist der Zitronensäurezyklus gleichzeitig auch die bedeutendste Energiequelle des Stoffwechsels. Er liefert den Wasserstoff für die biologische Oxidation und ist dadurch eng mit dem Energiestoffwechsel der Zelle verknüpft.

Die Bausteine des Zitronensäurezyklus sind Acidum citricum (Zitronensäure), Acidum cis-aconiticum (cis-Aconitsäure), Axidum oxalsuccinicum (Oxalbernsteinsäure), Acidum α-ketoglutaricum (α-Ketoglutarsäure), Acidum succinicum (Bernsteinsäure), Acidum fumaricum (Fumarsäure), Acidum DL-malicum (Apfelsäure) und als Salz Natrium oxalaceticum (oxalessigsaures Natrium).

Einige Karbonsäuren kommen im Tier- und Pflanzenreich auch außerhalb des Zitratzyklus vor, z.B. als Fruchtsäuren, die Apfelsäure oder Zitronensäure. Die Umwandlung der Karbonsäuren in die jeweils im Zitratzyklus folgenden Karbonsäure wird durch Enzyme vermittelt. Die beteiligten Enzyme können nun aber durch Noxen bedingt gehemmt werden (z.B. kompetitive Hemmung, Endprodukthemmung, Substrathemmung), wobei solche Blockaden in Folge zu Konzentrationsänderungen einzelner Säuren des Zitratzyklus führen können. Dies kann in verschiedenen Geweben dann wiederum Reaktionen oder Blockaden mit konsekutiven Symptomen oder Krankheitserscheinungen auslösen.

Bei therapeutischen Fragen ist zu berücksichtigen, daß Katalysatoren nur wirken können, wenn das Milieu stimmt. In Regelkreisen und Stoffwechselketten gehört dazu nicht nur die Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), sondern es müssen auch die entsprechenden Substrate und „Cofaktoren“ zur Verfügung stehen. Zu diesen Cofaktoren gehören Vitamine und die Spurenelemente, d.h. bestimmte Metallionen. Erst durch diese Cofaktoren werden die Katalysatoren aktiviert, d.h. spezifisch funktionsfähig. Bei Metall-Enzym-Komplexen spricht man häufig auch von Metallo-Enzymen.

Für den therapeutischen Einsatz ist aus den physiologischen Zusammenhängen heraus der Begriff „intermediäre Katalysatoren“ weiter gefaßt; er umfaßt Katalysatoren im strengen Sinn (Enzyme), zugehörige Substrate, Zwischenprodukte und Cofaktoren.

Daraus ergeben sich folgende Präparategruppen:

Einzel-Katalysatoren (Enzyme)
Einzel-Coenzyme (Cofaktoren, Vitamin-Cofaktoren)
Einzel-Intermediärprodukte
Enzymgemische
Katalysator-Kombinationen

Für die Aktivierung und Funktionen von Katalysatoren sind Spurenelemente bzw. Metallionen bei Hunderten von Prozessen erforderlich. Manche dieser Ionen zeigen dabei ein Janusgesicht. Während sie in kleinen Dosen die Katalyse ermöglichen, können sie in größeren Dosen Funktionen hemmen oder blockieren. Dies trifft vor allem für Metallionen zu, die einerseits Cofaktoren für Metallo-Enzyme sind, andererseits aber auch als „toxische Metalle“ bestimmte Enzymreaktionen blockieren.

4.3.2.1 Intermediärprodukte

Regelkreise und Stoffwechselketten können ihre Funktion nur erfüllen, wenn alle Kettenglieder intakt sind; bei physiologischen Abläufen bedeutet dies, dass Ausgangssubstrat, Katalysatoren und Intermediärprodukte für die einzelnen Stoffwechselschritte aufeinander abgestimmt sein müssen (z.B. Zitronensäurezyklus). Funktionsstörungen können im materiellen oder dynamischen Bereich entstehen; die Folgen sind immer wechselseitig. Daraus resultieren folgende Konstellationen:

Das Ausgangssubstrat ist quantitativ unzureichend oder qualitativ verändert. Aus der Michaelis-Menten-Beziehung der Abhängigkeit der katalytischen Reaktion vom verfügbaren Substrat ergibt sich, daß eine Fehlsteuerung schon beim Initialschritt vorgegeben ist.

Der Katalysator steht nur unzureichend zur Verfügung oder fehlt vollständig. Der Stoffwechselprozeß wird an dieser Stelle gebremst oder blockiert. Das zu katalysierende Produkt wird unzureichend oder überhaupt nicht mehr gebildet – die Stoffwechselkette wird abgeschwächt oder unterbrochen.

Diese Grundvorgänge spielen sich in Stoffwechselketten an vielen Stellen ab. Die genannte Leistung der Kette wird dabei stets vom schwächsten Glied – Substrat, Katalysator oder Intermediärprodukt – bestimmt. Da hinter jeder enzymatischen Fehlfunktion auch das nachfolgend zu katalysierende Produkt nur noch unzureichend gebildet wird, kommt den Intermediärprodukten für den weiteren Abauf der Kettenreaktion eine essentielle Rolle zu. In der Therapie sollten daher enzymatische Defekte nicht nur – sofern überhaupt möglich – mit dem fehlenden oder defizienten Katalystor beeinflußt, sondern auch mit den Intermediärprodukten gezielt hinter der Enzymblockade behandelt werden.

Zur Funktionsbereitschaft müssen dabei die Intermediärprodukte in einen reagiblen, aktivierten Zustand versetzt werden. Am Beispiel des Zitronensäurezyklus wird die Bedeutung der Intermediärprodukte besonders deutlich. Wichtige Intermediärprodukte sind:

Acidum aceticum	➜	Acetat
Acidum pyruvicum	➜	Pyruvat
Acidum phosphoricum	➜	Phosphat
Acidum fumaricum	➜	Fumarat

Der therapeutische Einsatz dieser Intermediärprodukte als Monosubstanzen ist sinnvoll, wenn der Stoffwechseldefekt lokalisiert und der Mangel an diesem Produkt gesichert oder wahrscheinlich ist. In homöopathischen Tiefpotenzen (D4 bis D8) dienen diese Einzelprodukte der Substitution.

Für den Zitronensäurezyklus stehen als Einzel-Intermediärprodukte zur Verfügung:

Acidum citricum-Injeel	Acidum DL-malicum-Injeel
Acidum cis-aconiticum-Injeel	Acidum succinium-Injeel
Acidum fumaricum-Injeel	Natrium oxalaceticum-Injeel
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel	Natrium pyruvicum-Injeel

Die für den Funktionsablauf erforderlichen Coenzyme wurden bereits bei den Einzel-Katalysatoren im Zusammenhang mit den Katalysatorkombinationen besprochen.

Katalysatoren, speziell die Enzyme, sind „Lotsen“, die ein Substrat als Edukt in ein anderes Substrat, auch Produkt genannt, überführen. Bei Katalysatormangel kommt es deshalb einerseits zu einem Defizit an Substrat 2 (Mangelsituation: Funktionsschwäche, Entwicklungsstörung, Funktionsausfall), andererseits aber auch gleichzeitig zu einem Stau vor dem Engpaß (Block) mit anflutendem Überschuß an Vorblock-Substraten.

In Stoffwechselketten führt ein initialer oder intermediärer Katalysatormangel zu einer Kettenreaktion mit zunehmendem Mangel an Intermediärprodukten und einem Defizit des Endproduktes.

4.3.2.2 Kombinationen intermediärer Katalysatoren

Indikationen für den therapeutischen Einsatz von Katalysator-Intermediärprodukt-Kombinationen ergeben sich bei:

Defizienzen an mehreren Stellen von Stoffwechselketten
genereller Unterfunktion der produzierenden Strukturen (Zellorganellen)
Membrantransportstörungen
anlagebedingten Fehlsteuerungen

Eine oder mehrere dieser Voraussetzungen liegen vor bei:

generellen Zell-Matrix-Dysfunktionen (Imprägnations-, Degenerationsphasen)
mitochondrialen Defekten
lysosomalen Defekten

Mitochondriale Defekte wirken sich in besonderem Maße auf den Energiestoffwechsel und die Summe der Stoffwechselketten aus, lysosomale Insuffizienzen hingegen auf den Stoffwechsel der Schleimhäute, die Matrixfunktion und das Bindegewebe.

Stoffwechselstörungen sowie krankheits- oder altersbedingte Leistungsminderungen dieser Zellorganellen können nur mit einer umfassenden Kombination von intermediären Katalysatoren, Intermediärprodukten und Cofaktoren sinnvoll behandelt werden. Für die lysosomalen Defekte stehen entsprechende Präparate zur Verfügung, wobei die Applikation dieser sauren Enzyme ein besonderes Problem darstellt.

Intermediäre Katalysatoren können mit organischem Material kombiniert werden (z.B. Suis-Organpräparate). Die Sinnhaftigkeit solcher Kombinationen liegt im gleichzeitigen Angebot von dynamischen Faktoren – Katalysatoren – und Bausteinen zur Regeneration und Reparation struktureller Defekte.

Intermediäre Katalysatoren haben integrale Funktionen inne und folglich strukturelle Auswirkungen auf gekoppelte Biosysteme. Ihre therapeutischen Anwendungsgebiete sind deshalb weit gefächert. Wenn die tatsächliche Nutzung bislang nur einem Bruchteil der sinnvollen Indikationen zugute kommt, liegt dies vornehmlich noch am Vorherrschen linearer Denkschienen in der heutigen Medizin. Das Denken in vernetzten Systemen, Wechselwirkungen und dem Ineinandergreifen von Information, Formation (Struktur) und Funktion wird leider immer noch vernachlässigt.

Legt man die Hauptfunktionen der Mitochondrien, integrative Vernetzung der Stoffwechselzyklen und (oxidative) Energiegewinnung zugrunde, ergibt sich, welche zentrale Rolle diese Zellorganellen für Gesundheit, Leistungspotential und bei Krankheitsprozessen spielen. Dem komplexen Geschehen bei mitochondrialen Struktur- und Funktionsanomalien ist mit Monosubstanzen nicht beizukommen. Nur organotherapeutische Katalysatoren und Substrate im Zusammenwirken mit unspezifischen Cofaktoren (Vitaminen, Coenzymen) können der Komplexität Rechnung tragen.

4.3.2.3 Stimulierung blockierter Enzymsysteme

Der Therapie mit homöopathisierten Faktoren des Zitronensäurezyklus kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sich nämlich nicht nur Stauungen gezielt beseitigen lassen (z.B. ein Pyruvatstau bei einer erheblichen Verlangsamung der Endoxidation), sondern mittels Induktion der entsprechenden Teilschritte wird der Ablauf des Zitronensäurezyklus wieder in Gang gesetzt und gleichzeitig die Atmung der Zelle beeinflußt.

Viele Enzymreaktionen benötigen Magnesium- oder Manganionen als zusätzliche Aktivatoren. So brauchen z.B. alle Kinasereaktionen für die Phosphatübertragung noch Magnesiumionen, während alkalische Phosphatasen durch Magnesium- und Manganionen sowie zahlreiche Peptidasen durch Manganionen aktiviert werden. In vielen Fällen können die Magnesiumionen ggf. auch durch Manganionen ersetzt werden. Daher ist es sinnvoll und verständlich, daß eine gezielte Therapie mit den intermediären Katalysatoren des Zitronensäurezyklus wegen der Bedeutung des anorganischen Phosphats durch eine Injektion von Magnesium -und Manganionen in Form ihrer Phosphatverbindungen eingeleitet oder kombiniert wird.

Eine solche Therapie eröffnet die Möglichkeit, direkt in das Zentrum des Geschehens einzugreifen. Mit den intermediären Katalyatoren lassen sich Heilreaktionen in bestimmter Weise katalytisch beeinflussen, wobei zentrale und kausale Regulationsmechanismen genutzt werden.

Hierbei spielt der Begriff der Feedback-Hemmung eine wichtige Rolle. Er besagt, daß ein Intermediärprodukt hemmend auf den weiteren Ablauf der Reaktion im Sinne einer Rückkopplung wirkt. Der Reaktionsablauf kann jedoch erst wieder in Gang gebracht werden, wenn die abzubauenden Produkte Abfluß erhalten bzw. verdünnt werden, wie das z.B. bei Entzündungen durch eine Ödemeinschwemmung geschieht. Jedes Substrat, besonders in verdünnter Form, kann also einen Reiz zur Synthese geeigneter Enzyme setzen, und umgekehrt wird durch eine starke Substratanflutung die Produktion von Enzymen, die zur Verstoffwechselung der Substrate führen, gedrosselt.

Viele Erkrankungen führen zu Störungen einzelner Enzymfunktionen, wodurch aber in Folge der gesamte Regelmechanismus versagt. Daraus ergibt sich wiederum, daß derartige Stoffwechselmetaboliten, die hemmend oder anregend auf die Enzyme wirken, entsprechend dem Arndt-Schulz-Gesetz des Umkehreffektes therapeutisch zur Bildung entsprechender Enzyme genutzt werden können. Sobald ein Spaltprodukt nicht weiterverwertet werden kann, da das notwendige Enzymsystem blockiert ist, läßt sich gerade dieses zur Induktion der Synthese des blockierten Enzymsystems nutzen.

Dieser therapeutische Ansatz ist für die zellulären Phasen von besonderer Bedeutung, da bei ihnen Schädigungen der Atmungskette bzw. der Endoxidation in den Mitochondrien vorliegen dürften. Sowohl die beteiligten Enzymsysteme als auch die Funktion der Mitochondrien ist seit langem bekannt. In letzteren sind sowohl der Zitratzyklus als auch die oxidative Phosphorylierung kompartimentiert, so daß dort über energiereiche Phosphate die für die Zelle notwendige Lebens- und Überlebensenergie bereitgestellt werden kann.

Die Enzymhemmung kann aber auch so erfolgen, daß eine in vielen Enzymen aktive Stoffgruppe wie die Thiolgruppe blockiert oder fremdbesetzt wird. Zahlreiche Stoffe wie beispielsweise das Coenzym A sind jedoch durch die freien Thiolgruppen in ihrer Aktivität gekennzeichnet. In anderen Fällen liegt der Enzymhemmung ein Mangel oder eine Blockierung der Spurenelemente zugrunde. Bei derartigen Blockierungen kommt es nachfolgend ebenfalls zu fortschreitenden Krankheitsprozessen.

Nicht zuletzt spielt auch das Histamin bei der Entstehung der zellulären Phasen eine entscheidende Rolle. Wenn das Histamin nicht auf biologischem Wege ausgeschieden werden kann, wird es aus der Inflammationsphase in Richtung auf die zellulären Phasen hin verdrängt und wirkt dann an anderen Organen und Geweben wie z.B. in der Bronchialschleimhaut durch Erzeugung eines Asthma bronchiale.

Wird der pH-Wert der Matrix verändert, d.h. wird die saure Umgebung der Zellen bei einem entzündlichen Prozeß durch geeignete Maßnahmen neutralisiert oder alkalisiert, kommt es zu einer Kopplung des Histamins mit Karbonylgruppen unter Bildung von Schiffschen Blasen, die sich jedoch als labile Strukturen in sauerer Reaktionsumgebung sofort wieder in die Ausgangsprodukte aufspalten und somit Asthmaanfälle durch das plötzliche Auftreten von Histamin hervorrufen können.

Zusammenfassend ist festzustellen:
Die Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salze bewirken eine Stimulierung blockierter Enzymsysteme und auch der anderen verknüpften Stoffwechselprozesse.

Der therapeutische Einsatz von Bestandteilen des Zitronensäurezyklus übt einen therapeutischen Reiz aus, durch den es möglich ist, derartige Schädigungen wieder auszugleichen.

Durch die Anwendung der einzelnen Stufen des Zitronensäurezyklus werden Stoffwechselblockierungen gelöst und im Gewebe vorliegende toxische Metaboliten ausgeschieden.

4.3.2.4 Gruppen von Katalysatoren
Gruppe A: Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salze

Anwendungsgebiete
Alle Erkrankungen, die den zellulären Phasen zuzuordnen sind (Degenerationsphasen, Dedifferenzierungsphasen) und damit durch enzymatische Fehlsteuerungen oder Blockierungen bzw. Störungen der Zellatmung gekennzeichnet sind, z.B.:

Paresen, Neuralgien, toxische Neuritiden, vegetative Dystonie, Migräne,
Dermatosen, Neurodermitis, Pruritus (auch Pruritus vulvae), Psoriasis, Vitiligo, Pemphigus, Sklerodermie,
Asthma bronchiale,
Ulcus ventriculi et duodeni, Hepatosen, Leberzirrhose und sonstige Leberschäden, Pankreopathien,
Nephropathien, z.B. Nephrosen und chronische Nephritiden,
Herzmuskelschäden, Angina pectoris, Myokardinfarkt-Nachbehandlung, Arteriosklerose, Zerebralsklerose,
Dysfunktionen und Dysregulationen innersekretorischer Drüsen, z.B. Diabetes mellitus, Dysthyreosen,
Präkanzerosen und Dedifferenzierungsphasen (früher: Neoplasmaphasen) an allen möglichen Geweben,
bei und nach Röntgen- und radioaktiven Bestrahlungen (einige Enzyme, z.B. die Malat-Dehydrogenase, sind strahlensensibel),
Thrombozytopenie, Leukopenie.

Dosierungsanleitung
Die einzelnen Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salze werden zweckmäßigerweise in derjenigen Reihenfolge injiziert, wie sie auch innerhalb der Zelle im Ablauf des Stoffwechsels entstehen, um alle möglichen Defekte, Stauungen und Fehlregulationen zu erfassen.

Es empfiehlt sich dabei stets, zwei bis drei Säuren (bzw. deren Salze) in einer Mischspritze auf einmal zu injizieren. Die Injektionen werden zweckmäßigerweise s.c. oder i.m. durchgeführt.

Da Magnesium- und Mangan-Ionen viele enzymatische Prozesse – besonders die phosphatverschiebenden Kinasereaktionen – aktivieren, wird das der Sammelpackung beiliegende Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel der ersten Injektion zugegeben (Mischspritze).

Im allgemeinen wird zwei- bis einmal wöchentlich injiziert. Nach einer Serie – also nach 4 Mischinjektionen (siehe unten) – wird eventuell ein behandlungsfreies Intervall bezüglich der Katalysatorentherapie von 2 bis 4 Wochen eingelegt, bis die Wirkung der Injektionen abgeklungen ist. Während dieser Zeit sollen jedoch die indizierten Biotherapeutika-Antihomotoxika-Heel (Injeele, Homaccorde, sonstige Kombinationspräparate-Heel, Suis-Organpräparate, Nosodenpräparate) verabreicht werden, welche auch während der Behandlung zusammen mit den Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salzen angewandt werden können. Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In der Gebrauchsinformation wird der Patient darauf hingewiesen, sich an seinen Therapeuten zu wenden.

Injektionsschema	
1. Injektion	Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel + Natrium pyruvicum-Injeel + Natrium oxalaceticum-Injeel
2. Injektion	Acidum citricum-Injeel + Acidum cis-aconiticum-Injeel
3. Injektion	Baryum oxalsuccinicum-Injeel + Acidum α-ketoglutaricum-Injeel
4. Injektion	Acidum succinicum-Injeel + Acidum fumaricum-Injeel + Acidum DL-malicum-Injeel

Nach einer Pause von 2 bis 4 Wochen Wiederholung dieser Injektionsserie.

Die einzelnen Säuren bzw. deren Salze können auch jeweils für sich allein in der Injeel-forte-Form wiederholt injiziert werden. Dies ist vor allem dann angezeigt, wenn bei einer der oben aufgeführten Mischinjektionen (1. bis 4.) eine besonders gute Wirkung zu erzielen war. Man soll nachfolgend dann die in dieser Mischung enthaltenen Ampullen einzeln applizieren.

Empfehlenswert ist der Genuß von viel frischem Obst, Traubensaft, Heidelbeeren, roter Bete. Die letztgenannten sind reich an Anthozyanen (Zellatmungsaktivatoren, Wasserstoffakzeptoren).

Darreichungsform und Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml. Sammelpackung Katalysatoren des Zitronensäurezyklus (enthält 9 Ampullen der Einzelmittel-Injeele + 1 Ampulle Magnesium Manganum-phosphoricum-Injeel).

Präparateliste der Katalysatoren Gruppe A

Acidum cis-aconiticum-Injeel	Acidum succinicum-Injeel
Acidum cis-aconiticum-Injeel forte	Acidum succinicum-Injeel forte
Acidum citricum-Injeel	Baryum oxalsuccinicum-Injeel
Acidum citricum-Injeel forte	Baryum oxalsuccinicum-Injeel forte
Acidum fumaricum-Injeel	Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel
Acidum fumaricum-Injeel forte	
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel	Natrium oxalaceticum-Injeel
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel forte	Natrium oxalaceticum-Injeel forte
Acidum DL-malicum-Injeel	Natrium pyruvicum-Injeel
Acidum DL-malicum-Injeel forte	Natrium pyruvicum-Injeel forte

Die Injeel-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenakkord: D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Ausnahme: Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel D12, D30, D200.

Die Injeel-forte-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenakkord D6, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml.

Gruppe B:
Chinone sowie sonstige intermediäre Atmungskatalysatoren

Allgemeine Hinweise
Als Chinone wird eine umfassende und wichtige Gruppe von organischen Verbindungen bezeichnet, welche aus aromatischen Dioxyverbindungen in einer reversiblen Reaktion durch Abspaltung zweier H-Atome entsteht. Chinone sind natürliche und synthetische Farbstoffe, sie kommen meist als gelb-, orange-, rot- oder blauschwarzfarbene, d.h. gefärbte Dioxyverbindungen vor.

In der Natur kommen Chinone in einigen Pilzen (Pilzfarbstoffe, Bakterien und Antibiotika), in höheren Pflanzen (als Blüten-, Rinden- und Wurzelfarbstoffe), in Blattdrüsen verschiedener Labiaten, im tierischen Organismus bei Gliederfüsslern, Stachelhäutern und Säugetieren vor.

In einem gesunden Körper kommen Chinone als Stoffwechselbestandteile in nur geringem Maße vor. Meist sind sie Bestandteile der Nahrungsstoffe oder der Teerstoffe, die in der eingeatmeten Luft enthalten sind.

Die Chinone haben die besondere Eigenschaft, überschüssige Sauerstoffradikale zu neutralisieren. Eine Chinontherapie verbessert die Zellatmung (biologische Oxidation).
Die Toxine, die im Laufe des Lebens entfernt werden müssen, können u.a. durch Oxidation abgebaut werden. Oxidation bedeutet Sauerstoffverbrauch und folglich besteht die Gefahr eines ineffizienten Stoffwechsels. Mit Chinonen ist es möglich, die Folgen einer Dysregulation zu behandeln. Die Chinontherapie stellt große Anforderungen an den Giftabwehrmechanismus des Organismus. Die Unterstützung des Toxinabwehrsystems und eine gezielte Ausleitungstherapie sind wichtig.

Gedanken von Dr. med. E. Reinstorff zum Buch „Das Überleben bei Krebs und Viruskrankheiten“ von William Frederick Koch:
Koch eröffnete durch sein Buch mit dem gleichnamigen Titel eine neuartige Schau des Krankheitsgeschehens und der sich daraus ergebenden erfolgreichen Therapie. Sie basiert auf einer ergänzenden Interpretation der Gewebsoxidationen, die den bekannten Gesetzen der Chemie entspricht, wobei die Phänomenologie des freien Radikals und der Doppelbindung eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Freie Radikale sind kurzlebige hochreaktive Stoffwechselprodukte, die ein oder mehrere ungepaarte Elektronen enthalten (Moleküle, Atome und Ionen). Schon in den 30iger Jahren hat William Koch die freien Radikale und ihre katalytischen Effekte in die medizinische Forschung eingeführt und mit besten Erfolg für die Heilung verschiedener Krankheiten verwendet. Damals entwickelte sich aufgrund seiner Forschungen die Kenntnis von der Existenz freier Radikale und in der technischen Chemie wurde die heute so bedeutungsvolle Kunststoffindustrie begründet.

Kochs grundlegende Thesen decken ein Schlüsselprinzip auf, das sowohl im physiologischen wie auch im pathologischen Geschehen eine Art Weichenstellung darstellt. Er nennt es einen „Least common denominator in disease condition“, einen letzten Generalnenner im Krankheitsgeschehen. Er erklärt diesen so rätselhaften Pasteur-Effekt auf der gleichen Basis wie die Verankerung von Pathogenen verschiedener Art mit dem energieproduzierenden Mechanismus einer Zelle. Er behauptet, daß dieser Vorgang bei verschiedenen Zellarten nach dem gleichen Muster abläuft, jedoch daraus ganz verschiedene Krankheitserscheinungen entsprechend der Eigenart der Wirtszelle und deren funktionell energetischen Aufgaben entstehen. Diese würden auf eine einheitlich gleichartige Weise in umgekehrter Richtung dem pathophysiologischen Ablauf einer erzwungenen Oxidation folgen, so daß Heilung eintreten kann.

Dr. Koch hat in seinem Buch durch Röntgenbilder, Zeugnisse und Biopsiebefunde amerikanischer Fachärzte und Kliniken eine große Zahl Belege für seine Fälle geschaffen.
Die Chinone stellen aufgrund ihrer Karbonylgruppe ein Oxidations-Reduktions-System dar (Redox-System; Chinon ÷ Hydrochinon).

Da beim Übergang von Chinon zu Hydrochinon freie Sauerstoffradikale entstehen, brechen über den dabei ablaufenden Wasserstoffentzug die Kondensationsvorgänge auf im Sinne einer Depolymerisation. Imprägnations-, Degenerations- und besonders Dedifferenzierungsphasen sind solche Kondensationsvorgänge.

Karbonylgruppen enthaltende Präparate „brennen“ retoxisch oder sonst verankerte Aminogruppen aus Azomethinverbindungen

(Azomethin-Doppelbindung) weg. Obwohl Methylenblau keine „Chinon-Struktur“ hat, ist es dennoch ein wichtiger Wassserstoffüberträger bzw. Wasserstoffakzeptor (siehe oben!) für biochemische Redoxprozesse im Sinne der „sauerstofflosen Oxidation“.

Sowohl die Chinone als auch das Methylenblau haben z.B. die Fähigkeit, unter Sauerstoffabschluß das Ferment Succinodehydrogenase (Dehydrierung der Bernsteinsäure in die Fumarsäure) zu vertreten; d.h. Methylenblau kann bei Abwesenheit von Sauerstoff an dessen Stelle als Elektronenakzeptor dienen.

Anwendungsgebiete
Die Präparate der Gruppe B sind vorzugsweise bei Krankheitsbildern bzw. zellulären Phasen rechts des biologischen Schnittes einzusetzen, also bei Imprägnations-, Degenerations- und Dedifferenzierungsphasen (früher: Neoplasmaphasen).

Dosierungsanleitung
Die Dosierung soll stets individuell erfolgen und ist abhängig zu machen vom Befund, vom Befinden und vom jeweiligen Ansprechen auf diese Präparate, was von Fall zu Fall – auch bei gleicher Diagnose! – recht unterschiedlich sein kann.

Im allgemeinen ist es empfehlenswert, die Katalysatorenpräparate der Gruppe B 1- (bis 2-)mal wöchentlich zu applizieren (i.m., s.c., i.c.; ggf. auch in die entsprechenden Akupunkturpunkte und evtl. i.v.).

Darauf hingewiesen sei, daß die Katalysatorenpräparate der Gruppe B bei den zellulären Phasen mit Vorteil auch zu interponieren bzw. zwischenzuschalten sind (ähnlich wie die Nosodenpräparate) neben der sonst erforderlichen Therapie mit weiteren Biotherapeutika.

Einige spezielle therapeutische Hinweise

Glyoxal sollte generell nur relativ selten appliziert werden. Dieses Präparat sollte man deshalb stets auch über einen längeren Zeitraum nachwirken lassen.

Bei der Anwendung von Para-Benzochinon ist es empfehlenswert, daß vor einer Behandlung mit diesem Präparat zunächst Hydrochinon etwa dreimal appliziert wird und erst anschließend dann Para-Benzochinon zur Anwendung kommt.

Chinhydron sollte mit einem homöopathischen Metall gekoppelt werden, z.B. mit Aurum-Injeel, Argentum-Injeel, Ferrum metallicum-Injeel.

Darreichungsform und Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Präparateliste der Katalysatoren Gruppe B

Anthrachinon-Injeel forte	Naphthochinon-Injeel
Chinhydron-Injeel	Naphthochinon-Injeel forte
Chinhydron-Injeel forte	Para-Benzochinon-Injeel
Glyoxal-Injeel	Para-Benzochinon-Injeel forte
Hydrochinon-Injeel	Trichinoyl-Injeel
Hydrochinon-Injeel forte	Trichinoyl-Injeel forte
Methylenblau-Injeel	Ubichinon-Injeel
	Ubichinon-Injeel forte

Die Injeel-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenakkord: D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml.

Die Injeel-forte-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenakkord D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml.

Gruppe C: Sonstige stimulativ wirkende Verbindungen

Allgemeine Hinweise
Sonstige stimulativ wirkende Verbindungen mit katalytischen Effekten auf Stoffwechsel- und Atmungsfunktionen sind u.a.: Homöopathisierte Vitamine der Vitamin B-Gruppe sowie von Vitamin A und Vitamin C – in tiefster Potenz jeweils D6 – als Co-Faktoren bzw. Co-Enzyme, stimulativ wirkende Verbindungen mit Katalysator-Effekten, z.B. biogene Amine wie Adrenalin, Serotonin (5-Hydroxi-tryptamin) und Histamin (4-(2'-Aminoäthyl)-Imidazol) bzw. deren Vorstufen wie die Aminosäuren Tryptophan (β-Indolalanin = Vorstufe des Serotonins) und Histidin (β-Imidazolalanin bzw. β-Imidazolylalanin = Vorstufe des Histamins) sowie die Aminosäuren Cystein (schwefelhaltig), Acidum L(+) asparagicum und Acidum glutaminicum, ferner die Tryptophan-Abbauprodukte Indol und Scatol (β-Methylindol) und die Aminosäuren-Abkömmlinge Guanidin (Imino-Harnstoff) und Methylguanidin sowie Anthozyane (Zellatmungsaktivatoren; Wasserstoffakzeptoren) und Elemente (Spurenelementfaktoren), z.B. Caesium und Cer (redoxkatalytische Wirkung).

Dosierungsanleitung
Im allgemeinen wird ein- bis zweimal wöchentlich injiziert. Die erneute Injektion eines oder mehrerer Katalysatoren wird erst dann durchgeführt, wenn die Wirkung der vorhergehenden abgeklungen ist. Mit der sich konsolidierenden Heilung werden im allgemeinen immer seltenere Injektionen erforderlich.

Darreichungsform und Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Präparateliste der Katalysatoren Gruppe C

Acetylcholinchlorid-Injeel	Histamin-Injeel forte
Acidum L(+)-asparagicum-Injeel	Histamin D200
Acidum glutaminicum-Injeel forte	Indol-Injeel
Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte	Insulin-Injeel
ACTH-Injeel	Scatol-Injeel
Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte	Serotonin-Injeel
Adrenalin-Injeel forte	Serotonin-Injeel forte
cAMP D8; D12; D30	Vitamin A-Injeel
Cortison-Injeel	Vitamin B_1-Injeel
Cortison-Injeel forte	Vitamin B_2-Injeel
Cystein-Injeel	Vitamin B_6-Injeel
Ferrum fumaricum-Injeel	Vitamin B_{12}-Injeel
Guanidin-Injeel	Vitamin C-Injeel
Histamin-Injeel	Vitamin C-Injeel forte

Therapeutische Methodenwahl

Allgemeine Empfehlungen
Der Einsatz von Biokatalysatoren hat eine starke Reizwirkung auf den Patienten (z.B. starke Müdigkeit nach Medikamentengabe). Es wird empfohlen, während der ersten drei Kurtage minimal 2 bis 3 Liter zu trinken und auch weitgehend auf körperliche Aktivitäten zu verzichten. Daneben ist eine toxinarme Diät erwünscht. Anzeichen einer regressiven Vikariation sollten nicht unterdrückt werden, sondern mit Hilfe biologischer Therapeutika ausgeleitet werden.

Ein exaktes Timing ist für den Einsatz von Katalysatoren von größter Wichtigkeit. Falsches Timing kann in manchen Fällen progressive Vikariationen auslösen. Dieses Phänomen tritt ein, wenn der Körper sich in einem äußerst labilen Zustand befindet oder zu schwach ist, einer Reiztherapie unterzogen zu werden.

Bei Patienten in geschwächtem Zustand muß besonders darauf geachtet werden, daß sehr langsam mit der Behandlung begonnen wird und nicht mit massiven Medikamentengaben eingesetzt wird.

Beispiel: Beginn mit einer ½ Ampulle oral 2x wöchentlich oder 2x wöchentlich 1 Ampulle in 1½ l Wasser auflösen und diese Lösung über den Tag verteilt in kleinen Schlucken trinken. Oft erzielen die Biokatalysatoren dann bereits die gewünschte Wirkung, ohne daß heftige Heilkrisen auftreten.

Hinweis zur Dosierung
Für alle Katalysatoren-Präparate der Gruppe B gilt, daß eine Wiederholung der Injektionen erst nach Abklingen evtl. auftretender, seltener Reaktionen (Erstverschlimmerungen) erfolgen soll sowie stets dann, wenn erneut Beschwerden auftreten.

Wichtig ist ferner eine gute Drainage, d.h. bei Patienten mit schwerer toxischer Belastung sollte vor der Therapie mit Katalysatoren eine Mobilisation der körpereigenen Abwehr erfolgen.

Bei der Bioregulationstherapie lassen sich im allgemeinen drei Phasen unterscheiden:

1. Stabilisierung des Krankheitsprozesses,
d.h. Behandlung möglicher Entzündungsprozesse, wobei in manchen Fällen die schulmedizinische Therapie nicht ohne weiteres abrupt abgebrochen werden darf. Eine Stabilisierung kann durch Diät, vernünftige Lebensführung, ausreichende Bewegung, Unterstützung der körpereigenen Abwehr etc. erzielt werden.

2. Ergänzung fehlender Stoffe,
wobei an Vitamine und Spurenelemente zu denken ist sowie Behandlung vorliegender Dysbiosen. Ein geschwächter Organismus mit schweren Mangelerscheinungen und Dysbiosen muß vorab mit parenteralen Vitaminpräparaten behandelt werden. Im Sinne von Mineral- und Spurenelementen ist vor allem auf Zink, Calcium, Kalium und Magnesium zu achten.

3. Chirurgische Behandlung;
Entfernung von Entzündungsherden: z.B. Zahnextraktionen, Nasennebenhöhlensanierung, Entfernung von Amalgam etc.

• 4.3.3 NOSODEN

Definition von Nosoden
Nosoden sind krankheitsauslösende Agentien, deren Virulenz oder Toxizität durch die homöopathische Zubereitung ausgelöscht wurde, deren Information aber die immunologischen Erkennungsmechanismen voll erreicht und entsprechende heilungsfördernde Stimulationen möglich macht.

Ausgangsmaterial
Nosoden sind nach einer homöopathischen Verfahrenstechnik hergestellte Zubereitungen aus pathologisch veränderten Organen oder Organteilen von Mensch oder Tier, ferner aus abgetöteten Kulturen von Mikroorganismen oder aus Zersetzungsprodukten tierischer Organe oder aus Körperflüssigkeiten, die Krankheitserreger bzw. Krankheitsprodukte enthalten, z.B. Blut, Liquor oder Punktionsflüssigkeit; vgl. in diesem Zusammenhang AMG vom 24.08.1976, § 3 (= Stoffliste) Abs. 3 und 4, und HAB 2000, amtliche Ausgabe, Vorschrift 43 und 44.

Die Identität des Ausgangsmaterials wird durch fachärztlichen Befund des Operationsmaterials oder durch Laborbefund protokollarisch belegt, ggf. auch durch Zertifikate der Lieferanten von Bakterien und Viren.

Das HAB sieht vor, daß das Ausgangsmaterial für Nosoden zunächst sterilisiert wird und danach, vor dem Verarbeiten, der Prüfung auf Sterilität des Arzneibuches (DAB 10) entsprechen muß. Erst dann kann die homöopathische Aufbereitung erfolgen. Es handelt sich also bei den Nosoden nicht um Impfstoffe, Seren oder dergleichen, sondern um reine Homöopathika. Aus diesem Ausgangsmaterial werden Urtinkturen nach den Vorschriften 43 oder 44 hergestellt.

Die Definition der Nosoden entspricht somit auch dem Stoffbegriff der im § 3 des Arzneimittelgesetzes festgehalten ist, insbesondere in den Punkten 3 und 4. Stoffe im Sinne des Gesetzes sind demnach:

chemische Elemente
Pflanzen und Pflanzenteile
Tierkörper, auch lebender Tiere sowie Körperteile, Bestandteile und Stoffwechselprodukte von Mensch oder Tier in bearbeitetem Zustand
Mikroorganismen einschließlich Viren sowie deren Bestandteile oder Stoffwechselprodukte

Für die Herstellung von Nosoden gibt es zwei verschiedene Vorschriften, nämlich die HAB 2000, Vorschrift 43 für Urtinkturen aus pathologisch veränderten Organen oder Organbestandteilen von Mensch oder Tier und die Vorschrift 44 für Urtinkturen aus abgetöteten Kulturen von Mikroorganismen oder aus Zersetzungsprodukten tierischer Organe oder aus Körperflüssigkeiten, die Krankheitserreger bzw. Krankheitsprodukte enthalten.

Einteilung der Nosoden

Auto-Nosoden
Das sind aus dem eigenen Organismus von Kranken gewonnene Substanzen, wie z.B. Blut, Harn, Tränenflüssigkeit, Sputum, Eiter, Stuhl oder krankes Gewebe.
Diese Ausgangsstoffe werden homöopathisiert und bei demselben Patienten angewendet.

Hetero-Nosoden
Das sind Stoffe, die nicht aus dem eigenen Organismus stammen.

Gruppen von Hetero-Nosoden
Es gibt virale, bakterielle und Impfstoff-Nosoden. Dies sind Nosoden, die aus Mikroorganismen oder Impfstoffen hergestellt werden. Es gibt weiterhin Gewebenosoden, zu denen wir auch Körpersekrete rechnen möchten.

Als Beispiele für *virale Nosoden* sollten genannt werden:

Die Coxsackie-Virus-B_4-Nosode	Diese wird hergestellt aus auf 109 plaquebildende Einheiten pro Milliliter eingestellte und abgetötete Coxsackie-B_4-Viren.
Die Herpes Zoster-Nosode	Diese wird hergestellt aus auf 106 plaquebildende Einheiten pro Milliliter eingestellte undabgetötete Herpes-Zoster-Viren.

Als Beispiel für *bakterielle Nosoden* seien genannt:

Die Bacterium coli-Nosode	Diese ist ein aus Escherichia-coli-Bakterienkulturen, die auf einen bestimmten Titer (107 KBE/g) eingestellt werden, hergestelltes Präparat.
Die Bacterium lactis aerogenes-Nosode	Eine aus einer Enterobacter-aerogenes-Bakterienkultur (107 KBE/g) hergestellte Nosode.

Gewebenosoden sind Nosodenpräparate aus pathologisch veränderten Organen bzw. Geweben und Stoffwechselprodukten.
Beispielsweise die Tonsillitis-Nosode, die aus chirurgisch entfernten entzündeten Mandeln (Tonsilla palatina) hergestellt wird.
Oder die Gastritis-Nosode, die aus operativ gewonnener Magenschleimhaut von Gastritispatienten hergestellt wird.
Das Ausgangsmaterial der Sinusitis-Nosode ist die aus entzündeten Nebenhöhlen gewonnene schleimige Masse.
Das Ausgangsmaterial der Otitis media-Nosode ist Eiter von an Mittelohrentzündung leidenden Patienten.

Gruppen von Nosodenzubereitungen

1.	Virale Nosoden	Herpes zoster-Nosode Coxsackie A_9 bzw. Coxsackie B_4
2.	Bakterielle Nosoden	Tuberculinum Staphylococcinum Streptococcinum
3.	Impfstoff-Nosoden	Grippe-Nosode Tollwut-Vakzine Rubeolae-Impfstoff
4.	Gewebe(Organ)-Nosoden	Gastritis-Nosode Tonsillitis-Nosode
5.	Sekretnosoden	Sinusitis-Nosode
6.	Inkretnosoden	Mastopathia cystica-Nosode

Auswahlprinzip der Nosoden
Je nach Ätiologie der ursprünglichen Erkrankungen, die zu einer unzureichenden immunologischen Aufarbeitung und damit in die Chronifizierung geführt haben, kommen verschiedene Arten von Nosoden zum Einsatz.

1.	Bakterien-Nosoden
2.	Viren-Nosoden
3.	Misch-Nosoden
4.	Organ-Nosoden
5.	Erb-Nosoden
6.	Auch homöopathisierte Allopathika können vom Prinzip her im weitesten Sinne zu den Nosoden gerechnet werden. Schließlich sind sie, wie wir bei vielen Therapieschäden feststellen müssen, häufig genug als krankheitsauslösende Agentien zu bezeichnen.
	Nosoden können ebenfalls aus unbelebten Stoffen, Schwermetallen, Umweltschadstoffen und sämtlichen chemischen Substanzen hergestellt werden. Diese besondere Form von Nosoden gewinnt in unserer umweltbelasteten Zeit immer mehr an Bedeutung und ihre Entwicklung muß den entsprechenden vitalen Erfordernissen angepaßt werden.

Therapeutische Methodenwahl
Über vier unterschiedliche prinzipielle Gesichtspunkte bei der Therapie mit Nosodenpräparaten informiert die folgende Tabelle (in Anlehnung an *Allendy/Fortier-Bernoville/Martiny)*:

Anwendung gemäß der

a. symptomatischen/anamnestischen Ähnlichkeit; (Simile-Prinzip);
b. am Ende bzw. nach soeben durchgemachter akuter Erkrankung.

Hierzu ist im einzelnen folgendes zu sagen:

Ad a. Die Anwendung der Nosoden soll also nach der symptomatischen Ähnlichkeit, d.h. nach der grundlegenden homöopathischen Regel des Simillimum bzw. nach der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit hinsichtlich einer alten, scheinbar geheilten Krankheit erfolgen.

Zur Anwendung von Nosodenpräparaten unter dem Gesichtspunkt der aktuellen ätiologischen Ähnlichkeit ist folgendes von Wichtigkeit:
Alle Nosoden können als spezifisches Heilmittel, als Isotherapeutikum bei der entsprechenden Krankheit angewendet werden, der sie entstammen. Im allgemeinen werden sie in diesem Falle als Zwischenmittel neben den angezeigten homöopathischen Mitteln verabfolgt, wobei vor allem ausleitende, Matrixkanalisierende Antihomotoxika (z.B. Lymphomyosot N, Galium-Heel N) eine große Rolle spielen.

Ad b. Nach überstandener Krankheit stellen die Nosoden allerdings ein ausgezeichnetes Mittel dar, die in der Matrix abgelagerten Toxine zur (schnelleren) Ausscheidung zu bringen.
Oft genug handelt es sich bei solchen Fällen nicht nur um die Ausscheidung der Erregertoxine, sondern auch um Restbestände der Erreger mit latenten Krankheitsherden sowie um nicht mehr pathogene Erregeransiedlungen (Dauerausscheider).

Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf soeben überstandene Infektionskrankheiten, wie Masern, Röteln, Windpocken, Grippe, Erysipel, Scharlach, Typhus, Diphtherie usw.

Auch können wir davon ausgehen, daß durch die Nosoden die spezifischen Abwehrvorgänge gegen die Krankheitsauslöser neu induziert werden. Die klinische Bestätigung für diesen immunmodulativen Effekt finden wir im Rückgang aktuell forcierter Antikörperbildungen als Ausdruck der nicht abgeschlossenen Toxinausschüttung der Krankheitserreger. So beobachtet man häufig die Normalisierung eines pathologisch erhöhten Antistreptolysintiter nach Einsatz der Streptokokken-Nosoden.

Indikationen für eine Nosodentherapie

- Chronisch-exsudative Erkrankungen
- Chronisch-proliferative Erkrankungen
- Degenerative Erkrankungen
- Autoaggressionserkrankungen (Cave!)
- Therapieschäden

Die Nosoden können als *Heilmittel des Terrains* bezeichnet werden. Sie sind deshalb besonders bei Dyskrasien, das heißt bei Krankheiten der Konstitution bzw. bei Summationszuständen von sich integrierenden bzw. bei integrierten Dispositionen indiziert, also im Sinne der Homotoxinlehre bei allen zellulären Phasen, besonders bei retoxisch gehemmten Phasen, bei Autoaggressionskrankheiten (Cave), bei den psorischen Krankheiten im Sinne von Hahnemann sowie bei Allergien.

Im Falle von Autoaggressionserkrankungen sollte nur nach entsprechender Vorbehandlung, wie ausleitenden Therapien mit Matrixkanalisierenden Antihomotoxika, behandelt werden.

Nosoden sind aber nicht nur bei zellulären Phasen indiziert, sondern häufig auch bei humoralen Phasen und zwar speziell dann, wenn eine dyskrasische Komponente mit im Spiel ist oder den Verlauf zu komplizieren droht oder bei reduzierter Immunpotenz.

Die Wirkung der Nosoden erfolgt im Sinne einer positiven Vikariation mit Entgiftung und Ausscheidung der Homotoxine. Dies bedeutet gleichzeitig eine Steigerung der abwehrgesteuerten Selbstheilungsvorgänge.

In der Mehrzahl der Fälle ist eine Summation bekannter und ggf. auch nicht bekannter Giftstoffe (Homotoxine) anzunehmen und auf dieser Erkenntnis basiert auch die Notwendigkeit und die Berechtigung zu einer gleichzeitigen Anwendung, einer Reihe von Nosoden die evtl. auch gekoppelt mit anderen Einzelmittel-Injeelen, Kombinationspräparaten usw. gleichsam als *Breitband-Antihomotoxikum* zu applizieren sind, um das genannte Terrain zu bereinigen.

Psorinoheel N (Tropfen, Ampullen) z.B. ist ein solches Breitband-Nosodenpräparat, welches außer den zwei Psora-Nosoden (Psorinum und Medorrhinum) auch noch Vaccininum und Bacillinum enthält, ferner zwei Konstitutionsmittel (Sulfur und Thuja) und eine Reihe weiterer homöopathischer Zubereitungen.

Abb. 6 „Breitbandnosode“ Psorinoheel N

Bestandteile	Charakterristik
Psorinum (Psorinum-Nosode)	Mangelhaftes organisches Reaktionsvermögen Chronische Hauterkrankungen, z.B. Akne, Ekzeme, Seborrhoe, Pruritus.
Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)	Hydrogenoide und sykotische Zustände, Urtikaria, chronische rheumatische Beschwerden
Sulfur (Schwefel)	Reaktionsmittel bei allen chronischen Krankheiten, z.B. bei juckenden nässenden Hautausschlägen, übelriechenden Achselschweiß, Pruritus, Drüsenschwellungen, Zelltätigkeit wird katalytisch beeinflußt.
Thuja (Lebensraum)	Konstitutionsmittel, besonders bei Krankheiten mit Neigung zu proliferativen Prozessen, Warzen, Kondylome, Papillome, Polypen. Chalazion. Übelriechende Schweiße.
Bufo (Kröte)	Konvulsionen. Bläschenförmige Ekzeme.
Natrium muriaticum (Natriumchlorid)	Nervöse Reizbarkeit mit Überempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse. Seborrhoische Ekzeme.
Vaccininum (Vaccininum-Nosode)	Neuralgien. Chronische Ekzeme. Konjunktivitis.
Wismutkaliumiodid (Kaliumtetrajodwismutat)	Luesfolgen. Paralyse-ähnliche Symptome. Störungen der Gehirnfunktionen.
Oleander (Oleander)	Pektanginöse Beschwerden mit Herzklopfen. Stirnkopfschmerzen mit Unruhe. Meteorismus. Schwäche und Lähmungen der Glieder, besonders der Beine. Ödeme.
Cicuta virosa (Wasserschierling)	Konvulsionen, Ekzeme im Gesicht.
Bacillinum (Bacillinum-Nosode)	Erkältungsneigung und Ekzeme. Impetigo. Pityriasis.

Dieses Kombinationspräparat auf Nosodenbasis ist vor allem bei den Phasen der Konstitution, das heißt bei den zellulären Phasen, aber auch bei den Phasen der Dispositionen, das heißt bei den humoralen Phasen, angezeigt.

Bei unklaren bzw. bei nicht sofort abklärbaren Krankheitsbildern, sowohl bezüglich der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit als auch bezüglich der symptomatischen Ähnlichkeit, wird man besonders bei zellulären Phasen selten fehlgehen, ein solches Kombinationspräparat auf Nosodenbasis in den Therapieplan mit einzubeziehen.

Nosodenpräparate haben eine tiefgreifende konstitutionelle Wirkung. Mit Nosoden kann praktisch jede Therapie wirkungsvoll unterstützt werden. Sie stellen bei der Heilung oft das fehlende Glied einer Reaktionskette dar, welches ohne das Nosodenpräparat nicht endgültig oder nur unter großen Schwierigkeiten erzielt werden kann. Die Wirkung erfolgt dabei sowohl über unterschwellige Antigen-Antikörper-Reaktionen als auch über den homöopathischen Gegentakt-Mechanismus von Co-Repressoren.

Dosierungshinweise
Die Dosierung soll stets und prinzipiell streng individuell erfolgen und ist abhängig zu machen vom Befund, vom Befinden und vom jeweiligen Ansprechen auf die entsprechenden Nosodenpräparate, was von Fall zu Fall recht unterschiedlich sein kann.
Im Allgemeinen gibt man 1 bis maximal 3x wöchentlich je 1 Ampulle.

Auch die *Dauer der Behandlung* mit den Nosodenpräparaten ist individuell unterschiedlich zu gestalten. Nach akuten Erkrankungen empfiehlt sich eine kurze Therapiedauer von etwa 2 - 4 Wochen, während sich die Behandlung einer chronischen Erkrankung – je nach Reaktionslage – über einen längeren Zeitraum (ca. 6 Monate) erstrecken kann.

Es empfiehlt sich, mit der normalen Injeel-Form die Nosodentherapie zu beginnen, anschließend dann in o.a. Gruppen a. und b. auf die forte-Injeel-Form überzugehen, und zwar insbesondere dann, wenn auf die normale Injeel-Form sich keine entsprechenden Reaktionen bzw. Besserungen einstellen sollten.

Ganz allgemein gilt und ganz besonders auch für die Nosodentherapie:

Höhere Potenzen (D12, D30 usw.) sind angezeigt:
- bei erhöhter Reizbarkeit (As-, P-, J-Typ, Chamomilla-Typ),
- bei Diathesen,
- bei Allergien,
- bei chronischen Leiden.

Niedere Potenzen (etwa bis D6 bzw. bis D8) sind angezeigt:
- bei mehr oder minder akuter Erkrankung,
- bei trägen Reaktionstypen (Sepia-, Nux vomica-, Graphites-, Silicea-Typ), wenn eine organotrope Wirkung auf ein bestimmtes Organ erwünscht ist.

Indikationen für höhere Potenzen verlangen meist relativ große Applikationsintervalle, bis zu mehreren Wochen.

Indikationen für niedere Potenzen verlangen dagegen in der Regel kurze Applikationsintervalle von etwa 2 bis 3 Gaben pro Woche.

Empfehlenswert ist es, mit der i.m.- bzw. mit der s.c.- oder i.c.- (Neuralpunkte, Akupunktur) Injektion zu beginnen und erst dann, falls kein Ansprechen auf diese Injektionsmethodik erfolgen sollte, ggf. auf die i.v.-Applikation der entsprechenden Nosodenpräparate überzugehen.

Sehr günstig lassen sich die Nosoden-Injeele im Rahmen einer Auto-Sanguis-Stufentherapie verwenden. Sie sollten allerdings immer in der letzten Stufe appliziert werden.

Zur Dosierung und Potenzierung von Nosodenpräparaten im Kindesalter ist folgendes zu sagen: Die Dosierung von Nosodenpräparaten im Kindesalter unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der Dosierung der übrigen Homöopathika im Kindesalter. D.h., daß man bei Kindern (etwas) weniger geben wird als bei Erwachsenen.

Dosierung (Einzeldosen = ED) bei Kindern
- bis zu 2 Jahren — ½ Amp. zu 1,1 ml = 0,25 ml bis maximal 3 - 4 Teilstriche
- von 2 - 6 Jahren — ½ Ampulle zu 1,1 ml = 0,5 ml bis maximal 7 - 8 Teilstriche
- ab 6 Jahre — jeweils 1 Ampulle zu 1,1 ml.

Niedere Potenzen, D4-D8, werden auch bei Kindern am Anfang der Therapie gegeben sowie bei einer mehr oder minder akuten Erkrankung – also gleiches Vorgehen wie beim Erwachsenen.

Höhere Potenzen, etwa D12-D30, werden auch im Kindesalter zur Anwendung gebracht nach einer anfänglichen Behandlung mit niederen Potenzen (D4-D8) bzw. bei chronischen Leiden. Hier gelten also die gleichen Potenzierungsangaben wie bei den Erwachsenen.

Generell gilt: Mit Nosoden – als „Heilmittel des Terrains“ – kann praktisch jede Therapie wirkungsvoll unterstützt werden.

Nosoden stellen in der Therapie oft das fehlende Glied einer Reaktionskette dar, wobei eine Heilung ohne das Nosodenpräparat nicht endgültig oder nur unter großen Schwierigkeiten erzielt werden kann.

Aus homotoxikologischer Sicht werden Nosoden hauptsächlich eingesetzt, um zelluläre Phasen in humorale Phasen zu überführen, d.h. um eine regressive Vikariation zu erzielen.
Jedoch sind Nosoden auch bei humoralen Phasen angezeigt, wenn ein Abgleiten in einen chronischen Zustand, d.h. eine progressive Vikariation befürchtet werden muß.
Die Therapie mit Nosodenpräparaten ist vor allem auch für den Elektroakupunkteur von sehr großem Interesse, da dieser die entsprechende(n) Nosode(n) mittels der Medikamententestung exakt bestimmen kann.

Zusammensetzung
Aus Platzgründen ist die Angabe der Bezugsgrößen und Menge bei den einzelnen Präparaten nicht aufgeführt. Für die folgenden Nosodenpräparate gilt als Beispiel:

Bacillinum-Injeel	1,1 ml Injektionslösung enthalten: Bacillinum-Nosode D12, Bacillinum-Nosode D30, Bacillinum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml.
Bacillinum-Injeel forte	1,1 ml Injektionslösung enthalten: Bacillinum-Nosode D8, Bacillinum-Nosode D12, Bacillinum-Nosode D30, Bacillinum-Nosode D200 jeweils 0,275 ml.

Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Präparateliste Nosoden

Adenoma mammae-Injeel
Adenoma prostatae-Injeel
Appendicitis-Nosode-Injeel
Asthma-Nosode-Injeel
Bacillinum-Injeel
Bacillinum-Injeel forte
Bacterium coli-Injeel
Bacterium coli-Injeel forte
Bacterium lactis aerogenes-Injeel
Bacterium proteus-Injeel
Bacterium pyocyaneus-Injeel
Calculi bili-Injeel
Calculi renales-Injeel
Carcinoma bronchium-Injeel
Carcinoma coli-Injeel
Carcinoma hepatis-Injeel
Carcinoma hepatis metastatis-Injeel
Carcinoma laryngis-Injeel
Carcinoma mammae-Injeel
Carcinoma uteri-Injeel
Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel
Coxsackie-Virus-A9-Injeel
Coxsackie-Virus-A9-Injeel forte
Coxsackie-Virus-A9 D8
Coxsackie-Virus-B4-Injeel
Coxsackie-Virus-B4-Injeel forte
Crinis humanus-Injeel
Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel
Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel forte
Diverticulose-Nosode-Injeel
Duodenitis-Nosode-Injeel
Fibroma pendulum-Injeel
Fluor albus-Nosode-Injeel
Gastritis-Nosode-Injeel
Glioma-Injeel
Granuloma dentis-Injeel
Grippe-Nosode-Injeel
Grippe-Nosode-Injeel forte
Herpes simplex-Nosode-Injeel
Herpes simplex-Nosode-Injeel forte
Herpes zoster-Nosode-Injeel
Herpes zoster-Nosode-Injeel forte
Kieferostitis-Nosode-Injeel
Kieferostitis-Nosode-Injeel forte
Klebsiella pneumoniae-Injeel
Klebsiella pneumoniae-Injeel forte
Listeriose-Nosode-Injeel
Mastoiditis-Nosode-Injeel
Mastopathia cystica-Nosode-Injeel
Medorrhinum-Injeel
Medorrhinum-Injeel forte
Meningeoma-Injee
Mumps-Nosode-Injeel
Mumps-Nosode-Injeel forte
Myoma uteri-Injeel
Myoma uteri-Injeel forte
Nagelmykose-Nosode-Injeel
Nagelmykose-Nosode-Injeel forte
Neurofibroma-Injeel
Osteomyelitis-Nosode-Injeel
Otitis media-Nosode-Injeel
Otitis media-Nosode-Injeel forte
Ovarialcyste-Injeel
Parodontose-Nosode-Injeel
Pertussis-Nosode-Injeel
Poliomyelitis-Nosode-Injeel
Polypus laryngis-Injeel
Polypus nasalis-Injeel
Psorinum-Injeel
Psorinum-Injeel forte
Pyodermie-Nosode-Injeel
Rubeolae-Nosode-Injeel
Salmonella paratyphi B-Injeel
Salmonella paratyphi B-Injeel forte
Salmonella typhi-Injeel
Salmonella typhi-Injeel forte
Sinusitis-Nosode-Injeel
Staphylococcus-Injeel
Staphylococcus-Injeel forte
Streptococcus haemolyticus-Injeel
Streptococcus haemolyticus-Injeel forte
Streptococcus viridans-Injeel
Streptococcus viridans-Injeel forte
Struma cystica-Injeel
Struma nodosa-Injeel
Struma parenchymatosa-Injeel
Sutoxol-Injeel
Sutoxol-Injeel forte
Tetanus-Antitoxin-Injeel
Tonsillarpfröpfe-Injeel
Tonsillitis-Nosode-Injeel
Trichomonaden-Fluor-Injeel
Tuberculinum-Injeel
Tuberculinum-Injeel forte
Ulcus ventriculi-Nosode-Injeel
Vaccininum-Injeel

• 4.3.4 SUIS-ORGANPRÄPARATE

Was sind Suis-Organpräparate?
Ein wichtiger Bestandteil der Antihomotoxischen Therapie ist die Gabe von Suis-Organpräparaten. Diese werden bevorzugt bei chronischen Krankheitsverläufen in den zellulären Phasen eingesetzt. Sie sind damit insbesondere für den älteren Patienten eine hervorragende Möglichkeit, die Organfunktionen zu reaktivieren. Die Präparate werden nach dem Simile-Prinzip eingesetzt, d.h. man verwendet jeweils das Präparat des zu therapierenden Organes.
Die Suis-Organpräparate sind nach Vorschrift 42 des amtlichen Homöopathischen Arzneibuches 2000 (HAB 2000) homöopathisch aufbereitete, d.h. verdünnte und potenzierte Organgewebe, deren Ausgangsstoffe von gesunden Schweinen stammen.

Die Suis-Organpräparate können wirkungsmäßig als organspezifische Arzneimittel mit stimulativen Eigenschaften charakterisiert werden. Der Wirkmechanismus der Suis-Organpräparate beruht auf einer organotropen Wirkung der zugeführten Substanzen bzw. Reize.

Haltung der Spendertiere und Organgewinnung
Zur Aufzucht der Schweine für die Herstellung der Suis-Organpräparate ist folgendes zu sagen: Die für die Organentnahme vorgesehenen Tiere stammen alle aus derselben Zuchtlinie eines als SPF-Bestand („spezifisch pathogenfrei“) anerkannten Ferkelerzeugerbetriebes, der in sechswöchigen Abständen vom zuständigen Staatlichen Tiergesundheitsdienst überwacht wird.

Die Aufzucht der Ferkel erfolgt in einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb. Dort wird zunächst eine Eingangsuntersuchung durch einen Tierarzt vorgenommen. Nachdem die Ferkel diese passiert haben, werden sie auf dem Hof von anderen Tieren getrennt gehalten und unter tierärztlicher Überwachung aufgezogen. Tiere, die wegen Erkrankung medikamentös behandelt werden mußten, werden von der Organentnahme ausgeschlossen. Als Futter werden hofeigene, vegetabile Futtermittel verwendet. Für beide Betriebsinhaber besteht eine vertragliche Verpflichtung, keine aus Säugetieren hergestellten Tiermehle oder Abfälle zu verfüttern.

Nach Erreichen des Schlachtgewichtes und durchgeführter Abgangsuntersuchung durch den zuständigen Amtstierarzt werden die Schweine auf dem nächstgelegenen Schlachthof, der EG-Status haben muß, nach der fleischbeschaurechtlich geforderten Lebendbeschau geschlachtet und anschließend daran die Schlachtkörperbeschau durchgeführt. Falls diese zu der Beurteilung „tauglich zum menschlichen Verzehr“ führt, werden Proben für folgende weitere Untersuchungen entnommen: eine bakteriologische Untersuchung, eine Untersuchung auf Hemmstoffe sowie eine serologische Untersuchung auf Brucellose, Leptospirose sowie Yersiniose gemäß den „Zoonosen-Empfehlungen“ des Bundesministeriums für Gesundheit vom 08.07.1991.

Anschließend werden dann in speziellen, vom übrigen Schlachthof abgetrennten und eigens für diesen Zweck errichteten Räumlichkeiten die für die Herstellung der Suis-Organpräparate benötigten Organe entnommen, die zunächst so lange unter Quarantäne bleiben, bis die Ergebnisse aller in die Wege geleiteten Untersuchungen vorliegen.

Erst dann werden die entnommenen Organe von der Oualitätskontrolle der Firma zur weiteren Verarbeitung freigegeben.

Eine Sterilisation erfolgt erst, wenn die Fertigung der potenzierten Organzubereitungen abgeschlossen ist. Damit behält das Material während der Potenzierung den Charakter des lebendigen Gewebes und die Präparate haben eine direkte Eiweißbeziehung zu den erkrankten Organen.

Die aufgezeigten Maßnahmen, die auch alle in einem Tierprotokoll dokumentiert werden, dienen dem Ziel, einen höchstmöglichen Standard bezüglich der Arzneimittelsicherheit (Zoonosen) für die Suis-Organpräparate zu gewährleisten.

Das Schwein als Spendertier
weist in seiner chemischen und biologischen Konstitution mit dem menschlichen Organismus zahlreiche Ähnlichkeiten auf, es entspricht also dem homöopathischen Simile.

Über die morphologische bzw. biologische Ähnlichkeit zwischen dem Organismus des Schweines und dem des Menschen wurde in den letzten Jahrzehnten wiederholt berichtet.
Einen Überblick über die Gemeinsamkeiten zwischen Schwein und Mensch gibt *Kirkman* (*Kirkman RL.*, 1989: Of swine and man: organ physiology in different species. In: Hardy MA (ed.): Xenograft 25. Elsevier, Amsterdam u.a.).

Ähnliche Merkmale von Schwein und Mensch (*nach Kirkman*, 1989)

1.	Größe
2.	Ernährungsgewohnheiten: Allesfresser
3.	Verdauungsphysiologie
4.	Nierenstruktur und -funktion
5.	Atemfrequenz und Atemvolumen
6.	Verlauf der Koronararterien
7.	Hämodynamik
8.	Neigung zum Fettansatz
9.	Krankheitsanfälligkeit
10.	Sozialverhalten

Aus homöopathischer Sicht kann damit ein vom Schwein gewonnenes und homöopathisch aufbereitetes Organpräparat als Simile zu den homologen menschlichen Organen angesehen werden, da trotz der Zugehörigkeit zu verschiedenen Spezies zahlreiche funktionale und strukturelle Ähnlichkeiten bestehen.

Reckeweg spricht deshalb den Organzubereitungen vom Schwein eine stärkere Wirkung zu als Präparaten, die vom Rind oder vom Schaf gewonnen wurden.

Anwendungsgebiete der Suis-Organpräparate
Die Suis-Organpräparate werden eingesetzt bei Erkrankungen der homologen humanen Organe. In der Stoffcharakteristik für nach HAB 2000 hergestellte Organpräparate, die von der für die Homöopathie zuständigen Aufbereitungskommission D am Bundesgesundheitsamt erarbeitet wurde, heißt es: „Organpräparate in homöopathischen Zubereitungen werden aus der Vorstellung heraus angewendet, daß bei einer Schwäche oder Störung des homologen Zielorgans im Menschen durch das entsprechende Organpräparat eine Unterstützung bewirkt wird“, und als Anwendungsgebiet wird dort genannt: „Unterstützende Behandlung bei einer Schwäche oder Störung des homologen Zielorgans im Menschen.“

Die Suis-Organpräparate sind besonders und vornehmlich bei zellulären Phasen, speziell bei chronischen Erkrankungen (Imprägnations-, Degenerations-, Dedifferenzierungsphasen) indiziert, können durchaus aber auch bei Phasen links des Biologischen Schnittes Anwendung finden, z.B. bei pathologisch gestörten Exkretionsphasen (Hyperhidrosis, Dysmenorrhoe, Obstipation, Ausscheidungsschwäche der Nieren u.a.).
Darauf hingewiesen sei, daß auch bei einer Vielzahl von Depositionsphasen, z.B. rheumatischen Erkrankungen, Myomen, Adipositas, Steinleiden usw. eine Therapie mit Suis-Organpräparaten angezeigt ist.

Hinweise zur Dosierung und zu den Applikationsarten der Suis-Organpräparate
Ein allgemeines Schema eines Therapieplanes zur Anwendung von Suis-Organpräparaten bei chronischen bzw. degenerativen Organschäden zeigt die folgende Tabelle.

Dauer ca.	Behandlung
3 - 4 Wochen	Vorbehandlung mit Entgiftungsmitteln (Hepeel, Lymphomyosot N, Galium-Heel N, Engystol, Psorinoheel N, Ubichinon compositum Ampullen, Coenzyme compositum Ampullen u.a.)
4 - 5 Wochen	1- bis 2mal wöchentlich Verabreichung der Suis-Organpräparate (i.m., s.c., i.c., in Akupunkturpunkte, auch oral oder als Auto-Sanguis-Stufentherapie; zunächst Injeel-Form, nach 6 - 8 Injektionen Injeel forte-Form) zusammen mit individuell gewählten antihomotoxischen Arzneimitteln
3 - 4 Wochen	Absetzen der Suis-Organpräparate nur die antihomotoxische Begleitmedikation wird weitergegeben. Falls nötig, zweite Injektionsserie mit Suis-Organpräparaten. Evtl. nach der klinischen Heilung Fortsetzung der Verabreichung der Organpräparate alle 2 - 3 Wochen

Nach der vierten bis fünften Woche der Verabreichung der Injeel-Form des Suis-Organpräparates wird versuchsweise – also gewissermaßen als Testampulle – die Injeel forte-Form i.m. bzw. s.c. verabfolgt, um festzustellen, inwieweit das betreffende Organ funktionsmäßig schon regeneriert ist bzw. ob sich die Heilung schon weitgehend durchgesetzt hat.

Bei schweren degenerativen Phasen sowie versuchsweise auch bei Dedifferenzierungsphasen müssen die Injektionen eventuell häufiger (alle 2 bis 3 Tage) verabfolgt und mit Präparaten, durch welche regressive Vikariationen provoziert und gefördert werden (Galium-Heel N, Engystol, Traumeel S), unterstützt werden, was zweckmäßig in Form von Mischspritzen erfolgt.

Auch Mischspritzen mit dem jeweils organtherapeutisch indizierten Biotherapeutikum sind oft zweckmäßig (z.B. mit Hepeel).

Desgleichen ist es oft angezeigt, mehrere Suis-Organpräparate entweder in Form einer Mischspritze gleichzeitig oder im alternierenden Rhythmus einzusetzen.

Mit der i.v.-Injektion der Suis-Organpräparate soll man anfangs zurückhaltend sein und diese Applikationsart erst nach längerer Anwendung der i.m.- und s.c.- bzw. i.c.-Injektionen (siehe auch oben!) durchführen.

Bei vielen Fällen empfiehlt es sich, vor Anwendung des jeweils organtherapeutisch indizierten Suis-Organpräparates über 2 bis 3 Wochen das entsprechende ableitende (= kanalisierende), funktionsmäßig tiefer gelegene Suis-Organpräparat zu applizieren, also bei Leberschäden Vesica fellea suis vor Hepar suis, bei Nierenleiden Vesica urinaria suis und Ureter suis sowie Pyelon suis vor Ren suis usw.

Bei schweren Giftbelastungen ist vor Anwendung des spezifisch indizierten Suis-Organpräparates zweckmäßigerweise das die Ausscheidungsfunktion des Darmes regulierende Organpräparat Colon suis D10, D30, D200 (ein- bis zweimal wöchentlich i.m. oder s.c. über 2 bis 3 Wochen) einzusetzen.

Über die Anwendung der Suis-Organpräparate im Rahmen der Auto-Sanguis-Stufentherapie z.B. bei Therapieschäden, bei toxischen Leberschäden, bei Migräne, bei chronischen Ekzemen, bei Asthma bronchiale, bei Ulcus duodeni bzw. ventriculi, bei Arthrosen und bei Lymphatismus siehe Kapitel 6, wo auch über die Hyperimmunisierungstherapie mit Suis-Organpräparaten berichtet wird.

Anwendungseinschränkungen
Da durch die Suis-Organpräparate immunologische Mechanismen angeregt werden, ist bei Fällen von ausgeprägter Kachexie bzw. von Marasmus eine stimulative Wirkung der Suis-Organpräparate vielfach nicht mehr zu erwarten. Andererseits würde eine eventuell auftretende Herdreaktion beim Abbau geschädigter Zellen kachektische und marantische Patienten u.U. gefährden.

Handelsformen der Suis-Organpräparate
Die Suis-Organpräparate stehen in Ampullen zu 1,1 ml als Potenzenakkorde in zwei Stärkegraden zur parenteralen (und ggf. auch zur oralen – Trinkampullen; s. auch Punkt 4!) Organotherapie zur Verfügung, und zwar jeweils mit dem Potenzenakkord D10, D30, D200 und mit dem Potenzenakkord D8, D12, D30, D200 (= forte-Form).

Zusammensetzung
Aus Platzgründen ist nachfolgend eine vereinfachte Schreibweise gewählt worden. Die beiden Stärkegrade – jeweils mit Zusatz Injeel bzw. Injeel forte bezeichnet – haben grundsätzlich die gleichen obengenannten Werte.

Beispiel:

Aorta suis-Injeel	1,1 ml Injektionslösung enth.: Aorta suis D10, Aorta suis D30, Aorta suis D200 jeweils 0,367 ml.
Aorta suis-Injeel forte	1,1 ml Injektionslösung enth.: Aorta suis D8, Aorta suis D12, Aorta suis D30, Aorta suis D200 jeweils 0,275 ml.
Arteria suis-Injeel	1 ,1 ml Injektionslösung enth.: Arteria suis D10, Arteria suis D30, Arteria suis D200 jeweils 0,367 ml.
Arteria suis-Injeel forte	1,1 ml Injektionslösung enth.: Arteria suis D8, Arteria suis D12, Arteria suis D30, Arteria suis D200 jeweils 0,275 ml. Nach dem gleichen Schema sind alle Suis-Organpräparate aufgebaut. Die Rezeptierung erfolgt immer mit der Zusatzbezeichnung Injeel oder Injeel forte, um die Beschaffung über Apotheke und Großhandel zu beschleunigen.

Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Hinweise zur Erstattung
Bitte beachten Sie, daß einige Privatkrankenkassen bei der Erstattung von Suis-Organpräparaten Schwierigkeiten machen. Die Verordnung auf Kassenrezept ist bei der Beachtung der geltenden Vorschriften möglich.

Präparateliste Suis-Organpräparate

Aorta suis-Injeel
Aorta suis-Injeel forte
Arteria suis-Injeel
Arteria suis-Injeel forte
Bronchus suis-Injeel
Bronchus suis-Injeel forte
Cardia ventriculi suis-Injeel
Cartilago suis-Injeel
Cartilago suis-Injeel forte
Cerebellum suis-Injeel
Cerebellum suis-Injeel forte
Cerebrum frontalis suis-Injeel
Cerebrum frontalis suis-Injeel forte
Cerebrum occipitalis suis-Injeel
Cerebrum occipitalis suis-Injeel forte
Cerebrum suis-Injeel
Cerebrum suis-Injeel forte
Cerebrum totalis suis-Injeel
Cerebrum totalis suis-Injeel forte
Coecum suis-Injeel
Colon suis-Injeel
Colon suis-Injeel forte
Cor suis-Injeel
Cor suis-Injeel forte
Cornea suis-Injeel
Cornea suis-Injeel forte
Corpus luteum suis-Injeel
Corpus luteum suis-Injeel forte
Corpus pineale suis-Injeel
Corpus pineale suis-Injeel forte
Corpus vitreum suis-Injeel
Corpus vitreum suis-Injeel forte
Cutis suis-Injeel
Cutis suis-Injeel forte
Dens suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel forte
Ductus auricularis externus suis-Injeel
Ductus deferens suis-Injeel
Duodenum suis-Injeel
Duodenum suis-Injeel forte
Embryo totalis suis-Injeel
Embryo totalis suis-Injeel forte
Epididymis suis-Injeel
Fel suis-Injeel
Funiculus umbilicalis suis-Injeel
Funiculus umbilicalis suis-Injeel forte
Gingiva suis-Injeel
Gingiva suis-Injeel forte
Glandula lymphatica suis-Injeel
Glandula lymphatica suis-Injeel forte
Glandula parathyreoidea suis-Injeel
Glandula parathyreoidea suis-Injeel forte
Glandula submandibularis suis-Injeel
Glandula suprarenalis suis-Injeel
Glandula suprarenalis suis-Injeel forte
Glandula thymi suis-Injeel
Glandula thymi suis-Injeel forte
Glandula thyreoidea suis-Injeel
Glandula thyreoidea suis-Injeel forte
Hepar suis-Injeel
Hepar suis-Injeel forte
Hypophysis suis-Injeel
Hypophysis suis-Injeel forte
Hypothalamus suis-Injeel
Hypothalamus suis-Injeel forte
Jejunum suis-Injeel
Jejunum suis-Injeel forte
Larynx suis-Injeel
Larynx suis-Injeel forte
Lens suis-Injeel
Lens suis-Injeel forte
Lingua suis-Injeel
Mamma suis-Injeel
Mamma suis-Injeel forte
Medulla oblongata suis-Injeel
Medulla oblongata suis-Injeel forte
Medulla ossis suis-Injeel
Medulla ossis suis-Injeel forte
Medulla spinalis suis-Injeel
Medulla spinalis suis-Injeel forte
Mucosa nasalis suis-Injeel
Mucosa nasalis suis-Injeel forte
Musculi oculi suis-Injeel
Musculus suis-Injeel
Musculus suis-Injeel forte
Nervus olfactorius suis-Injeel
Nervus opticus suis-Injeel
Nervus opticus suis-Injeel forte
Oculus totalis suis-Injeel
Oculus totalis suis-Injeel forte
Oesophagus suis-Injeel
Onyx suis-Injeel
Os petrosum suis-Injeel
Os petrosum suis-Injeel forte
Os suis-Injeel
Os suis-Injeel forte
Ovarium suis-Injeel
Ovarium suis-Injeel forte
Pankreas suis-Injeel
Pankreas suis-Injeel forte
Parotis suis-Injeel
Placenta fetalis suis-Injeel
Placenta suis-Injeel
Placenta suis-Injeel forte
Pons suis-Injeel
Prostata suis-Injeel
Prostata suis-Injeel forte
Pulmo suis-Injeel
Pulmo suis-Injeel forte
Pulpa dentis suis-Injeel
Pulpa dentis suis-Injeel forte
Pyelon suis-Injeel
Rectum suis-Injeel
Rectum suis-Injeel forte
Ren suis-Injeel
Ren suis-Injeel forte
Retina suis-Injeel
Retina suis-Injeel forte
Salpinx uteri suis-Injeel
Sanguis suis-Injeel
Splen suis-Injeel
Splen suis-Injeel forte
Sympathicus suis-Injeel
Testis suis-Injeel
Testis suis-Injeel forte
Tonsilla pharyngica suis-Injeel
Tonsilla suis-Injeel
Tuba Eustachii suis-Injeel
Tuba Eustachii suis-Injeel forte
Ureter suis-Injeel
Urethra suis-Injeel
Uterus suis-Injeel
Uterus suis-Injeel forte
Vena suis-Injeel
Vena suis-Injeel forte
Ventriculus suis-Injeel
Ventriculus suis-Injeel forte
Vesica fellea suis-Injeel
Vesica fellea suis-Injeel forte
Vesica urinaria suis-Injeel
Vesica urinaria suis-Injeel forte

5 Biotherapeutika-Antihomotoxika, ihr stofflicher Aufbau und ihre medizinisch-therapeutische Wirkungsweise

5.1 Der Unterschied der Biotherapeutika-Antihomotoxika zu klassischen Homöopathika

Während der klassisch therapierende, homöopathische Arzt ausschließlich mit sogenannten Einzelmitteln therapiert, deren Inhaltsstoffe nach den festgelegten Herstellungsregeln des homöopathischen Arzneibuches potenziert werden und deren Anwendung nach Anamnese und anschließender Repertorisation gemäß der Simile-Regel erfolgt, werden Biotherapeutika-Antihomotoxika vom antihomotoxisch therapierenden Arzt in der Regel indikationsmäßig eingesetzt. Die Biotherapeutika-Antihomotoxika bestehen meist aus Kombinationen homöopathischer Stoffe und sind nach der Legaldefinition der EU-Richtlinie 92/73 EC homöopathische Arzneimittel, die ausschließlich nach den Vorschriften des amtlichen deutschen Homöopathischen Arzneibuches (HAB 2000) hergestellt werden.

Im Gegensatz zu den klassischen homöopathischen Einzelmitteln kommt es beim therapeutischen Einsatz der Biotherapeutika-Antihomotoxika wesentlich darauf an, daß diese Arzneimittel entsprechend den Maßgaben der Homotoxikologie nach Reckeweg eingesetzt werden. Dies bedeutet im einzelnen, daß der Arzt zunächst die Phase, in der sich die Krankheit des zu behandelnden Patienten gemäß der Sechs-Phasen-Tabelle nach Reckeweg zur Zeit befindet, bestimmt.

Wegen des phasenhaften Verlaufs von Krankheiten muß der Arzt sein Augenmerk auf sogenannte Vikariationseffekte, darunter versteht man den Wechsel einer Krankheit von einer Phase in eine andere, richten. Therapeutisches Ziel ist die Rückführung der Krankheit aus einer Phase rechts des Biologischen Schnittes (Phasen 4 bis 6) in eine Phase links des Biologischen Schnittes (Phasen 1 bis 3). Dazu muß in jedem Falle die Ausleitung von Homotoxinen mit den entsprechenden Biotherapeutika-Antihomotoxika in Gang gesetzt werden.

Wegen der hohen Komplexität von Krankheiten, besonders wenn diese chronifiziert sind, kommt es für den Erfolg der antihomotoxischen Therapie entscheidend darauf an, die Biotherapeutika-Antihomotoxika „phasen-gerecht“ einzusetzen. Dabei kann als Daumenregel gelten, daß insbesondere die sogenannten Compositum-Präparate bei den Krankheiten in den sogenannten Matrixphasen 3 und 4 sowie in der Degenerations- und Dedifferenzierungsphase indiziert sind. Dies im wesentlichen aus dem Grund, weil neben den spezifischen klassischen homöopathischen Wirkstoffen weitere antihomotoxische Wirkstoffe wie potenzierte Suis-Organauszüge, Katalysatoren, Nosoden und, in einigen Fällen, auch die sogenannten Homöopathisierten Allopathika in diesen Präparaten enthalten sind. Wie sich nämlich in der Praxis gezeigt hat, können klassische homöopathische, gut gewählte Simile eine Krankheit, die sich in den zellulären Phasen 4 oder 5 befindet, oft nicht in eine regressive Vikariation überführen, wenn nicht dafür Sorge getragen wird, daß z.B. bestimmte Enzymdeffekte oder Blockaden auf der zellulären Ebene vorher durch richtig gewählte antihomotoxische Wirkstoffe wie Katalysatoren, Suis-Organbestandteile, Nosoden und homöopathisierte Allopathika aufgehoben werden. Erst nach Aufhebung der Blockaden tritt die Wirkung des angezeigten Similes ein. Denn das homöopathische Einzelmittel setzt ein noch zumindest teilweise auf stimulative Reize antwortendes Terrain voraus. Reaktionsblockaden müssen mit anderen Strategien aufgebrochen werden wie z.B. der antihomotoxischen Ausleitung, der Auto-Sanguis-Stufenkur, der Neuraltherapie und der Diätetik.

Zur Erreichung der „regressiven“ Vikariation sind demnach gut gewählte Einzelmittel + Injeele/forte aus dem Bereich der Katalysatoren, Nosoden und Suis-Organe oder entsprechende Kombinationen, besonders die sogenannten Compositum-Präparate geeignet. Wenn jedoch ein regressiver Vikariationseffekt eingetreten ist und sich die Zweit- oder Drittkrankheit (Stellvertreterkrankheit) z.B. in die Phase 2 zurückentwickelt hat, dann sind auch klassische Einzelmittel oder die üblichen Spezialitäten der Biotherapeutika-Antihomotoxika, welche lediglich Kombinationen klassischer Einzelbestandteile enthalten, erfolgreich anwendbar.

Für die zielführende Anwendung der Biotherapeutika-Antihomotoxika ist aus dem oben Gesagten folgendes festzuhalten:

- die Festlegung der Phase, in der sich die Krankheit befindet
- die Erfassung von Vikariationseffekten
- die Ausleitung von Homotoxinen und
- die antihomotoxische oder homöopathische Behandlung der nach der Vikariation entstandenen Krankheit in der Ausleitungsphase.

Das Arzneimittelbild der Homöopathie kann durch Kombination mehrerer Arzneimittelbilder, wie es z.B. in den antihomotoxischen Compositum-Präparaten gegeben ist, schärfer individuell eingestellt werden. Die Antihomotoxika eignen sich gleichzeitig zum indikationsbezogenen Einsatz.

5.2 Die Behandlung von Krankheiten rechts des Biologischen Schnittes mit Biotherapeutika-Antihomotoxika

Den sogenannten zellulären Phasen rechts des Biologischen Schnittes sind folgende Eigenschaften gemeinsam:

- sie haben eine längere Entwicklungszeit hinter sich, d.h. die Erkrankungen weisen Chronizität auf;
- als Folge der Chronizität sind in der Regel intrazelluläre, strukturelle Schäden an Organellen der Zelle eingetreten;
- die strukturellen Schäden sind häufig auf Blockaden von physiologischen metabolischen Prozeßketten zurückzuführen (Enzymblockaden);
- die Matrix ist in ihrer Funktion durch Ablagerung von Stoffwechselmetaboliten (= Homotoxinen) und durch die häufig begleitende Azidose in ihrer Funktionalität stark verändert;
- die Veränderung der Matrix hat wiederum Auswirkungen auf die immunologischen Reaktionen innerhalb der Matrix (immuntoxische und paradox verlaufende Reaktionen);
- dadurch bedingt ist die ordnungsgemäße Versorgung von angrenzenden Parenchymzellen mit den über die Blutkapillaren herangebrachten Nährstoffen stark verändert oder eingeschränkt (Störung der Transitstreckenfunktion der Matrix).

Mit der Veränderung der Matrix und der physiologischen Reaktionsweise der Matrix wird gleichzeitig der Abtransport von Schadstoffen und Metaboliten behindert mit der Folge der Rückgiftwirkung dieser Abfallstoffe (Homotoxine) auf die zu entsorgenden Organparenchymzellen.

Aus diesen obengenannten Veränderungen insbesondere in der Matrix ergibt sich bei Erkrankungen rechts des Biologischen Schnittes zwanglos die allgemeine antihomotoxische Strategie zur Behebung dieser Schäden durch:

- Drosselung der weiteren Schadstoffzufuhr z.B. durch Kostumstellung (Diät),
- Deblockade von Enzymsystemen besonders in den stoffwechselaktiven Organen wie Leber und Niere sowie Intestinaltrakt und Lunge mit Hilfe der Katalysatoren-Präparate,
- Beseitigung der Gewebsazidose, z.B. durch alkalische Kost,
- Drainage der Matrix über die verschiedenen Entgiftungstechniken wie Lymphdrainage, physikalische Therapie (Sauna), Gabe von homöopathischen Lymphmitteln (z.B. Lymphomyosot N),
- therapeutische Restitution von geschädigten intrazellulären Strukturen mittels geeigneter Biotherapeutika-Antihomotoxika (z.B. Suis-Organpräparate).

Bei der Drainage der Matrix empfiehlt sich neben der Gabe von Lymphmitteln die Gabe von Nosoden, da die Nosode als Isotherapeutikum einen hochspezifischen Reiz zur Veränderung der Giftlage bewirkt. Nosoden sind bekanntlich Therapeutika des Terrains und haben die Eigenschaft, den Körper spezifisch an die „ähnliche“ oder vergleichbare toxische Gesamtsituation der durch die Nosoden repräsentierten Erkrankungen zu „erinnern“.

Darüber hinaus kann es zur Behandlung einer Rückgiftwirkung durch häufige Einnahme von stark wirksamen allopathischen Substanzen erforderlich sein, das jeweilige homöopathisierte Allopathikum quasi als „Arzneimittel-Nosode“ dem kranken Organismus anzubieten. Durch die Homöopathisierung des Allopathikums, im allgemeinen gilt dies etwa ab der D6-Potenz, wird eine Umkehrung der Giftwirkung dieses Allopathikums induziert. Für diese Umkehrwirkung liefern die Arndt-Schulz'sche Regel bzw. der Hormesis-Effekt eine schlüssige wissenschaftliche Erklärung.

Die Deblockade von Enzymen oder Stoffwechselketten wird sehr wirkungsvoll durch die Gabe von antihomotoxischen Katalysatoren-Präparaten wie Coenzyme compositum im Wechsel mit Ubichinon compositum erreicht. Beide Präparate enthalten eine sinnvolle Kombination wichtiger Vitamine und Coenzyme sowie Zwischenprodukte der energieliefernden Stoffwechselzyklen in homöopathischer Potenzierung ab D6. Nach Schmid (1) greifen diese Präparate auf der molekularen Ebene an den Mitochondrien an und helfen dem Organismus, die energieliefernden intrazellulären Prozesse wieder einzuregulieren. Dabei sind die Potenzen in der Größenordnung von D6 bis D10 substitutiv und können metabolische Entgleisungen in den energieliefernden Zyklen durch Substitution wieder in Gang setzen.

Da jede schwere Erkrankung, die keine Selbstheilungstendenz mehr aufweist, gekoppelt ist mit Entgleisungen auf der Ebene der energieliefernden Prozesse, ist deshalb eine begleitende, evtl. intermittierende Gabe dieser Präparate in allen Fällen angezeigt, was in der therapeutischen Praxis, sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin, immer wieder erfolgreich bestätigt werden konnte.

Eine sinnvolle Ergänzung erfahren diese beiden Katalysatoren-Präparate durch die Gabe einer Spurenelementkombination wie z.B. Molybdän compositum. In dieser Kombination werden wichtige Spurenelemente wie Molybdän, Zink, Eisen, Kobalt, Cer, Mangan, Kupfer, Nickel, Rubidium mit Sulfur und Phosphor kombiniert, die beide als Polychreste eine stark stimulative Wirkung besonders auf Schleimhäute und Gewebezellen besitzen und zu den sogenannten Reaktionsmitteln in der Homöopathie gehören. Die obengenannten Spurenelemente liegen als Salze in Tiefpotenzen zwischen D3 und D8 vor. In diesen Bereichen haben diese Spurenelemente keine toxischen Wirkungen mehr, sondern sie haben eine rein stimulative bzw. eine substitutive Wirkung. Diese Elemente katalysieren viele enzymabhängige Reaktionen. Bekanntlich sind insbesondere Molybdän, Kupfer, Nickel, Zink, Mangan und Kobalt Elemente, die essentiell für bestimmte Enzymkomplexe sind, d.h. ohne sie können diese Enzymkomplexe nicht arbeiten.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Katalysatoren, Mineralien und Spurenelemente enthaltenden Compositum-Präparate bei allen mit Energiedefiziten verbundenen, chronischen Erkrankungen angezeigt sind wie z.B. dem Chronic Fatigue-Syndrome oder bei altersbedingten Verschleißkrankheiten.

5.3 Das Vikariationsphänomen

Durch die Einführung des Vikariationsprinzips in die antihomotoxische Therapie hat Reckeweg auf die Dynamik jedes Krankheits- bzw. Gesundungsprozesses aufmerksam gemacht. Die Wechselbeziehungen, die zwischen einem Biosystem und den schädigenden Homotoxinen bestehen, ändern sich während einer Erkrankung und bei dem Gesundungsprozeß ständig. Die zielgerichteten selbstregulatorischen Kräfte des Organismus bleiben in der Regel bei Erkrankungen bis einschließlich der 3. Phase der 6-Phasen-Tabelle der Homotoxikosen noch erhalten. Dagegen sind nach Überschreitung des Biologischen Schnittes ab Phase 4 die Selbstregulation und eine Heilung aus eigener Kraft für den Organismus praktisch nicht mehr möglich. In diesem Falle muß deshalb therapeutisch-medizinisch eingegriffen werden, um doch noch eine Gesundung zu erzielen.

Da die Rückführung einer Krankheit nach einer „regressiven“ Vikariation meist in die Phasen 3 oder 2 einmündet, treten nach der Rückführung von zellulären Erkrankungen rechts des Biologischen Schnittes häufig Entzündungsphasen auf. Dadurch wird in der Regel auch ein Wechsel des antihomotoxischen Therapeutikums erforderlich, da in der Phase 2 das symptomatisch angezeigte Akutmittel angezeigt ist.

In den Phasen 2 und 3, die zu den sogenannten humoralen Phasen nach Reckeweg gehören, ist die Selbstregelungskapazität des Organismus – wie gesagt – noch vorhanden, so daß es lediglich stimulativer Arzneireize bedarf, um insbesondere in der Matrix Entzündungsmechanismen in Gang zu setzen und in kontrollierter Weise ablaufen zu lassen. Dabei tritt meist die Ausleitung der Krankheit über die Haut oder die Schleimhäute auf. Vermehrtes Schwitzen, Auswurf, kräftige Harnbildung, leichte Diarrhöe und Fieber sind begrüßenswerte Anzeichen einer Verschiebung aus den zellulären Krankheitsphasen 4 bis 6 und Zeichen einer regressiven Vikariation und Besserung des Grundleidens. In den Akutphasen 1 und 2 sind Compositum-Präparate der vorher beschriebenen Art im Grunde nicht mehr erforderlich, sondern es sind Akutpräparate wie z.B. Traumeel S oder gut gewählte Homaccord-Präparate oder Einzelmittel-Injeele die Mittel der Wahl.

5.4 Die Wirkung der Homaccorde und Injeele

Homaccorde und Injeele oder Misch-Injeele sind Präparate, die einen oder mehrere homöopathische Wirkstoffe in jeweils mehreren Potenzstufen enthalten. Dabei ist in der Regel eine Tiefpotenz mit einer mittleren Potenz und einer Hochpotenz kombiniert. Hintergrund dieser Potenzenkombination, genannt Potenzenaccord, ist die bereits seit fast 100 Jahren bestehende therapeutische Erfahrung, daß die gleichzeitige Gabe von niedriger, mittlerer und hoher Potenz eine Verminderung der Erstverschlimmerung bewirkt. Bekanntlich treten Erstverschlimmerungen besonders häufig bei der Gabe von einzeln gegebenen Hochpotenzen auf.

Mit der Gabe eines Potenzenaccordes wird der Organismus auf mehreren hierarchischen Ebenen angesprochen, nämlich auf der organotropen Ebene durch die Tiefpotenz, auf der funktiotropen Ebene durch die mittlere Potenz und auf der „informativen“ oder „geistigen“ Ebene mit Hilfe der Hochpotenz. Da insbesondere im Verlaufe von regressiven Vikariationen chronischer oder schwerer Erkrankungen aus den Phasen 4, 5 oder gar 6 erhebliche funktionale und informative neben den makroskopisch faßbaren organisch-strukturellen Fehlern auftreten, sind solche Potenzenaccord-Präparate wegen der darin enthaltenen Hochpotenz auch zur Ausleitung zellulärer Erkrankungen geeignet.

5.5 Erkrankungen in der humoralen Phase (Phase 1 bis 3 der 6-Phasen-Tabelle) und ihre antihomotoxische Behandlung

Die Behandlung von Krankheiten der humoralen Phase (1 bis 3) kann mit relativ „unspezifischen“ homöopathischen Substanzen erfolgen. Unspezifisch soll hier heißen, daß der Angriffspunkt des Präparates sich nicht auf ein bestimmtes, z.B. degenerativ geschädigtes Organ konzentriert, sondern daß es eine Wirkung auf den gesamten Organismus ausübt und insbesondere über das Blut und das Lymphsystem einwirkt.

Dabei hat sich in der Praxis herausgestellt, daß solche Erkrankungen der humoralen Phase insbesondere der Depositionsphase (Phase 3) sehr wirksam durch eine sogenannte Auto-Sanguis-Stufenkur, d.h. eine Eigenblut-Nosode in Kombination mit Spezialitäten bzw. Reaktionstherapeutika, zu behandeln sind. Typische Vertreter dieser Präparate sind beispielsweise die unspezifisch stimulierenden Präparate bei allen Infektionserkrankungen wie z.B. Gripp-Heel, Engystol oder auch Traumeel S. Die Wirkung dieser Präparate wird durch die Auto-Sanguis-Stufenkur in sehr effizienter Weise verstärkt, weil durch diese Eigenblutnosode ein zusätzlicher immunologischer Reiz besonders auf die Matrix aus geübt wird.

Auch die sogenannten Einzelmittel-Injeele der klassischen homöopathischen Substanzen gehören in die Behandlung von Erkrankungen der humoralen Phase, wobei bei diesen die Kombination von tiefen und hohen Potenzen den Vorteil haben, daß sie eine recht schonende und meist ohne Erstverschlimmerung verlaufende therapeutische Wirksamkeit haben.

Bei allen Erkrankungen der humoralen Phase ist davon auszugehen, daß die intrazellulären Strukturen noch intakt sind und Enzymblockaden oder zelluläre Strukturdefekte noch nicht aufgetreten sind. Aus diesem Grunde kann der Organismus hier direkt durch das homöopathische Simile im gegengiftspezifischen Sinne angeregt und dieser Effekt ggf. durch die Eigenblut-Nosode noch verstärkt werden. Das homöopathische Arzneimittelbild wird bekanntlich am gesunden Probanden bestimmt, der keine zelluläre Erkrankung hat.

Die 3. Phase, die sogenannte Depositionsphase, wird noch zu den humoralen Phasen gerechnet, da das Homotoxin hier lediglich in der Matrix abgekapselt wird und quasi wie auf einer Mülldeponie aus dem Verkehr gezogen wird. Diese Phase tritt immer dann ein, wenn Homotoxine vom Körper nicht mehr in der Inflammationsphase 2 abgebaut werden können.

Bei der Depositionsphase werden die Homotoxine kondensiert abgelagert, jedoch meist ohne strukturelle Änderungen der Matrix bzw. funktionelle Beeinträchtigungen größeren Ausmaßes in ihr zu verursachen. Solange die physiologischen Filter- und Schutzfunktionen durch die Matrix noch wahrgenommen werden können, ist die reguläre Versorgung der umgebenden Parenchymzellen und Gewebe gewährleistet. Dramatisch ändert sich die Situation erst bei der Überschreitung des Biologischen Schnittes, wenn durch immer mehr deponierte, kondensierte Homotoxine die Eigenstruktur der Matrix so belastet wird, daß sie ihre Filter- und Schutzfunktion im Rahmen der Versorgungsleistungen nicht mehr wahrnehmen kann und die Homotoxine in die zu versorgenden Gewebezellen einwandern und dort zelluläre, d.h. strukturelle Veränderungen an Zellorganellen wie z.B. Mitochondrien oder Nukleus bewirken.

5.6 Die Applikationsarten von Biotherapeutika-Antihomotoxika

Biotherapeutika-Antihomotoxika können oral, parenteral oder lokal/extern angewendet werden. Dabei empfiehlt sich insbesondere bei gut zu lokalisierenden Beschwerden eine Kombination von oralen mit lokalen Maßnahmen, z.B. bei Verletzungsfolgen oder Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Darüber hinaus ist eine segmentale parenterale Behandlung von bestimmten Körperarealen mittels subkutaner oder intrakutaner Quaddelung oder Infiltration ein häufig praktiziertes Vorgehen bei der Behandlung schmerzhafter Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die am meisten verbreitete Applikationsart ist – wie allgemein bei homöopathischen Präparaten – die systemische orale Applikation mittels Tabletten oder Tropfen bzw. bei Kindern auch die Anwendung von Suppositorien.

Im Einzelfall können Injektabilia anstelle einer parenteralen Applikation auch im Rahmen einer oralen Trinkampullen-Medikation verabfolgt werden. Diese Anwendung empfiehlt sich insbesondere, wenn alkoholische Tropfen nicht zur Anwendung gelangen sollen bei Kleinkindern oder alkoholgefährdeten Patienten.

Die Anwendung von Injektabilia ist sehr vielgestaltig, sie umfaßt die intravenöse, die intramuskuläre, subkutane und intrakutane Applikation oder Quaddelung, aber auch die segmentale, die periartikuläre sowie – in einzelnen Fällen – auch die intraartikuläre Anwendung. Die parenterale Applikation empfiehlt sich als periartikuläre oder subkutane Injektion besonders bei Gelenkbeschwerden und gut lokalisierbaren Schmerzen. Durch Infiltration von Biotherapeutika-Antihomotoxika in Kombination mit neuraltherapeutischen Substanzen wie Procain oder Xylocain kann sehr rasch und komplikationslos Beschwerdefreiheit erreicht werden. Und schließlich ist die Applikation an Akupunkturpunkte eine sehr wirkungsvolle Applikationsart für Biotherapeutika-Antihomotoxika (Homöosiniatrische Anwendung (6, 7, 9)).

5.7 Literatur

(1) Schmid F., Antihomotoxische Medizin, Band I: Grundlagen, Klinik, Praxis; Aurelia-Verlag, Baden-Baden, 1. Aufl., 1996

(2) Reinhart E., Suis-Organ-Präparate in der Homotoxikologie; Aurelia-Verlag, Baden-Baden, 1. Aufl., 1994

(3) Heine H., Lehrbuch der biologischen Medizin – Grundlagen und Systematik; Hippokrates Verlag, Stuttgart, 2. Aufl., 1997

(4) Luckey T.D., Hormology with Inorganic Compounds. In: Luckey T.D., Vleingopal B., Hutcheson D., editors. Heavy metal - toxicity, safety and hormology. Stuttgart, New York, San Francisco, London, Georg-Thieme-Verlag, 1975; 81-103

(5) Calabrese E. J., Biological Effects of Low Lever Exposures to Chemicals and Radiation; Lewis Publishers, Inc., Michigan, 1991

(6) Skribot E.W., Anwendung von Homöopathika in die homöosiniatrischen Akupunkturpunkte; Biologische Medizin, Band 9, Heft 2, 1980; 51-63

(7) Ebert H., Homöosiniatrie, Haug-Verlag, Heidelberg, 1992

(8) De la Fuye R., Schmidt, H.; Die moderne Akupunktur; Hippokrates-Verlag, Stuttgart, 1952

(9) Frase, W., Behandlung von Schmerzzuständen an Gelenken mit Antihomotoxika, EHK 2/2000; 93–97

6 Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg

6.1 Zusammenfassung

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg stellt eine Sonderform der Eigenblutbehandlung dar. Sie wurde auf der Grundlage der Homöopathie in Verbindung mit der Reckeweg'schen Homotoxinlehre entwickelt und hat sich bei den verschiedensten chronischen bzw. degenerativen Erkrankungen wie z.B. Asthma bronchiale, Ekzeme, Leberschäden und vielen anderen mehr in der Praxis hervorragend bewährt.

Durch Entnahme von Patientenblut, dessen homöopathische Potenzierung über mehrere Stufen und anschließende Re-Injektion können nach Reckeweg genau diese Krankheitsgifte in ein homöopathisch wirksames Reiztherapeutikum verwandelt werden, welches nach dem Arndt-Schulz'schen-Gesetz im Sinne einer Umkehrwirkung die körpereigenen Abwehrkräfte zu verstärkter Entgiftung anregt und dadurch die Heilung der Krankheit fördert.

Die Kombination mit anderen Eigenblttherapien wie UVA/B/E; Ozontherapie oder HOT ist ebenfalls möglich und außerordentlich erfolgreich. Man verwendet für die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie einen bei diesen genannten Methoden immer übrigbleibenden Blutstropfen zur weiteren Potenzierung. Es wird nicht empfohlen, die homöopathischen Präparate mit UV-Licht zu bestrahlen oder mit Ozon zu versetzen, da nicht bekannt ist, ob dadurch die homöopathische Information verändert wird.

Die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie wird heute nach folgenden Regeln durchgeführt:

1. Stufe	Symptomatisches Mittel (z.B. Traumeel S, Belladonna-Homaccord, Apis-Homaccord, Engystol)
2. Stufe	Drainagemittel (Terrainmittel, z.B. Lymphomyosot N, Galium-Heel N)
3. Stufe	Organpräparat (z.B. Suis-Organpräparate, geeignete Composita wie Hepar compositum N, Mucosa compositum)
4. Stufe	Nosode (z.B. Echinacea compositum SN, Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Psorinoheel N oder homöopathisiertes Allopathikum wie Penicillin-Injeel, Doxycyclin-Injeel, Cortison-Injeel)

Die Auto-Sanguis-Stufenkur (1. bis 4. Stufe) wird jeweils in einer einzigen Sitzung zur Durchführung gebracht.

Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzungen sollten in der Regel mindestens 4 bis 5 Tage betragen, da die zu erwartende Reaktion des Organismus aus biologischen Gründen diesen Zeitraum benötigt.

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg mit Biotherapeutika-Antihomotoxika hat sich u.a. zur Behandlung folgender Krankheitsbilder in der Praxis besonders bewährt:

1.	Therapieschäden durch Arzneimittel
2.	Rezidivierende Virusinfekte
3.	Präkanzerosen
4.	Toxische Leberschädigungen
5.	Migräne
6.	Chronische Ekzeme
7.	Asthma bronchiale
8.	Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi
9.	Arthrosen
10.	Lymphatische Diathese/Lymphatismus.

Selbstverständlich muß die Auswahl der zu verabreichenden Präparate stets individuell dem Krankheitsbild und der Reaktionslage des Patienten angepaßt werden.

Am Beispiel von 10 Krankheitsbilder werden anhand einiger bewährter Therapieschemata auch die wichtigsten Präparate aufgezeigt, wobei zum Teil auch Nosoden-Präparate mit einbezogen sind, die allerdings immer in der letzten Stufen appliziert und nicht potenziert werden sollten.

Sobald es gelungen ist, durch die Auto-Sanguis-Stufentherapie das chronische Stadium der jeweiligen Krankheit zu durchbrechen, braucht in vielen Fällen nur noch oral weiterbehandelt zu werden.

6.2 Einführung und theoretische Hinweise

Aus der Medizingeschichte gibt es Hinweise, daß die Wirksamkeit der Eigenblutbehandlung dadurch bemerkt wurde, daß nach stumpfen Traumen mit Hämatombildung auch andere Erkrankungen im Rahmen der Hämatomresorption verschwunden waren. Dies hat dazu geführt, daß in den Anfängen der Eigenbluttherapie (Autohämotherapie) dem Patienten eine kleine Menge Blut abgenommen und sofort wieder intramuskulär injiziert wurde. Damit wurde auf künstliche Weise ein Hämatom geschaffen. Man stellte sich vor, daß durch die Injektion des Eigenblutes Abwehrkräfte freigesetzt würden, die sich gegen die „krankmachenden Kräfte des Blutes“ wendeten. In der Folgezeit wurde die Eigenbluttherapie auf verschiedenste Weise modifiziert und vervollkommnet, wobei die ursprüngliche Eigenbluttherapie – als Reizkörpertherapie, als Umstimmungstherapie, als unspezifische Reiztherapie bzw. als unspezifische Stimulationstherapie – in der Praxis in vielen Einzelfällen wie z.B. der Akne mit guten Erfolgen Anwendung findet.

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg stellt eine Sonderform der Eigenblutbehandlung dar. Sie wurde auf der Grundlage der Homöopathie in Verbindung mit der Reckeweg'schen Homotoxinlehre entwickelt und hat sich bei den verschiedensten chronischen bzw. degenerativen Erkrankungen wie z.B. Asthma bronchiale, Ekzeme, Leberschäden und vielen anderen mehr in der Praxis hervorragend bewährt (siehe auch „Bewährte Indikationen“).

Nach der Homotoxinlehre Reckeweg's werden praktisch fast alle Krankheiten entweder als Abwehrreaktionen des Organismus gegen Gifte oder als Ausdruck von Giftschädigungen definiert. Daraus folgt, daß im Blut eines jeden Patienten die für seine Erkrankung typischen Krankheitsgifte (Homotoxine) wiederzufinden sind.

Durch Entnahme von Patientenblut, dessen homöopathische Potenzierung über mehrere Stufen und anschließende Re-Injektion können nach Reckeweg genau diese Krankheitsgifte in ein homöopathisch wirksames Reiztherapeutikum verwandelt werden, welches nach dem Arndt-Schulz'schen-Gesetz im Sinne einer Umkehrwirkung die körpereigenen Abwehrkräfte zu verstärkter Entgiftung anregt und dadurch die Heilung der Krankheit fördert.

Durch Zugabe geeigneter homöopathischer Injektionspräparate wird die Wirkung des potenzierten Eigenblutes nach dem Bürgischen Prinzip noch zusätzlich verstärkt. Es hat sich daher als zweckmäßig erwiesen, im Rahmen der Auto-Sanguis-Stufentherapie die für den jeweiligen Krankheitsfall indizierten homöopathischen Ampullenpräparate zum Potenzieren des Patientenblutes zu verwenden.

Insgesamt soll mit der Auto-Sanguis-Stufentherapie eine Gegenwirkung gegen exogene und endogene Homotoxine (z.B. auch gegen toxische Abbauprodukte körpereigener Zellen) erreicht werden, welche die naturgerechte Heilung chronischer Krankheiten fördert.

Daneben werden weitere Wirkungsmechanismen diskutiert, insbesondere ein homöopathischer Umkehreffekt gegen Autoantikörper sowie gegen Antigen-Antikörper-Reaktionen durch das in steigenden Verdünnungen mitinjizierte Komplement aus dem körpereigenen Blut (sogenannter Komplement-Umkehr-Effekt; in der 4. Stufe besteht eine Potenzierung des Blutes, die etwa einer C4 entspricht!).

Hierdurch fänden auch die häufig zu beobachtenden günstigen Wirkungen der Auto-Sanguis-Stufentherapie – im Sinne einer Desallergisierung/Desensibilisierung/Hyposensibilisierung – auf Autoaggressionskrankheiten eine Erklärung. Man muß allerdings hierzu sagen, daß es zur Zeit keinerlei größere wissenschaftliche Untersuchungen hierüber gibt. Es handelt sich hierbei um hypothetische Überlegungen, die aus den positiven Beobachtungen in der täglichen Praxis resultieren.

6.3 Praktische Hinweise zur Durchführung

Die Auto-Sanguis-Stufenkur (1. bis 4. Stufe) wird jeweils in einer einzigen Sitzung zur Durchführung gebracht.

Das für die Herstellung der verschiedenen Eigenblutpotenzstufen benötigte Blut kann wie bei einer üblichen Blutabnahme durch Punktion einer Vene und anschließender Aspiration gewonnen werden. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, nach Durchführung einer intravenösen Injektion dieselbe Spritze mit den darin noch enthaltenen Blutresten für die Herstellung der benötigten Eigenblutverdünnungsstufen zu verwenden. Wichtig ist in beiden Fällen, daß die Spritze anschließend vollständig ausgespritzt wird, so daß nur im Konus noch winzige Mengen Blut, eventuell vermischt mit Resten der vorher applizierten Injektionslösung, verbleiben.

Anmerkung
Falls eine Venenpunktion aus technischen oder aus sonstigen Gründen bei der Durchführung der Auto-Sanguis-Stufenkur nicht möglich ist, kann der benötigte Blutstropfen auch mittels Schnepper aus der Fingerbeere oder aus dem Ohrläppchen entnommen werden. Mit dieser Methode braucht dann selbstverständlich auch die erste Stufe nicht i.v. appliziert werden. Vielmehr kann bei dieser „Schnepper-Methode" die Applikation der ersten Stufe bei der Durchführung der Auto-Sanguis-Stufenkur mittels i.m. bzw. s.c. oder i.c. Injektion erfolgen bzw. segmental unter neuraltherapeutischen Gesichtspunkten.

Die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie wird heute nach folgenden Regeln durchgeführt:

1. Stufe	Symptomatisches Mittel (z.B. Traumeel S, Belladonna-Homaccord, Apis-Homaccord, Engystol)
2. Stufe	Drainagemittel (Terrainmittel, z.B. Lymphomyosot N, Galium-Heel N)
3. Stufe	Organpräparat (z.B. Suis-Organpräparate, geeignete Composita wie Hepar compositum N, Mucosa compositum)
4. Stufe	Nosode (z.B. Echinacea compositum SN, Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Psorinoheel N oder homöopathisiertes Allopathikum wie Penicillin-Injeel, Doxycyclin-Injeel, Cortison-Injeel)

Alle vier Stufen werden grundsätzlich in einer Sitzung durchgeführt. Die Applikation der 1. Stufe wurde bereits oben dargestellt. Nachdem die erste Stufe appliziert und die Spritze so gut wie möglich ausgespritzt wurde, so daß sich im Konus der Spritze nur noch Spuren der Injektionsflüssigkeit der 1. Stufe befinden, wird mit derselben Spritze das Präparat der 2. Stufe aufgezogen. Dabei wird ein Schüttelraum in der Spritze freigelassen und 10mal kräftig durchgeschüttelt. Die so erhaltene 2. Stufe wird dann intramuskulär oder subkutan, evtl. segmental oder auch in Akupunkturpunkte, Schmerzpunkte usw. gespritzt. Die 3. Stufe erhält man, indem man mit derselben Spritze nun das Organpräparat aufzieht, einen Schüttelraum freiläßt und wiederum 10mal kräftig im homöopathischen Sinne verschüttelt. Diese 3. Stufe kann dann wie die 2. Stufe i.m., s.c. oder i.c. gespritzt werden. Die 4. Stufe wird dann in gleicher Weise wie die vorigen Stufen mit Nosodenpräparaten oder homöopathisierten Allopathika zubereitet. Wichtig ist dabei zu beachten, daß alle Stufen mit ein und derselben Spritze zubereitet werden. Nur so ist es gewährleistet, daß der Tropfen Blut, der anfänglich im Rahmen der Applikation der 1. Stufe gewonnen wird, auch stufenweise hochpotenziert wird.

Wiederholung
Zu Beginn der Kur sollten Injeele in der forte-Form noch nicht eingespritzt werden. Diese können jedoch nach ca. 2 bis 3 Wochen zum Einsatz kommen, sofern bei den einfachen Injeelen keinerlei überschießende Reaktionen aufgetreten sind (sogenannte Heilkrisen).

Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzungen sollten in der Regel mindestens 4 bis 5 Tage betragen, da die zu erwartende Reaktion des Organismus aus biologischen Gründen diesen Zeitraum benötigt. Sofern irgendwelche Erstverschlimmerungen aufgetreten sind, müssen diese *v o r* erneuter Durchführung abgeklungen sein. Eine Wiederholung der Auto-Sanguis-Stufenkur in kürzeren Abständen als oben angegeben, z.B. alle 3 Tage oder öfter, sollte besonderen Fällen vorbehalten bleiben und nur bei entsprechender Erfahrung mit dieser Therapiemethode durchgeführt werden.
Die Kombination mit anderen Eigenbluttherapien wie UVA/B/E; Ozontherapie oder HOT ist ebenfalls möglich und außerordentlich erfolgreich. Man verwendet für die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie einen bei diesen genannten Methoden immer übrigbleibenden Blutstropfen zur weiteren Potenzierung. Es wird nicht empfohlen, die homöopathischen Präparate mit UV-Licht zu bestrahlen oder mit Ozon zu versetzen, da nicht bekannt ist, ob dadurch die homöopathische Information verändert wird.

6.4 Hyperimmunisierung nach Reckeweg

Bei fehlenden, zu schwachen oder zu schnell nachlassenden Reaktionen auf die Auto-Sanguis-Stufentherapie sollte die Hyperimmunisierung nach Reckeweg zwischengeschaltet werden. Diese Behandlung spricht die Ausscheidungsorgane an und stimuliert diese in ihrer Funktionsfähigkeit. Dies ist erforderlich, da bei der Auto-Sanguis-Stufentherapie eben diese Funktionen mitverantwortlich für die Wirkung sind. Die Hyperimmunisierung besteht darin, daß man, soweit dies praktikabel ist, in kurzen Zeitabständen (z.B. alle 3 bis 4 Stunden) dasselbe Suis-Organpräparat eventuell sogar in steigenden Stärken oder verschiedene Suis-Organpräparate hintereinander subkutan oder intramuskulär injiziert. Ein allgemeines Schema könnte wie folgt aussehen:

1.	Vesica urinaria suis-Injeel
2.	Ren suis-Injeel
3.	Colon suis-Injeel
4.	Hepar suis-Injeel
5.	Pulmo und Bronchus suis-Injeel

Man muß hier hinzufügen, daß die Hyperimmunisierung nach Reckeweg allerdings nur in sehr seltenen Fällen indiziert ist, zumal hierbei auch an die Mitarbeit des Patienten hohe Anforderungen gestellt werden. Sollte die Injektion der entsprechenden Suis-Organpräparate aus zeitlichen Gründen nicht getrennt möglich sein, kann man alle Präparate mischen und in einer Injektion s.c. geben. Die Wirkung ist dadurch etwas abgeschwächt und man muß die Injektion am nächsten Tag noch einmal wiederholen.

6.5 Bewährte Indikationen

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg mit Biotherapeutika-Antihomotoxika hat sich u.a. zur Behandlung folgender Krankheitsbilder in der Praxis besonders bewährt:

1.	Therapieschäden durch Arzneimittel
2.	Rezidivierende Virusinfekte
3.	Präkanzerosen
4.	Toxische Leberschädigungen
5.	Migräne
6.	Chronische Ekzeme
7.	Asthma bronchiale
8.	Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi
9.	Arthrosen
10.	Lymphatische Diathese/Lymphatismus.

Selbstverständlich muß die Auswahl der zu verabreichenden Präparate stets individuell dem Krankheitsbild und der Reaktionslage des Patienten angepaßt werden.

Am Beispiel der folgenden 10 Krankheitsbilder werden anhand einiger bewährter Therapieschemata auch die wichtigsten Präparate aufgezeigt, wobei zum Teil auch Nosoden-Präparate mit einbezogen sind, die allerdings immer in der letzten Stufen appliziert und nicht potenziert werden sollten.

Weiterhin werden bei diesen Krankheitsbildern zusätzlich oral zu verabreichende und andere Begleittherapien aufgezeigt, damit die Behandlung insgesamt ein abgerundetes Ganzes darstellt. Auch hier sind natürlich gewisse Abänderungen je nach Lage des entsprechenden Behandlungsfalle möglich und auch sinnvoll.

Sobald es gelungen ist, durch die Auto-Sanguis-Stufentherapie das chronische Stadium der jeweiligen Krankheit zu durchbrechen, braucht in vielen Fällen nur noch oral weiterbehandelt zu werden.

6.6 Therapieschemata

Die genannten Präparate sind eine Auswahl der bei diesen Indikationen häufig angewendeten Antihomotoxika. Sie können je nach Indikation und Symptomatik des Patienten einzeln oder auch als Mischung mehrerer Ampullenpräparate pro Stufe injiziert werden. Selbstverständlich müssen nicht in jedem Falle alle genannten Mittel gegeben werden.

Anmerkung
Die in den einzelnen Stufen der Auto-Sanguis-Stufentherapie zu verabreichenden Arzneimittel sind in den nachfolgend aufgeführten Therapieschemata nicht durch Zahlen, sondern durch Buchstaben gekennzeichnet. Dies erfolgte aus dem Grund, weil je nach Gewinnung des Ausgangsblutes die Zuordnung der Präparate zu den einzelnen Stufen unterschiedlich ist. Das unter Stufe 1 aufgeführte Präparat kann entweder unmittelbar in der Spritze aufgezogen und sofort intravenöse injiziert werden (was genaugenommen der Stufe 0 der Auto-Sanguis-Stufentherapie entsprechen würde) oder erst nach Aspiration eines Blutstropfens (aus der Vene oder mittels „Schnepper-Methode“) und Ausspritzen desselben aufgezogen und anschließend injiziert werden (1. Verdünnungsstufe des Blutes). Beide Vorgehensweise sind therapeutisch als gleichwertig zu betrachten. Die unter Stufe 2, 3 usw. angegebenen Präparate werden in der angegebenen Reihenfolge zur Herstellung der weiteren Verdünnungsstufen verwendet.

• 6.6.1. THERAPIESCHÄDEN DURCH ARZNEIMITTEL

a.	Engystol
b.	Hepar compositum N + Lymphomyosot N + Coenzyme compositum
c.	Thyreoidea compositum
d.	Ubichinon compositum Ampullen + analoges Suis-Organpräparat und eventuell analoges homöopathisiertes Allopathikum (Anamnese bzw. Medikamententestung!)

Wegen der Simile-Wirkung sollte in der letzten Stufe bei dem analogen homöopathisierten Allopathikum besser eine chemisch ähnlich definierte Substanz (= „Ähnlichkeits-Prinzip“) gewählt werden als das exakte Isopathikum (= „Gleichheits-Prinzip“). Der Simile-Effekt ist hierbei deutlich stärker. Als Beispiel dazu die Glukokortikoid-Therapie. Hierbei zeigt sich die Wirkung von Mineralokortikoid deutlich im Vorteil.

Wirkung
Immunstimulativ, Anregung der Funktion der Zellorganellen, Anregung gestörter Hormonfunktionen, Anregung der Entgiftung und der Entschlackung der Matrix.

Zusätzlich
Lymphomyosot N (Tropfen)
Galium-Heel N (Tropfen)
Psorinoheel N (Tropfen)

• 6.6.2. REZIDIVIERENDE VIRUSINFEKTE

a.	Traumeel S + Engystol
b.	Hepar compositum N + Lymphomyosot N
c.	Mucosa compositum + Coenzyme compositum + Ubichinon compositum
d.	Grippe-Nosode + Euphorbium compositum + evtl. Psorinoheel N

Wirkung
Anregung der Funktion der Zellorganellen, Anregung der Entgiftung, Anregung der Entschlackung der Matrix, entzündungshemmend, Neutralisation blockierender, retoxisch vikariierter Erkrankungen und/oder allopathischer Therapieschäden.

Zusätzlich
Gripp-Heel (Tabletten)
Psorinoheel N (Tropfen)
Lymphomyosot N (Tropfen)

• 6.6.3. PRÄKANZEROSEN

a.	Engystol + Lymphomyosot N + Galium-Heel N
b.	Solidago compositum SN + Thyreoidea compositum
c.	Mucosa compositum + Placenta compositum
d.	Psorinoheel N + Ubichinon compositum + Coenzyme compositum

Wirkung
Anregung der Zellorganellfunktionen, Anregung der Entgiftung, Optimierung der Hormonfunktionen, Anregung der Organdurchblutung mit Revitalisierung, Anregung der Leukozytenmigration und Stimulation der spezifischen Lymphozyten sowie Deblockierung alter Infektauswirkungen.

Zusätzlich
Lymphomyosot N (Tropfen)
Galium-Heel N (Tropfen)

• 6.6.4. TOXISCHE LEBERSCHÄDEN

a.	Engystol
b.	Hepeel + Carduus marianus-Injeel forte
c.	Vesica fellea suis-Injeel + Fel suis-Injeel + Testis compositum N (bei Männern) oder Ovarium compositum (bei Frauen)
d.	Ubichinon compositum + Psorinoheel N

Wirkung
Anregung der biliären Entgiftung sowie der Funktion der Zellorganellen, Anregung der Revitalisierung und Verbesserung der Leberfunktion.

Zusätzlich
Galium-Heel N
(Tropfen bzw. Ampullen in Form der Trinkampullen-Medikation)
Hepeel (Tabletten)
Traumeel S (Tabletten)

• 6.6.5. MIGRÄNE

a.	Engystol + evtl. Iris-Injeel + evtl. Kalium bichromicum-Injeel
b.	Cerebrum compositum NM + Hepar compositum N
c.	Arteria suis-Injeel + Vena suis-Injeel
d.	Coenzyme compositum + Ubichinon compositum + evtl. bei fokaler Genese Mastoiditis-Nosode-Injeel oder Sinusitis-Nosode-Injeel oder Granuloma dentis-Injeel

Wirkung
Anregung der zellulären Funktionen und der Immunstimulation, Verbesserung der Ausscheidungsvorgänge, Verbesserung der zentralvenösen Steuerung, Neutralisierung eventueller Streueffekte aus sog. Foci (Fokaltoxikosen).

Im Anfall

a.	Gelsemium-Homaccord
b.	Spigelon
c.	Ferrum phosphoricum-Injeel
d.	Aconitum-Homaccord
e.	Belladonna-Homaccord
f.	Procain 1% 0,5 ml

Alle 5 Ampullenpräparate (jeweils 1,1 ml) und das Procain in der Mischspritze aufziehen und langsam intravenös injizieren.

Im Intervall
folgende Mischung als „Migränetropfen“:
Rp.: Spigelon (Tropfen)
Gelsemium-Homaccord (Tropfen)
Galium-Heel N (Tropfen) āā ad 90,0
M.D.S.: Migränetropfen 3x täglich 10 Tropfen vor dem Essen.

• 6.6.6. CHRONISCHE EKZEME

a.	Traumeel S
b.	Hepar suis-Injeel + Lymphomyosot N + Graphites-Homaccord
c.	Cutis suis-Injeel + Arsenicum album-Injeel
d.	Ubichinon compositum + Coenzyme compositum + evtl. Histamin D 200 + evtl. Acidum formicicum D 200

Wirkung
Anregung der Entgiftung und der Zellorganellenfunktionen, regenerativ-antiphlogistische Wirkung, desallergisierend, Stabilisierung der Zellmembran.

Oral
Traumeel S Tabletten

Lokal
folgende Mischung als „Ekzemsalbe“
Rp.: Urea pura 2,5
Sulfur präcipitatus 1,0
Traumeel S Salbe ad 50,0
M. ft. ungt. d. s.: Ekzemsalbe mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen.

• 6.6.7. ASTHMA BRONCHIALE

a.	Engystol + Acidum formicicum-Injeel
b.	Lymphomyosot N + Hepar compositum
c.	Cutis suis-Injeel + Funiculus umbilicalis suis-Injeel
d.	Histamin-Injeel + Cuprum-Injeel + evtl. Sanguis suis-Injeel

Wirkung
Verbesserung der Funktion der Zellorganellen, desallergisierende Wirkung, spasmolytisch, Verbesserung der Entgiftungsfunktionen.

Zusätzlich
Folgende Mischung gegen Asthma:
Rp.: Tartephedreel N (Tropfen)
Drosera-Homaccord (Tropfen)
Husteel (Tropfen) āā ad 90,0
M.D.S.: Hustentropfen bzw. Asthmatropfen 3x täglich 10 Tropfen vor dem Essen.

• 6.6.8. ULCUS DUODENI ET VENTRICULI

a.	Traumeel S
b.	Lymphomyosot N + Hepar compositum N
c.	Glandula suprarenalis suis-Injeel + Mucosa compositum
d.	Salmonella typhi-Injeel + Salmonella paratyphi B-Injeel + Coxsackie-Virus-A_9-Injeel

Wirkung
Entzündungshemmend, Anregung der Zellorganellenfunktionen, Regulation des Neurovegetativums, Deblockierung von bakteriellen Vorschäden.

Zusätzlich
Gastricumeel (Tabletten)
Duodenoheel (Tabletten)
Anacardium-Homaccord (Tropfen)

• 6.6.9. ARTHROSEN

a.	Traumeel S + Zeel comp. N
b.	Lymphomyosot N + Coenzyme compositum
c.	Cartilago suis-Injeel + evtl. Funiculus umbilicalis suis-Injeel + evtl. Glandula suprarenalis suis-Injeel + evtl. Glandula parathyreoidea suis-Injeel
d.	Psorinoheel N + Ubichinon compositum + evtl. homöopathisiertes Allopathikum

Wirkung
Entzündungshemmende und regenerative Wirkung, daneben Verbesserung des Knorpelstoffwechsels, Verbesserung der Hormonfunktionen.

Oral
Zeel comp. N Tabletten
Traumeel S Tabletten (bei entzündlicher Komponente)

Lokal
Salbenverbände mit Zeel comp. N und bei entzündlicher Komponente mit Traumeel S. Periartikuläre Injektionen mit Zeel comp. N und Traumeel S in der Mischspritze bei akuten entzündlichen Exazerbationen. Sonst nur mit Zeel comp. N (periartikulär).

Dieselben Präparate sind auch indiziert bei Harnsäure-Diathese und bei Periarthropathia humeroscapularis. Bei Periarthropathia humeroscapularis zusätzlich noch Ferrum-Homaccord (Tropfen).

• 6.6.10. LYMPHATISMUS

a.	Traumeel S
b.	Lymphomyosot N + Galium-Heel N
c.	Hypophysis suis-Injeel + Coenzyme compositum
d.	Psorinoheel N + Ubichinon compositum + Echinacea compositum S

Wirkung
Entzündungshemmend, Anregung der Zelltätigkeit, Anregung der biliären Entgiftung, Anregung der Entschlackung der Matrix und der Lymphdrainage.

Zusätzlich
Lymphomyosot N (Tropfen)
Traumeel S (Tabletten)

7 Dedifferenzierungsphasen

7.1 Grundlagen der antihomotoxischen Tumorbehandlung

Das Handeln des Arztes, besonders klinischen Tumorbehandlung, steht häufig unter dem Diktat kollektiver Zwänge, herrührend von einem gesellschafts-psychologischen Prinzip der Beharrlichkeit des Paradigmas der monokausalen „Search-and-destroy-Strategie“ mit der Tumorzelle als Zielgebiet.

Dieser Therapieansatz wandelt sich derzeit dahin, daß weitgehend die körpereigene Abwehr die Tumorresistenz mit ihrer seelisch-geistigen-körperlichen Basis den Therapieerfolg und auch die weitere Prognose bestimmt („Psychoonkologie“ 1, 4).

In den 70iger Jahren erkannte man zunehmend, daß man bei der Tumorbehandlung auf der Stelle trat. Immer häufiger entschieden sich auch die Patienten selbst für alternative Möglichkeiten der Behandlung. Heute lassen sich die scharfen Frontverläufe der einzelnen Vorstellungen nicht mehr halten, immer häufiger kommt es zu biologischen Begleitbehandlungen im Rahmen der konventionellen Krebstherapie (eine aktuelle Übersicht bietet das Schwerpunktthema „Komplementäre Onkologie“ in: Erfahrungsheilkunde 1998, Heft 2, Band 47).

Je nach Ausprägung und Schweregrad stehen vielfältige Arzneimittel allopathischen, homöopathischen und phytopharmazeutischen Ursprungs zur Verfügung.

Die Tumorvalenz ist die eigentliche Determinante, die das Resultat der Behandlung weitgehend festlegt. Sie wird bestimmt durch:

- die Tumorlokalisation und Ausdehnung
- die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors
- die Streufähigkeit des Tumors

Dies sind Bedingungen, die die Umgebung des Tumors – der Gesamtorganismus – dem malignen Geschehen vorgibt.

- das Tumorgeschehen; Störung des Grundsystems und der Homöostase
- Tumor als Endpunkt der malignen Entwicklung.

Der Zellstoffwechsel ist von der Zufuhr, von Baustoffen und Abtransport der Endprodukte abhängig, vor allem von entstehenden freien Radikalen. Unser Blutgefäßsystem und Lymphsystem ist abhängig von besonderen nervalen, afferenten und efferenten Einflüssen. Die Körperzelle darf von der sie umgebenden extrazellulären Matrix (Grundsubstanz) nicht getrennt gesehen werden, der Zustand der Matrix entscheidet über den Zustand der Zelle, und damit *auch* der *Tumorzelle* (1, 4).

Die Tumorvalenz ist also abhängig von einem feinstregulierten und durch eine Vielzahl von Interdependencen charakterisierten kybernetischen System.

Jahrelange Störungen z.B. durch Umwelteinflüsse, Streß, falsche Ernährung u.a.m. verursachen Störungen der Matrix und Minderung der Abwehrfähigkeit, wodurch einer malignen Entwicklungen Vorschub geleistet wird. Auch Metastasen sind nur in einer „gestörten“, d.h. für sie geeigneten Matrix, überlebensfähig (Übersicht bei 1).

Da von einem Tumorgeschehen stets der Gesamtorganismus betroffen ist, ist die Tumorkrankheit als Allgemeinkrankheit zu verstehen.

Die im Krebsgeschehen bei zellulärer Dedifferenzierung freigesetzten matrixgeschädigten Substanzen (Radikalionen, Aktivatoren proteolytischer Enzyme, Zytokine, Wachstumsfaktoren u.a.m.) führen global zu einer latenten Azidose der Matrix, wodurch wiederum der Tumorprozeß aktiviert wird usw. Letztlich treibt das Geschehen auf eine biologische Reaktionsstarre mit immunologischer Erblindung begleitet von einem Mangel an seelischer Wahrnehmungs-, Begegnungs- und Auseinandersetzungsfähigkeit.

Der große Nachteil jeder Chemotherapie ist ihre direkte Ausrichtung auf die Tumorzelle ohne zu berücksichtigen, daß vor und um jede Zelle ein Extrazellulärraum mit Grundsubstanz als funktioneller Wächter liegt.

Die Zytostase führt daher zwangsläufig zu schweren Störungen der Grundsubstanz, damit aber auch ihrer Regulationsbedingungen:

- Die Abwehrschwäche nimmt zu;
- aufgrund von Zellstoffwechselstörungen treten vermehrt Radikalionen auf;
- die latente Gewebsazidose nimmt zu;
- damit erhöht sich das proteolytische Gewebspotential;
- die Gefährdung der Gewebsregulation nimmt zu.

Chemotherapien müssen daher im Sinne eines Erhaltes bzw. Wiederherstellung der Grundregulation und Aktivierung der Abwehr abgeschirmt werden. Hier kann adjuvant Antihomotoxische Therapie sehr hilfreich sein. Dies besonders aufgrund der Aktivierung regulatorischer Lymphozytenklone durch Antihomotoxika, die in die gegenseitige Abstimmung des zellulären und humoralen Abwehrsystems eingeschaltet sind (3, 4).

Die konventionelle Tumorbehandlung besteht in der lokalen und lokoregionalen, makroskopischen, chirurgischen Ausschaltung, ebenso in einer computergesteuerten Strahlenbehandlung und einer systemischen Chemotherapie entsprechend des jeweiligen Tumorstadiums mit dem Ziel auch der mikroskopischen Tumorausräumung. Abgesehen von multiplen Nebenwirkungen sind selbst verfeinerte chirurgische und radiologische Behandlungsstrategien bei multimodalen Konzepten nicht generell erfolgsversprechend.

Die Tumorforschung der letzten Jahre hat gezeigt, daß Mineralien und Spurenelemente, die Vitamine A, C und E sowie bestimmte Enzyme für eine Reihe von Regelkreisen essentiell sind. Diese Stoffe müssen substituiert werden.

Zur ganzheitlichen Tumorbehandlung gehören auch die Lösung seelischer Probleme der Kranken, und die Stärkung seiner geistigen Durchhaltekräfte während und nach der Tumorbehandlung.

Die ganzheitliche Tumorbehandlung besteht deshalb aus drei Hauptkomponenten:

1. die konventionelle Tumorbehandlung durch

- chirurgische Maßnahmen
- Radiotherapie
- Chemotherapie

2. Biologische Begleittherapie

- Stärkung der körpereigenen Abwehr
- Substitutionsbehandlung und Regenerationsbehandlung

3. seelisch-geistige Komponente

- mit entsprechenden psychologisch erlernbaren mentalen Tumorabwehrmethoden

Obwohl es sich bei einem Karzinom aus der Sicht der Homotoxinlehre um eine Dedifferenzierungsphase, d.h. um die am weitesten fortgeschrittene Phase der Homotoxikosen handelt, sind unter gezielter adjuvanter biologischer Therapie Remissionen beobachtet worden.

Es ist zu betonen, daß die biologische Therapie keine Kollision mit den bewährten schulmedizinischen Therapieformen anstrebt. Sie wird additiv (zusätzlich) und komplementär (ergänzend) durchgeführt. Zunächst muß die Tumormasse durch Operation und Bestrahlung verkleinert werden.

Folgende Grundprinzipien sind wichtig:

1. Ausleitung + Entgiftung
2. Ernährung
3. Antihomotoxische Therapie

1. Am Anfang der Behandlung steht eine mehrwöchige, *reine Ausleitungs- und Entgiftungstherapie.*

2. Die *Ernährungstherapie* sollte so aussehen, daß auf Vollwerternährung unter Verzicht auf Mastfleischsorten geachtet wird. Tierische Fette und Proteine sollten im wesentlichen stark reduziert werden. (Hinweis auf Verzicht arachidonsäurehaltiger Lebensmittel und Entzündungsmediatoren etc.)

Ferner sollten alle mit Farb- und Konservierungsstoffen zubereiteten Lebensmitteln aus dem Speiseplan gestrichen werden, es herrscht Alkohol- und Nikotinverbot.

Beispiel für eine orale Therapie sind: Leber-Galletropfen SN, Magen-Darmtropfen S, Nieren-Elixier ST und Lymphtropfen S oder die entsprechenden Tablettenpräparate: Nux vomica compositum Cosmoplex, Scophularia compositum Cosmoplex, und Solidago compositum Cosmoplex. Diese Präparate sollten in der jeweiligen Normaldosierung verordnet werden.

3. *Antihomotoxische Therapie*
Die Routinekur nach Leimbach ist eine empfehlenswerte Alternative oder Ergänzung zu dieser Ausleitungstherapie:

Rezept

Galium-Heel N
Lymphomyosot N
Psorinoheel N
Phosphor-Homaccord
āā ad 120,0
6x täglich 8 bis 10 Tropfen, nach 8 Wochen 4x täglich 8 bis 10 Tropfen, nach weiteren 8 Wochen 3x täglich 8 bis 10 Tropfen.

Da aufgrund des laufenden Anfalls intermediärer Homotoxine ein chronischer Streß besteht, verstärkt sich die Erschöpfung der Nebennierenrinde. Daher ist es zweckmäßig Berberis-Homaccord zu interponieren.

7.2 Therapieschema

Zur parenteralen Therapie eignen sich Hepar compositum N, Solidago compositum SN, Lymphomyosot N und Nux vomica-Homaccord. Die Ampullenpräparate werden 3x wöchentlich i.m., s.c., i.c. oder i.v. injiziert oder in Form einer Trinkampullenmedikation gemischt. Das Präparat Lymphomyosot N kann sowohl als auch verabreicht werden, d.h. auch oral in Form von Tropfen (3x täglich 20 Tropfen).

Sehr häufig findet man bei Karzinompatienten, aufgrund einer latenten Gewebsazidose extra- und intrazelluläre Stoffwechselblockaden, die durch den Einsatz der Katalysatorenpräparate Coenzyme compositum Ampullen und Ubichinon compositum gelöst werden können (ebenfalls 3x wöchentlich in der o.g. Applikationsform).

Als Anregung der Depolymerisation zusätzlich zu Ubichinon compositum ist der Einsatz von Glyoxal compositum zu empfehlen, welches im allgemeinen nur bei Nachlassen der Besserung zwischengeschaltet wird. Als Wechselmittel kommen Para-Benzochinon-Injeel (D30) und cAMP D30 in Frage.

Nach einer Ausleitungsphase von etwa vier Wochen kann eine spezielle immunstimulierende bzw. immunmodulierende Therapie angeschlossen werden.

• 7.2.1 ANTIHOMOTOXISCHE THERAPIE

Echinacea compositum SN (Firma Heel)

Engystol

Lymphomyosot N

Thyreoidea compositum

Tonsilla compositum N

eventuell auch spezifische Nosodentherapie:
Carcinoma coli-Injeel, Carcinoma hepatis-Injeel, Carcinoma hepatis metastatis-Injeel, Carcinoma laryngis-Injeel, Carcinoma mammae-Injeel, Carcinoma uteri-Injeel

Carcinom-Nosoden stehen nicht für alle Krebserkrankungen zur Verfügung, sie können aber nach dem homöopathischen Simile-Prinzip eingesetzt werden. Die Auswahl erfolgt nach Tumorart und -lokalisation, am besten auch durch naturheilkundliche Testverfahren (EAV, Kinesiologie).

• AUTO-SANGUIS-STUFENTHERAPIE

(siehe Auto-Sanguis-Stufentherapie)

• 7.2.2 THYMUSTHERAPIE (THYMUS THX)

• 7.2.3 MISTELPRÄPARATE (ISCADOR, PLENOSOL, HELIXOR)

• 7.2.4 ZYTOPLASMATISCHE THERAPIE

Ney-Tumorin

• 7.2.5 SAUERSTOFFTHERAPIEN

Ozon-Sauerstoff-Therapie/HOT

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

• 7.2.6 HYPERTHERMIE

Zur speziellen medikamentösen Behandlung von lokalisierten Karzinomen, z. B. Magenkarzinomen stehen eine Reihe biologischer Präparate zur Verfügung. Diese Präparate können per Elektroakupunktur ausgetestet werden, z.B. beim Magenkarzinom Ulcus ventriculi-Nosode-Injeel und Gastritis-Nosode-Injeel. Diese genannten Nosodenpräparate sind speziell einzusetzen und von Fall zu Fall verschieden.

Zu der genannten Therapie mit Heel-Spezialitäten empfehlen sich im Rahmen einer biologischen Behandlung additiv:

eine hochdosierte Dauertherapie mit Enzympräparaten

hochdosiertes Vitamin C, Vitamin A bzw. β-Carotin + Vitamin E (Vitamin-E-Gaben dürfen nicht im Falle hormonaktiver Tumoren erfolgen, wie z.B. Ovarialkarzinom, bestimmte Arten von Mammakarzinomen, Hodenkarzinomen etc.)

Darmsanierung

Selen-Trinkampullen täglich als Dauertherapie

zur Entgiftung täglich Orthosiphonblätter, Indischer Nierentee der Firma Fides

Rote Bete-Konzentrate täglich oder einfacher Rote-Bete-Saft

Begleittherapie bei Chemotherapie
Jeweils zwei Tage vor und zwei Tage nach der Chemotherapie sollte eine HOT durchgeführt werden.

Während der Chemotherapiezeit (mehrere Wochen bis Monate):

Iscador (Firma Weleda)	2x wöchentlich s.c.
Ubichinon compositum Amp.	2x wöchentlich s.c.
Wobe-Mugos (Firma Mucos)	3x täglich 3 Tabletten oder Dragees
Nux vomica-Homaccord	3x täglich 15 Tropfen
Vitamin C	4g täglich
Selenase (Firma G.N. Pharm)	3x wöchentlich 1 Trinkampulle
A-E-Mulsin Emulsion (Firma Mucos)	

Außerdem sollten große Mengen rechtsdrehender Milchsäure sowie Zink und Kupfer in Abhängigkeit der spektralanalytischen Werte eingenommen werden.

Nach der Chemotherapie:

	Symbioselenkung, Thymusinjektionen, 2x wöchentlich 2 Ampullen (während der Thymusinjektionen Iscador-Pause).

Außerdem:

Cosmochema Entzündungstropfen	20 Tropfen morgens
Hepeel oder	2x täglich 2 Tabletten
Hepar compositum N	zusammen 2x wöchentlich
Ubichinon compositum Ampullen	je 1 Ampulle

Einige biologische Verfahren können und sollen kombiniert angewandt werden, um den Therapieerfolg zu steigern, wie z.B. antihomotoxische Therapie und Ozontherapie.

Die biologische Therapie ist eine Dauertherapie. Sie führt nicht nur zu einer Steigerung der körpereigenen Abwehr und somit der Tumorabwehr, sondern auch zur Verminderung der Nebenwirkungen der Bestrahlungen und Zytostatika-Therapie.

Eine Verbesserung der körperlichen Verfassung (z.B. durch Appetitsteigerung) sowie der psychischen Situation (z.B. weniger Angst, mehr Lebensmut) ist als positive Wirkung zu erkennen und trägt zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Daher ist die Immuntherapie nicht nur eine Säule, sondern das Fundament der biologischen Krebsbehandlung.

Sie sollte von Anfang an neben Chirurgie, Strahlen und Chemotherapie in den Therapieplan miteinbezogen werden.

7.3 Literatur

(1) Heine H., Psychoonkologie. Z Onkol 1996; 28(1): 10-4

(2) Heine H., Neurogene Entzündungen als Basis chronischer Schmerzen – Beziehungen zur Antihomotoxischen Therapie. Biol Med 1997; 26(6): 246-50

(3) Heine H., Schmolz M., Immunologische Beistandsreaktion durch pflanzliche Extrakte in Antihomotoxischen Präparaten. Biol Med 1998; 27(1): 12-4

4) Uexküll Th. v, Wesiak W., Theorie der Humanmedizin. München: Urban und Schwarzenberg 1988

8 Schmerzbehandlungen

Die Nosodentherapie kann Restgifte früher durchgemachter Erkrankungen aus dem Körper beseitigen. Bei der Anamneseerhebung führt die Frage nach grippalen Infekten, Anginen, Gelbsucht, Nierenstörungen, Zahnschmerzen oft auf den richtigen Weg. Auch Kinderkrankheiten, wie Masern, Mumps, Windpocken, können dem Schmerzgeschehen ursächlich zugrunde liegen.

Durch Infiltration eines Lokalanästhetikums in den Herd kann man das Störfeld vorübergehend ausschalten und den Schmerz innerhalb von Sekunden beeinflussen. Die diagnostische und therapeutische Lokalanästhesie ist bei richtiger Anwendung die Methode der Wahl zur Behandlung chronischer Schmerzzustände. Durch die Kombination mit homöopathischen Komplexmitteln kann man den therapeutischen Effekt noch verbessern.

Therapieformen
Injektionen am Locus dolendi
Injektion in das Segment
Injektionen an Nervenwurzeln oder Ganglien
Injektionen an und in Gelenke
Injektionen an das Periost
Injektionen am Störfeld

• INDIKATIONEN UND THERAPIEVORSCHLÄGE

Zunächst muß man feststellen, daß es kein hochwirksames homöopathisches oder pflanzliches Analgetikum gibt. Die orale Therapie kann daher zunächst immer nur eine Begleittherapie sein. Erst im Verlauf und nach längerer Zeit kann man deutliche Erfolge sehen. Durch die Darreichung des passenden Biotherapeutikums wird die dem Schmerz zugrundeliegende Homotoxinlage beeinflußt. Am Anfang der Behandlung steht daher zumeist die Injektionstherapie. Je nach Art des Schmerzes kann man folgende Empfehlung geben:

Gelsemium-Homaccord, Spigelon	Kopfschmerz, Migräne
Spascupreel	stechende und krampfende Schmerzen
Ranunculus-Homaccord	Interkostalschmerz
Rhododendroneel S	Wetterfühligkei
Belladonna-Homaccord	klopfender Entzündungsschmerz
Bryaconeel	neuralgische Entzündungsschmerzen
Atropinum compositum	Koliken und Spasmen

• ERKRANKUNGEN DER WIRBELSÄULE

Halswirbelsäule
Die Symptomatik im Bereich der Halswirbelsäule ist je nach Lage der Veränderung ganz unterschiedlich.

oberes Zervikalsyndrom	Nackenschmerzen, Hinterkopfschmerzen, Migraine cervicale
mittleres Zervikalsyndrom	Schulterschmerzen
unteres Zervikalsyndrom	Brachyalgien, Myalgien im Schulter-und Nackenbereich, Epikondylitis

Zur Therapie empfiehlt sich die Mischung eines Lokalanästhetikums mit einem homöopathischen Komplexmittel. Man kann so die sofortige Wirkung der diagnostischen und therapeutischen Lokalanästhesie mit dem heilenden Effekt der Homöopathie verbinden.

Degenerative Wirbelsäulenveränderung	1 Amp. Discus comp. N + 3 ml Neuraltherapeutikum
Migränekopfschmerz	1 Amp. Spigelon + 1 Amp. Gelsemium-Homaccord + 2 ml Neuraltherapeutikum
Periarthritis und Epikondylitis	1 Amp. Traumeel S + 3 ml Neuraltherapeutikum

Brustwirbelsäule

Interkostalschmerzen	
Tietze-Syndrom	
Postherpetischer Schmerz, Interkostalschmerz	1 Amp. Ranunculus Homaccord + 3 ml evtl. Neuraltherapeutikum + Vitamin B12
Zostertherapie	1 Amp. Mezereum-Homaccord + 1 Amp. Ranunculus-Homaccord + 3 ml zusätzlich auch Neuraltherapeutikum + Vitamin-B-Komplex

Lendenwirbelsäule

Lumbalgie, Lumbago, Lumbalsyndrom	
Ischialgie	
L4/LS-Wurzelsymptomatik	
S1-Wurzelsymptomatik	
Ischiasneuritis	1 Amp. Discus compositum N + 1 Amp. Traumeel S + 5 ml Neuraltherapeutikum dazu 1 Amp. Neuralgo-Rheum-Injeel i.m.

• ERKRANKUNGEN DER EXTREMITÄTEN

Arthrosetherapie

kleine Gelenke	1 Amp. Zeel comp. N + 2 ml Neuraltherapeutikum
große Gelenke	2 Amp. Zeel comp. N + 3 ml Neuraltherapeutikum

Arthritisbehandlung

Arthritis	1 Amp. Traumeel S + 1 Amp. Zeel comp. N + 3 bis 5 ml Neuraltherapeutikum

Schulter-Arm-Syndrom

Periarthritis humeroscapularis	Zeel comp. N, Traumeel S, Discus comp. N, Neuralgo-Rheum-Injeel
Bursitis subacromialis	1 Amp. Traumeel S + 3 ml Neuraltherapeutikum
Schulterarthrose	Zeel comp. N, bei Aktivierung mit Traumeel S
Frozen shoulder	Traumeel S + Neuraltherapeutikum

Ellenbogenschmerzen

Epicondylitis humeri radialis Epicondylitis humeri ulnaris Bursitis olecrani	Traumeel S und Discus comp. N mit Neuraltherapeutikum
Karpaltunnelsyndrom	1 Amp. Graphites-Homaccord + 2 ml Neuraltherapeutikum (evtl. Operation notwendig!)

Hüftgelenksschmerzen

Koxarthritis	1 Amp. Zeel comp. N + 1 Amp. Traumeel S + 3 bis 5 ml Neuraltherapeutikum
Koxarthrose	2 Amp. Zeel comp. N

Kniegelenksschmerzen

Gonarthritis Gonarthrose Bursitiden	Zeel comp. N und Traumeel S auch in Verbindung mit Neuraltherapeutikum o.ä.

• SCHMERZEN IM KOPFBEREICH

Kopfschmerz und Migräne

Kopfschmerz, Migräne	1 Amp. Gelsemium-Homaccord + 1 Amp. Spigelon + 3 ml Neuraltherapeutikum

Tinnitus aurium

Tinnitus aurium	1 Amp. Vertigoheel + 3 ml Neuraltherapeutikum auch mit Graphites-Homaccord und Barijodeel

• ANTIHOMOTOXISCHE EINZELMITTEL

Indikationsbezogen siehe Reckewegs Homoeopathia antihomotoxica, 6. völlig überarbeitete Auflage 1999, Seiten 3 bis 142.

• SONSTIGE THERAPIEMETHODEN

Diät, Fasten
physikalische Therapie, Hydrotherapie
Akupunktur, Elektroakupunktur
Chirotherapie
Eigenblutbehandlung, Auto-Sanguis-Stufenkur
Ozon- und Sauerstofftherapie
Psychotherapie, Entspannungsübungen

• AUTO-SANGUIS-STUFENTHERAPIE NACH RECKEWEG BEI ERKRANKUNGEN DES RHEUMATISCHEN FORMENKREISES

Stufe		
A	Zeel comp. N	bei allen degenerativen Skeletterkrankungen
	Traumeel S	bei entzündlichen Reaktionen im Vordergrund
	Neuralgo-Rheum-Injeel	bei Neuralgien und Myalgien
	Discus compositum N	bei wirbelsäulenabhängigen Schmerzen
B	Lymphomyosot N	zur Lymphdrainage und Bindegewebsentschlackung
C	Engystol	bei oder nach Virusinfektionen
	Echinacea compositum SN	zur Stärkung der Abwehrkräfte
	Coenzyme compositum	zur Stoffwechselaktivierung
	Ubichinon compositum	Aktivierung der Giftabwehr und Fermentsysteme
	Sammelpackung Katalysatoren	Induktion der Fermentsysteme
D	Suis-Organpräparate, wie z.B. Musculus, Os, Funiculus umbilicalis, Hepar	Grippe, Arthritis urica, Herpes zoster und simplex usw.
	Nosodenpräparat, z.B. Streptococcus, Staphylococcus	

Die obengenannten Ampullen werden nach den Regeln der Auto-Sanguis-Kur einzeln oder auch gemischt verabreicht.

• PHYSIKALISCHE THERAPIE MIT TRAUMEEL S- UND ZEEL COMP. N-SALBEN

Die Anwendung oben genannter Salben erfolgt vorzugsweise mit Okklusiv- und Stützverbänden, man kann sie auch als Massagecreme verwenden. In der Iontophorese ist der Einsatz ebenfalls möglich, man muß aber die Polarität zur Hälfte der Behandlungszeit wechseln, weil die Inhaltsstoffe unterschiedliche Ladungen besitzen.

9 Schadstoffbelastung

Die Auswirkungen toxischer Belastung (Homotoxine) auf das Krankheitsgeschehen der Patienten war in der antihomotoxischen Therapie schon immer bekannt. Zunehmend wird die Wichtigkeit auch in der Schulmedizin registriert. Mittlerweile gibt es die Zusatzbezeichnung „Umweltmedizin“.

Schadstoffe können bis zum Nachweis einzelner Moleküle erkannt werden. Relativ schwierig ist aber die Diagnosestellung, da die Symptomatik recht unspezifisch ist. Man beobachtet Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Kopfschmerzen, Hyperaktivität, Infektanfälligkeiten und Allergien. Oft werden diese Symptome als psychosomatisch fehlinterpretiert. Auch chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Stoffwechselstörungen und Herz-Kreislauferkrankungen sowie Nieren- und Blasenerkrankungen können schadstoffabhängig entstehen.

Die stärkste Symptomatik zeigen diese Umweltbelastungen in dem Krankheitsbild *Multiple Chemikaliensensibilität (MCS)*. Der Begriff Multiple Chemical Sensitivity wurde in den 60er Jahren von dem Amerikaner Randolph geprägt. Nach dieser Definition handelt es sich um eine erworbene Erkrankung, hervorgerufen als Folge einer Überlastung des menschlichen Organismus mit exogenen Stoffen. Die Patienten reagieren auf zahlreiche Chemikalien mit relativ gleichförmiger Symptomatik.

Die Diagnostik ist außerordentlich schwierig und zeitaufwendig, eine Repertorisation nach antihomotoxischen Gesichtspunkten ist in diesen Fällen hilfreich. Folgende Diagnosekriterien sprechen für eine MCS:

Es besteht eine Intoleranz gegenüber mehreren chemischen Substanzen in Belastungshöhen, welche problemlos von der übrigen Bevölkerung vertragen werden.
Die Dauer der Erkrankung beträgt mehrere Monate.
Es bestehen multiple Symptome in mehreren Organbereichen, welche uniform nach unterschiedlichen Belastungen auftreten.
Es besteht eine zeitliche Abhängigkeit von Exposition und Symptomatik.
Andere Erkrankungen wie Allergien, Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen usw. konnten ausgeschlossen werden.

Die Leitsymptome sind unspezifische zentralnervöse Beschwerden wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gedächtnis-, Konzentrations- und Schlafstörungen, Störungen der Befindlichkeit, weiter Reizerscheinungen an den Schleimhäuten der Augen und des Respirationstraktes sowie unspezifische Magen- und Darmstörungen. Typisch sind auch Reizerscheinungen im Hautbereich sowie Schmerzen im Muskel- und Gelenksbereich.

Ein weiteres Krankheitsbild, das ebenfalls zu Schwierigkeiten in Diagnostik und Therapie führt, ist das Sick-Building-Syndrom (SBS). Dies ist ein international gebräuchlicher Begriff für Gesundheits-, Befindlichkeits- und Behaglichkeitsstörungen, die in den Innenräumen auftreten. Die WHO definierte 1983 das Sick-Building-Syndrom wie folgt:

Eine bestimmte Anzahl von Personen im gleichen Raum/Gebäude (etwa 20 %) klagen spontan über unspezifische Beschwerden/Befindlichkeitsstörungen, die beim Aufenthalt in diesen Räumen/Gebäuden auftreten, sich hier ggf. verschlimmern und sich nach verlassen des Raumes/Gebäudes bessern oder ganz verschwinden.

Typischerweise beklagen Patienten beim Sick-Building-Syndrom folgende Beschwerden oder Beeinträchtigungen:

Haut	Trockenheit, Reizungen, Juckreiz, Ausschlag
Augen	Brennen, Rötungen, Bindehautreizungen, Tränenfluß
Nase	Trockenheit, Schnupfen, Reizungen
Rachen	Kratzen, Heiserkeit, Trockenheit
Lunge	Reizhusten, unspezifische Überempfindlichkeit, Infektanfälligkeit
zentrales Nervensystem	Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, rheumatische Beschwerden

Frauen klagen wesentlich häufiger als Männer über Beschwerden im Sinne eines Sick-Building-Syndroms, höheres Alter und längere Betriebszugehörigkeit begünstigen das Auftreten, es erkranken bevorzugt Personen in beruflich untergeordneter Position, der Chef leidet meist nicht an Sick-Building-Syndrom.

Risikofaktoren sind:

• PHYSIKALISCHE FAKTOREN, WIE
Klima (Raumtemperatur, relative Luftfeuchte, Belüftungsrate)
raumlufttechnische Anlagen
Beleuchtung
Lärm
Elektrosmog
Radonkonzentration
Vibration
Ergonomie
Farbgebung

• CHEMISCHE FAKTOREN, Z.B.
allgemeine Schadstoffanreicherung von außen
allgemeine Schadstoffanreicherung von innen (organische Lösungsmittel, Kunststoffausdünstungen, Kunstharze)
Klimaanlage (Biozide)
Formaldehyd (Möbel)
Reinigungsmittel
Staub (Teppiche, Papier, Zigarettenrauch)
Ozon
CO_2 (Hauptemittent ist der Mensch)
VOC-Emissionen (Volatile Organic Compounds aus Klebern, Bodenbelägen, Isoliermaterialien, Dichtmassen, Lacken, Farben, Tapeten, Wandverkleidungen, Holzverkleidungen, Spanplatten)
Gerüche

• BIOLOGISCHE FAKTOREN
Pilze
Bakterien
Viren
Allergene
Geschlecht
Alter
allergische Disposition

• PSYCHISCHE FAKTOREN
Überforderung
Unterforderung
sozial niedrige Position
fehlende Einflußnahme auf den Arbeitsprozeß und die Arbeitsplatzgestaltung
fehlende menschliche Kommunikation am Arbeitsplatz
Mobbing
Teiltätigkeit mit Kontrollverlust des Ganzen
drohende Arbeitslosigkeit
private Probleme
„was kränkt, macht krank“

Die Diagnostik macht zunehmend Fortschritte, wenn es um die Therapie geht, gibt es so gut wie keine schulmedizinischen Behandlungskonzepte. Hier müssen naturheilkundliche Verfahren als durchaus besser angesehen werden.

Die Homotoxikologie hat drei Säulen in der Behandlung:

1. Vermeidung weiterer Zufuhr
2. Verbesserung der Zell- und Organfunktionen
3. Optimierung der entgiftenden und ausleitenden Funktionen

Bei der Vorbeugung toxischer Belastung spielt die orthomolekulare Therapie eine zunehmend wichtige Rolle. Durch hohe Dosen von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen (z.B. Vitamin E, Vitamin C, Beta-Karotin, Magnesium und Selen) können Patienten recht gut geschützt werden.

Für die Ausleitungs- und Entgiftungstherapie sowie die Besserung der Organfunktionen ist die Antihomotoxische Therapie der beste Weg. Basismitttel zur Entgiftungstherapie ist das Lymphomyosot N. Dieses Präparat hat eine entgiftende Wirkung auf Matrix und Lymphosystem. Besonders hat es sich bei der Entgiftung von Schwermetallbelastungen bewährt. Aus diesem Grunde wird es routinemäßig vor, während und nach einer Amalgamsanierung (siehe Kapitel Amalgamausleitung) angewendet.

Sehr häufig gibt man zur Entgiftung des Zytoplasmas zusätzlich das Präparat Galium-Heel N. Da Umweltbelastungen oft sog. Stoffwechselblockaden hinterlassen, ist die Gabe der Biokatalysatoren essentiell. Zumeist werden die beiden Präparate Coenzyme compositum Ampullen und Ubichinon compositum Ampullen gemeinsam zwei- bis dreimal pro Woche gegeben.

Besonders empfehlenswert ist eine Infusionstherapie zur allgemeinen Ausleitung und Entgiftung. Einer handelsüblichen Vollelektrolytlösung (250 ml) gibt man die Präparate Hepar compositum N für die Leber, Solidago compositum SN für die Nieren, Nux vomica-Homaccord für Magen und Lymphomyosot N für das Lymphgewebe zu. Man gibt diese Infusion üblicherweise zweimal pro Woche, insgesamt fünf- bis zehnmal.

Bei erheblich stoffwechselblockierten Patienten (metabolisches Syndrom) gibt man initial die sog. Katalysatoreninfusion. Einer Infusionslösung gibt man alle zehn Ampullen der Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus zu.

Eine orale Ausleitungstherapie ist ebenfalls möglich:

Lymphomyosot (Tbl.)	3x täglich 3 Tabletten oder
Lymphomyosot N (Tropf.)	3x täglich 15 bis 20 Tropfen
Hepeel (Tbl.)	3x täglich 1 Tablette
Reneel N (Tbl.)	3x täglich 1 Tablette
Nux vomica-Homaccord (Tr.)	3x täglich 10 Tropfen

Bei Schadstoffbelastungen findet man oft eine Störung im Bereich der Spurenelemente. Das Präparat zum Ausgleich heißt Molybdän compositum. Man gibt zweimal pro Woche 1 Tablette.

Zum Abbau von Verschlackungen ist auch eine Enzymtherapie geeignet. Die genannte Präparatekombination ist als eine optimale Entgiftungstherapie aufzufassen und sollte im Zusammenhang mit ganzheitlichen Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, Darmsanierung, Streßreduktion, leichter sportlicher Betätigung etc., über einige Monate durchgeführt werden.

9.1 Literatur

(1) Wolf C., Arzneimittel-, Therapie-Kritik & Medizin und Umwelt. Marseille Verlag München, 1. Quartal 1998, Jg. 30, Heft 1, S. 95-99

(2) Brede-Weisflog B., Arzneimittel-, Therapie-Kritik & Medizin und Umwelt. Marseille Verlag München, 1. Quartal 1998, Jg. 30, Heft 1, S. 105-111

10 Amalgam-Ausleitung

Unter Amalgam-Schäden versteht man in der Regel alle negativen Auswirkungen auf den Organismus durch freigesetztes Quecksilber aus Amalgamfüllungen.

Seit Jahren werden die Zahnärzte mit den Beschwerden von amalgamtragenden Patienten konfrontiert. Durch die Beobachtung von Folgekrankheiten durch Quecksilberbelastungen im Körper mehrt sich in letzter Zeit weltweit die Kritik an der Anwendung von Amalgam.

Hierzu muß zunächst gesagt werden, daß die Frage, ob und inwieweit Schäden durch Amalgamfüllungen überhaupt auftreten können, zur Zeit in der Wissenschaft sehr konträr diskutiert wird und sich vorerst noch kein übereinstimmendes Urteil zwischen den Fachleuten abzeichnet. Grundsätzlich dürften aber eine gesunde Ernährung, z.B. mit Vollwertkost, sowie eine intensive Mundhygiene zur Prophylaxe der Zahnkaries die beste „Vorbeugung“ zur Vermeidung von Amalgamfüllungen darstellen.

Wie bei allen chronischen toxischen Belastungen, ist bei der Therapie auch die Zufuhr von essentiellen Nahrungsstoffen von großer Bedeutung. Hierzu gehören die essentiellen Aminosäuren (Valin, Leucin, Isoleucin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin, Threonin), die essentiellen Fettsäuren (höher ungesättigte Fettsäuren wie Linol- und Linolensäure), Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen.

Besonders die essentiellen Spurenelemente (Selen, Zink, Molybdän, Mangan, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Silizium, Vanadium, Jod und Fluor), die im Körper nur in sehr geringen Mengen vorkommen, deren Fehlen aber zu Störungen biochemischer Abläufe führt, müssen in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen (Literatur: „Documenta Geigy, Wissenschaftliche Tabellen“, 7. Auflage [1977], Geigy Pharmazeutika, Wehr/Baden).

Ein Mangel an Spurenelementen kann sich äußern in Geruchs- und Geschmacksstörungen, neurologischen Störungen, Nachtblindheit, Adynamie, Immunschwäche, verringerter Belastbarkeit durch toxische Elemente, Peroxide- und Sauerstoffradikale.

Amalgam ist eine Legierung, die in der Regel zu 53% aus Quecksilber, ca. 20% Silber, ca. 16% Zinn und 10% Kupfer besteht.

Die Giftigkeit des Quecksilbers beruht vor allem auf seiner Wirkung als Zellgift. Das Schwermetall bindet die Sulfhydryl-Gruppen der Proteine und blockiert somit verschiedene lebenswichtige Enzymsysteme.

Unser gegenwärtiges Wissen über die Kinetik und die toxischen Effekte von Hg und Methyl-Hg reicht aus, um bereits heute für eine Minimierung der Quecksilberbelastung einzutreten.

Quecksilber ist ein Zell- und Protoplasmagift und wird in Leber, Nieren, Milz sowie im Gehirn gespeichert und extrem langsam wieder ausgeschieden (normaler Hg-Spiegel im Harn 0,5 - 5 Mikrogramm/Tag). Insbesondere die lange Halbwertzeit von Quecksilber im Gehirn von etwa 18 Jahren läßt die Aussage zu, daß einmal in das Gehirn gelangtes Quecksilber dieses Organ zu Lebzeiten kaum wieder verläßt.

Die akute Quecksilbervergiftung zeigt sich in Speichelfluß, Stomatitis, Gastroenteritis, ulzeröser hämorrhagischer Kolitis mit Erbrechen, Koliken und Diarrhöen, Nephritis mit Anurie und Urämie.

Die chronische Quecksilbervergiftung bringt Symptome mit sich wie Mattigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Speichelfluß, Stomatitis, Albuminurie, zentralnervöse Symptome wie Stimmungslabilität, Angst, Erregung, Muskelzucken, Seh-, Hör-, Sprach- und Gangstörungen, Merkschwäche, Persönlichkeitsabbau, sowie sensible, distal betonte, symmetrische Polyneuropathien (Parästhesien, Analgesien) (Literatur: „Handlexikon der Medizin“, Autor: G. Thiele, Verlag Urban & Schwarzenberg, München – Wien – Baltimore).

Auch auf die Gefahr einer Immunsuppression, hervorgerufen durch die Mobilisierung von Quecksilber aus Amalgamfüllungen, ist hinzuweisen. Durch die mechanische Belastung beim Kauvorgang und durch das Einwirken von Säuren aus der Nahrung unterliegen Dental-Amalgame einer ständigen Korrosion. Dabei gelangt kontinuierlich freigesetztes Quecksilber in den Organismus, wo es besonders die zelluläre Immunität negativ beeinflußt.

Bereits wenige Minuten nach Quecksilber-Mobilisierung durch 20minütiges Kaugummi-Kauen oder schluckweises Trinken von heißem Zitronensaft kommt es zu einer Reaktion des Immunsystems, wobei die Aktivität der T-Lymphozyten, der T-Helferzellen und der natürlichen Killerzellen signifikant abnimmt.

Quecksilber und seine Komponenten sind in der Lage, das System der Energieleitbahnen (Meridiane, Energiegefäße nach Voll) in Unordnung zu bringen. Vom Standpunkt ganzheitlichen, kybernetischen Denkens können von den metallischen Komponenten des Amalgams Informationsimpulse feinster Art ausgehen, welche die Energieleitbahnen nach Voll beeinträchtigen.

Wenn durch ein regulationsdiagnostisches Verfahren wie die Elektroakupunktur nach Voll das Amalgam oder dessen Komponenten als Regelkreisstörungen erkannt worden sind, sollten in der ersten Therapiephase in größeren zeitlichen Abständen alle Amalgamfüllungen entfernt werden. Danach muß sich eine Ausleitungs- und Regulationstherapie besonders mit biologischen Therapeutika anschließen, um die im Gewebe deponierten Metalle zu entfernen.

Die Ausleitungstherapie kann in einfachen Fällen mittels homöopathischer Komplex- oder Einzelmittel erfolgen. Schwer gestörte Patienten bedürfen einer Regulationstherapie mittels getesteter homöopathischer und isopathischer Medikamente, u.U. ist in schweren Fällen zusätzlich eine parenterale Gabe von schwermetallbindenden Antidoten wie DMPS (Dimaval) angezeigt.

Erste Erfahrungen mit Heel-Präparaten bei Amalgamschäden liegen vor für Lymphomyosot N (Tropfen), das wegen seiner ausgeprägten Matrix entschlackenden und kanalisierenden Wirkung eine Ausscheidung evtl. resorbierten Quecksilbers fördert.
Als Dosierung empfehlen wir 3x täglich 15-20 Tropfen Lymphomyosot N.

Mehrere der Injeel-Präparate (z.B. Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel u.a.) enthalten potenziertes Quecksilber als Potenzenakkord und können im Sinne eines homöopathischen Similes zu diesem Zweck eingesetzt werden.

Weitere Entgiftungsmittel aus dem Präparateprogramm, die neben Lymphomyosot N bei allen zellulären Phasen zur Anwendung kommen sollten, sind Galium-Heel N, Psorinoheel N sowie Nux vomica-Homaccord. Ihre Dosierung beträgt in der Regel jeweils 3x täglich 20 Tropfen.

Als Schutz wichtiger Zellorganellen (z.B. der Mitochondrien) gegen freie Radikale (besonders Sauerstoff-Radikale) sollte auch eine Selentherapie in Verbindung mit Antioxidantien wie Vitamin E in den Therapieplan einbezogen werden.

Auf dem III. Stuttgarter Mineralstoff-Symposium 1990 machte Herr Dr. med. W. Köstler, Universitäts-Lektor aus Wien, folgende Vorschläge für Amalgamträger:

Lassen Sie sich nur jeweils eine Amalgamfüllung im Abstand von drei Wochen entfernen. Dadurch werden Spitzenwerte in der Quecksilberbelastung vermieden und die vorhandenen Entgiftungsmechanismen nicht überfordert.

Nehmen Sie während der Entfernungsphase ständig Selen zu sich, damit Sie genügend bioverfügbares Selen besitzen, das sowohl für die Quecksilberentfernung als auch für den allgemeinen Oxidationsschutz benötigt wird.

Lassen Sie sich nach der Entfernung des Amalgams keine anderen Metalle in die Zahndefekte einbringen. Verwenden Sie Steinzement zur zwischenzeitlichen Füllung der Kavitäten.

Lassen Sie nach der Entfernung des Amalgams die Blutspiegel der Spurenelemente Selen, Kupfer und Zink bestimmen und füllen Sie evtl. vorhandene Mangelzustände wieder auf. Für die Selenzufuhr eignen sich vor allem die beiden Präparate selenase (Trinkampullen) und selenminerase (Tabletten).

Lassen Sie in regelmäßigen Abständen nach der Amalgamentfernung das Verhältnis der immunkompetenten Zellen zueinander kontrollieren.

11 Mikrobiologische Therapie: Ein Therapiekonzept zur Immunmodulation

11.1 Grundlagen

• IMMUNOLOGISCHE ASPEKTE

Die Grundlage immunmodulatorischer Therapieansätze ist das Immunsystem, von dem wir heute wissen, daß es sehr viel komplexer aufgebaut ist, als ursprünglich angenommen (3, 8). Das Immunsystem vermittelt nicht nur „Immunität“, d.h. Schutz vor Ansteckungen, sondern dient der Erledigung zahlreicher weiterer Aufgaben in Vernetzung mit der Mikroflora, den Schleimhäuten, dem Stoffwechsel, dem Nervensystem und dem Hormonsystem. Aus phylogenetischer Sicht ist der Darm als die Wiege des Immunsystems anzusehen. Die Haut und insbesondere die Schleimhäute im Verdauungstrakt sind die unmittelbaren Grenzflächen zu unserer Umwelt, so daß es durchaus logisch erscheint, daß diesen Grenzflächen eine besondere immunologische Bedeutung zukommt. Erst in den letzten Jahren haben wir die Erkenntnis gewonnen, daß etwa 85% des Immunsystems den Mukosa des menschlichen Körpers zugeordnet sind. In der Ontogenese sind die morphologischen Grundlagen dieses relativ autonomen Systems die aus dem Entoderm hervorgehenden Organe. Zuerst wurde begriffen, daß es ein eigenständiges darmassoziiertes Lymphgewebe gibt (GALT). Der jüngste Stand der Erkenntnisse ist, daß allen Schleimhäuten das Mukosa-Immunsystem gemeinsam ist, das die unterschiedlichen Organe miteinander vernetzt (1, 2, 13). Die im Mukosa-Immunsystem repräsentierten Grenzflächen haben eine außerordentlich große Ausdehnung, z.B.: 400 m^2 Dünn- und Dickdarm, 80 m^2 Lunge, 2,5 m^2 Haut. Ein Großteil dieser Schleimhäute ist normalerweise von Mikroorganismen besiedelt (1, 15, 16).

• MIKROBIOLOGISCHE ASPEKTE

Der Mensch ist mit einer ungeheuren Vielfalt und Vielzahl an Mikroorganismen kolonisiert. In verschiedenen Habitaten siedeln verschieden zusammengesetzte Mikrobengesellschaften in unterschiedlichen Populationsdichten. Alleine in Dünndarm und Dickdarm siedeln etwa 300 bis 500 verschiedene Mikrobenarten, die man in 17 Familien und 47 Genera einteilen kann.

Durch intensive Studien mit keimfreien Tieren hat man sehr viel über die Bedeutung der Mikroflora erfahren, vor allem in Hinsicht auf die Struktur und Funktion des Immunsystems. Bei keimfreien Tieren sind 85% des Immunsystems, nämlich das Mukosa-Immunsystem, überhaupt nicht ausgebildet. Die Anzahl von Granulozyten ist wesentlich erniedrigt und die Funktion dieser Granulozyten eingeschränkt. Durch Beimpfen von keimfreien Tieren mit unterschiedlichen Mikroorganismen hat man Beziehungen zwischen den Mikroben studieren können und festgestellt, daß sich die komplexen Mikrobengesellschaften in Gleichgewichten stabilisieren, die von außen eindringenden Mikroben bei dem Versuch der Kolonisierung Widerstand entgegensetzen. Diesen Widerstand bezeichnet man als Kolonisationsresistenz.

Die normale Mikroflora ist daher für Struktur und Funktion des Mukosa-Immunsystems und des Immunsystems von entscheidender Bedeutung. Darüberhinaus vermittelt die normale Mikroflora aus sich heraus auch einen gewissen Schutz gegenüber krankheitserregenden Eindringlingen. Die Mikroflora ist daher für Gesundheit und Krankheit ein ganz entscheidender Faktor. In der Anordnung der Abwehreinrichtungen in den meisten Mukosa imponiert die normale Mikroflora als eine der ersten Abwehrbarrieren (1, 15, 16).

• SYMBIOSE

Der Begriff „Symbiose“ wurde 1879 von Anton Heinrich de Bary definiert: „Die Symbiose ist das fortwährende und innige Zusammenleben ungleichnamiger Organismen“. Die Definition der Symbiose umgreift eine Vielzahl von Lebensgemeinschaften, Parasitismus, Neutralismus, Kommensalismus und Mutualismus eingeschlossen (12). Gregory äußerte schon 1951: „Der Wert des Konzepts liegt in der Ausweitung des Konzepts Organismus als strukturelle Einheit auf den Einschluß heterogener Systeme mit dem Resultat einer funktionellen Einheit oder eines funktionellen Feldes“ (siehe 10).

Dieses Konzept wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe auf die Betrachtung von Mikroflora-Populationen im Digestionstrakt übertragen (10). Ganz im Sinne von de Bary werden der Mensch und die Mikroben als eine symbiontische Lebensgemeinschaft begriffen. Die „normale“ Mikroflora des Menschen enthält auch opportunistische Krankheitserreger, mit welchen der Mensch fortwährend und innig zusammenlebt, die normalerweise unter Kontrolle neutraler, kommensaler und mutualistischer Mikroorganismen stehen und daher ihre krankheitserregenden Eigenschaften nicht entfalten können (10).

- **PROBIOTIKA**

Der Begriff „Probiotikum“ war bisher nur sehr diffus definiert und beinhaltete sehr unterschiedliche Vorstellungen. Im Rahmen eines im Juni 1994 durchgeführten Seminars zum Thema „Probiotika“: Aussichten der Anwendung bei opportunistischen Infektionen erarbeitete ein internationales Expertenteam die folgende Definition: Ein „Probiotikum“ ist eine mikrobielle Präparation, die lebende und/oder abgetötete Mikroben einschließlich Bestandteilen und Stoffwechselprodukten enthält. Probiotika können als Lebensmittelzusatz, als Prophylaktikum oder als Therapeutikum eingesetzt werden (17).

11.2 Mikrobiologische Therapie

- **DEFINITION**

Die Mikrobiologische Therapie ist definiert als die orale und parenterale Anwendung von verschiedenen lebenden und/oder abgetöteten Mikroben und/oder deren Bestandteilen zu therapeutischen Zwecken. Die wesentlichen Elemente der Mikrobiologischen Therapie sind mikrobielle Präparate und Autovakzine. In der Roten Liste sind etwa 35 mikrobielle Präparate aufgeführt (6). Trotz der enormen Artenvielfalt symbiontischer Mikroben sind im wesentlichen nur vier Arten Grundlage der meisten Präparate: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Bifidobacterium bifidum und Lactobacillus acidophilus. An Nicht-Symbionten kommen Saccharomyces boulardii zum Einsatz.

- **WIRKUNGSWEISE**

Die Mikrobiologische Therapie mit mikrobiellen Präparaten und Autovakzinen (4) ist ein wissenschaftlich begründetes Therapieverfahren (6, 11). Die ursprünglich aus Erfahrungsgut resultierende, aus konventioneller Sicht unbegreifliche Behandlung der unterschiedlichsten Erkrankungen, von akuten und chronischen Entzündungen im HNO-Bereich, im Respirationstrakt, im gastrointestinalen Gebiet, im Urogenitaltrakt, bis zu Allergien und anderen reichend, gewinnt in jüngsten immunologischen Erkenntnissen ihr Verständnis. Die Freisetzung der Zytokine Interleukin-1ß, IL-6 und Interferon-g wird direkt und dosisabhängig stimuliert. Die orale Applikation mikrobieller Präparate aktiviert ruhende B-Zellen, die im Sinne einer Kaskadenreaktion proliferieren, was zu einer Erhöhung der IgA-Synthese führt. Die Stimulation der Aktivitäten des Mukosa-Immunsystems ist durch eine Erhöhung sekretorischen IgAs im Speichel belegt (7, 9, 11, 14, 17).

In das komplexe Räderwerk aus Mukosa-Immunsystem, Immunsystem, Nervensystem, Stoffwechsel und Hormonsystem wird mit unterschiedlichen immunologischen Signalen effektvoll eingegriffen. Damit erfährt die über vierzigjährige, sorgfältige ärztliche Erfahrung in der Therapie mit mikrobiellen Präparaten und Autovakzinen eine eindrucksvolle Bestätigung.

- **INDIKATIONEN**

Durch kontrollierte klinische Prüfungen gesicherte Indikationen sind: Immunmodulation, Erkältungskrankheiten, chronisch rezidivierende Infektionen der Luftwege, chronische Sinusitis, Entzündungen im Mund-, Nasen-, Rachenraum und Mittelohr, gastrointestinale Störungen, Colon irritabile und Harnwegsinfektionen. Aus Erfahrungsgut resultieren weitere Indikationen: Gastroenteritis, Enterocolitis, postantibiotische Colitis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Hepatopathien, Cholecystopathien, Hauterkrankungen, allergische Erkrankungen und Mykosen. Diese Indikationen sind zur Zeit Gegenstand weiterer klinischer Studien. Alle diese Indikationen betreffen das aus dem Entoderm gebildete Mukosa-Immunsystem. Das breite Spektrum der Indikationen findet im Mukosa-Immunsystem als Substrat seine Erklärung (2, 13).

- **KOMBINATIONSTHERAPIE**

Im Sinne ganzheitlicher Behandlungsweisen wird die Mikrobiologische Therapie in der Praxis erfolgreich mit der antihomotoxischen Therapie und der Ernährungstherapie kombiniert.

- **ANTIHOMOTOXISCHE THERAPIE**

Zu einer erfolgreichen Mikrobiologischen Therapie sollte immer eine antihomotoxische Behandlung gehören, denn eine normale funktionsfähige Flora kann nur auf einem physiologischen Milieu gedeihen. Umweltbelastungen, fehlerhafte Ernährung, aber auch allopathische Medizin (wie z.B. häufige Antibiotikagaben) führen gerade bei chronisch kranken Patienten zu schwerwiegenden Milieuveränderungen, die mit Hilfe der antihomotoxischen Medizin behandelt werden.

Der erste Schritt in der Therapie dieser chronischen Erkrankungen ist dabei die Durchführung einer Entgiftungstherapie. Das Basismittel zur Mikrobiologischen Therapie ist Nux vomica-Homaccord. Dieses homöopathische Kombinationspräparat führt zu einer Funktionsverbesserung im Bereich des Magen-Darm-Traktes.

Das zweite ebenso wichtige Präparat zur Entgiftungstherapie ist Lymphomyosot N. Es hat eine die Lymphe mobilisierende Matrix entschlackende Wirkung.

Zur Anregung der entgiftenden Lebertätigkeit verwendet man Hepar compositum N und zur Förderung der Nierenausscheidung Solidago compositum SN.

Diese Behandlung unterstützt man durch eine gesteigerte Flüssigkeitszufuhr, am besten in Form von mineralarmen Wässern, Obst- und Gemüsesäften. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist auch zum Angehen der Mikrobiologischen Therapie unbedingt erforderlich.
Die notwendige normale Trinkmenge beträgt bei der Frau 2 Liter, beim Mann 3 Liter pro Tag. Bei einer Entgiftungstherapie kann diese Menge auf 4 bis 5 Liter pro Tag gesteigert werden (Cave: Herz- und Nierenerkrankungen).

Zur Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen verschiedenster Art und Lokalisation verwendet man das Präparat Mucosa compositum, bei Erkrankungen der Haut Cutis compositum N.

Bei allen entzündlichen Erkrankungen, so auch im Magen-Darmbereich, hat sich Traumeel S bewährt. Bei kolitischen Beschwerden hat sich auch das Präparat Podophyllum compositum bewährt.

Zur Behandlung von spastischen Zuständen verwendet man Spascupreel (S), bei Übelkeit und Brechreiz verschiedener Genese Vomitusheel (S).

Es gibt noch zahlreiche andere homöopathische Komplexmittel (wie z.B. Duodenoheel, Gastricumeel, Hepeel etc.) sowie die gesamte Palette der homöopathischen Einzelmittel, die sich im Rahmen einer Mikrobiologischen Therapie zur Immunmodulation einsetzen lassen.
Durchgemachte Infektionskrankheiten können gerade im Magen- und Darmbereich zu chronischen Krankheitssymptomen führen. Eine gezielte Nosodentherapie ermöglicht in diesen Fällen eine kausale naturheilkundliche Therapie.

- **ERNÄHRUNGSTHERAPIE**

Die Lebensweise eines Patienten ist von entscheidender Bedeutung für die langfristige Sicherung des Erfolgs therapeutischer Maßnahmen. Im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie sollten vor allem auch ernährungstherapeutische Hinweise gegeben werden (5).

11.3 Literatur

(1) Berg Rodney D., Waaij van der, Dirk, Heidt Peter J., and Rusch Volker C., Interactions Between the Indigenous Microflora and the Host Immune System. Old Herborn University Seminar Monograph 2. Institute for Microecology, Herborn-Dill (1988).

(2) Castro Gilbert A., Gut Immunophysiology: Regulatory Pathways Within a Common Mucosal Immune System. NIPS 4, 59-64 (1989).

(3) Gemsa Diethard, Kalden Joachim Robert, und Resch Klaus (Herausgeber), Immunologie. Grundlagen – Klinik – Praxis. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York (1991).

(4) Institut für Mikroökologie, Kornmarkt 34, 35745 Herborn-Dill.

(5) Koerber von, Karl, Männle Thomas, und Leitzmann Claus, Vollwert-Ernährung. Konzeption einer zeitgemäßen Ernährungsweise. 7. Auflage. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg (1993).

(6) Kolb Hans, und Maaß Christian, Kompendium der Mikrobiologischen Therapie. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg (1991).

(7) Ottendorfer D., Immunologische Untersuchungen zum Wirkungsnachweis eines bakteriellen Immunmodulators nach oraler Applikation an Minischweinen. Veröffentlichung in Vorbereitung (1994).

(8) Roitt Ivan M., Borstoff Jonathan, and Male David K. (editors), Immunology. Gower Medical Publishing, London, New York (1989).

(9) Rosenkranz W., und Grundmann E., Immunmodulatorische Wirkung lebender nicht-pathogener Enterococcus faecalis-Bakterien des Menschen. Arzneimittelforschung 44(I), 5, 691-695 (1994).

(10) Rusch Volker C., Das Konzept Symbiose: Eine Übersicht über die Terminologie zur Beschreibung von Lebensgemeinchaften ungleichnamiger Organismen. Mikroökologie und Therapie 19, 33-59 (1989).

(11) Rusch Volker C., Mikrobiologische Therapie: Ein wissenschaftlich begründetes Konzept zur Immunmodulation. Erfahrungsheilkunde (1994).

(12) Schlegel Hans G., Allgemeine Mikrobiologie. 6. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart (1985).

(13) Stern Martin, Immunphysiologie des Magen-Darm-Traktes. Symposium, Harvard Medical School, August 1991. Deutsches Ärzteblatt 89 (7), 326-328 (1992).

(14) Tarkkanen P., In-vitro-Untersuchungen mit Lymphozytenkulturen zum Vergleich verschiedener mikrobieller Präparate und Autovakzine. Veröffentlichung in Vorbereitung (1994).

(15) Waaij van der, Dirk, Heidt Peter J., Rusch Volker C., and Gebbers Jan-Olaf, Microbial Ecology of the Human Digestive Tract. Old Herborn University Seminar Monograph 1.Institute for Microecology, Herborn-Dill (1990).

(16) Roitt J. M. et al., Kurzes Lehrbuch der Immunologie, 2. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1993.

(17) Mayr A., Entwicklung, Aufbau und Funktion der körpereigenen Abwehr unter besonderer Berücksichtigung des Immunsystems. In: Zilch M. J. (Hrsg.), Immunologie im Spannungsfeld individueller Disposition und Exposition. Forum Medizin Verlagsgesellschaft, Gräfelfing 1992, pp. 21-34.

12 Allgemeine Regeln zum praktischen Vorgehen beim therapeutischen Einsatz der Heel-Präparate

Die im Therapeutischen Index aufgeführten Präparate wurden aufgrund der Erfahrung zahlreicher Therapeuten aller Fachrichtungen incl. Kliniker und Zahnärzte, die sich seit vielen Jahren mit der homöopathisch/antihomotoxischen Behandlungsmethode befassen, zusammengestellt. Weiterhin wurden auch die Ergebnisse der in neuerer Zeit durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchungen (z.B. Anwendungsbeobachtungen, „medical trials“, klinische Prüfungen usw.) bei der Erstellung der Therapievorschläge mit verwertet.

Grundsätzlich können die meisten Präparate, je nach Art der zu behandelnden Erkrankung, auf zweierlei Weise eingesetzt werden:

1. zur Akutbehandlung bei plötzlich auftretenden Erkrankungen oder Beschwerden,
2. zur Langzeitbehandlung bei chronischen Krankheitszuständen.

Bei der Akutbehandlung sind häufige Gaben des entsprechenden Präparates angezeigt, in der Regel alle 15 Minuten 1 Tablette oder 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden als initiale Stoßtherapie).

Injektabilia werden bei akuten Zuständen anfangs täglich appliziert. Als allgemeine Regel gilt, daß die angezeigten Präparate umso häufiger verabreicht werden sollten, je heftiger und akuter die Beschwerden auftreten. Nach Besserung sollte die Zahl der Arzneigaben allmählich reduziert werden.

Bei der Langzeitbehandlung chronischer Krankheitszustände werden die oral zu verabreichenden Präparate in der Regel in einer Dosierung von 3 mal täglich 10 Tropfen bzw. 3 mal täglich 1 Tablette eingenommen (Tabletten langsam im Mund zergehenlassen), Injektionslösungen werden 2-1 mal wöchentlich appliziert. Diese Dosierungen sind auch für die Nachbehandlung akuter Erkrankungen zu empfehlen.

Zu betonen ist, daß die Hinweise zur Dosierung der einzelnen Präparate lediglich Richtlinien darstellen, die dem in der homöopathisch/antihomotoxischen Therapie noch weniger erfahrenen Therapeuten eine Hilfestellung geben sollen, wie die Präparate zweckmäßigerweise dosiert werden. Mit zunehmender Erfahrung gehen die meisten Therapeuten dazu über, weitestgehend bei jedem Patienten individuell zu dosieren, wobei dann nicht nur die Schwere des jeweiligen Krankheitsverlaufes, sondern auch konstitutionelle Gegebenheiten und die individuelle Reaktionslage des Patienten mit in die Überlegungen zur Dosiswahl und/oder Applikationshäufigkeit einbezogen werden.

12.1 Dosierung bei Säuglingen und Kleinkindern

Grundsätzlich kann die Dosierung homöopathischer Arzneimittel bei Säuglingen und Kleinkindern (ebenso wie bei Erwachsenen) individuell gehandhabt werden. Aufgrund des zum Teil unterschiedlichen Ansprechens der einzelnen Patienten auf die Verabreichung dieser Präparate ist die Angabe starrer Dosierungsschemata nicht sinnvoll und würde auch den Erfahrungen der antihomotoxischen Therapie widersprechen.

Die Tropfenpräparate enthalten Alkohol, die Tablettenpräparate Milchzucker. Dies ist speziell bei der Kinderdosierung zu beachten.

Folgende Dosierungsvorgaben haben sich jedoch in der Praxis als Richtlinien bewährt:

Grundschema für *Tropfen*- und *Tablettenpräparate*:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
0 - 3 Jahre	½ der Erwachsenendosis	4x täglich ⅓ der Erwachsenendosis
4 - 6 Jahre	½ der Erwachsenendosis	6x täglich ½ der Erwachsenendosis
7 - 11 Jahre	⅔ der Erwachsenendosis	8x täglich ⅔ der Erwachsenendosis

Maßgeblich ist die jeweils im Einzelfall vorgesehene Tagesdosis bei Erwachsenen. Bei einigen Präparaten gelten abweichend hiervon eigene Dosierungsanweisungen.

Beispiel: Bei Lymphomyosot N beträgt die Erwachsenendosis 3 mal täglich 15-20 Tropfen. Dementsprechend erhalten Säuglinge und Kleinkinder von 0-3 Jahren 5 Tropfen, Kinder von 4-6 Jahren 8 Tropfen und Kinder von 7-11 Jahren 10 Tropfen.

Die *Tropfen* können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.

Die *Tabletten* im Mund zergehen lassen. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann die entsprechende Einzeldosis auch mit etwas Flüssigkeit vermischt eingegeben werden.

Von den *Ampullenpräparaten* erhalten Säuglinge und Kleinkinder als Einzeldosis:

Altersgruppe	Dosierung
0 - 3 Jahre	ca. 0,3 ml
4 - 6 Jahre	ca. 0,5 ml
7 - 11 Jahre	ca. 0,6 ml

i.m., s.c., i.c.oder i.v. appliziert.

Nähere Einzelheiten über die Dosierung (und Potenzierung) bei Nosodenpräparaten im Kindesalter siehe Kapitel 4.3.3 (Nosodenpräparate S. 25).

Zäpfchenpräparate: Von dem Präparat Viburcol N Suppositorien erhalten Säuglinge (vom 1. Lebenstag an) bis zum Alter von 6 Monaten eine Dosis von bis zu 2 Zäpfchen täglich, ab 6 Monaten bis zu 3 Zäpfchen pro Tag. Von Vomitusheel S sollten ebenfalls bei Säuglingen bis zu ½ Jahr höchstens 2 Zäpfchen täglich verabreicht werden. Die mittlere Richtdosis von Spascupreel S Suppositorien beträgt bei Säuglingen bis ½ Jahr 2-3 mal täglich ½ Zäpfchen, bei Kindern ab 6 Monaten 2-3mal täglich 1 Zäpfchen. Atropinum compositum S Suppositorien sollten in der Regel erst ab dem 3. Lebensmonat gegeben werden, und zwar bei Kleinkindern unter 3 Jahren in einer Dosis von maximal 2mal täglich 1 Zäpfchen, bei Kindern von 3-5 Jahren in einer Dosierung von maximal 3 Zäpfchen und bei älteren Kindern von maximal 5 Zäpfchen pro Tag.

12.2 Auswahl der zu verordnenden Präparate

Bei der Auswahl der therapeutisch einzusetzenden Präparate sollte in der Regel folgendermaßen vorgegangen werden:

Sofern sich im therapeutischen Index oder im Präparateindex ein Arzneimittel finden läßt, dessen Indikation dem zu behandelnden Krankheitsbild exakt entspricht oder bei dem das homöopathische Arzneimittelbild des Inhaltsstoffes genau mit dem Symptomenbild des Patienten übereinstimmt, so sollte dieses Mittel vorrangig eingesetzt werden.

Bei vielfältigen Krankheitserscheinungen oder wenn sich kein exakt passendes Arzneimittel auf Anhieb ausfindig machen läßt, sollte man der Symptomatik entsprechend vorgehen und evtl. gleichzeitig mehrere Präparate gegen die verschiedenen vorliegenden Beschwerden einsetzen, z.B. gleichzeitig Mittel gegen Kopfschmerz, Herzbeschwerden, Venenstauung, Gelenkschmerzen usw.

Wenn Präparate in mehreren unterschiedlichen Darreichungsformen zur Verfügung stehen (z.B. Tropfen und Tabletten), so können diese von der therapeutischen Wirkung her in aller Regel als gleichwertig angesehen werden. Da die Tropfen laut HAB-Herstellungsregeln mit Alkohol-Wasser-Gemischen zubereitet sind, sollten diese jedoch nur mit gewisser Zurückhaltung bei solchen Patienten verordnet werden, bei denen die Zufuhr von geringen Alkoholmengen bereits zu Problemen führen könnte, wie z.B. bei Leber- und Alkoholkranken, und zwar insbesondere bei „trocken gewordenen“ Alkoholikern! Bei dieser Patientengruppe empfiehlt es sich, Ampullenpräparate zu verwenden. Andererseits sollten Tablettenpräparate bei der selten vorkommenden Laktoseintoleranz nur mit Vorbehalt gegeben werden.

Ein Diabetes mellitus stellt keine Gegenanzeige für die Verabreichung der Tablettenpräparate dar. Bei schwereren Formen dieser Erkrankung, die einer streng kohlenhydratbilanzierten Diät bedürfen, sollten pro Tablette (à 300 mg) allerdings 0,025 BE (Broteinheit) angerechnet werden.

12.3 Spezielle Anwendung der Ampullenpräparate

Bei den zur Verfügung stehenden Ampullenpräparaten muß zwischen zwei Gruppen grundsätzlich unterschieden werden:

1. Kombinationspräparate (z.B. Composita, Homaccorde, Mischinjeele)
2. Einzelmittel-Injeele und Injeele forte sowie Einzelmittel in Einzelpotenzen

Die Ampullenpräparate der 1. Gruppe werden wie die Tropfen- und Tablettenpräparate weitestgehend indikationsbezogen eingesetzt. Von zahlreichen dieser Präparate stehen gleichzeitig auch orale Darreichungsformen zur Verfügung (u.a. Tropfenzubereitungen bei sämtlichen - 30 -Homaccorden). Die Frage, ob bei solchen Präparaten der Applikation der Injektionslösung oder der oralen Verabreichung der Vorzug zu geben ist, läßt sich nicht pauschal beantworten. Durch Auswertung der Therapieergebnisse bei großen Fallzahlen im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen konnte für einige Kombinationspräparate diese Frage in den letzten Jahren genauer untersucht werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß die Behandlungsresultate bei Applikation der Injektionslösung in der Regel etwas besser sind als bei Gabe der oralen Darreichungsform. Allerdings können aufgrund der unterschiedlichen Begleitumstände bei den dokumentierten Behandlungsfällen (z.B. unterschiedliche Beschwerdedauer, Zusatztherapien usw.), die vermutlich die Behandlungserfolge nicht unwesentlich mitbeeinflußt haben dürften, diese Ergebnisse noch nicht als gesichertes Wissen bezeichnet und auch nicht pauschal auf sämtliche Präparate übertragen werden.

Generell kann jedoch empfohlen werden, bei weniger schwer ausgeprägten Krankheitserscheinungen zunächst die oralen Darreichungsformen einzusetzen. Die Applikation der Ampullen kommt vor allem dann in Frage, wenn hochakute Verlaufsformen vorliegen oder wenn sich bei chronischen Krankheitsbildern durch Gabe der Tropfen- bzw. Tablettenpräparate kein ausreichender Behandlungserfolg erzielen läßt. Sehr empfehlenswert ist es auch, nach einer Injektion bzw. im Anschluß an eine Injektionsserie die entsprechende orale Darreichungsform anschließend über einen längeren Zeitraum zur Nachbehandlung zu verordnen. Bei Kindern oder sehr spritzenscheuen Patienten kann man die Ampullenpräparate auch trinken lassen. Hierzu werden die Ampullen in etwas zimmerwarmes Wasser gegeben und getrunken.

12.4 Einsatzmöglichkeiten der Einzelmittel-Injeele

Die Ampullenpräparate der 2. Gruppe (Einzelmittel-Injeele und Injeele forte sowie Einzelmittel in Einzelpotenzen) unterscheiden sich von denjenigen der 1. Gruppe dadurch, daß jeweils nur 1 Grundstoff in homöopathischer Zubereitung in dem Präparat enthalten ist. Bei den Injeelen bzw. Injeelen forte liegt dieser Wirkstoff in Form eines sogenannten Potenzenakkordes vor, wobei neben der tiefsten Potenz auch höhere und höchste Potenzen des gleichen Grundstoffes in der Arzneilösung enthalten sind. Dadurch wird erfahrungsgemäß der therapeutische Effekt verbreitert, vertieft und nachhaltig verstärkt. Durch die in der Mischung enthaltenen Hochpotenzen werden auch etwa mögliche Erstverschlimmerungen abgedämpft.
Die Einzelmittel-Injeele und Injeele forte werden, soweit sie klassische Homöopathika als Wirkstoffe enthalten, weitestgehend nach den Arzneimittelbildern therapeutisch eingesetzt. Die beste Wirkung ist dabei in der Regel zu erzielen, wenn das Symptomenbild des Patienten mit dem Arzneimittelbild des verabreichten Homöopathikums möglichst exakt übereinstimmt. Es kann auch eine Mischung verschiedener Injeele verabreicht werden, wenn jedes einzelne Präparat mit seinem Arzneimittelbild zu den Symptomen des Patienten in irgendeiner Beziehung steht.

12.5 Wann sollten homöopathisierte Allopathika, intermediäre Katalysatoren, Nosoden und Suis-Organpräparate eingesetzt werden?

Gerade bei Patienten, deren Erkrankungen bereits mit chemischen Medikamenten behandelt wurden oder bei denen sogar der Verdacht besteht, daß arzneimittelbedingte Gesundheitsschäden vorliegen, empfiehlt es sich, neben den sonst indizierten Präparaten auch die homöopathisierten Allopathika therapeutisch einzusetzen. Diese Präparate, welche ebenso wie die klassischen Homöopathika als Injeele und Injeele forte – und z.T. auch als Einzelpotenzen zur Verfügung stehen, enthalten chemisch definierte Arzneimittel in homöopathisch potenzierter Form und werden wie die übrigen Homöopathika entsprechend der Ähnlichkeitsregel „Similia similibus curentur“ eingesetzt.

Die homöopathisierten Allopathika werden aus der Vorstellung heraus verordnet, daß der Organismus durch Verabreichung von Spurendosen derjenigen Pharmaka, die zur Behandlung früherer Erkrankungen eingesetzt wurden und dabei möglicherweise zu Arzneimittelschäden geführt haben könnten, dazu angeregt wird, diese Schäden wieder zu regenerieren. Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, exakt den gleichen chemischen Wirkstoff in homöopathischer Verdünnung zu verabreichen, der die Schädigung hervorgerufen hat, sondern es kann auch ein ähnlicher Wirkstoff zum Einsatz gelangen.

Die intermediären Katalysatoren, die ebenfalls als Injeele und Injeele forte – und z.T. auch als Einzelpotenzen zur Verfügung stehen, enthalten homöopathische Potenzen solcher Stoffe, die auch im normalen menschlichen Zell- oder Organstoffwechsel eine Rolle spielen. Durch die Verabreichung dieser Stoffe sollen feinste Reize gesetzt werden, um das Stoffwechselgeschehen zu aktivieren und blockierte Zell- und Enzymfunktionen wieder in Gang zu setzen. Die Anwendung der intermediären Katalysatoren kommt vor allem bei chronischen und degenerativen Erkrankungen in Betracht.

Die Nosoden sind nach einer homöopathischen Verfahrenstechnik hergestellte Zubereitungen aus pathologisch veränderten Organen oder Organteilen von Mensch oder Tier, ferner aus abgetöteten Kulturen von Mikroorganismen oder aus Zersetzungsprodukten tierischer Organe bzw. aus Körperflüssigkeiten, die Krankheitserreger oder Krankheitsprodukte enthalten. Auch Nosoden sind als Injeele und Injeele forte – und z.T. auch als Einzelpotenzen verfügbar. Die Nosoden können als „Heilmittel des Terrains“ bezeichnet werden. Sie entfalten keine direkten Wirkungen auf die Krankheitserreger, können aber die Abwehrlage des Organismus im Hinblick auf die endgültige Überwindung einer Infektion oder infektionsbedingten Schädigung verbessern. Die Nosoden werden in der Regel zur Nachbehandlung nach Abklingen des akuten Stadiums einer Infektion bzw. einer Infektionskrankheit eingesetzt, was einer Anwendung im Sinne der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit entspricht. Sie können aber auch im Sinne einer symptomatischen Ähnlichkeit verabreicht werden – d.h. z.B. nach den grundlegenden homöopathischen Regeln des Simillimums –, oder wenn bei einem Patienten ohne Nachweis einer stattgefundenen Krankheit lediglich Symptome bestehen, die denjenigen einer bestimmten Krankheit ähnlich sind.

Weiterhin sind auch die Suis-Organpräparate als Injeele und Injeele forte erhältlich. Suis-Organpräparate werden zur organspezifischen Stimulationstherapie eingesetzt. Besonders bei degenerativen Organschäden sowie bei Funktionsschwächen von Organen können die Suis-Organpräparate erfolgreich eingesetzt werden. In der Regel wird dabei zunächst eine Vorbehandlung mit den krankheitsspezifisch indizierten homöopathischen Kombinationspräparaten durchgeführt und anschließend das organbezogene Suis-Organpräparat – allein oder in Kombination mit den sonst erforderlichen homöopathischen Arzneimitteln – verabreicht. Gerade bei Mischungen von Suis-Organpräparaten mit anderen Homöopathika wurde oft beobachtet, daß die Organzubereitungen die übrigen homöopathischen Wirkstoffe wie auf einer Gleitschiene auf das betreffende Zielorgan hinzuleiten scheinen, wodurch eine verstärkte Wirkung zustandekommt.

12.6 Wann kommen höhere Potenzen (Injeele) und wann tiefere Potenzen (Injeele forte) zum Einsatz?

Die Einzelmittel-Injeele (einschließlich homöopathisierte Allopathika, Katalysatoren, Nosoden und Suis-Organpräparate) stehen manchmal in zwei Stärken, und zwar als Injeel und Injeel forte zur Verfügung.

Zu den Anwendungsmöglichkeiten dieser verschiedenen Stärken der Präparate ist folgendes zu sagen: Wenn die individuelle Reaktionslage des Patienten nicht genau bekannt ist, empfiehlt es sich, zu Beginn der Behandlung die einfachen Injeele zu verabreichen, da hierdurch die vergleichsweise mildesten Reize gesetzt werden und heftige Erstreaktionen somit praktisch nicht zu befürchten sind. Bei chronischen Krankheiten ist es ohnehin ratsam, vorwiegend mit höheren Potenzen zu therapieren und nur bei nachweislich schlechtem Ansprechen auf tiefere Potenzstufen (Injeele forte bzw. Einzeltiefpotenzen) überzugehen. Bei sehr sensibel reagierenden Patienten können sich auch auf die normalen Injeele leichte Erstverschlimmerungen bemerkbar machen. In diesen Fällen sollte mit einer erneuten Arzneigabe so lange abgewartet werden, bis die Reaktionen abgeklungen sind. Bei akut auftretenden, heftigen Beschwerden können, sofern es sich nicht gerade um einen besonders sensibel reagierenden Patienten handelt, auch tiefere Potenzen (Injeele forte) gleich zu Beginn der Behandlung eingesetzt werden. Mit fortschreitender Besserung geht man dann zu den Injeelen über.

12.7 Wie werden die Injeele und Injeele forte appliziert?

Injeele, Injeele forte und Einzelpotenzen können sowohl intramuskulär, subkutan als auch intrakutan injiziert werden.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine intravenöse Injektion stets mit entsprechender Vorsicht und unter sorgfältiger Beobachtung des Patienten durchgeführt werden. Dies gilt besonders, wenn ein Mittel zum erstenmal appliziert wird, da eine allergische Reaktion auch bei den stark verdünnten Inhaltsstoffen der Homöopathika nie völlig ausgeschlossen werden kann. Die intravenöse Verabreichung eines Präparates kann bei akuten Beschwerden angezeigt sein, da durch diese Applikationsart mit dem vergleichsweise raschesten Wirkungseintritt zu rechnen ist. Im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen ließ sich für bestimmte Kombinationspräparate bereits zeigen, daß bei intravenöser Verabreichung besonders gute Therapieergebnisse festgestellt wurden. Es lagen hier bei i.v.-Applikation die therapeutischen Erfolgsquoten höher als bei i.m.-, s.c.- bzw. i.c.-Applikation des gleichen Präparates. Die subkutane Injektion zeigt, im Schmerzgebiet appliziert, oder wenn sie in einen Akupunkturpunkt verabreicht wird, vielfach sehr rasch in Erscheinung tretende Wirkungen, ansonsten ist sie mit der intramuskulären Injektion vergleichbar.

Die intrakutane Injektion ist bei Schmerzzuständen indiziert, und zwar vor allem dann, wenn neurale Effekte erwünscht sind. Man setzt die Quaddeln segmental, neural, appliziert im Schmerzgebiet oder z.B. an den Ausgangsstellen der Interkostalnerven neben der Wirbelsäule links oder rechts entsprechend dem Segment, evtl. auch über den Wirbeln selbst. Es können hierbei sämtliche zur Behandlung des Krankheitsbildes indizierten Ampullenpräparate in einer Spritze gemischt und in mehreren großen Quaddeln entlang der Wirbelsäule (paravertebral) appliziert werden, vorzugsweise in Punkte des Blasenmeridians.

Von einigen Therapeuten werden die Ampullenpräparate mitunter auch zur oralen Einnahme verordnet. Dabei wird der Patient angewiesen, den Ampulleninhalt in einem Glas Wasser zu verdünnen und schluckweise zu trinken. Aufgrund dieses Verordnungsverhaltens mancher Therapeuten wird gelegentlich der Ausdruck „Trinkampullen“ gebraucht. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß besondere Trinkampullen, die sich von den üblichen Ampullen mit Injektionslösungen in der Form bzw. in der Handhabung unterscheiden, nicht zur Verfügung stehen.

12.8 Therapie bei besonderen Verlaufsformen

Gelegentlich kann es nach Verabreichung homöopathischer Arzneimittel zu einer leichten Erstverschlimmerung bzw. überschießenden Reaktion bzw. zu einer Heilkrise kommen, wie es ja auch aus der Balneologie (Badereaktion mit anfänglicher kurzfristiger Verschlimmerung der Beschwerden) bekannt ist. Diese Reaktion ist in der Regel als harmlos zu betrachten und klingt im allgemeinen von selbst wieder ab. Es kann jedoch auch vorkommen, daß sich auf die Gabe homöopathischer Präparate ein neues Symptomenbild entwickelt, welches eine Umstellung der Medikation erforderlich macht. Manchmal ist in solchen Fällen die symptomatische Herausentwicklung eines typischen Arzneimittelbildes festzustellen. Es sollte dann das betreffende homöopathische Mittel als Injeel (ggf. als Injeel forte) verabreicht oder ein Kombinationspräparat gewählt werden, in welchem das betreffende Mittel als Einzelbestandteil enthalten ist.

Häufig ist im Rahmen der homöopathischen Behandlung ein verstärktes Ingangkommen von Ausscheidungsvorgängen zu beobachten. Dies kann sich z.B. in vermehrtem Abgang von Sekreten, gesteigerter Harnausscheidung usw. äußern. Solche Erscheinungen sind in der Regel als ein prognostisch günstiges Zeichen im Hinblick auf eine erfolgreiche Ausleitung krankheitsauslösender Stoffe (Homotoxine) zu werten. Auch wenn Ausscheidungsvorgänge einsetzen sollten, die in der Regel als pathologisch gewertet würden (z.B. Fluor albus, Aufbrechen von Fisteln o.ä.), kann dies dennoch ein Zeichen dafür sein, daß im Organismus Selbstheilungskräfte aktiviert wurden und der Körper über diese Ausscheidungswege bzw. über Ausweichphasen die für die Krankheit verantwortlichen Giftstoffe zu beseitigen versucht. Diese Ausweichphasen haben eine „Biologische Ventilfunktion“. Man sollte daher gründlich abwägen, ob eine Beeinflussung dieser Vorgänge durch unterdrückende Maßnahmen notwendig ist oder nicht. Das gleiche gilt auch für fieberhafte Reaktionen, die im Rahmen der homöopathischen Therapie gelegentlich auftreten können.

Sofern durch die bestehende Krankheit noch keine irreparablen Organschäden gesetzt wurden, läßt sich der Gesundheitszustand des Patienten durch eine richtig gewählte und aus reichend lange durchgeführte Therapie oft völlig wiederherstellen. Wie weit die Genesung bereits vorangeschritten ist, läßt sich häufig daran ablesen, welche Reaktionen auf die Verabreichung der indizierten Präparate noch zu beobachten sind. Deutliche Erstreaktionen nach Gabe der therapeutisch indizierten Präparate zeigen oft an, daß das bestehende Krankheitsbild noch einer längeren, intensiven Therapie bedarf; ist die Genesung dagegen schon weit fortgeschritten, so treten auch auf die forte-Zubereitungen der Injeele, Nosoden, Suis-Organpräparate usw. keine (oder höchstens rudimentäre) Reaktionen auf.

Bei irreversiblen degenerativen Veränderungen oder neoplastischen Entartungen von Organen oder Geweben ist auch durch eine homöopathische Stimulationstherapie keine endgültige Heilung mehr zu erwarten. Hier kann es aber dennoch sinnvoll sein, die entsprechend der Symptomatik indizierten Präparate zu verabreichen, weil dadurch Entgiftungssysteme des Organismus aktiviert und in die Lage versetzt werden, mit den aufgrund der Erkrankung anfallenden Giftstoffen (Homotoxinen) besser fertig zu werden. Auch hier macht sich die Ausleitung von Homotoxinen in Form von gesteigerten Ausscheidungsvorgängen bemerkbar. Parallel zum Einsetzen dieser Ausscheidungsvorgänge ist zumeist eine Besserung des Allgemeinbefindens des Patienten zu beobachten, was beides als ein Zeichen für ein gutes Ansprechen des Patienten auf die Präparate gewertet werden darf. Es empfiehlt sich daher, diejenigen Präparate, die eine günstige Wirkung erkennen ließen, über einen längeren Zeitraum zu verabreichen. Auch wenn dadurch keine Heilung des Grundleidens erzielt werden kann, so ist es doch häufig möglich, die den Organismus zusätzlich belastenden Krankheitsgifte weitestgehend auszuleiten und eine Verbesserung der Lebensqualität bei gleichzeitiger Verlangsamung des Krankheitsverlaufes zu erreichen.

13 Einleitung zum Therapeutischen Index

Die antihomotoxische Therapie ist, wie die Homöotherapie, eine auf Arzneireizen basierende Stimulationstherapie. Die in den antihomotoxischen Präparaten enthaltenen homöopathischen Einzelbestandteile sind größtenteils aufgrund von Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen nach der Regel „Similia similibus curentur“ ausgewählt worden.

Mit den antihomotoxischen Präparaten ist eine Form der Therapie gegeben, mit der die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert und im Organismus abgelagerte Giftstoffe (Homotoxine) über die natürlichen Ausscheidungswege ausgeleitet werden können. Dadurch ist es häufig möglich, Funktionsschwächen von Organen zu regulieren, die Heilung akuter Erkrankungen zu beschleunigen und die Krankheitserscheinungen selbst bei chronischen und rezidivierenden Erkrankungen nachhaltig zu bessern.

Es sollte jedoch auch nicht gezögert werden, von den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Chemo-, Antibiotika- oder Substitutionstherapie Gebrauch zu machen, wenn die Selbstheilungskräfte des Organismus erschöpft sind, echte Gewebszerstörungen, bindegewebige Entartungen oder altersbedingte irreparable Prozesse vorliegen. Die antihomotoxischen Präparate sind dann allerdings eine sehr gute Ergänzung zu den obengenannten Behandlungsverfahren, um die letzte Möglichkeit des Organismus zur Eigenregulierung noch auszunutzen. Sofern fachärztliche Untersuchungen bzw. Kontrolluntersuchungen aufgrund des Krankheitsbildes angezeigt sind, müssen diese auch während der antihomotoxischen Behandlung regelmäßig durchgeführt werden.

Die im Therapeutischen Index unter den einzelnen Indikationen aufgeführten Präparate sollen Anregungen vermitteln, welche homöopathisch/antihomotoxischen Arzneimittel im konkreten Behandlungsfall sinnvoll eingesetzt werden können. Dabei ist jedoch zu betonen, dass für die Auswahl der individuell zu verordnenden Präparate oft die Kenntnis der klinischen Diagnose allein nicht ausreichend ist, sondern dass bei der Arzneiwahl auch andere Gesichtspunkte wie z.B. Schwere und Art der Symptome, Modalitäten, Besonderheiten des Krankheitsverlaufes sowie konstitutions-pathologische Gesichtspunkte und die jeweilige Reaktionslage des Patienten berücksichtigt werden müssen. Auch bioelektronische Arzneifindungsverfahren wie EAV, BFD, Vegatest usw. können dabei sehr hilfreich sein. Aufgrund der Vielschichtigkeit der meisten in der Praxis vorkommenden Krankheitsbilder ist häufig eine kombinierte Therapie erforderlich.

Die bei den einzelnen Diagnosen unter der Rubrik „Basistherapie“ aufgeführten Präparate stellen die Mittel der ersten Wahl für den jeweiligen Indikationsbereich dar und zwar stets unterteilt nach oraler und parenteraler Applikationsart, wobei bei sehr vielen Krankheitsbildern ausserdem noch auf die therapeutischen Möglichkeiten mittels einer lokalen und/oder Suppositorientherapie hingewiesen wird. Häufig führt die alleinige Verabreichung dieser Präparate bereits zum Ziel. Unter dem Oberbegriff „Symptomenbezogene Therapie“ werden verschiedene weitere therapeutische Möglichkeiten bzw. Alternativen aufgezeigt, wodurch zusätzliche Anregungen für die Gestaltung eines individuellen Therapieplanes vermittelt werden sollen. Des öfteren ist es auch erforderlich, dass aufgrund eines Wechsels der Symptome im Verlauf der Behandlung einzelne Präparate gegen andere ausgetauscht werden müssen.

Zusätzlich sind unter jeder Indikation noch weitere therapeutische Verfahren aufgeführt, die als begleitende Maßnahmen die antihomotoxische Behandlung sinnvoll unterstützen können. Erfahrungsgemäß lassen sich durch eine Kombination der antihomotoxischen Behandlungsmethode mit weiteren (z.B. physikalischen, diätetischen oder sonstigen) auf das Krankheitsbild abgestimmten Therapiemaßnahmen die besten Behandlungserfolge erzielen. Die bei den nachfolgenden Indikationen angegebenen Therapieschemata haben sich in der Praxis vielfach bewährt.

Weitere Anregungen zur Gestaltung eines individuellen Behandlungsplanes können dem Abschnitt „Allgemeine Regeln zum praktischen Vorgehen beim therapeutischen Einsatz der Präparate“ entnommen werden.

14 Therapeutischer Index

Abszess

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Erysipel, Erysipeloid, Lyme-Borreliose (Erythema migrans, Lymphadenosis cutis benigna),
  Phlegmone, Neoplasma, Tbc („kalter“ Abszess)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Vorzugsweise Injektionstherapie! Evtl. chirurgische Intervention, gezielte Antibiotikatherapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[Entzündungen und Verletzungen jeder Art]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [Entzündungen und Verletzungen jeder Art]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen und Verletzungen jeder Art]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [beginnende Abszedierung]
Hepar sulfuris [fördert Einschmelzung]
Myristica sebifera [„Homöopathisches Messer“]
Staphisagria [bei chronischen/schleichenden Abszessen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleisch-, zucker- und kochsalzarme Kost, Reduktion der Gewürze
Physikalische Therapie: Je nach Stadium Wärme- oder Kälteanwendung; ggf. Saugglocke
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Umspritzung im Gesunden
Weitere Verfahren: Ozontherapie, Symbioselenkung bei chronisch rezidivierenden Abszessen

Abwehrschwäche

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache – Alter, Diabetes mellitus, Adipositas, Fehlernährung, chronische Stressbelastung, psychische Belastungen, Genussgifte, Umweltgifte, ionisierende Strahlen, „Anti-Mittel“ wie Antipyretika, Chemotherapeutika, Kortisone, Immunsuppressiva, Folge von Infektionskrankheiten u.a. – abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Angin-Heel SD (Tabl.) [Angina tonsillaris; Tonsillarpfröpfe]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel, Karbunkel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte und zur Steigerung der körpereigenen Abwehr bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus; Neigung zur Infektanfälligkeit]
Pulsatilla compositum (Amp.) [Aktivierung der mesenchymalen Abwehr; Stimulierung der Abwehrsysteme]
Tonsilla compositum N Ampullen [Steigerung der körpereigenen Abwehr, insbes. Stimulation des Lymphapparates]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
China S [Erschöpfung; Neigung zur Chronizität]
Ferrum phosphoricum [Fieber- u. Entzündungsmittel]
Ginseng [Schwächezustände]
Ipecacuanha [Übelkeit, Husten]
Lachesis S [Entzündung mit Sepsisneigung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ausreichende Vitamingaben, laktovegetabile Vollwerternährung
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Abhärtung, Sport, physikalische Therapie (z.B. Kneipp)
Allgemeintherapeutische Erfahrungen: Grippe-Cocktail: je 1 Ampulle Engystol, Gripp-Heel, Traumeel S i.m., s.c., i.v. (als Mischspritze)
Anmerkungen: **Engystol** besonders bei Virus-Infekten, **Echinacea compositum (forte) SN** besonders bei bakteriellen Infekten

Addison‘sche Erkrankung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  In schweren Fällen wird man ohne Nebennierenhormone, speziell zur Überbrückung von Gefahrensituationen, nicht auskommen können. Alle Überlastungen, auch solche durch stark wirksame Therapeutika sollten vermieden werden.
- **BASISTHERAPIE**
  Neben evtl. Hormontherapie

Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

A

Parenterale Therapie:
China-Homaccord S [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Arsenicum album-Injeel [Nephritis, Albuminurie, Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen, Verstimmungszustände]
Zwischenmedikation
Phosphor-Homaccord (Tropf.) [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie, akute und chronische Nierenkrankheiten]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Symptomenbezogene Therapie
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [Anregung der Entgiftung]
Tonico-Injeel (Amp.) [Besserung der Durchblutung und des Stoffwechsels]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Anregung der Entgiftung]
Tonsilla compositum N Ampullen [Anregung der Abwehr]
Thyroidea compositum (Amp.) [Anregung der Abwehr]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Anregung von Leber- und Nierenentgiftung]
Einzelmittel-Injeele
Arsenicum album S [Schwächemittel, Erschöpfung, Abmagerung]
Phosphorus S [Erschöpfung, Leberschäden (Parenchymmittel)]
Intermediäre Katalysatoren
Coenzyme compositum und **Ubichinon compositum** [Regulierung der Fermentfunktionen]
Glyoxal compositum [bei Therapieresistenz]
Suis-Organpräparate-Injeele
Glandula suprarenalis suis
Hepar suis
Ren suis [alle drei zusammen in öfteren Wiederholungen]

Adenoide Vegetationen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, juveniles Nasen-Rachen-Fibrom.

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus, Zerebralsklerose]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, z.B. auch bei Angina]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp., Nasentropfen) [Sinusitiden, Rhinitiden, Tubenkatarrhe]
Naso-Heel SN (Tropf.) [Rhinitis acuta und chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungsmittel, allgemein bei chronischen Krankheiten]
Tonsilla compositum N Ampullen [Steigerung der körpereigenen Abwehr bei exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder, Therapieschäden]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastöser lymphatisch/exsudativer Diathese; Drüsenaffektionen, „Hilusdrüsen-Kinder“]
Calcium phosphoricum [Konstitutions- und Schwächemittel]
Hydrastis [Schleimhautmittel; starke Absonderungen]
Sanguinaria [Schleimhautmittel für die oberen Luftwege]
Thuja S [Konstitutionsmittel; Antiproliferationsmittel]
Nosoden-Injeele: **Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode**
Intermediäre Katalysatoren: Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Mucosa nasalis suis, Tonsilla suis, Tonsilla pharyngica suis** [geistige und körperliche Entwicklungsstörungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: TLA, 3. Mandelpol
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Ozon

Adipositas

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung dieses multifaktoriellen Krankheitsbildes: u.a. exogene alimentäre Mastfettsucht, Bewegungsmangel, familiär-konstitutionelle Fettsucht sowie (Post)Pubertäts-Fettsucht und Maternitäts-Fettsucht (postpartale), endogene Fettsucht: cerebral, diencephal, dys- bzw. hypogenital, hypothyreotisch, klimakterisch, Diabetes mellitus.

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel forte NF (Tropf.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Parenterale Therapie:
Thyreoidea compositum [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, ödematöse Schwellungen]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der weiblichen Drüsenfunktionen – auch im Klimakterium]
Syzygium compositum N (Tropf.)
[bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen]
Solidago compositum SN (Amp.)
[zur Anregung der Nierenausscheidung]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der männlichen Organfunktionen, z.B. bei Dystrophia adiposo-genitalis]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Steigerung der körpereigenen Abwehr, Stimulation des Lymphapparates]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus (forte S) [Bindegewebsverschlackung mit Fettablagerungen]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel; pastös-lymphatische Pykniker]
Fucus vesiculosus [hypothyreotische Fettsucht]
Ignatia S [Depressionen, Melancholie, Folgen von Kummer: „Kummer-Speck“]
Lachesis S [pastös-phlegmatische Konstitution mit ödematösen Zuständen, oft verbunden mit Obstipation und Hitzewallungen (Klimakterium)]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Tuberculinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis,
Glandula thyreoidea suis,
Hypophysis suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia.
Ernährung: Kalorienarme Diät
Physikalische Therapie: Bewegungstherapie, Sport, Hydrotherapie
Neuraltherapie: Tonsillen, Schilddrüse
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Psychotherapie, Gruppentherapie, Verhaltenstherapie

Adnexitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Zyste, Tumor, Appendizitis, Extrauteringravidität, Nephrolithiasis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist aszendierend, selten hämatogen bzw. lymphogen
  Cave: Akute Appendizitis!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Gynäcoheel N (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Zustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch Adnexitis sowie Kolpitis, Fluor albus]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Abwehrfunktionen, u.a. auch bei Dysmenorrhoe, Endometritis, Metritis, Parametritis]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen, Ödeme, Zystenbildung]
Lachesis S [bes. linksseitige Adnexaffektionen]
Nosoden-Injeele:
Trichomonaden-Fluor
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Salpinx uteri suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia.
Physikalische Therapie: Wärmetherapie im chronischen Stadium, Kältetherapie bei (per)akuten Zuständen
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Gynäkologischer Raum, Frankenhäuser-Raum mit **Lymphomyosot N** [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: ggf. Psychotherapie

Akne

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen (u.a. Medikamente) und Arten der Akne; Ekzem, Follikulitis, Rosacea, Rhinophym.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Evtl. dermatologische Abklärung! Die Seborrhoe kann das Entstehen einer Akne begünstigen (Acne sebacea, Acné sébacée).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Acne pustulosa und Acne conglobata]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [zur Langzeittherapie bei Narben und Keloiden (Aknekeloid, Acne conglobata)]
Gynäcoheel N (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion, u.a. auch bei Dermatosen und Dermatitis]
Hepeel (Tabl., Amp.) [bei Leberschäden]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen, Pruritus]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der männlichen Organfunktionen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus (forte S)
[Seborrhoe; Acne vulgaris, Acne necroticans]
Ledum [Akne (conglobata), bes. an der Stirn]
Selenium [Acne conglobata]
Sulfur (forte) S
[Reaktionsmittel; chronische Hauterkrankungen]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus [Acne pustulosa und Acne conglobata],
Streptococcus haemolyticus
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis [Darmregulierung], **Cutis suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie mit Ozon
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Ernährung, weißmehlarme Kost, Reduktion von Zucker, Kaffee, Schokolade, Hühnereiweiß und sonstigen Allergenen
Physikalische Therapie: Lichttherapie (UVA)
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Ganglion stellatum, subkutane Infiltration
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, EAP-Testung

Allergie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Allergieformen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]

Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen] (nicht bei akuter allergischer Dermatitis)
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Hirnfunktion]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Allergie sowie bei Akne vulgaris, Neurodermitis, Sklerodermie]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion, u.a. bei Dermatosen, Lupus erythematodes und Neurodermitis]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[exsudative/lymphatische Diathese]
Mucosa compositum (Amp.)
[Schleimhauterkrankungen und -katarrhe verschiedener Art und Lokalisation]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Insektizid [Dermatitiden, Leberschäden nach Umweltbelastung (Spritzmittel!)]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Medorrhinum
Homöopathisierte Allopathika Injeele:
Penicillin
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus;
Histamin
Suis-Organpräparate Injeele:
Coecum suis, Colon suis, Cutis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie [desallergisierend,desensibilisierend, hyposensibilisierend]:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Allergie-Diät-Schema mit Suchkost bzw. Eliminationsdiät
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, EAP-Testung

Alopezie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Iatrogene bzw. Medikamenten-Alopezie,
  Alopecia diffusa
  Alopecia areata; endokrine Störungen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[vegetative Steuerung; Haarausfall im Alter sowie bei Erschöpfungszuständen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der weiblichen Drüsenfunktionen, u.a. auch im Klimakterium]
Placenta compositum (Amp.) [Förderung der Durchblutung]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der männlichen Drüsenfunktionen, z.B. bei Erschöpfungszuständen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Thallium sulfuricum [Alopecia areata und diffusa]
Thuja S [Konstitutionsmittel; bes. bei Neigung zur Chronizität sowie bei Fokaltoxikosen]
Nosoden-Injeele:
Crinis humanus, Grippe-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Placenta suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Mineralien- und vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung

Alzheimer Krankheit/ Senile Demenz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere degenerative Hirnerkrankungen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Behandlungsmöglichkeiten hängen entscheidend vom Behandlungsbeginn ab. Während im Früh- und Intermediärstadium die Aussichten durchaus erfolgversprechend sind, bleiben im Spätstadium alle Bemühungen erfolglos.

Basistherapie
Orale Therapie:
Adjuvant allgemein entgiftende Maßnahmen:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Coenzyme compositum Ampullen
Ubichinon compositum Ampullen
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

A

Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.)
[bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Carbo compositum (Amp.)
[bei zerebralen Durchblutungsstörungen, auch nach Apoplexie]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[bei Erschöpfungszuständen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[zur Verbesserung der Konstitution bei Toxinbelastungen]
Molybdän compositum (Tabl.)
[zur Regulierung des Mineralgleichgewichts]
Nervoheel N (Tabl.)
[bei Erschöpfungszuständen mit nervösen Beschwerden]
Spigelon (Tabl., Tropf., Amp.)
[bei konstitutionellen Kopfschmerzen]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer aber auch psychischer Art]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen, Neurasthenie]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Kollapszuständen]
Vertigoheel (Tabl., Tropf., Amp.) [bei Schwindel]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele:
China S [allgemeine Entkräftung]
Ginseng [Schwächezustände]
Graphites [altersbedingte Erkrankungen]
Kalium bromatum [Minderung der Erregbarkeit des Gehirnes, Folgen des Schlaganfalls, Gedächtnisschwäche]
Kalium phosphoricum
[depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände nach Überanstrengung und schweren Krankheiten]
Lachesis S
[Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände]
Natrium carbonicum forte N
[körperliche und geistige Schwäche, Verstimmungszustände]
Nosoden-Injeele:
Psorinum [Schwächezstände besonders nach schweren Krankheiten, Kopfschmerzen, Verstimmungszustände],
Tuberculinum [Schwächezustände, chronische Kopfschmerzen, nervöse Reizbarkeit]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum frontalis suis, Cerebrum occipitalis suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Geistige und körperliche Aktivierung
Lebensstilumstellung und Ernährungslenkung bilden die Basistherapie. Dazu kommt eine ausreichende Vitaminversorgung speziell mit B-Vitaminen. Kombinationspräparate mit Mineralien und Spurenelementen sind zu bevorzugen.

Amenorrhoe (sekundäre)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gravidität, Anorexie, Tumore
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung: neben organischen bzw. endokrinologischen auch nach psychischen Ursachen fahnden!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gynäcoheel N (Tropf.) [Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Ovarium compositum [Dysmenorrhoe, entzündliche und degenerative Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Erschöpfungs- bzw. neurovegetative Amenorrhoe]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.)
[Adnexitis, Para-Endometritis, Dysmenorrhoe, Zwischenschmerz/Mittelschmerz, Vaginitis; klimakterische Neurosen]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Adipositas]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus
[Sexualschwäche, Neurasthenie, depressive Zustände]
Aristolochia clematitis
[bei Postlaktations-Amenorrhoe und bei reflektorischer Situationsamenorrhoe]
Cimicifuga S [präklimakterische Amenorrhoe]
Graphites [Amenorrhoe bei plethorisch/phlegmatisch/pyknischer Konstitution mit Adipositas]
Pulsatilla S [Depressionen mit Zyklusstörungen (oft Menarche schon verspätet!)]
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum [träger Reaktionstyp]
Suis-Organpräparate Injeele:
Hypophysis suis, Ovarium suis
Begleittherapie
Ernährung: Diät speziell bei Adipositas bzw. bei Anorexie
Physikalische Therapie: Wärme, Moorbäder, Fango
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Ganglion (Ganglion cervicale uteri) und Frankenhäuser-Plexus (Plexus utero-vaginalis) sowie gynäkologischer Raum, Schilddrüse
Weitere Verfahren: Akupunktur, Psychotherapie

Amyotrophe Lateralsklerose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Multiple Sklerose.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nur adjuvante Therapie möglich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung hormoneller Regelkreise]
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Cerebrum compositum NM [Aktivierung der Hirnfunktionen]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[Verbesserung der Durchblutung]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Entgiftung über die Leber]
Ovarium compositum (Amp.) [bei Frauen als Zwischenmittel]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapie bei chronischen Erkrankungen]
Testis compositum N Ampullen
[bei Männern als Zwischenmittel]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[kräftige Stimulation der Drüsen- und Bindegewebsfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Grippe-Nosode, Salmonella paratyphi B
Homöopathisierte Allopathika Injeele:
Sulfonamid
Katalysatoren-Injeele:
Histamin
Suis-Organpräparate-Injeele:
Glandula suprarenalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur

Anämie

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursachen abklären! Substitutionstherapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Ferrum-Homaccord (Tropf.) [Förderung der Eisenresorption]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
China-Homaccord S [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Veratrum-Homaccord [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung der Fermentfunktionen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Verbesserung der Leberfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Verbesserung der Schleimhautfunktionen]
Tonico-Injeel (Amp.)
[geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Atmungsenzyme und Verbesserung der Sauerstoffutilisation]
Einzelmittel-Injeele: **Acidum fumaricum, Ferrum**
Katalysatoren-Injeele: **Natrium pyruvicum**
Suis-Organpräparate-Injeele:
Hepar suis, Medulla ossis suis, Sanguis suis, Splen suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Ernährungsumstellung

Angina pectoris

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Funktionelle Herzbeschwerden,
  Roemheld-Syndrom = Gastrokardialer Symptomenkomplex,
  HWS-Syndrom (vertebragene Angina pectoris), psychosomatische Herzalterationen.

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Stets exakte Differentialdiagnostik betr. KHK (= Koronare Herzkrankheit) incl. Infarkt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Pectus-Heel (Tabl.) [pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Cralonin [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Angio-Injeel [Koronardurchblutungsstörungrn, pectanginöse Beschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Grippe und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Hypotonie, Herzrhythmusstörungen]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.) [Herzstiche mit Arrhythmie sowie bei Roemheld und Lungenemphysem]
Crataegus-Heel S (Tropf.) [altersbedingte und infektiös-toxische Myokardschwäche; Koronardurchblutungsstörungen]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[stenokardische Beschwerden mit Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion]
Melilotus-Homaccord N Tropfen
Melilotus-Homaccord (Amp.) [Stenokardie bei Hypertonikern, besonders Plethora, präapoplektische Zustände]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Strophanthus compositum (Amp.)
[Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäß- und Herzwirkung]
Arsenicum album S [Herzschmerzen mit Angst und Unruhe]
Cactus [stenokardische Beschwerden mit Herzklopfen und Blutdrang zum Kopf]
Kalmia S [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Spigelia S [Stenokardien, bes. auch vertebragene]
Tabacum [Herzklopfen mit Zittern, Tachykardie und Todesangst]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9 [Stenokardie mit Tachykardie, Tachyarrhythmie, Extrasystolie]
Coxsackie-Virus-B_4
[Herzstiche mit Extrasystolie, Arrhythmie, Tachykardie]
Grippe-Nosode, Psorinum, Tuberculinum
[Herzschmerzen mit Tachykardie und Arrhythmie]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cor suis
Begleittherapie
Ernährung: Dauernde Ausschaltung von Risikofaktoren, cholesterin-/purinarme, schlackenreiche Kost
Physikalische Therapie: Training, „Koronarsport“
Neuraltherapie: Ganglion stellatum, Herzpunkte
Weitere Verfahren: Akupunktur, Autogenes Training und ggf. Psychotherapie, Chiropraktik bei HWS bedingten Herzstichen, Sauerstofftherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne), Ozontherapie, Oxyvenierungstherapie (nach H.S. Regelsberger)

Angina tonsillaris

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Diphtherie, Angina agranulocytotica (Schultz),
  Herp-Angina (Coxsackie-Virus A, bes. bei Kindern),
  Pfeiffer-Angina, Scharlach,
  Angina Plaut-Vincent (meist einseitig).

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufige Folgekrankheiten:
  Glomerulonephritis, rheumatisches Fieber, Polyarthritis, Tonsillen als Fokus; evtl. Antibiotikabehandlung.

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Angin-Heel SD (Tabl.) [Mandelentzündungen]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Tonsillarhypertrophie, Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Steigerung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Angina tonsillaris und bei Fokaltoxikosen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Tonsillarhypertrophie, Tonsillitis chronica, Lymphatismus]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Steigerung der körpereigenen Abwehr, Stimulation des Lymphapparates; Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder]

A

Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [Angina tonsillaris mit hohem Fieber]
Lachesis S [Pharyngolaryngitis mit düsterroten (peri)tonsillären Schwellungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Tonsilla suis [chronische Tonsillitis, Tonsillarhypertrophie],
Tonsilla pharyngica suis [Rachenmandelhypertrophie]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Neuraltherapie:
Kieferwinkel, Gaumenbogen, 3. Mandelpol
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Halswickel

Angstzustände

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Siehe auch psychische Symptome.

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Traumeel S [Regeneration der Sulfidfermente]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Gehirnfunktionsmittel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Ubichinon compositum Ampullen
[Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[Angst mit Vernichtungsgefühl, „wie Eis in den Adern"]
Arsenicum album S
[Ängste mit Unruhe und Verzweiflung sowie Erschöpfung]
Aurum [Melancholie]
Phosphorus S [furchtsame Schwäche, Angst vor Dunkelheit, Gewitter, große Erregbarkeit]
Katalysatoren-Injeele:
Acidum cis-aconiticum [Angst und Beklemmungszustände]
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cerebrum suis

Anorexie (Appetitlosigkeit)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Diagnostische Abklärung!
- **BESONDERE HINWEISE:**
  An psychische Ursachen (Anorexia nervosa/mentalis, Pubertätsmagersucht) sowie an medikamentenbedingte Ursachen (PAS, INH u.a.) denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Anorexie verbunden mit Brechreiz/Erbrechen (Vomitus)]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum S
[Anorexie verbunden mit Magen-Darm-Spasmen]
Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Diarrheel S (Tabl.)
[Diarrhoen akuter und chronischer Art; Gastroenteritis]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis; Cholezystitis; Cholelithiasis; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Leber- und Pankreasdysfunktionen]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychische Erschöpfung; psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage (Anorexia senilis)]
Tonico-Injeel (Amp.)
[physische Erschöpfungszustände]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Abwehrschwäche; Anorexie bei und nach Infektionskrankheiten]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium phosphoricum [Konstitutionsmittel, reduzierter Ernährungs- und Kräftezustand]
Hyoscyamus [Übererregbarkeit]
Ignatia S [vegetative Dystonie, Hysterie]
Pulsatilla S [Depressionen mit Weinerlichkeit]
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Ernährung: Vitamine, Mineralien, Substitutionstherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Psychotherapie

Anosmie (Geruchsverlust)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, Allergie, Hirnschädigungen, Polyposis, postinfektiöse sowie psychische = „funktionelle" Anosmie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.) [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Naso-Heel SN (Tropf.) [akute und chronische Rhinitis, auch mit Sinusitis]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr (postinfektiöse Anosmie!)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungsmittel, allgemein bei chronischen Krankheiten]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates, Steigerung der körpereigenen Abwehr; auch bei Therapieschäden]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [bei Commotio cerebri]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Euphorbium (forte S) [Rhinitis, Sinusitis]
Luffa operculata [Rhinitismittel; bes. bei Rhinitis sicca/atrophicans]

Nosoden Injeel und forte:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum DL-malicum
[Rhinitis vasomotorica, Rhinitis atrophicans, Sinusitis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Nervus olfactorius suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia Physikalische Therapie: Inhalationen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Mandelpole
Weitere Verfahren: Akupunktur, Suerstofftherapie, Ozontherapie

Aphthen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Behçet (chronische Virusinfektion?), Leukoplakie, Soor; Infektionskrankheiten, z.B. Masern, Röteln, Mumps, Varizellen; Stomatitis aphthosa/herpetica (Herpes simplex)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache weitgehend unbekannt.
  Cave: Große Rezidivneigung; Präkanzerose (Leukoplakie); Zahnsanierung erforderlich

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Angin-Heel SD (Tabl.)
[Angina tonsillaris acuta und chronica; Tonsillarpfröpfe]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr, z.B. auch bei Stomatitis, Gingivitis, Angina tonsillaris und Fokaltoxikosen]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungsmittel, allgemein bei chronischen Krankheiten]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Mundschleimhautmittel; „Splitterschmerz“]
Borax [Aphthenmittel]
Kalium bichromicum
[Mundschleimhautmittel; fadenziehende zähe Sekrete]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Stomatitiden]
Nosoden-Injeele:
Herpes simplex-Nosode, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Gingiva suis, Lingua suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Mundspülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
EAP-Testung, Symbioselenkung, Pinselung mit Traumeel S Ampullen, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (mit Eigenblut)

Apoplexie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Enzephalomalazie, Massenblutung, Neoplasma, Trauma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung! (Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie bzw. zur Nachbehandlung sowie zur Prophylaxe).

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Melilotus-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck]
Parenterale Therapie:
Melilotus-Homaccord [Bluthochdruck]
Carbo compositum [Apoplex und Herzinfarkt]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[postapoplektische arteriosklerotische Gedächtnisschwäche bzw. Hirnleistungsschwäche]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Sickerblutungen, Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.)
[Herzschwäche, Arrhythmie, Angina pectoris, Hypertonie]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.)
[Herzstützung, bes. bei Altersherz]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[pektanginöse Beschwerden verbunden mit Tachykardie und Herzklopfen]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungsmittel, allgemein bei chronischen Erkrankungen, z.B. auch bei postapoplektischen (migräneartigen) Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Hämatome, Steigerung der Herzkraft]
Belladonna S
[Plethora, hochroter Kopf, arterielle Hyperämie, Gefäß-Pulsieren]
Carbo vegetabilis
[Kollapsneigung, Kreislaufversagen]
Papaver
[Präapoplexiemittel bei Plethora, Schwindel und Benommenheit]
Vipera berus [Blutungsneigung, Sprachstörungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum frontalis suis, Cerebrum occipitalis suis, Cerebrum totalis suis
Begleittherapie
Ernährung: Risikofaktoren ausschalten
Physikalische Therapie: Massagen, Krankengymnastik, Training
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatumblockade (kontralateral)
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne), Ozon

A

Arteriosklerose

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Risikofaktoren: familiäre Belastung,
  Diabetes mellitus, Hypertonie, Hyperlipidämie

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Ginseng compositum N (Tropf.) [Schwächemittel, Geriatrikum]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Angio-Injeel (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.) [pektanginöse Beschwerden, bes. bei Hypertonie]
Carbo compositum (Amp.)
[Apoplexie- und Myokardinfarkt-Prophylaxe]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [pektanginöse Beschwerden]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Zerebralsklerose mit den entsprechenden Symptomen wie Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung, Erregungszuständen, Depressionen u.a.]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.)
[arteriosklerotische, degenerative Herzaffektionen, Hypertonie]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Altersherz]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[chronische degenerative Krankheiten]
Neuro-Injeel Ampullen [psychische Erschöpfungszustände und depressive Stimmungslage]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[arteriosklerotische zerebrale Leistungsschwäche]
Tonico-Injeel (Amp.)
[physische und psychische Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[arteriosklerotisch bedingter (Alters-)Schwindel]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Herz- und Gefäßtonisierung; Zerschlagenheitsgefühl; Apoplexiefolgen]
Aurum jodatum [Arteriosklerosemittel]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Aorta suis, Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Risikoarme Ernährung
Physikalische Therapie: Kneippkuren, Training
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatumblockade
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Arthritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Infektiöse Arthritis, Arthritis urica, „aktivierte“ Arthrose
- **BESONDERE HINWEISE:**

Diagnostische Abklärung, Rheumaserologie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[neuralgische, stechende Schmerzen, Parästhesien]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepar compositum N (Amp.)
[zur Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Lithiumeel comp. (Tabl.)
[gichtisch-rheumatische Diathese]
Placenta compositum (Amp.) [Durchblutungsmittel]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[(peri-)arthritische Beschwerden, besonders bei Wetterfühligkeit mit Verschlimmerung vor und bei Nasswetter]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [Synovitis/Synovialitis]
Colchicum (forte S)
[Muskel- u. Gelenkrheumatismus]
Formica rufa
[Umstimmungsmittel bei Allergien (Arthritis allergica!)]
Kalmia S [rote, heisse, geschwollene Gelenke]
Rhododendron
[vor allem auch kleine Gelenke befallen; Schmerzen besonders in der Ruhe]
Rhus Tox S
[rheumatische Schmerzen mit Nasswetterverschlimmerung]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Musculus suis, Os suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Elektrotherapie, TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation – eine Elektroakupunkturanalgesie); je nach Stadium Kälte (Kryotherapie) bzw. Wärme
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]), **Solidago compositum SN** (Amp.)
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Arthrose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arthritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung der Ursache(n) und des jeweiligen Stadiums der Arthrose: „stumme“ Arthrose, „dekompensierte“ bzw. „aktivierte“ Arthrose (nach Wagenhäuser bzw. nach P. Otte).

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Rheumatismusmittel, neuralgische Schmerzen]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[neurale Störfelder, bes. HWS-bedingte]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[zur Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[arthritische, neuralgische und vertebragene Beschwerden]
Osteoheel S (Tabl.)
[Knochenschmerzen, Periostitis, Exostosen (reaktive osteophytäre Wucherungen!)]
Rheuma-Heel (Tabl.)
[(peri)arthritische Beschwerden („aktivierte“ Arthrose!)]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Weichteilrheumatismus sowie Neuralgien und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Actaea [Heberden-Polyarthrose]
Bryonia S [entzündlicher Rheumatismus, „aktivierte“ Arthrose]
Caulophyllum thalictroides [Finger-Polyarthrosen]
Guajacum [chronisches Rheuma, bes. auch der kleinen Gelenke (Finger-Polyarthrosen!)]
Rhus Tox S [Anlauf- bzw. Startschmerz: typisch bei Arthrose!]
Ruta [Bouchard-Arthrose]
Sticta [arthrotische Beschwerden, bes. der Kniegelenke]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
[bes. bei Arthrosen der kleinen Gelenke (incl. WS) und bei Finger-Polyarthrosen (Heberden, Bouchard, Rhizarthrose)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Os suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Kost, Gewichtsreduktion
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Wärme, Übungsbehandlung, Krankengymnastik

Asthma bronchiale

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Asthma cardiale, Allergie, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Beim akuten Asthmaanfall Kortikoide und Theophyllinderivate!

Basistherapie
Orale Therapie:
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Drosera-Homaccord (Tropf.) [asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Husteel (Tropf.) [Hustenreiz bei Erkältung und Bronchitis]
3x täglich jeweils 15 Tropfen zusammen einnehmen
Parenterale Therapie:
Drosera-Homaccord
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Ignatia-Homaccord
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Symptomenbezogene Therapie
Bronchalis-Heel (Tabl.)
[Bronchitis, besonders chronischer Raucherkatarrh]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Virus-erkrankungen: Masern-, Grippe-, Asthma!)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, bes. bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Kollapszustände, kalter Schweiß]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [schmerzhafter Reizhusten]
Carbo vegetabilis [Dyspnoe, Lufthunger, Kollapsneigung]
Sticta [Rhinitis, Reizhusten]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Coxsackie-Virus A_9, Coxsackie-Virus B_4, Grippe-Nosode, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Trichinoyl, Hydrochinon [Dyspnoe, Störungen der Sauerstoff-Utilisation], Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Mucosa nasalis suis, Pulmo suis, Splen suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie mit **Echinacea compositum (forte) SN** (Amp.)
[allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenkarenz
Physikalische Therapie: Inhalationen, Atemgymnastik
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Störfeldsuche (Nasennebenhöhlen, sinubronchiales Syndrom), Ganglion stellatum
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Psychotherapie

Atherome

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Echte Atherome sind versprengte embryonale Talgdrüsenkeime, sog. falsche Atherome sind Talgretentionszysten. Differentialdiagnostisch sollten Atherome immer gegenüber Lipomen und vor allem gegenüber Metastasen maligner Tumoren abgegrenzt werden.

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]

Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [zur lokalen Infiltration]
Lymphomyosot N [zur Matrixdrainage]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[bei infizierten Atheromen]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp., Salbe)
[bei lokalen Entzündungen]
Einzelmittel-Injeele:
Baryum carbonicum, Conium S [bei Verhärtung von Atheromen, Drüsenschwellungen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis
Begleittherapie
Exzision
Salbenverbände
Eigenbluttherapie, z.B. mit **Echinacea compositum (forte) SN** [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten] und **Lymphomyosot N** [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Balanitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Formen, Ursachen (u.a. Soor, häufig bei Diabetes mellitus) und Schweregrade der Balanitis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung! Ggf. Partnerbehandlung. Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Abropernol N (Tabl.) [Hautkrankheiten mit Exsudation]
Parenterale Therapie:
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse, pustulöse, bullöse Symptome]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Entzündungen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Bereich der der ableitenden Harnwege]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungsmittel, allgemein bei chronischen Krankheiten]
Syzygium compositum N (Tropf.)
[Balanitis bei Alters-Diabetes]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris
[Neigung zur Haut- und Schleimhauteiterungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[oberflächliche Haut- und Schleimhautulzerationen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Sitzbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Bandscheibenschaden

(Osteochondrosis intervertebralis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  U.a. Morbus Scheuermann, Osteoporose, Spondylolisthesis (Wirbelgleiten); Bechterew, Wirbel-Tbc, Wirbelmetastasen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.)
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[HWS-bedingte Neuralgien; Zervikalmigräne, neurale Störfelder]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[parästhetische Neuralgien, besonders auch Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Osteochondrose, bes. der LWS mit Ischiasneuralgien]
Cruroheel S (Tabl.)
[Ulcus cruris (Wurzelirritationssyndrom bei LWS-Osteochondrose!)]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Schulter-Arm-Syndrom bzw. bei Periarthritis humeroscapularis]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[HWS-Osteochondrose mit Neuralgien (Migraine cervicale]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien, bes. auch vertebragener Genese]
Osteoheel S (Tabl.)
[Periostitis; Exostosen: Osteophytenbildung, Randzacken, Spangen]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[Zervikalsyndrom mit Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Conium S [Alters- und Neuralgiemittel]
Hekla Lava [osteophytische Randzacken und Spangen]
Lithium carbonicum
[rheumatoide Arthritis; Kopfschmerzen]
Rhododendron
[Knochen- und Bindegewebsmittel; Verschlimmerung vor Regenwetter und Gewitter]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Glandula parathyreoidea suis, Glandula suprarenalis suis, Glandula thyreoidea suis, Musculus suis, Os suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie (lokale Quaddelungen paravertebral), chiropraktische und/oder balneologische bzw. physikalische Therapie

Bechterew'sche Erkrankung (Spondylitis ankylosans/ankylopoetica)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Immunologische und radiologische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.) [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Colocynthis-Homaccord (Tropf.) [Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Spascupreel S (Supp.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht; Osteomalazie]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden; Nasswetterverschlimmerung]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen bei Männern; Bechterew: Androtropie ca. 10:1!]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen; Osteochondrose, Arthrosen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen incl. Spondylarthrosis]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [Muskel- und Gelenkbeschwerden; entzündlicher Rheumatismus]
Conium S
[Koordinationsstörungen der Glieder; zittrige Schwäche]
Hekla Lava [Exostosen; Kreuzschmerzen]
Phosphorus S [vornübergebeugte kyphotische Haltung]
Rhododendron [Gelenkmittel, bes. auch für kleine Gelenke (Spondylarthritis auch bei Reiter-Krankheit]
Rhus Tox S
[rheumatische Beschwerden mit Nasswetterverschlimmerung sowie Verschlimmerung in Ruhe und „Startschmerz"]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum, Osteomyelitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Medulla ossis suis, Os suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Balneologie, TENS, Elektrotherapie
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Quaddeltherapie paravertebral
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Ozontherapie, Sauerstofftherapie, HOT

Blepharitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenfachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Abwehrsteigerung bei entzündlichen Prozessen; bes. bei Blepharitis scrophulosa und Staphylokokken-Blepharitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit), Drüsenschwellungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch der Bindehaut des Auges]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Krankheiten, u.a. auch bei Hauterkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse]
Kalmia S [Rötungen, Schwellungen, Schmerzen; Fokalherde]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Eiterungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Spülungen
Neuraltherapie: Ganglion ciliare
Weiter Verfahren: Akupunktur

Blutungsneigung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.) [Blutungen]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Reizzustände, petechiale Blutungen]

B

Parenterale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N [Blutungen]
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [venöse Stase; variköses Ekzem; thrombophlebitische Zustände]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Paeonia comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzema und Fissura ani; Hämorrhoiden]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Blutergüsse]
Cinnamomum [generell bei Blutungen und Blutungsneigung]
Crotalus [Blutungen aus Körperöffnungen]
Hamamelis [venöse Blutungen, Hämorrhoidalblutungen]
Sabina [Unterleibsblutungen]

Brechreiz

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Vomitusheel (Tropf.) [Erbrechen und Brechreiz]
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Parenterale Therapie:
Colchicum compositum mite S
[Begleittherapie bei Krebserkrankungen]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Atropinum compositum (Amp.) [Krämpfe und Koliken]
Atropinum compositum S (Supp.)
[bei Gallenkoliken, Nierenkoliken, Nabelkoliken der Kinder, spastischem Husten; Pertussis Dysmenorrhoe]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Brechreiz bei Leber-Galle-Affektionen wie Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica, sonstige Leber(parenchym)schädigungen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[Übelkeit/Brechreiz (= Nausea) bei Kinetosen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreaserkrankungen und Oberbauchbeschwerden, z.B. gastrokardialer Symptomenkomplex]
Mucosa compositum (Amp.)
[Schleimhautmittel; bei gastroenteritischem Brechreiz]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Brechreiz – ggf. verbunden mit Meteorismus bei Nikotin-, Kaffee-, Alkoholabusus]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Übelkeit/Brechreiz (= Nausea) bei Kinetosen sowie Schwindelzuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Brechreiz/Erbrechen mit Unruhe]
Colchicum (forte S) [Übelkeit und Brechreiz schon beim Anblick bzw. Geruch von Speisen]
Ipecacuanha
[Husten mit Brechreiz und Erbrechen (das nicht erleichtert)]
Nux vomica S [bes. morgendlicher Brechreiz; Diätfehler, Reizmittelmissbrauch]
Weitere Verfahren: Ggf. Psychotherapie

Bronchiektasen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Emphysem
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Zu unterscheiden sind:
  angeborene Bronchiektasen, oft in Verbindung mit einer zystischen Fibrose (Mukoviszidose) und erworbene Bronchiektasen, z.B. nach frühkindlichen Erkrankungen wie Masern, Pertussis sowie nach Tbc, Pneumonien und Abszessen (Fremdkörperaspiration).
  Bronchiektasen führen meist zu einer progredienten respiratorischen und kardialen Insuffizienz (Cor pulmonale)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronische Bronchitis, Emphysem]
Droperteel (Tabl.) [(spastische) Bronchitis]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Bronchiolitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Husteel (Tropf.) [spastische Bronchitis]
Lamioflur (Tropf.)
[bei Schleimhauterkrankungen (mit stinkenden Sekreten)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [bei eitrigen Prozessen]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[laryngealer Husten, petechiale Blutungen]
Tartephedreel N (Tropf.)
[„absteigende“ Katarrhe der Atemwege mit asthmatischem Husten, der sich schwer löst]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenum jodatum
[Atemnot und Schleimbildung sowie Bronchitis putrida]
Guajacum [generelles Bronchiektasenmittel, übelriechender eitriger Auswurf]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen]
Hyoscyamus
[Bronchiolenerschlaffung, grün-schleimiger Auswurf]
Ipecacuanha [Husten mit Brechreiz und Übelkeit]
Kalium carbonicum (forte N)
[Schwächemittel; Erkältungsanfälligkeit; Nachtschweisse]
Kreosotum [Bronchitis foetida]
Stannum [Bronchiektasen mit „maulvollem“ Auswurf]
Nosoden-Injeele:
Bacillinum, Coxsackie-Virus A_9, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Pertussis-Nosode, Sinusitis-Nosode
[Sinubronchiales Syndrom], **Tuberculinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Mucosa nasalis suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Bronchitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Asthma cardiale, Asthma bronchiale;
  (akute) tuberkulöse Bronchitis, Bronchialkarzinom, Bronchiektasen, (Broncho)Pneumonie, Lungenembolie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Akute Pneumonie, Neubildungen

Basistherapie
Orale Therapie:
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronische Bronchitis, Emphysem]
Droperteel (Tabl.) [(spastische) Bronchitis]
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte, bes. im Anfangsstadium (z.B. Grippe-Bronchitis)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Pertussis, asthmatoide Bronchitis mit Hustensalven, Bronchiolitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe-Bronchitis]
Husteel (Tropf.) [spastische Bronchitis; z.B. auch bei Erkältungskrankheiten, Pleuritis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Steigerung der körpereigenen Abwehr, z.B. bei exsudativer Diathese, bei lymphatischen Kindern mit Entwicklungsstörungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Guajacum [chronische Bronchitis mit eitrigem Auswurf]
Hyoscyamus [Katarrhe der oberen Luftwege und Bronchien; trockener (nächtlicher) Kitzelhusten]
Ipecacuanha [akute und subakute Bronchitis mit Übelkeit/Brechreiz]
Kreosotum [Bronchitis und Bronchiolitis (foetida)]
Natrium muriaticum
[chronische Rhinitis, Tracheitis und Bronchitis]
Phosphorus S [trockener Reizhusten; Blutungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Pertussis-Nosode, Sinusitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Abklopfen, Einreibungen, Atemtherapie
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Lokale Thoraxpunkte, Stellatumblockade; Cubitalvene
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Bronchopneumonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Malignom, Embolie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Biotherapeutika-Antihomotoxika bei akuter Bronchopneumonie als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Aconitum-Homaccord (Tropf.) [grippale Infekte, Akutmittel]
Bryaconeel (Tabl.) [akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen; zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Grippe]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Parenchymmittel; Blutungsneigung (petechiale Blutungen)]
Tartephedreel N (Tropf.) [„absteigende“ Katarrhe der Atemwege mit asthmatischem Husten, der sich nur schwer löst]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Guajacum [chronische Bronchitis und Bronchopneumonie mit übelriechendem Auswurf]
Hyoscyamus [Katarrhe der oberen Luftwege und Bronchien; nächtlicher Reizhusten]
Phosphorus S [trockener Husten; Blutungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Einreibungen, Abklopfungen
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Stellatumblockade, Cubitalvene, Thoraxquaddel
Weitere Verfahren: Akupunktur

Bursitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumor, Abszess, akzessorischer Knochenkern, freie Gelenkkörper, Osteophyten, Apophysenabriss, PCP, Tbc, Gonorrhoe
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Erforderliche Abklärung der Ursache: Häufig chronische Reizzustände (Bursitis praepatellaris, Bursitis olecrani).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S (i.c. lokal bzw. intrabursal)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Osteophyten, Exostosen; Periostitis]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen]
Silicea [Chronizität von Reiz- und Entzündungszuständen]
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Umspritzung, direkte Infiltration, Fokussuche
Weitere Verfahren: OP, Punktion, Salbenverband; ggf. Kälte

Chalazion

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hordeolum (Gerstenkorn) = schmerzhaft

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ekzeme, besonders trockene, chronische: Entzündungen im Bereich des äußeren Auges; Chronizität („Hordeolosis“)]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Graphites [Lidrandentzündungen, Blepharo-Konjunktivitis]
Hepar sulfuris [Neigung zu Eiterungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Blepharo-Konjunktivitis]
Myristica sebifera [akute und subakute Eiterungen, „homöopathisches Messer“]
Silicea [dünnflüssig-wässriger Eiter; Chronizität]
Staphisagria [Chalazion, Hordeolum; Blepharo-Konjunktivitis; Neigung zu Keloiden]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie: Nur bei Rezidiven!
Auto-Sanguis-Stufentherapie (nur bei Rezidiven!):
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme], **Berberis-Homaccord** (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Weitere Verfahren: Physikalische Therapie; ggf. augenärztlicher operativer Eingriff

Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  z.B. Gallenblasen-Empyem, Steinverschluss mit Ikterus, akutes Abdomen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Operationsindikation beachten!

Basistherapie
Orale Therapie:
Chelidonium-Homaccord N (Tropf.) [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Injeel-Chol [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [generelles Entzündungsmittel bei lokalisierten Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Diarrheel S (Tabl.) [akute und chronische Diarrhoe, Gastroenteritis]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie zur Leberfunktionsstörungen bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen]
Momordica compositum N (Amp.) [Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden; Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Leber-Mittel, bes. bei Diätfehlern und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee); Meteorismus]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Gastroenteritis; Kollapszustände (mit kaltem Schweiß)]
Vomitusheel (Tropf.) [bei Brechreiz, Erbrechen]
Einzelmittel-Injeele:
Cholesterinum [Lebererkrankungen]
Crotalus [Hämorrhagien und septische Prozesse]
Leptandra [bei Oberbauchsyndrom und Meteorismus]
Lycopodium S [Meteorismus, (Sub)Ikterus (gelbliche Hautfarbe)]
Mandragora e radice siccato [Meteorismus bei Cholezystopathien und Hepatopathien]
Podophyllum [bei Pankreopathien]
Taraxacum [Cholezystopathien]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fettarme und blähungsarme Ernährung
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Claudicatio intermittens

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arterielle Verschlusskrankheiten;
  Thromb(end)angiitis obliterans (Winiwarter-Buerger) [meist bei Männern im mittleren Lebensalter, starke Raucher],
  Dysbasia angiospastica (Raynaud) [Gynäkotropie 5:1].
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung notwendig!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen; bei Endangiitis obliterans/Endarteriitis obliterans = Thrombangiitis obliterans (= Winiwarter-Buerger) sind meist gleichzeitig oder bereits vorher auch die Venen betroffen]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörung]

Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Spascupreel (Tabl., Amp.) **Spascupreel S** (Supp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, z.B. auch Gefäßspasmen sowie bei Wadenkrämpfen; ferner Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäßwirkung]
Plumbum metallicum [Arteriosklerose; Gefäßspasmen]
Secale cornutum [Taubheitsgefühl; Wadenkrämpfe]
Tabacum [angiospastische Zustände (z.B. Raynaud); Parästhesien]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Placenta suis, Vena suis (evtl. als Mischspritze)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Nikotinkarenz
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen, Krankengymnastik, Gehtraining
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Colitis, Crohn'sche Erkrankung

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Colitis ulcerosa, Colitis mucosa, Morbus Crohn (Enteritis regionalis), Darmdivertikel, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Podophyllum compositum (Tropf.)
[colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Diarrheel S (Tabl.) [Diarrhoen, Gastroenteritis]
Parenterale Therapie:
Podophyllum compositum
[colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Colitis mit Fistelbildung/Fisteleiterung]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.) [depressive Verstimmungen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [generell bei Entzündungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Colitis ulcerosa!)]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Darmaffektionen, bes. nach Diätfehlern und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee); ferner Meteorismus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ignatia S [Depressionen; Darmspasmen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Coxsackie-Virus-A_9, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenfreie Kost
Physikalische Therapie: Einläufe
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (Darmbegasung), HOT; ggf. Psychotherapie

Commotio cerebri und postkommotionelle Beschwerden

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Contusio und Compressio cerebri, Schädelbasisfraktur
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Vertigoheel (Tropf., Tabl.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen, zerebrale Reizzustände]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Regenerationsmittel bei posttraumatischer Hirnleistungsschwäche (z.B. Gedächtnisschwäche, nervöse Erschöpfung, Depressionen; Erregungszustände)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[bei Ödemen (Hirnödem bei SHT = Schädelhirntraumen; Thixotropie bei Commotio cerebri!)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen, Kopfschmerzen]
Arnica S [bei Entzündungen und Folgen von Traumen]
Hypericum [Neuralgien und depressive Zustände nach Traumen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Vena suis
Weitere Verfahren: Bettruhe

Cushing-Syndrom

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Genaue Abklärung erforderlich.

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]

Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung der Fermentfunktionen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Ovarium compositum (Amp.) [bei Frauen]
Placenta compositum (Amp.) [Regulierung der peripheren Durchblutung]
Testis compositum N Ampullen [bei Männern]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Stimulationseffekte auf Drüsen- und Bindegewebsfunktion]
Traumeel S (Tabl.,Tropf., Amp.) [biologisches Antiphlogistikum]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus [Anregung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Darmspasmen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Atropinum compositum [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Symptomenbezogene Therapie
Diarrheel S (Tabl.) [Antidiarrhoikum bei akuter und chronischer Diarrhoe sowie bei Gastroenteritis; Meteorismus]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Gastroenteritis mit Kollapszuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Magnesium phosphoricum [Entkrampfungsmittel]
Nux vomica S [akute und chronische Gastrointestinalbeschwerden, bes. auch nach Diätfehlern und Reizmittelabusus]
Veratrum S [Brechdurchfall; Kollapszustände, kalter Schweiss]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Coecum suis, Colon suis, Duodenum suis, Jejunum suis, Rectum suis
Begleittherapie
Ernährung: Substitution von Mineralien
Physikalische Therapie: Wärme
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie; ggf. Psychotherapie

Dekubitus

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörung]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Placenta compositum [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lokale Therapie:
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Traumeel S Ampullen (aufträufeln) [lokales Antiphlogistikum]
Echinacea compositum (forte) SN Ampullen (aufträufeln) [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen, Gefäßspasmen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen; bes. bei bakteriellen (Misch)Infektionen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, u.a. auch bei unklaren fieberhaften Infekten und Viruserkrankungen; Kachexie-Dekubitus]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [venöse Stase, variköses Ekzem; thrombophlebitische Zustände]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Eiterprozesse]
Lachesis S [bei septischen Prozessen; bläulich-dunkelrote Verfärbung]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel]
Rhus Tox S [verschiedene Hautaffektionen; Neigung zu Eiterungen]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum succinicum [schlecht heilende eiternde Wunden], Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus suis, Vena suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Ozontherapie (Saugglockenbegasung, Umspritzung), HOT

Demenz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Alzheimer
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Behandlungsmöglichkeiten hängen entscheidend vom Behandlungsbeginn ab. Während im Früh- und Intermediärstadium die Aussichten durchaus erfolgversprechend sind, bleiben im Spätstadium alle Bemühungen erfolglos.

Basistherapie
Orale Therapie:
Adjuvant allgemein entgiftende Maßnahmen:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]

Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Coenzyme compositum Ampullen
Ubichinon compositum Ampullen
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.)
[bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Carbo compositum (Amp.) [bei zerebralen Durchblutungsstörungen, auch nach Apoplexie]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.) [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.) [bei Erschöpfungszuständen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[zur Verbesserung der Konstitution bei Toxinbelastungen]
Molybdän compositum (Tabl.)
[zur Regulierung des Mineralgleichgewichts]
Nervoheel N (Tabl.)
[bei Erschöpfungszuständen mit nervösen Beschwerden]
Spigelon (Tabl., Tropf., Amp.)
[bei konstitutionellen Kopfschmerzen]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer aber auch psychischer Art]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen, Neurasthenie]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Kollapszuständen]
Vertigoheel (Tabl., Tropf., Amp.) [bei Schwindel]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]

Einzelmittel-Injeele:
China S [allgemeine Entkräftung]
Ginseng [Schwächezustände]
Graphites [altersbedingte Erkrankungen]
Kalium bromatum
[Minderung der Erregbarkeit des Gehirnes, Folgen des Schlaganfalls, Gedächtnisschwäche]
Kalium phosphoricum
[depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände nach Überanstrengung und schweren Krankheiten]
Lachesis S [Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände]
Natrium carbonicum forte N
[körperliche und geistige Schwäche, Verstimmungszustände]

Nosoden-Injeele:
Psorinum [Schwächezstände besonders nach schweren Krankheiten, Kopfschmerzen, Verstimmungszustände],
Tuberculinum [Schwächezustände, chronische Kopfschmerzen, nervöse Reizbarkeit]

Suis-Organpräparate-Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum frontalis suis, Cerebrum occipitalis suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Vena suis

Begleittherapie
Geistige und körperliche Aktivierung
Lebensstilumstellung und Ernährungslenkung bilden die Basistherapie. Dazu kommt eine ausreichende Vitaminversorgung speziell mit B-Vitaminen. Kombinationspräparate mit Mineralien und Spurenelementen sind zu bevorzugen.

Depressionen, exogene

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Psychische Alterationen, endogene Depressionen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Suizidgefahr!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]

Parenterale Therapie:
Ignatia-Homaccord
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische Beschwerden, Depression]

Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [zerebrales Regenerationsmittel; insbesondere bei postenzephalitischen und arteriosklerotischen bzw. Altersdepressionen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen (somatogene Depressionen)]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer aber auch psychischer Art]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum phosphoricum S
Neurasthenie, nervöse Erschöpfungszustände]
Aurum (colloidale)
[Angst, Melancholie; nächtliche Verschlimmerung]
Hypericum
[zerebralsklerotische und postkommotionelle Depressionen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenfrei
Weitere Verfahren: Störfeldsuche, Neuraltherapie, Lichttherapie, Autogenes Training, Psychotherapie

Dermatosen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Verschiedene Ursachen, Formen und Stadien abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]

Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]

Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben – nicht bei hochakuten allergischen Hautaffektionen!]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse, pustulöse, bullöse Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Dermatosen bei Leber-Galle-Affektionen incl. Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen, bei toxischen Exanthemen und bei Dermatitis; ferner bei Neurodermitis]
Injeel-Chol (Amp.)
[Dermatosen bei Leber-Galle-Affektionen wie Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden, Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden; allgemein bei chronischen Erkrankungen]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Ekzeme, Allergien]
Adeps suillus (forte S)
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [eitrige Prozesses]

Rhus Tox S [Entzündungen, Suppurationen]
Sulfur (forte) S
[bei allen mehr oder minder chronischen Hautveränderungen]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Medorrhinum, Psorinum, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin [Ekzeme, Allergien], Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Lymphdrainage, Waschungen, UVA
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Cubitalvene (im Wechsel)
Weitere Verfahren: Allergietest, Fokussuche, Symbioselenkung

Diabetes mellitus (Altersdiabetes)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Diabetes juvenilis (insulinpflichtig)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Steroiddiabetes ausschließen, Spätfolgen beachten! Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Syzygium compositum N (Tropf.)
[Altersdiabetes, Anregung der Drüsenfunktionen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Matrixtherapie, perineurales Odem bei Polyneuropathie]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Hirmstoffwechselstörungen, Demenz]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Dermatomykosen u.a.: diabetische Hautaffektionen!]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme bei Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen]
Momordica compositum N (Amp.)
[regulativer antihomotoxischer Effekt bei Störungen der Pankreasfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Natrium sulfuricum [Hepatopathie; Melancholie]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium lactis aerogenes, Mumps-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum [diabetische Durchblutungsstörungen]; Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Pankreas suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Dem Kohlenhydratstoffwechsel angepasst; WBE (1 WBE = Weißbroteinheit entspricht 10 g Zucker) und Äquivalenttabellen berücksichtigen!
Physikalische Therapie: Bewegungstherapie, Gewichtsreduktion bei Übergewicht
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, HOT, schulmedizinische Maßnahmen

Diarrhoe

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Crohn, Colitis ulcerosa bzw. mucosa, Gastro-Entero-Colitis, Karzinom, Nahrungsmittelallergie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Beachte ggf. Diarrhoe bei einer meldepflichtigen Infektionskrankheit (u.a. Dysenterie, Paratyphus, Typhus abdominalis)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Diarrheel S (Tabl.) [Diarrhoen, Gastroenteritis]
Veratrum-Homaccord (Tropf.) [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.) [Durchfälle bei Galle- und Leber-Affektionen (incl. Pfortaderstauung)]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gastroenteritis, Enterocolitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Diarrhoen bei chronischen Leber- und Pankreas-Affektionen bzw. bei akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern)]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[bei eitrigen bzw. entzündlichen Prozessen]
Momordica compositum N (Amp.)
[regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion: pankreatogene Diarrhoe]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Colitis ulcerosa!)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum phosphoricum S [Antidiarrhoikum, bes. bei schmerzlosen Durchfällen und Schwäche]
Aloe [bes. bei morgendlicher Diarrhoe und Stuhldrang bzw. bei Incontinentia ani]
Arsenicum album S [diffuse Diarrhoen, Abmagerung, Durst]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Diarrhoe mit Blut und Tenesmen]
Podophyllum [schmerzlose Durchfälle; spritzende Stühle („Hydrantenstuhl")]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis, Rectum suis, Ventriculus suis [Diarrhoe bei Achylia gastrica!]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Ggf. Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution. Nach Abklingen der Symptome allergen- und glutenfreie Ernährung

D

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot N (Tabl.) **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme], **Solidago compositum SN** (Amp.)
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (evtl. Darmbegasung), HOT

Distorsionen (Verstauchungen)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Fraktur, habituelle Distorsion/Luxation (Schlottergelenk)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung, Röntgendiagnostik!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [Lokal-Applikation!] [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N [Lokal-Applikation!] [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen mit Rötungen, Schwellungen]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Quetschungen, Hämatome]
Hamamelis [venöse Stauungen, Blutungsneigung]
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Initial Kälteanwendung; Reizstrom, Lymphdrainage, Krankengymnastik
Neuraltherapie: Quaddeltherapie
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie bei Morbus Sudeck; gemäß der Schwere Okklusivverband, Tape-Verbände, Zinkleim, Ruhigstellung

Divertikulitis / Divertikulose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Polypen, Neoplasma, Appendizitis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung; Alkoholverbot!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Veratrum-Homaccord [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Diarrheel S (Tabl.) [akute und chronische Diarrhoe, Gastroenteritis]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie zur Anregung zur Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Podophyllum compositum (Tropf., Amp.)
[Dickdarmkatarrhe, z.B. Colitis ulcerosa et mucosa]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Diarrhoe mit Erschöpfung und Abmagerung]
Bryonia S [Wechsel zwischen Diarrhoe und Obstipation]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Diarrhoe mit Blutungen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Diverticulose-Nosode, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Coecum suis, Colon suis, Duodenum suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Jejunum suis, Rectum suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Alkoholverbot, Flüssigkeitszufuhr, ballaststoff- bzw. schlackenreiche (aber nicht blähende) sowie generell fleischarme Kost, Stuhlregulation
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Physikalische Therapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Dysmenorrhoe

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Organische Ursachen: genitale Hypoplasie, Retroflexio uteri, Myome, Entzündungen, Endometriose;
  funktionelle Ursachen: hormonale und vegetative Störungen, Parametropathia spastica.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gynäcoheel N (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Hormeel SN (Tropf.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Parenterale Therapie:
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen, Akroparästhesien]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützeden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]

Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen nicht nur bei Dysmenorrhoe sondern auch bei Endometritis und bei Metritis/Parametritis sowie bei Menorrhagien]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung der peripheren Durchblutung sowie ferner – außer bei Dysmenorrhoe – auch bei Endometritis und bei vegetativer Dystonie]

Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [nervöse Verstimmungszustände],
Cimicifuga S [Krampfneigung],
Colocynthis S [Krämpfe mit stechenden Schmerzen],
Lilium tigrinum [genitale Senkungsbeschwerden],
Pulsatilla S [verspätete Menarche, verspätete Menses, Hypomenorrhoe],
Sepia [präklimakterische Dysmenorrhoe]

Nosoden-Injeele:
Trichomonaden-Fluor

Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis, Ovarium suis, Placenta suis, Salpinx uteri suis, Uterus suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie
Ernährungsumstellung bei Obstipation und Flatulenz

Physikalische Therapie: Wärme

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Neuraltherapie: Gynäkologischer Raum, Schilddrüse

Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Fokussuche, manuelle Therapie; z.B. bimanuelle Massage der weiblichen Beckenorgane nach Thure-Brandt bei Adhäsionen, Uterus-, Scheidenprolaps; Entspannungstherapie, Entspannungstechniken

Dyspepsie

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie

Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]

Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]

Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]

Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Gallenkoliken, Cholangitis, Cholezystitis (biliäre Dyspepsie); Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen, Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Diarrheel S (Tabl.)
[akute und chronische Diarrhoe, Gastroenteritis]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art, Leberschäden; meist verbunden mit Meteorismus und Appetitlosigkeit]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus sowie im Bereich der oberen und unteren Luftwege (Dyspepsie im Säuglingsalter bei Infekten derselben!) und der ableitenden Harnwege (Pyelitis-Dyspepsie im Säuglingsalter)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Schwächemittel bei Gastroenteritis; Verschlimmerung nach Nahrungsaufnahme]
Lycopodium S [reduzierte Verdauungsfunktion mit Meteorismus und Appetitlosigkeit]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Jejunum suis, Rectum suis, Ventriculus suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme], **Hepar compositum N** (Amp.) [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Diät

Ekzem

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ekzemformen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung; Mischinfektion? Mikrobielles Ekzem?

Basistherapie

Orale Therapie:
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]

Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]

Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [lichenifizierte Ekzeme]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [intertriginöse Ekzeme; Hyperhidrosis; Hyperkeratosen sowie ferner Perniones, Erythema exsudativum multiforme et nodosum]
Aesculus-Heel (Tropf.) [variköse Ekzeme]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [pustulöse und bullöse Ekzeme mit ödematösen Schwellungen (urtikarielle)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Karbunkel, Furunkel sowie entzündliche Ekzeme]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [chronische, trockene Ekzeme]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [variköse Ekzeme]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen; ferner bei toxischen Exanthemen, bei Dermatosen, bei Neurodermitis sowie bei Erythematodes]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[vesikulöse Ekzeme; Pruritus sowie bei Herpes zoster]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Entzündungen mit Brennschmerz an Geweben]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: pastös-lymphatische Pykniker]

Cistus canadensis [juckende, trockene, rissige Hautaffektionen]
Natrium muriaticum [chronische Hauterkrankungen u.a. auch Eczema flexuarum]
Rhus Tox S [brennende, juckende erysipeloide Ekzeme]
Sulfur (forte) S [Reaktions- und Umstimmungsmittel bei chronischen Ekzemen]
Viola tricolor [bes. bei impetiginösen Ekzemen und exsudativer Diathese]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Psorinum, Staphylococcus, Tuberculinum

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Tonsilla pharyngica suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (bes. bei chronischen und rezidivierenden Ekzemen)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Fleisch-, fett-, salz- und gewürzarme sowie allergenfreie Kost; ggf. „Suchkost“

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme],
Solidago compositum SN (Amp.) [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Ekzema ani

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig bei Diabetes mellitus, Proktitis und (inneren) Hämorrhoiden sowie bei Leberschäden! Mykosen ausschließen!

Basistherapie

Orale Therapie:
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Hämorrhoiden, entzündliche Hautveränderung im Analbereich, Fissuren]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]

Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen, variköses Ekzem, Hämorrhoiden]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt: Analekzem bei Proktitis, Diarrhoe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Analekzeme bei Durchfallstörungen, Diarrhoen, z.B. bei Gastroenteritis, ggf. verbunden mit Stuhl-Inkontinenz]

Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: pastös-lymphatische Pykniker]
Graphites [trockene Ekzeme und Rhagaden]
Thuja S [Analekzeme mit Rhagaden]

Nosoden-Injeele:
Tuberculinum, Trichomonaden-Fluor

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie: Sitzbäder, Analhygiene

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, ggf. Antimykotika

Emphysem (der Lungen)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Boeck, Morbus Hodgkin, Silikose, Mykosen, chronische Bronchitis, obstruktive Lungenventilationsstörungen, Tumor; physiologisch im Alter („Altersemphysem“)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Hauptsymptome: Atemnot, herabgesetzte Vitalkapazität. Chronische Bronchitis als häufigste Ursache. Adjuvante Therapie!

Basistherapie

Orale Therapie:
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]

Parenterale Therapie:
Cor compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]
Ignatia-Homaccord [psychosomatische Beschwerden, Depression]

Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen, Herzrhythmusstörungen, bes. bei Hypotonie]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [Bronchitis, besonders chronische Raucherkatarrhe]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Crataegus-Heel S (Tropf.) [Koronardurchblutungsstörungen; infektiös-toxische sowie altersbedingte Myokardschwäche (Cor pulmonale)]
Droperteel (Tabl.) [bei Stauungskatarrhen]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.) [asthmatoide Bronchitis]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der Leberzellfunktionen; auch bei Hypercholesterinämie]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Bereich der oberen und unteren Luftwege (chronische Bronchitis als häufige Ursache eines Lungenemphysems!)]
Solidago compositum SN (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.) [bei spastischem Emphysem]
Tonsilla compositum N Ampullen [Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Ignatia S [Atemnot, Lufthunger, „Seufzer-Atmen“; depressive Verstimmung]
Sticta [Bronchitis (chronica) mit Reizhusten, bes. im Alter]

Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Pertussis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum DL-malicum [Myokardschwäche], Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Cor suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Abklopfung, Atemgymnastik, intensives Training
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Mukolytika

Endarteriitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Atherosklerose, Kollagenosen, Riesenzell-Arteriitis, Takayasu-Arteriitis (beim Aortenbogen-Syndrom)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist bei Männern im mittleren Lebensalter (20-40 J.) mit Nikotinabusus!
  Fokussuche!

Basistherapie
Orale Therapie:
Arteria-Heel N (Tropf.)
[periphere Durchblutungsstörungen (ggf. mit Akroparästhesien und Kältegefühl), angiospastische Zustände]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.) [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen
[vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen, Hypotonie; Herzrhythmusstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.)
[außer bei Endarteriitis obliterans auch angezeigt bei Myokardschwäche, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Hypertonie sowie bei Neigung zum Emphysem und Lungenödem]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, Folgen von Herzmuskelschädigungen, Altersherz, infektiös-toxische Myokardschwäche]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Cantharis [brennende Schmerzen]
Causticum S [brennende Schmerzen]
Lachesis S [bei Kapillarschädigungen und Thrombosen]
Secale cornutum [Parästhesien; trophische Störungen]
Tabacum
[angiospastische Zustände; Kältegefühl, Gangrän-Tendenz; Parästhesien]
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum citricum [kalte aber auch brennende Füße, Parästhesien],
Acidum DL-malicum [kalte Hände und Füße mit livider Färbung],
Acidum succinicum [bläuliche Hände und Beine; „bleierne Müdigkeit"],
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis, Vena suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Je nach Stadium Kälte oder Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Darmsanierung; Nikotinverbot; Vermeidung von Nässe und Kälte; reizlose Diät

Endometritis / Endometriose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chronische Adnexitis,
  Uterus myomatosus,
  Uteruskarzinom, Endometriosis uteri interna, Polyposis,
  Endometritis senilis (Östrogenmangel!),
  Status post abortum bzw. post partum (Streptokokken, Staphylokokken!)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gynäcoheel N (Tropf.) [Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus, Rhinitis, Sinusitis]
Parenterale Therapie:
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Ovarium compositum [Dysmenorrhoe, entzündliche und degenerative Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen, Blutungsneigung]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch im gynäkologischen Bereich, z.B. bei Adnexitis und Kolpitis sowie Metritis/Parametritis]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. bei Dysmenorrhoe und bei Endometritis]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Uteruskongestionen]
Crotalus [Blutungsneigung, bes. aus Körperöffnungen]
Hydrastis [Uterusblutungen]
Kreosotum [Blutungsneigung; Hypermenorrhoe; chronische Entzündungen; ätzender/übelriechender Fluor]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Trichomonaden-Fluor

Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon [hormonelle Dysfunktionen; Pruritus vulvae/vaginalis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Salpinx uteri suis, Uterus suis
Begleittherapie
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Raum
Weitere Verfahren: Akupunktur

Enuresis nocturna

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Zystitis, Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!
  Organbefunde (u.a. Spina bifida) ausschließen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Plantago-Homaccord (Tropf.)
[Reizblase, Bettnässen, Inkontinenz]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Populus compositum SR (Tropf.)
[bei Albuminurie sowie bei Reizzuständen im Harnwegesystem, auch bei Zystitis/Zystopyelitis sowie als Nebenmittel bei Bakteriurie (Enuresis bei Harnwegsinfektionen) und insbesondere auch bei Miktionsstörungen (1. Stadium des Prostata-Adenoms]
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reizblase sowie 1. Stadium des Prostata-Adenoms]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Incontinentia urinae (et ani)]
Causticum S
[Incontinentia urinae (et ani) mit Harndrang beim Husten]
Kreosotum [Harndrang und Enuresis nocturna (bes. in der 1.Nachthälfte)]
Ruta [Reizblase],
Tabacum [Harnträufeln, Blasenkrämpfe]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum suis, Hypothalamus suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: 4-6 Quaddeln über Kreuzsteißbeingegend
Weitere Verfahren: Akupunktur; ggf. Psychotherapie

Epicondylitis

(humeri radialis = „Tennis-Arm“ bzw. humeri ulnaris = „Golfer-Arm“ bzw. „Werfer-Ellenbogen“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tendopathie (Insertionstendopathie), Trauma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fokussuche; Rö-Kontrolle (HWS) angezeigt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Bryaconeel (Tabl.) [akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S (lokale Applikation) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bes. bei HWS-Osteochondrose]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schulter-Arm-Syndrom]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Discus compositum N (Tropf.) [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat: außer bei Epicondylitis, u.a. auch bei Tendovaginitis, Bursitis, Periarthritis humeroscapularis sowie bei Styloiditis]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hekla Lava [Exostosen, knöcherne Spornbildungen]
Spiraea ulmaria (forte S) [Epicondylitis, Muskelrheumatismus; Verschlimmerung durch Bewegung/Überanstrengung und Nässe]
Staphisagria [Adynamie der Muskeln; Neigung zu Keloiden]
Symphytum [Hämatome, Periostitis]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon [Knochen-, Periost- und Knorpelschmerzen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Os suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Je nach Stadium Kälte (hochentzündliche Reizzustände) bzw. Wärmeanwendungen, Massagen, Krankengymnastik
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: HWS-Quaddeln
Weitere Verfahren: Akupunktur, ggf. Störfeldersuche, manuelle Therapie, Epicondylitisbandage, Tape-Verband, Okklusivverband; ggf. Operation nach Hohmann.

Epididymitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gonorrhoe, Tbc, Lues, Hodentorsion, posttraumatisch
  Besondere Hinweise:
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]

E

Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (antiphlogistische Wirkung)
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr – auch bei fieberhaften Infekten]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Testis compositum N Ampullen [Impotentia virilis, Ejaculatio praecox]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen, Blasentenesmen]
Spongia [Epididymitis (und Orchitis) mit Lymphdrüsenschwellung]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Epididymis suis, Funiculus umbilicalis suis, Testis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Je nach klinischem Bild lokale Kälte- oder Wärmeanwendung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Direkte Schmerzblockade in Nebenhoden
Weitere Verfahren:
Ozontherapie mit Eigenblut, Sauerstofftherapie, Suspensorium mit Traumeel S Salben-Verband

Epileptiforme Zustände

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Neben einer genauen Abklärung ist es oft erforderlich, dass eine zusätzliche schulmedizinische Therapie angewandt wird.

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Schwef-Heel (Tabl.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Leber-erkrankungen]
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Hepeel [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [versuchsweise als Zwischenmittel]
Coenzyme compositum Ampullen [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Hepar compositum N (Amp.) [Leberentgiftung]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [zerebrale Fehlfunktionen, Kopfschmerzen]
Belladonna S [zerebrale Reizzustände mit Krämpfen und Delirien]
Cuprum [Krämpfe der Muskulatur, epileptiforme Zustände]
Phosphorus S [furchtsame Schwäche, Angstzustände]
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cerebrum suis, Corpus pineale suis, Hepar suis, Hypothalamus suis
Begleittherapie
Schulmedizinische Therapie!
Mikrobiologische Therapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Epistaxis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Polyposis, Grippe und andere Infektionskrankheiten, Neoplasma, Trauma, Morbus Osler, Eisenmangel, Leukämie, Leberzirrhose, Urämie, Arteriosklerose, Hypertonie, Thrombozytopenie; ferner habituell (bes. bei Kindern) und intra menses (ggf. als „vikariierendes Nasenbluten“).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Behandlung

Basistherapie
Orale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.) [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Phosphor-Homaccord (Tropf.) [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [venöse Stase, ggf. mit Blutungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Bereich der oberen und unteren Luftwege (Epistaxis bei Rhinitis sicca)]
Einzelmittel-Injeele:
Crotalus [Blutungen, bes. aus Körperöffnungen]
Lachesis S [Kapillarschädigungen, düsterrote Schwellungen]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Bindegewebsschwäche und exsudativer Diathese bzw. Lymphatismus]
Vipera berus [Blutungsneigung und Blutungen, bes. aus Körperöffnungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Mucosa nasalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Kälte (über Stirn-Nacken-Region)
Weitere Verfahren:
Akupressur (Kleinfinger, d.h. Gummiring um Endglied des gleichseitigen Kleinfingers), Tamponade, Verödung

Erbrechen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Vomitus matutinus ist sehr häufig bei chronischer Pharyngitis, bei Ösophagitis und bei chronischer Gastritis – besonders bei „Säufer-Gastritis“ –, bei Pylorospasmus sowie bei Hyperemesis gravidarum.

Basistherapie
Orale Therapie:
Vomitusheel (Tropf.) [Erbrechen und Brechreiz]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Atropinum compositum [Krämpfe und Koliken]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.) [Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom (Singultus, Übelkeit und Emesis (Erbrechen) gehören zu den postprandialen Frühsymptomen beim Dumping!); Vomitus (matutinus)]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.) [Oberbauchsyndrom; Pankreopathie]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.) [Gallenkoliken; Cholangitis; Cholezystitis, Vomitus biliosus); Stauungsikterus; Leberschädigungen (Parenchymschäden); Hepatitis acuta und chronica; als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gastricumeel (Tabl.) [Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen, Meteorismus]

Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern). Meteorismus; Pfortaderstauung]
Momordica compositum N (Amp.) [Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden; regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Gastroenteritis mit unstillbarem Erbrechen und Erschöpfung]
Colchicum (forte S)
[Magenschmerzen mit Erbrechen von Galle (Vomitus biliosus) und Schleim; das Erbrechen wird bereits durch den Geruch oder Anblick von Speisen ausgelöst]
Ipecacuanha [Brechreiz und Erbrechen verschiedener Ursachen; typisch: Erbrechen erleichtert nicht!]
Nux vomica S [Brechreiz bei Reizmittelabusus; insbes. bei Alkoholabusus („Säufer-Gastritis“ mit Vomitus matutinus)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cardia ventriculi suis, Colon suis, Hepar suis, Oesophagus suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergen- und reizstoffarme Ernährung
Physikalische Therapie: Feuchte Wärme
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung;
psychische Führung bei psychogenem Vomitus hystericus

Erkältungsneigung

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[allgemein zur Anregung des Abwehrsystems]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp., Nasentropfen)
[entzündungshemmende Wirkung]
Hepar compositum N (Amp.) [Leberfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Aufbesserung der Schleimfunktionen]
Naso-Heel SN (Tropf.)
[bei ersten Erscheinungen des Schnupfens]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Besserung der Nierenfunktion]
Tonsilla compositum N Ampullen
[kräftige Anregung des lymphatischen Apparates]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[entzündungshemmende Wirkung]
Einzelmittel-Injeele:
Cistus canadensis [jede Erkältung schlägt auf den Hals]
Kalium carbonicum (forte N) [eine Erkältung folgt der anderen]
Lycopodium S [Venöse Stase, Hepatopathie, Anregung der Leberentgiftung]
Thuja S [empfindlich gegen Kälte und Feuchtigkeit]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Psorinum
Suis-Organpräparate-Injeele:
Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Erschöpfungszustände

- **BESONDERE HINWEISE:**
Abklärung der Ursache: somatisch, z.B. verzögerte Rekonvaleszenz, Neoplasma; ferner bei Neurasthenie, Psychasthenie.

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.) [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Aletris-Heel (Tabl.) [Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Parenterale Therapie:
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Regenerationsmittel, nervöse Erschöpfung; Depressionen, Gedächtnisschwäche, Arteriosklerose, „Altersmittel“]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme, auch bei Neoplasien]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Leber-Krankheiten; Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht, u.a. auch bei Dysmenorrhoe, Menorrhagien und im Klimakterium]
Procainum compositum (Amp.) [Revitalisierungsmittel bei zellulären Phasen jeder Art, Präkanzerose]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht – u.a. bei Impotentia virilis und im Klimakterium virile]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Phosphorus S [Erschöpfung nach Infektionskrankheiten]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum suis, Colon suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Massagen, Bäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Störfelder
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, HOT, Fokussuche

E

Erysipel

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Akute Dermatitis, Erysipeloid (Schweinerotlauf)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Antibiotikatherapie! Sehr große Rezidiv-Neigung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S (Tabl., Tropf.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen, pustulöse und bullöse Ekzeme: Erysipelas bullosum]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen und Ulcus cruris]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei allen entzündlichen Hautreaktionen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen (Erysipelas phlegmonosum)]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. bei Elephantiasis sowie bei Diabetes mellitus, Dekubitus, Ulcus cruris gangraenosum]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [akute Infektionen mit hohem Fieber]
Belladonna S [Rubor, Calor, Dolor, Tumor]
Cantharis [brennende Schmerzen, hämorrhagische Entzündungen]
Lachesis S [Erysipel, septische Prozesse; bläulichrote Verfärbung (typisch bei Erysipeloid!), ödematöse Schwellungen]
Rhus Tox S [Erysipel mit flammender Röte]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Exantheme

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen), Umstimmungsmittel]
Hepar compositum N (Amp.) [Entgiftung der Leber]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Entgiftung der Leber]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Nosodenpräparat bei Therapieschäden]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Kanalisation bei Therapieschäden]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[Fermentregeneration bei Therapieschäden]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Homöopathisierte Allopathika-Injeele:
sind je nach der vorliegenden Therapieschädigung als Isopathika, besser jedoch im Sinne des Simile-Prinzips (Ähnlichkeits-Prinzip) einzusetzen
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Fazialisparese

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE**
  zwischen zentraler (u.a. vaskuläre Hirnprozesse incl. Apoplexie, Neoplasma) und peripherer (Stirnrunzeln nicht möglich!) Fazialisparese stets erforderlich!
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte sowie generell bei Erkältungen: nässe- und kältebedingte periphere Fazialisparese entzündlicher Genese!]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Regenerationsmittel bei Hirnaffektionen: vaskuläre ischämische Hirnprozesse bei zentraler Fazialisparese!]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen, gestörten Drüsenfunktionen, bei degenerativen Erkrankungen (zellulären Phasen)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Gelsemium S [Paresen der Hirnnerven sowie peripherer Nerven]
Hypericum [Zerebralsklerose, Neuralgien]
Lachesis S [Paresen nach Infektionen]
Plumbum metallicum [Zerebralsklerose, Neuritiden]
Silicea [Konstitutionsmittel, u.a. Neigung zu Erkältungen]
Zincum metallicum [Paresen und Lidptosis]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Baryum oxalsuccinicum [zerebrale Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen],
Glyoxal compositum [degenerative Erkrankungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum totalis suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Reizstrom, Krankengymnastik
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Ganglion stellatum, Ganglion sphenopalatinum, Mandelpol
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie mit kleiner Eigenblutbehandlung

Fersensporn (Hackensporn, Kalkaneussporn)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Unterer bzw. oberer/hinterer (= Haglund-Exostose/Ferse) Fersensporn
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung (Röntgen)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.)
[Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen, Verletzungsfolgen)
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.)
[bei Neigung zu Fisteleiterungen und entzündlichen Prozessen]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[erweichend auf Narbengewebe und Keloide – Langzeittherapie!]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Trauma- und Überlastungsmittel]
Asa foetida [Knochenschmerzen, Periostitis]
Graphites
[Übergewicht (Adipositas) – (oft Ursache für untere Fersensporne!)]
Guajacum [schmerzende Gelenke und Sehnen: Insertionstenopathie bei Haglund-Exostose/Ferse!]
Hekla Lava [generelles Exostosemittel]
Mezereum (forte S) [Kälte-Empfindlichkeit]
Natrium sulfuricum [Nasswetterverschlimmerung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla ossis suis, Os suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Quaddel im Segment
Weitere Verfahren: Akupunktur; orthopädische Schuhe bzw. Maßeinlagen; Softpoint-Fersenkissen; ggf. Gewichtsreduktion, durchblutungsfördernde Maßnahmen

Fertilitätsstörungen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sterilität
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Ovarium compositum (beim weiblichen Geschlecht)
Testis compositum N Ampullen (beim männlichen Geschlecht)
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme; generell zur Revitalisierung]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[lymphatische Konstitution]
Ypsiloheel N (Tabl.)
[vegetative Dystonie]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [Sexualschwäche; psychische Depressionen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Trichomonaden-Fluor
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum DL-malicum [Erschöpfungszustände, Frigidität],
Acidum succinicum [Erschöpfungszuständen, bleierne Müdigkeit; Frigidität],
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis (weibl.), **Ductus deferens suis** (männl.), **Hypophysis suis, Ovarium suis** (weibl.), **Prostata suis** (männl.), **Salpinx uteri suis** (weibl.), **Testis suis** (männl.), **Uterus suis** (weibl.)
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang, Prostata (beim Mann)

Fibromyalgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Leitsymptome sind vor allem lokale Verspannungsschmerzen sowie schmerzhafte Myogelosen und umschriebene schmerzhafte Verhärtungen der Muskulatur ohne klinische und serologische Entzündungszeichen. Zwei verschiedene Gewebestrukturen sind betroffen, zum einen der parenchymatische Verband der Muskelzellen und Skelettmuskulatur, zum anderen die kollagenen Fasern und Fibroblasten des Bindegewebes im Bereich von Sehnen und Knorpel.

Basistherapie
Orale Therapie:
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Traumeel S (Tabl., Tropf.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomoysot N
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Hinweis: Die Zumischung eines handelsüblichen Lokalanästhetikums ist möglich.
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[allgemeine Erschöpfung und depressive Stimmungslage]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei vertebragenen Neuralgien und neuralen Störfeldern]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[bei peripheren Durchblutungsstörungen, Akroparästhesien]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien, besonders Ischias]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[bei Verschlechterung durch nasses und kaltes Wetter]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom und Epicondylitis]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei bindegewebigen Verhärtungen]
Lithiumeel comp. (Tabl.)
[bei Gicht und rheumatischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.) [zur Therapie auch der Schleimhäute von Gelenken und Sehnen]
Neuro-Injeel (Amp.) [bei psychosomatischen Beschwerden]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Bellis perennis
Bryonia S [stechende Schmerzen bei Bewegung]
Caulophyllum thalictroides [kleine Gelenke, schwere ziehende wandernde Schmerzen und Steifigkeit]
Dulcamara [Nass- und Kaltwetterverschlimmerung]
Formica rufa
[wandernde Schmerzen, schlimmer bei feuchter Kälte]
Ginseng [rheumatische Beschwerden mit neuralgischen Schmerzen und großer Steifigkeit]
Gnaphalium polycephalum [Steifigkeit mit Gefühl als fehle die Gelenkschmiere]
Kalmia S [rasch wandernde lanzierende Schmerzen]
Petroleum
[schmerzhafte Steifigkeit, Schwäche, knackende Gelenke]
Ranunculus bulbosus
[Beschwerden insbesondere im Brustkorbbereich]
Rhododendron [Beschwerden bei Wetterwechsel]
Ruta [Wirbelsäulenbeschwerden, Zerschlagenheitsgefühl am ganzen Körper]
Sabina [Unverträglichkeit von Wärme]
Sepia [lahm und steif, Spannung wie zu kurz]
Spiraea ulmaria [umherziehende Schmerzen]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Sinusitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Musculus suis
Begleittherapie
Allgemeine Ausleitungs- und Entgiftungstherapie:
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden] oder **Hepar compositum N** (Amp.) [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen] oder
Solidago compositum SN (Amp.)
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Katalysatorenpräparate:
Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen und Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin-B-Komplex, Vitamin E und Magnesium
Physikalische Therapie
Sonstige Verfahren: Neuraltherapie, Akupunktur, manuelle Medizin, Psychotherapie

Fieber

- **BESONDERE HINWEISE:**
Insbesondere bei rezidivierenden Fieberschüben (= Symptom) stets Ursache – also die Krankheit – abklären! Unterstützende Maßnahmen!
Fieber ist primär nicht als schlecht anzusehen, es ist ein Symptom, welches anzeigt, dass das Immunsystem arbeitet.

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl.) [grippale Infekte]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte; hierbei besonders beginnende Fieberzustände, Schüttelfröste]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Fieber mit zerebralen Reizzuständen]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen sowie besonders Fieber mit Rötungen und Schweißausbrüchen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Fieber mit Schwächezuständen und Erschöpfung]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. Neigung zur Infektanfälligkeit), Fieber bei „Drüsen-Kindern"]
Tonsilla compositum N Ampullen [Steigerung der körpereigenen Abwehr besonders bei exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [trockenes Fieber mit Schüttelfrost; beginnende Fieberzustände]
Belladonna S [Fieber mit heißem Schweiß]
Eupatorium perfoliatum [periodisches Fieber; Zerschlangenheitsgefühl, Muskel- und Knochenschmerzen]
Ferrum phosphoricum [Fieberzustände mit Erschöpfungszuständen und geringer Abwehrkraft]
Gelsemium S
[Fieber ohne Durst, Schüttelfröste, Zerschlagenheitsgefühl]
Lachesis S [septisches Fieber mit Delirien]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Entfieberungsbäder, Einläufe

Fissura ani

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache [u.a. verhärteter Stuhl, proktogene Obstipation, Thrombophlebitis im Analkanal, Hämorrhoiden, Homosexualität] abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Hämorrhoiden, entzündliche Hautveränderung im Analbereich, Fissuren]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]

F

Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Viburcol N (Supp.) [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Spascupreel S (Supp.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Hautaffektionen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Entzündung und Einrisse an Körperöffnungen mit „Splitter-Schmerz“ und Geschwürsbildung]
Graphites [rissige Haut, Ekzem, Chronizität; Adipositas]
Natrium muriaticum [Rhagaden – Nase, Mund, After]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; proktogene Obstipation, harter Stuhl]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Tuberculinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Rectum suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ballaststoffreiche Kost
Physikalische Therapie: Sitzbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Stuhlregulierung

Fisteln

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Cave: Fistelkarzinom!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen, besonders eiternde Unterschenkelfisteln aber auch fistelnde Otitis media, Ulcus cruris]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Fisteleiterungen und bei Osteomyelitis (chronische Eiterungen aus Fistelgängen!)]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[generell bei Eiterungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen]
Paeonia comp.-Heel (Tabl.)
[Fissura ani und Hämorrhoiden]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S [Fisteln mit Knocheneiterung sowie Zahnfisteln]
Argentum nitricum [innere Fisteln; Gewebedestruktion]
Silicea [Konstitutionsmittel; bes. auch bei chronischen Eiterungen]
Nosoden-Injeele:
Mastoiditis-Nosode, Osteomyelitis-Nosode, Tuberculinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ballaststoffreiche Kost, Darmsanierung bei Fisteln im Darmkanal (z.B. beim Morbus Crohn)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: **Lymphomyosot N** lokal in den Fistelgang
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (Fistelbegasung), Symbioselenkung, Umspritzung, chirurgische Intervention, physikalische Therapie

Fluor albus

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gonorrhoe, Lues, Mykosis (Soor), Trichomoniasis, Chlamydien, Polyposis, Tbc, Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache fachärztlich abklären;
  Partnerbehandlung („Ping-Pong-Infektion“).

Basistherapie
Orale Therapie:
Lamioflur (Tropf.)
[Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus, Rhinitis, Sinusitis]
Gynäcoheel N (Tropf.) [Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen: außer bei Fluor (albus), u.a. auch bei Adnexitis und Kolpitis]
Ovarium compositum (Amp.)
[Regulation des Inkretoriums bei ovarieller Dysfunktion; z.B. bei Fluor albus infolge Östrogenmangels (Klimakterium) und Kraurosis vulvae]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Carbo vegetabilis [Fluor albus bei Erschöpfungszuständen]
Caulophyllum thalictroides [Fluor albus bei Dysmenorrhoe]
Kreosotum [Fluor, Pruritus vulvae]
Pulsatilla S [Fluor albus (mit Depression), bes. bei verspäteter Menstruation]
Sepia [wundmachender Fluor, bes. im (Prä)Klimakterium]
Nosoden-Injeele:
Fluor albus-Nosode, Trichomonaden-Fluor
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Sitzbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Frankenhäuser-Plexus, Schilddrüse, Plexus sacralis
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Darmsanierung; ggf. Psychotherapie (bei Fluor albus als psycho-reaktiv/vegetativem Symptom)

Foetor ex ore

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache – auch zahnärztlich! – abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Gastricumeel (Tabl.) [bei Gastritis acuta et chronica]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (Foetor hepaticus)]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida
[häufiges meteoristisches Aufstoßen bzw. Singultus]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Foetor ex ore bei Munderkrankungen (Gingivitis, Aphthen, Parulis, Stomatitis, Pulpitis, Peridontitis) mit Ptyalismus]
Nosoden-Injeele:
Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Pulpa dentis suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Mundspülungen
Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Mandelpol, Nebenhöhle
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie (ozonisiertes Wasser), Symbioselenkung, Zahnsanierung

Fokaltoxikosen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache eruieren!
  Allgemeine Hinweise: An einem devitalen Zahn sprossen mit dem sich bildenden Granulom vegetative Gefäßnerven, die mit dem zur Devitalisierung verwandten Homotoxin (Arsen und andere) in Berührung kommen, welcher Vorgang einem Imprägnationseffekt entspricht.
  Bei Narben haben die daraus resultierenden Durchblutungsstörungen ebenfalls imprägnative Auswirkungen im Gefolge.
  Die daraus sich ergebenden Störungen entsprechen der Fokaltoxikose (neuralpathologischen Reflexen im Sinne von Reilly, Speransky, Ricker).
  Die Entfernung eines solchen Herdes ist indiziert, z.B. Zahnextraktion.
  Da die Tonsillen infolge vielfacher retoxischer Behandlung von Anginen ebenfalls derartige Imprägnationsherde aufweisen können, kann die Exstirpation ebenfalls indiziert sein.
  Hier sind aber auch Möglichkeiten der Provokation von regressiven Vikariationen (Angina) gegeben, mittels derer derartige Imprägnationsphasen in der Tonsille zur Auflösung gebracht und ausgeheilt werden können.
  Diese regressiven Vikariationen sollte man in jedem Falle erzielen bzw. über eine solche abzuheilen versuchen mittels folgender Präparate:

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Angio-Injeel (Amp.)
[pektanginöse Beschwerden]
Barijodeel (Tabl.)
[Lymphatismus, u.a. auch chronische hyperplastische Anginen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien mit stechenden Schmerzen und Parästhesien]
Cralonin (Amp.)
[infektiös-toxische Myokardschwäche, nervöse Herzstörungen, Herzstiche und Herzschmerzen sonstiger Art (pektanginöse Beschwerden]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch bei Viruserkrankungen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Migräne (Migraine cervicale) und Zervikalsyndrom sowie Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, u.a. auch im (peri-)tonsillären Gewebe, z.B. bei Anginen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Weichteilrheumatismus; Neuralgien, arthritische und Bandscheibenbeschwerden]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Interkostalneuralgien; pleuritische Schmerzen; ferner Herpes zoster]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Weichteilrheumatismus und Neuralgien sowie (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel]
Hypericum [Neuralgien und krampfartige Schmerzen]
Kalmia S
[fokaltoxische Infektarthritis, fokaltoxischer Muskelrheumatismus, fokaltoxische Herzaffektionen (Endo-, Myo-, Perikarditis)]
Lachesis S
[bei septischen Prozessen sowie bei Angina tonsillaris]
Phytolacca S
[fokaltoxischer Muskel- und Gelenkrheumatismus; Tonsillitis]
Staphisagria
[bei rezidivierenden und schleichenden chronischen Infektionen sowie bei Zahnkaries und Parodontose]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions- und Reaktions- bzw. Umstimmungsmittel]
Thuja S
[bei allen fokalbedingten mehr oder weniger chronischen Krankheiten]
Nosoden-Injeele:(Einsatz gemäß des Fokus)
Übersicht über „Fokalherd-Nosoden“:
Appendicitis-Nosode, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode, Sinusitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
[Endocarditis lenta],
Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode; ggf. Mastoiditis-Nosode, Osteomyelitis-Nosode, Otitis media-Nosode,
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Tonsilla suis

F

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost.
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Darmsanierung, Symbioselenkung, physikalische Therapie, Lymphdrainagen

Frostbeulen (Perniones)

Basistherapie
Orale Therapie:
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme, pustulöse und bullöse Ekzeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Haut- und Uterhautaffektionen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Abrotanum [Teleangiektasien; juckende Frostbeulen]
Acidum nitricum [Hautschäden mit Geschwürsbildung; „Splitterschmerz“]
Pulsatilla S [reißende Schmerzen in den Füßen; Neigung zu kalten sowie Folgen von durchnässten Füßen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen

Furunkulose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Metastasierende Abszesse in verschiedenen Organen, Morbus Hodgkin.
- **BESONDERE HINWEISE:**
Erhöhte Disposition bei verschiedenen Krankheiten (meist staphylogen), z.B. Diabetes mellitus, Gicht, chronische Infektionskrankheiten, körperliche Abwehrschwäche, Immundefekte (AIDS).

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, z.B. Furunkeln sowie ferner u.a. bei Karbunkeln, Abszessen, Phlegmonen und Fokaltoxikosen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Karbunkel, Furunkel und zwar bes. bei beginnenden Furunkeln]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen; allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen; ggf. mit Blasenbildung]
Belladonna S [Rubor, Calor, Dolor, Tumor]
Hepar sulfuris [Eiterprozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S
[bei septischen Prozessen mit bläulichroten Schwellungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Furunkulose im akuten und chronischen Stadium]
Myristica sebifera [Furunkel, Abszesse; „homöopathisches Messer“: beschleunigte Einschmelzung]
Silicea [Konstitutionsmittel; dünnflüssig-wässriger Eiter sowie zur Beendigung der Eiterung]
Staphisagria [Pyodermie und Furunkulose]
Nosoden-Injeele: **Staphylococcus**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Waschungen, UVA
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Umspritzung der Mandelpole
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (kleine Eigenblutbehandlung), Symbioselenkung, Stuhlregulierung

Fußschweiß

Basistherapie
Orale Therapie:
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Leber-erkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Hautaffektionen, u.a. auch bei Mikrosporie, Interdigital- und sonstigen Dermatomykosen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.)
[zur Anregung der Abwehrmechanismen bei Dermatosen, besonders bei Pyodermien und juckenden Hautaffektionen]

F

Solidago compositum SN (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung bei Fehlfunktionen derselben wie Fußschweiß und genereller Hyperhidrosis sowie bei Ekzemen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen, Pruritus: Entgiftungsmittel mit erweitertem Schwefeleffekt]
Einzelmittel-Injeele:
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; kalte sowie übelriechende Schweiße]
Sulfur (forte) S [Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon [starke Überempfindlichkeit gegenüber Wasser und Seife; Neigung zur Schrunden- und Rhagadenbildung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis, Ren suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Eichenrindenbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur (Nierenpunkte), Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Gangrän

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Trockene/feuchte Gangrän
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig bei Diabetes mellitus;
  adjuvante Therapie, evtl. chirurgische Intervention,
  Keimstatus (Anaerobier und Fäulnisbakterien bei feuchter Gangrän = „heißer Brand“;
  Clostridium perfringens bei Gasgangrän [= Gasbrand]).

Basistherapie
Orale Therapie:
Arteria-Heel N (Tropf.) [arterielle periphere Durchblutungsstörungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Ulcus cruris, Fisteleiterungen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. bei Raucherbeinen, Arteriosklerose, Endarteriitis obliterans, Ulcera cruris gangraenosa, Diabetes mellitus]
Syzygium compositum N (Tropf.) [bei diabetischer Gangrän]
Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [septisches Fieber; feuchte übelriechende Gangrän („heißer Brand“)]
Kreosotum [(diabetische) Gangrän mit Brennschmerz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen; düsterrote Entzündungen]
Secale cornutum [trockene Formen der arteriosklerotischen Gangrän (= „kalter Brand“ bzw. Mumifikation) sowie bei Morbus Raynaud]
Stramonium [Gangrän mit Schmerzen und Unruhe]
Vipera berus [thrombophlebitische Gangrän]
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum [diabetische Durchblutungsstörungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Placenta suis, Sympathicus suis, Vena suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Bäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (Beutelbegasung), Unterspritzung, Gewebeaktivierung

Gastritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Malignomausschluss, Ulcus ventriculi, pylori et duodeni
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ausschluss einer „Medikamenten-Gastritis“ (u.a. durch Salizylate, Phenylbutazon, Kortikosteriode, Zytostatika).
  Röntgen- Gastroskopie-Kontrollen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität sowie bei gleichzeitig vorliegender Duodenitis mit und ohne Ulkus]
Erigotheel (Amp.) [Hyperazidität und Supermobilität des Magens sowie bei Ulcus duodeni et ventriculi]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [akute Gastritis; Völlegefühl, Erbrechen (= Vomitus), Appetitlosigkeit, Widerwillen gegen alle Speisen; Verdrießlichkeit]
Argentum nitricum [nervöse Gastritis (ohne und mit Ulcus ventriculi); abgemagerte, gealterte Patienten (Facies gastrica)]
Bismutum subnitiricum
[Gastroduodenitis; Verschlimmerung nach/durch Essen]
Pulsatilla S [Gastritis mit Völlegefühl und Brechreiz sowie schlechtem pappigem Geschmack]
Nosoden-Injeele: **Gastritis-Nosode**
Intermediäre Katalysatoren: **Histamin** [Magen-(Darm-)Spasmen, bes. bei allergischer Gastritis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis [nasale Reflex-Gastritis],
Ventriculus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Kohlenhydratreduktion, Magenschonkost; cave Alkoholabusus! Nikotinverbot!
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Wärmeanwendung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Plexus solaris, oberer Grenzstrang, Ganglion coeliacum
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, Autogenes Training

Gastroenteritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Alkoholabusus, Infektion, Dyspepsie, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa/mucosa, Allergie, Malassimilations-Syndrom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Keimprofil!

Basistherapie
Orale Therapie:
Diarrheel S (Tabl.) [Diarrhoen, Gastroenteritis]
Veratrum-Homaccord (Tropf.) [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Veratrum-Homaccord [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Duodenoheel (Tabl.)
[Duodenitis, Ulcus duodeni (Hyperazidität) sowie ferner Dyspepsie]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gastroenteritis sowie Enterocolitis]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen, Meteorismus]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Verdauungstrakt]
Podophyllum compositum (Tropf., Amp.)
[Katarrhe der Dickdarms, z.B. Colitis mucosa et ulcerosa]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Morgen-Diarrhoe, ggf. mit Stuhlinkontinenz]
Arsenicum album S [Brechdurchfall, Erschöpfung]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[schwere Durchfälle mit Blut und Tenesmen]
Podophyllum
[spritzende, schmerzlose Durchfälle („Hydrantenstühle")]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Pankreas suis, Rectum suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fasten, allergenfreie Ernährung
Physikalische Therapie: Wärmeanwendung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Plexus solaris, oberer Grenzstrang, Störfeldsuche
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Stuhluntersuchung, Darmsanierung

Gedächtnisschwäche

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arteriosklerose (Zerebralsklerose), Traumata (Commotio, Contusio, Compressio cerebri, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen, Morbus Alzheimer (vor allem Kurzzeitgedächtnis betroffen!)

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Selenium-Homaccord [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere arterielle Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [zur Herzstützung (Herzmuskelschädigungen, infektiöstoxische Myokardschwäche; Zustand nach Herzinfarkt, bes. beim Altersherz]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Procainum compositum (Amp.)
[Revitalisierungsmittel; Geriatrikum]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Schwindelsymptomatik, besonders arteriosklerotisch bedingte Schwindelzustände; verlangsamte Hirnstammfunktion („lange Leitung")]
Einzelmittel-Injeele:
Aurum jodatum [Arteriosklerose]
Kalium bromatum [Depressionen, Angst, Verwirrung, Unruhe]
Kalium phosphoricum [Apathie, depressive Zustände]
Selenium [Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit]
Sulfur (forte) S [Konstitutions- und Stoffwechselmittel; reizbare, pessimistische, depressive Stimmungslage verbunden mit Gedächtnisschwäche]
Thuja S [Konstitutionsmittel mit Angriff am ZNS: schwerfälliges Denken, Schludrigkeit, schlechtes Erinnerungswermögen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum frontalis suis, Cerebrum totalis suis, Hepar suis, Ovarium suis, Testis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum; ggf. in Störfelder
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, „Gehirnjogging"

Gehörgangsekzem

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Kontaktekzem, Neurodermitis atopica localisata, Otomykose, mikrobielles Ekzem, seborrhoisches Ekzematoid, Superinfektion (Staphylokokken)
- **BESONDERER HINWEIS:**

Basistherapie
Orale Therapie:
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus, Rhinitis, Sinusitis]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [trockene, chronische Ekzeme]

Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [urtikarielle Ekzeme]
Adeps suillus (forte S)
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei exsudativer Diathese]
Graphites [chronische, trockene Gehörgangsekzeme]
Kreosotum [Ekzem mit Juckreiz und Blutungsneigung]
Natrium muriaticum [ekzematöse und pustulöse Exantheme]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; Neigung zur Chronizität]
Sulfur (forte) S
[seborrhoische und trockene Ekzeme mit großem Juckreiz]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Ductus auricularis externus suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Am Mastoid quaddeln
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung, Spülungen

Gehörgangsfurunkel

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Mastoiditis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Diabetes mellitus; evtl. Antibiotikatherapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.)
[(nässende) Ekzeme, Hyperhidrosis, Hyperkeratose]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen; bullöse, pustulöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Phlegmonen, Abszessen sowie bei Otitis media oft mit Ohrenfluss (laufendes Ohr)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. Neigung zur Infektanfälligkeit)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel und Karbunkel]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Eiterprozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Furunkulose]
Myristica sebifera
[beschleunigt Einschmelzung: „homöopathisches Messer“]
Staphisagria [trockene und nässende Dermatosen]
Nosoden-Injeele:
Mastoiditis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Ductus auricularis externus suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Kost, Zuckerreduktion
Neuraltherapie: Quaddeln am Mastoid
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung

Gelenkerguss

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hydrarthros: traumatisch sowie als Reizerguss bei „aktivierter Arthrose“ – P. Otte und bei Allergie
  Hämarthros: traumatisch sowie bei Hämophilie („Blutergelenk“). Stets Ausschluss einer Gelenksinfektion sowie einer Tbc, Lues und Gonorrhoe und eines Neoplasmas sowie einer Gicht und einer Arthritis rheumatica bzw. einer Polyarthritis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ergussart abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung: Blutergüsse im Gelenk (= Hämarthros)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Infektanfälligkeit und zur Ödembildung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen: allergische (meist intermittierende) Gelenkergüsse (Hydrarthros bzw. Hydrops intermittens articulorum)]
Colchicum (forte S) [wandernde Gelenkbeschwerden mit Schwellungen; z.B. auch bei Gicht und Polyarthritis]
Crotalus [Gelenkblutungen (Hämarthros)]
Vipera berus [Blutungsneigung und Blutungen im Gelenk]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele: **Cartilago suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kälteanwendungen
Ausleitende Therapie:
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Neuraltherapie:
Störfelderbeseitigung, Quaddeltherapie am Kniegelenk
Weitere Verfahren: Schröpfen, Punktion

Gicht

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Stoffwechselabklärung!
  Cave „Gicht-Niere“, Harnsäure-Nierensteine und „Gicht-Hypertonie“

Basistherapie
Orale Therapie:
Lithiumeel comp. (Tabl.) [Gicht und rheumatische Erkrankungen]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S
[Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie der Leberzellfunktionen, auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; ferner Hypercholesterinämie (oft mit Gicht verbunden bei „Luxuskonsum“ sowie bei Adipositas]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[weichteilrheumatische und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat: Podagra, Gonagra, Chiragra; Arthritis/Tendovaginitis/Bursitis urica]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum benzoicum [Gelenk- und Muskelschmerzen]
Arnica S [Neuralgien und Myalgien]
Bryonia S [entzündlich-rheumatische Erkrankungen]
Colchicum (forte S)
[wandernde Gelenkschmerzen; akuter Gichtanfall]
Sabina
[Gicht (Großzehe und Handgelenke!); Gelenkrheumatismus]
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum
[langsam fortschreitende Gicht mit weissen Tophi],
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Cartilago suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Os suis, Ren suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Purinarme Kost, Alkoholeinschränkung, Gewichtsreduktion
Physikalische Therapie: Feucht-kalte Umschläge
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme],
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen],
Aderlass
Neuraltherapie: Mandelpol, Gelenkquaddel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung

Gingivitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Iatrogen (Medikamenten-Gingivitis/Gingivahyperplasie), Gravidität, Leukämie, Agranulozytose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Zahnärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.)
[bei Fisteleiterungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Magen-Darm-Lebermittel, bes. bei Genussmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Osteoheel S (Tabl.)
[Gingivitis mit Knochenschmerzen (Periostitis)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[Schleimhautentzündungen; „Splitterschmerz“]
Asa foetida
[Weichteilentzündungen; extreme Berührungsempfindlichkeit]
Borax
[Mundaphthen/Stomatitis aphthosa]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Gingivitis sowie Pulpitis und Parodontitis bzw. Parodontose]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Dens suis, Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Spülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Lokale Infiltration, Störfeldsuche
Weitere Verfahren: Zahnsanierung! Amalgam! Symbioselenkung

Glaskörpertrübung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenärztliche Kontrolluntersuchungen sind bei allen Augenerkrankungen dringend anzuraten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Fermentregeneration]
Placenta compositum (Amp.) [Verbesserung der Durchblutung mit Kanalisation der Entgiftungsfunktion]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [als Zwischenmittel]
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus [Anregung der Fermentregeneration]
Suis-Organpräparate-Injeele: **Corpus vitreum suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Glaukom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen und Arten;
  Migräne, Arteriitis temporalis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Notfallsituation! Augenärztliche Abklärung!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.) [Kollaps- und Schwächemittel.]
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck, Tachycardie, pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Veratrum-Homaccord [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Arteriosklerose und anderen geriatrischen Indikationen sowie bei vegetativer Dystonie: allgemeine Disposition für das primäre Glaukom sind höheres Alter, vegetative Labilität; Auslösung oft durch Stress]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen (Glaucoma chronicum!]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[migräneartige Kopfschmerzen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Oculoheel (Tabl.) [Blepharo-Konjunktivitis]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, z.B. bei Arteriosklerose, aber auch bei Hornhauttrübungen (matte Hornhaut durch Epithelödem beim primären Glaukom)]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [Kopfschmerzmittel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [periodische Migräne; Schmerzen und Tränenfluss]
Cinnabaris [Schmerzen durch den Augapfel schießend]
Kalmia S [Kopfschmerz über den Augen; Iritis-Mittel]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus vitreum suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Augenpunkte, Glabella, Ganglion ciliare

Globusgefühl

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Ösophagitis, Aortenaneurysma, psychische Ursache, funktionelle Schluckstörungen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Nervoheel N (Tabl.) [nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Ignatia-Homaccord [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei vegetativer Dystonie sowie bei geriatrischen Indikationen]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gastricumeel (Tabl.) [Magenkrankheiten (Gastritis acuta und chronica) sowie Sodbrennen und Meteorismus mit Klossgefühl]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Heiserkeit sowie Seitenstrangangina mit Globusgefühl]
Strumeel T (Tabl.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Strumeel forte NF (Tropf.) [bei Globusgefühl infolge Kropf]
Einzelmittel-Injeele:
Ambra [Globusgefühl bei neurovegetativen Störungen mit Krampfhusten]
Asa foetida [Fremdkörpergefühl im Hals, verbunden mit Magendruck, Dysphagie und Singultus]
Ignatia S [Globusgefühl mit Hysterie und/oder Depressionen]
Lachesis S [Erstickungsgefühl, Kitzel, Globusgefühl, bes. auch bei Tonsillitis]
Pulsatilla S [Hypochondrie und Weinerlichkeit]
Spongia [Räusperhusten bei Struma parenchymatosa]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Larynx suis, Oesophagus suis, Sympathicus suis, Ventriculus suis**
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Ganglion stellatum, Thyreoidea-Quaddel
Weitere Verfahren: Psychotherapie

Glomerulonephritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chronische Pyelonephritis, nephrotisches Syndrom, sekundäre Nephrosklerose,
  Lupus erythematodes,
  Wegener-Klinger-Granulomatose (= fokale nekrotisierende Glomerulitis)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung (relativ häufig nach Streptokokkeninfekten – incl. Scharlach – als „Zweitkrankheit“)!
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie, akute und chronische Nierenkrankheiten]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S [Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände im Urogenitaltrakt]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. – außer bei Glomerulonephritis – auch bei Pyelitis/Pyelonephritis, Zystitis/Zystopyelitis sowie bei Fokaltoxikosen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und zur Infektanfälligkeit; Tonsillarhypertrophie und Tonsillitis chronica (Tonsillen als Foki!)]

Plantago-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Enuresis nocturna, Incontinentia urinae, Reizblase]
Populus compositum SR (Tropf.)
[Anregung der Nierenfunktion und -exkretion; Nephrolithiasis, Albuminurie]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung wie Zysto-Pyelo-Nephritis]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Nephritis mit fettiger Degeneration]
Cantharis [Nephritis, Zystitis mit Hämaturie und Albuminurie]
Lachesis S [bei septischen und hämorrhagischen Prozessen]
Phosphorus S [Nephritis mit Hämaturie und Zylindrurie]

Nosoden-Injeele:
Cystopyelonephritis-Nosode, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans (embolische Herdnephritis Löhlein),
Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Eiweiß- und Flüssigkeitsbilanzierung
Neuraltherapie: Nierenpol, oberer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie; Fokussuche und -eliminierung

Glossitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Melkersson-Rosenthal-Syndrom (granulomatöse Glossitis), Möller-Hunter-Glossitis (bei perniziöser Anämie), Plummer-Vinson-Syndrom (Eisenmangelanämie, achylische Chloranämie), Diabetes mellitus, psychische Genese
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Anaphylaxie als Ursache! Ursache auch schlechte Zahnprothesen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
(eitrige und entzündliche Erkrankungen)

Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen (mit Rubor, Tumor, Calor, Dolor)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen): Glossitis bei Infektionskrankheiten]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen und zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Lamioflur (Tropf.) [bei Schleimhauterkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Glossitis dissecans mit tiefen Einrissen der Zungenoberfläche!)]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen sowie bei Leberschäden]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Borax [Geschwüre und Aphthen der Mundschleimhaut und der Zunge]

Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Dens suis, Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Hepar suis, Lingua suis, Pulpa dentis suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Antigenfrei
Neuraltherapie: Mandelpol, Störfeldersuche
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Granulome (Zähne)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Extraktion beherdeter Zähne ist wegen der Gefahr der Ausprägung einer Fokaltoxikose unter besonderer Vorsicht durchzuführen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Galium-Heel N (Tropf.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

Parenterale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea Compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]

Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [bei Lymphatismus]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Narben und Neuralgien]
Hepeel (Tabl., Amp.) [zur Verbesserung der Leberentgiftung]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [bei rheumatischen Affektionen]
Rhododenroneel S (Tropf.) [bei Narben und Neuralgien]

Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode

Suis-Organpräparate-Injeele: **Tonsilla suis**

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Ernährungsumstellung
Mikrobiologische Therapie
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie

Grippaler Infekt, Grippe (Influenza)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Mischinfektionen, bakterielle Superinfektionen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl.) [grippale Infekte]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]

G

Gripp-Heel [grippale Infekte]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Viburcol N (Supp.) [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Grippe und katarrhalische Infekte, bes. im Anfangsstadium mit Schüttelfrösten]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen, z.B. auch Angina tonsillaris]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [Bronchitis, besonders chronischer Raucherkatarrh (trockener Reizhusten)]
Bryaconeel (Tabl.) [grippale Infekte, neuralgische Schmerzen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Grippe sowie Otitis media (Grippe-Otitis) und Poly)Sinusitis]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. der Bindehaut des Auges (Grippe-Konjuktivitis]
Naso-Heel SN (Tropf.) [Rhinitis und Polysinusitis]
Tartephedreel N (Tropf.) [„absteigende" Katarrhe der oberen Luftwege: schneller Übergang einer Laryngitis in eine Bronchitis. Husten, der sich nur schwer löst]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [trockene Tracheo-Bronchitis mit Hustenreiz und Retrosternalschmerz; Kopfschmerzen]
Causticum S [Laryngo-Pharyngitis, Aphonie, Reizhusten; brennende Schmerzen]
Eupatorium perfoliatum [fieberhafte Infekte mit Glieder- und Retrosternalschmerz mit Wundheitsgefühl]
Ferrum phosphoricum [anfängliche Fieber- und Entzündungszustände; Patienten mit geringer Abwehrkraft]
Lachesis S [ödematöse blaurote livide Verfärbung, Blutungsneigung; Immunstimulans]
Phosphorus S [fieberhafte (Broncho)Pneumonie, Blutungsneigung]
Rhus Tox S [grippale Infekte mit Neuralgien und Myalgien]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode [nach überstandener Krankheit], **Klebsiella pneumoniae, Sinusitis-Nosode, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Physikalische Therapie: Halswickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weiteres Vorgehen:
Rp.: Drosera-Homaccord Tropf.,
Husteel Tropf.,
Tartephedreel N Tropf. ana 30,0
M.D.S.: Hustentropfen, 3x tägl. 15 Tropfen

Hämatome

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Leukämie, Morbus Werlhof (thrombozytopenische Purpura) und andere hämorrhagische Diathesen (z.B. Hämophilie = „Bluterkrankheit") bzw. Gerinnungsstörungen; Traumata
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Behandlung des Grundleidens!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.) [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cinnamomum-Homaccord N [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [venöse Stase; thrombophlebitische Zustände]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Stase]
Arnica S [Distorsionen, Luxationen, Frakturen, Quetschungen mit Hämatomen]
Crotalus [hämorrhagische Diathese]
Hamamelis [venöse Stase mit Stauungsdruck]
Phosphorus S [Blutungsneigung; hämorrhagische Diathese]
Vipera berus [Blutungsneigung und Blutungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamin K-reich
Physikalische Therapie: Kälte, Quarkanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Ggf. Punktion

Hämorrhoiden

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Analkarzinom, Rektumkarzinom, Proktitis, Analthrombose, Leberzirrhose

Basistherapie
Orale Therapie:
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Hämorrhoiden, entzündliche Hautveränderung im Analbereich, Fissuren]
Podophyllum compositum (Tropf.) [colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Podophyllum compositum [colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Lokale Therapie:
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [Varikosis bzw. venöse Stase, Hämorrhoiden (mit „Splittergefühl")]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.) [bei Neigung zur Blutungen, kapillare Sickerblutungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Gastroenteritis]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [Hämorrhoiden, Pfortaderstauung, chronische Obstipation]
Cinnamomum [Hämorrhoidalblutungen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis, Rectum suis, Vena suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Cave: Gewürze, Äthanol!
Physikalische Therapie: Kälteanwendung
Weitere Verfahren: Stuhlregulierung; ggf. Operation

Harnwegsinfekt

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S [Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Suppositorien:
Spascupreel S [Krampfzustände, Tenesmen]
Atropinum compositum S [Krampfzustände, Tenesmen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel (Zystitis, Zystopyelitis als hämatogene Infektion im Rahmen anderer entzündlicher Prozesse), Karbunkel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie]
Plantago-Homaccord (Tropf.) [Reizblase, Incontinentia urinae, Enuresis nocturna]
Populus compositum SR (Tropf.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Störungen der Nierenfunktion und -exkretion bei Albuminurie sowie bei Reizzuständen im Harnwegesystem, z.B. auch bei Zystitis/Zystopyelitis; bei Hydronephrose und Nephrolithiasis, insbesondere auch bei Miktionsstörungen (1. Stadium des Prostata-Adenoms; als Nebenmittel auch bei Bakteriurie]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizblase; im 1. Stadium des Prostataadenoms (sog. Prostatahypertrophie)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Nephritis; brennende Schmerzen]
Cantharis [Zystitis, Urethritis; Harndrang, Strangurie]
Hepar sulfuris [bei eitrigen Prozessen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Cystopyelonephritis-Nosode, Medorrhinum, Staphylococcus, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr; laktovegetabile gewürzarme Kost; ggf. „Schaukeldiät“

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Hashimoto-Thyreoiditis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Schilddrüsenfunktionsstörungen anderer Ursache wie Basedow-Krankheit, Schilddrüsenentzündung, Schilddrüsenadenome, Jodüberangebot, Überdosierung von Schilddrüsenhormonen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine chronisch-lymphozytäre Schilddrüsenentzündung in einer hypertrophen Form. Sie ist eine Autoimmunkrankheit. Die Ursachen liegen vermutlich in einem autosomal-dominanten Erbgang. Schilddrüsenerkrankungen aller Art treten in betroffenen Familien gehäuft auf. Es handelt sich um eine Autosensibilisierung gegen Thyreoglobulin. In 95 % der Fälle ist eine Manifestation bei Frauen im Alter von 40 bis 60 Jahren, bei 25 % der Kranken findet man gleichzeitig andere Autoimmunerkrankungen.
  Wie bei allen Autoimmunerkrankungen muss man mit den Gaben von immunstimulierenden Homöopathika außerordentlich vorsichtig, ja zurückhaltend sein. Alle schilddrüsenspezifischen Homöopathika haben einen stimulierenden Effekt.

Basistherapie
Orale Therapie:
Allgemein ausleitende Therapie mit
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Thyreoidea compositum [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Symptomenbezogene Therapie
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck, Tachycardie, pectanginöse Beschwerden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Globusgefühl]
Nervoheel N (Tabl.)
[bei nervösen Störungen, Unruhezuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Schilddrüsenerkrankungen, Entzündungen der oberen Luftwege]
Ferrum sulfuricum [Schilddrüsenüberfunktion]
Jodum [Schilddrüsenüberfunktion]
Lycopus virginicus
[Herzklopfen, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion]
Spongia [Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie Lymphdrüsen, Schilddrüse]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Staphyloccocus [Schädigung durch Staphylokokken-Gifte, z.B. Autoaggressionskrankheiten],
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Struma cystica, Struma parenchymatosa
Suis-Organpräparate-Injeele:
Glandula lymphatica suis, Glandula thyreoidea suis
Begleittherapie
Die Heel-Therapie kann hier nur palliativ erfolgen, die Grundtherapie muss mit Kortison, Enzymen und evtl. immunsuppressiven Maßnahmen durchgeführt werden.
Enzympräparate und Antioxidantien

Hepatitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sarkoidose, malignes Lymphom, Brucellose, Listeriose, Toxoplasmose, Leptospirose, Lues;
  viral verursachte Hepatitiden
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären (u.a. auch Alkohol- und Drogen-Hepatitis)!
  Cave: Posthepatitische Leberzirrhose
  Trinkampullenmedikation!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Engystol (Tabl.) [Virushepatitis]
Parenterale Therapie:
Hepeel [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Hepar compositum N [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.) [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen, Hepatitis acuta et chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden), Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Duodenoheel (Tabl.) [Duodenitis, Ulcus duodeni]
Engystol (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen); also besonders indiziert bei infektiöser bzw. viraler Hepatitis]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen (chronisch-persistierende Hepatitis!)]
Gastricumeel (Tabl.) [Gastritis acuta et chronica, Sodbrennen, Meteorismus]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern); Pfortaderstauung, Meteorismus]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Lebermittel, bes. nach Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee) und nach Diätfehlern; Meteorismus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Leberschäden mit Durchfall und Hinfälligkeit/Abmagerung]
Cynara scolymus [Leberentgiftung]
Lycopodium S
[Hepatopathie mit Pfortaderstauung und Meteorismus]
Phosphorus S [fettige Degeneration der Leber; Blutungsneigung]
Taraxacum [Hepatitis, Cholezystopathie mit dumpfem Leberschmerz, Meteorismus und Flatulenz]
Nosoden-Injeele (in Abhängigkeit von Ursache der Hepatitis) u.a.:
Cirrhosis hepatis-Nosode, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Herpes simplex-Nosode, Listeriose-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Cystein [Leberaffektionen als Therapieschaden],
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Cave: Alkohol, Fett!
Physikalische Therapie: Leberwickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Vorderer Grenzstrang, oberer Grenzstrang, Plexus solaris
Weitere Verfahren: HOT (hämatigene Oxigenationstherapie)
Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Herpes labialis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Infekte anderer Genese (z.B. Candida), allergische Ekzeme.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Herpesinfekte treten gehäuft nach grippalen Infekten auf und sind ein Zeichen gestörter Immunsysteme. Eine diagnostische Abklärung muss in jedem Fall erfolgen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.) [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S Salbe [zur lokalen Behandlung der Herpeskrusten]
Symptomenbezogene Therapie
Cutis compositum N (Amp.) [bei Beteiligungen der Haut]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[bei bakteriellen Superinfektionen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[zur Ausleitungstherapie der lymphatischen Systeme]
Einzelmittel-Injeele:
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Schleimhautentzündungen der Atemwege]
Mezereum S [juckende Hautreizungen und Hauteiterungen]
Ranunculus bulbosus [Viruserkrankungen der Haut]
Rhus Tox [juckende Hautkrankheiten, fieberhafte Infektionskrankheiten, Nervenschmerzen]
Nosoden-Injeele:
Herpes simplex-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele:
Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie der chronischen Herpesinfekte:
1. Stufe Euphorbium comp. SN
2. Stufe Lymphomyosot N
3. Stufe Mucosa compositum
4. Stufe Herpes simplex-Nosode-Injeel

Vitamine
Antioxidantien
Euphorbium comp. Nasentropfen SN (Dosierspray) [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]

Herpes zoster

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Zoster corneae (unbedingt augenärztliche Behandlung), Zoster-Meningoenzephalitis und Zoster-Myelitis;
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ranunculus-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Mezereum-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Parenterale Therapie:
Ranunculus-Homaccord [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN (auf die Bläschen aufsprühen) [antivirale Wirkung]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme (pustulöse bzw. bullöse Zosterbläschen!); zerebrale Reizzustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Dermatosen, u.a. auch Impetigo contagiosa]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen]

Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [wunde und rissige Hautveränderungen; Blutungsneigung (Zoster haemorrhagicus)]
Apis S [Schwellungen, Juckreiz, stechende brennende Schmerzen]
Argentum nitricum
[Abmagerung; gealtertes Aussehen (Zoster im Senium!); „Splitterschmerz"; lanzinierende Schmerzen]
Cantharis [bullöse und pemphiginöse brennende Dermatitiden; bes. bei Zoster im Gesicht]
Euphorbium (forte S) [Zerschlagenheitsgefühl; starke unerträgliche Brennschmerzen; pustulöse Blasen]
Formica rufa [generell: Umstimmungsmittel; speziell Neuralgien und Druckempfindlichkeit der Nervenaustrittstellen]
Hepar sulfuris [Phlegmone-Tendenz (Zoster phlegmonosus!)]
Hypericum [Neuralgien bei akutem Zoster und bei postherpetischen Neuralgien]
Mezereum (forte S) [vesikulöse herpetische Ekzeme; Schorfbildung und Abschuppung (Zoster necroticans/gangraenosus)]
Ranunculus bulbosus
[Herpes zoster mit Brennen, Jucken und Schorfbildung]
Rhus Tox S [bullöse blasige Dermatitiden mit Brennen und Juckreiz; Neuralgien]

Nosoden-Injeele:
Bacterium proteus, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Vaccininum

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Medulla oblongata suis, Sympathicus suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Ernährung
Akupunktur: Besonders bei postherpetischen Neuralgien
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung, physikalische Therapie

H

Herzinsuffizienz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Schweregrade
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung, ob eine Herzglykosidbedürftigkeit besteht!
  Kardiologische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Crataegus-Heel S (Tropf.) [Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörung, Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Parenterale Therapie:
Cralonin [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Cor compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]

Symptomenbezogene Therapie
Angio-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei ödematösen Zuständen]
Aurumheel N Tropfen
[bes. bei Hypotonie sowie bei Herzrhythmusstörungen und bei vegetativ-funktionellen Herz- und Kreislaufstörungen]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion; pektanginöse Beschwerden]
Melilotus-Homaccord N Tropfen
Melilotus-Homaccord (Amp.)
[bes. bei rotem Hochdruck (Plethora) sowie bei präapoplektischen Zuständen]
Pectus-Heel (Tabl.) [pektanginöse Beschwerden]
Strophanthus compositum (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kollapszustände]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäßwirkung]
Aurum [hypertensive Stenokardien]
Cactus [Angina pectoris, Herzklopfen]
Carbo vegetabilis
[Herzangst, Kollapsneigung, Dyspnoe, „Emphysem-Herz"]
Coffea [Cor nervosum]
Crataegus [Präinsuffizienz, Altersherz]
Digitalis [Herzmuskelkräftigung]
Spongia [„Strumaherz"; Reizhusten]
Strophanthus [Cor nervosum, kardiale Angstzustände]

Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Aorta suis, Arteria suis, Cor suis, Vena suis

Begleittherapie
Ernährung: Diät, cholesterin- und fettarme Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, ggf. Neuraltherapie [vertebragene Angina pectoris], Sauerstofftherapie, Ozontherapie, dosiertes körperliches Training
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Herzneurose (Cor nervosum)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Angina pectoris (incl. vertebragene!), Herzinfarkt, larvierte Depression
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Organbefund ausschließen,
  Ausschluss einer Fokaltoxikose!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aurum Heel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pectanginöse Beschwerden, auch vertebragener Ursache]
Pectus-Heel (Tabl.) [pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Angio-Injeel
[Koronardurchblutungsstörungrn, pectanginöse Beschwerden]
Strophanthus compositum
[koronare Durchblutungsstörung, Stärkung des Herzmuskels]

Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen
[vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen sowie Herzrhythmusstörungen, bes. bei Hypotonie]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Altersherz; nervöse Herzstörungen wie Herzstiche und Herzschmerzen sonstiger Art, Folgen von Herzmuskelschädigungen, Koronardurchblutungsstörungen, Zustand nach Myokardinfarkt]
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität, Duodenitis, Ulcus duodeni, ggf. verbunden mit gastrokardialem Symptomenkomplex]
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Tachykardie, bes. bei Schilddrüsenüberfunktion, pektanginöse Beschwerden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionen, hysterische Aphonie, paradoxe Symptome; ggf. verbunden mit Unruhe, Angst und Herzklopfen]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden, Neurosen im Klimakterium]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globusgefühl]

Einzelmittel-Injeele:
Coffea [Herzklopfen mit Schlaflosigkeit]
Strophanthus
[kardiale Angstzustände, „Herz schlägt bis zum Hals“]
Valeriana [Herzklopfen mit Globusgefühl]

Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Psorinum, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Tuberculinum

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cor suis, Hypothalamus suis, Vena suis

Begleittherapie
Neuraltherapie:
Quaddeltherapie präkordial bzw. paravertebral HWS
Weitere Verfahren: Sport, psychische Führung

Herzrhythmusstörungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
Kardiologische Abklärung notwendig!
Mineralhaushalt beachten!
Fokalherde!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]

Parenterale Therapie:
Cactus compositum [koronare Durchblutungsstörung, Stärkung des Herzmuskels]
Cor compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]

Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei initialen Fieberzuständen]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Galle-Lebermittel, als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; deshalb ggf. auch indiziert bei infektiös-toxischer Myokardschwäche mit Rhythmusstörungen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden; ggf. mit gastrokardialem Symptomenkomplex]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; hysterische Aphonie; paradoxe Symptome, ggf. verbunden mit Unruhe, Angst, Herzklopfen]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Strophanthus compositum (Amp.) [Nachbehandlung nach Myokardinfarkt (hierbei oft Herzrhythmusstörungen!)]

Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Herzklopfen, Unruhe, Angst]
Lycopus virginicus [Hyperthyreose mit Arrhythmie und/oder (paroxysmaler) Tachykardie]
Sepia [Konstitutionsmittel, bes. für das Klimakterium]
Tabacum [Gefäßkrämpfe und Herzklopfen mit Todesangst]

Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Suis-Organpräparate Injeele:
Cor suis, Glandula suprarenalis suis, Musculus suis, Sympathicus suis

Begleittherapie
Ernährung: Allergene ausschließen!
Weitere Verfahren: Akupunktur, Ozon

Hodgkin-/Non-Hodgkin-Lymphom

- **BESONDERE HINWEISE:**
Nur als ergänzende Therapie. Regelmäßige fachärztliche Kontrolluntersuchungen zur Beurteilung des Therapieverlaufes sind unbedingt erforderlich.

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Parenterale Therapie:
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungsmittel]
Glyoxal compositum (Amp.) [Zwischenmittel]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [Bindegewebsmittel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[lymphatische Stase, Anregung der Ausscheidungen]
Thyreoidea compositum (Amp.) [„antineoplastischer" Effekt]
Tonsilla compositum N Ampullen [Zwischenmittel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode

Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
[Verbesserung der Fermentfunktionen]

Suis-Organpräparate-Injeele:
Corpus pineale suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Splen suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Bei etwa erforderlicher zytostatischer und/oder strahlentherapeutischer Behandlung empfiehlt sich ein Leberschutz mit Hepeel, Chelidonium-Homaccord N, Injeel-Chol und Hepar compositum N sowie Hepar suis-Injeel. Zur Vermeidung und/oder zur Beseitigung von Strahlenschäden empfiehlt sich die Gabe von Causticum compositum 3x pro Woche 1 Ampulle s.c..

Hordeolum (Gerstenkorn)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Chalazion (Hagelkorn) = schmerzlos!

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.)
[Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische: Entzündungen im Bereich des äußeren Auges; Chronizität („Hordeolosis")]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Graphites
[Hordeolum, Lidrandentzündungen, Blepharo-Konjunktivitis]
Hepar sulfuris [Neigung zu Eiterungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Blepharo-Konjunktivitis]
Myristica sebifera
[akute und subakute Eiterungen, „homöopathisches Messer"]
Silicea [dünnflüssig-wässriger Eiter; Chronizität]
Staphisagria [Chalazion, Hordeolum; Blepharo-Konjunktivitis; Neigung zu Keloiden]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie: Nur bei Rezidiven!
Auto-Sanguis-Stufentherapie (nur bei Rezidiven!):
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]), **Berberis-Homaccord** (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Weitere Verfahren: Physikalische Therapie; ggf. augenärztlicher operativer Eingriff

Hyperemesis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Allergie, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Organbefund ausschließen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Vomitusheel (Tropf.) [Erbrechen und Brechreiz]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Anacardium-Homaccord (Tropf.) [Dumping-Syndrum, Duodenalerkrankungen, Übelkeit und Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Hyperemesis bei Gallen- und Leber-Affektionen wie Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken, Stauungsikterus, Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden)]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[Hyperemesis bei Kinetosen/Reisekrankheiten]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gastricumeel (Tabl.) [bei Magenbeschwerden (Gastritis acuta et chronica mit und ohne Ulkus), Sodbrennen, Meteorismus]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art, Leberschäden – oft verbunden mit Appetitlosigkeit und Meteorismus]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Lebermittel; Hyperemesis, bes. nach verdorbenen Speisen und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Hyperemesis bei Kinetosen/Reisekrankheiten sowie auch bei sonstigen Schwindelzuständen – insbesonders arteriosklerotisch bedingten]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Brechdurchfall, Erschöpfung, Unruhe, Angst]
Colchicum (forte S) [Erbrechen von Galle und Schleim]
Digitalis [Übelkeit (Nausea)]
Ipecacuanha [Husten mit Erbrechen und Übelkeit; Erbrechen erleichtert nicht!]
Kreosotum
[Schwangerschaftserbrechen (Hyperemesis gravidarum)]
Tabacum [gastrokardialer Symptomenkomplex, Singultus]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Duodenum suis, Hepar suis, Sanguis suis, Ventriculus suis, Oesophagus suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie: (Nicht bei Gravidität!)
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie:
Plexus solaris, Cubitalvene (i.v.), abdominaler Grenzstrang; ggf. Psychotherapie

Hyperhidrosis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Hyperhidrosis bei Ekzemen, Intertrigo sowie bei exsudativer Diathese]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen sowie Schweißausbrüche bei Fieber]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Hauterkrankungen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SN (Tropf., Amp.) [funktionelle Störungen des weiblichen Zyklus; bes. bei Achselschweiß]
Klimakt-Heel (Tabl.)
[klimakterische Schweißausbrüche mit Hitzewallungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Hyperhidrosis verbunden mit Heiserkeit]

Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung (Ableitung auf die Niere!) – auch bei Fußschweiß indiziert]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum benzoicum
[Hyperhidrosis bei uratischer Diathese und bei Fokalinfektionen/Fokaltoxikosen verbunden mit Hitzegefühl]
China S
[häufige erschöpfende Nachtschweiße („Schwächemittel“)]
Hepar sulfuris [Hyperhidrosis mit Pyodermien]
Jaborandi [abnorme Schweißausbrüche, bes. nachts]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[übelriechende, klebrige, gelbliche Nachtschweiße]
Sepia [Hitze und starkes Schwitzen im Klimakterium]
Sulfur (forte) S [Konstitutions- und Stoffwechselmittel; kalter Fußschweiß, übelriechender Achselschweiß]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum, Tuberculinum

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis, Ren suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Flüssigkeitsausgleich
Physikalische Therapie: Eichenrindenbäder, Sauna
Weitere Verfahren: Akupunktur, Autogenes Training

Hyperkinetisches Syndrom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verhaltensstörungen anderer Genese. Petit-mal-Epilepsien. Unruhezustände anderer Genese.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Als hyperkinetisches Syndrom wird ein Symptomenkomplex bezeichnet, der durch folgende Erscheinungen gekennzeichnet ist: Unruhe, Umtriebigkeit bis Rastlosigkeit, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmangel, Sozialintegrationsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, phasenweise destruktives Verhalten. Die Ursache der Störung ist unbekannt, obwohl eine Reihe von Fakten angeschuldigt werden. Dazu gehören phosphathaltige Nahrungsmittel, raffinierte Kohlenhydrate, Reizüberflutung durch übersteigerten Fernseh- und Videokonsum, Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Basistherapie

Orale Therapie:
Valerianaheel (Tropf.), 3x täglich 10 Tropfen und bei Bedarf [Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]

Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]

Lokale Therapie:
Viburcol N (Supp.) [Unruhezustände mit und ohne Fieber]

Symptomenbezogene Therapie
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Kopfschmerzen]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Spascupreel S (Supp.) [bei Spasmen im Magen-Darm-Bereich und auch der quergestreiften Muskulatur]

Einzelmittel-Injeele:
Hyoscyamus
[Unruhe und Erregungszustände, Schlafstörungen]
Passiflora incarnata
[Schlafstörungen, Krampfleiden, Unruhezustände]
Rhus Tox S [Angst, Unruhe und Verstimmungszustände]
Valeriana [Schlafstörungen mit Unruhe, nervöse Störungen]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [bei leicht zornigen, eifersüchtigen, hinterlistigen, ängstlichen, feigen Kindern], **Psorinum** [bei rechenschwachen, zu Lügen und läppischem Verhalten neigenden Kindern], **Tuberculinum** [bei zarten, schlaffen, müden, launischen Knaben]

Suis-Organpräparate-Injeele:
Cerebellum suis, Cerebrum totalis suis

Begleittherapie
Vermeidung raffinierter Kohlenhydrate und Einstellung auf eine konservenfreie Vollwertkost
Vermeidung von Reizüberflutungen

Weitere Verfahren: Entspannende Verfahren, psychotherapeutische Lenkung
Sportliche Aktivitäten

Konstitutionstherapie: Zincum valerianicum, Bromum, Opium und auch mit Calcium phosphoricum
Mikrobiologische Diagnostik und Therapie

Hypertonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Formen und Schweregrade der Hypertonie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären (essentiell, renal, endokrin)! Risikofaktoren beachten!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie

Orale Therapie:
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck, Tachycardie, präcordialer Druck]
Melilotus-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck]

Parenterale Therapie:
Melilotus-Homaccord [Bluthochdruck]
Rauwolfia compositum [Bluthochdruck]

Symptomenbezogene Therapie
Cactus compositum (Amp.)
Cactus compositum S (Tropf.)
[Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[arteriosklerotische periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [zur Herzstützung, bes. beim Altersherz]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[pektanginöse Beschwerden, Tachykardie, besonders bei Hyperthyreose: hier (meist) nur systolischer RR erhöht]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; Hypercholesterinämie]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung; indiziert besonders bei Nierenhochdruck]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[bei zerebralsklerotischem Schwindel]

Einzelmittel-Injeele:
Aurum colloidale [Herz- und Kreislauf-Krankheiten bei rotem Hochdruck bzw. Plethora]
Glonoinum [Hypertonie mit Herzklopfen]
Viscum album
[essentielle Hypertonie und generell bei Arteriosklerose]

Nosoden-Injeele:
Psorinum, Staphylococcus

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus;
Acidum fumaricum, Acidum DL-malicum
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cor suis, Hepar suis, Ren suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Salzarme Kost, Gewichtskontrolle; ggf. Reduktionskost
Neuraltherapie: Störfelder, Ganglion stellatum, Ganglion caroticum
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Aderlass

Hypophyseninsuffizienz

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nach den Vorstellungen der Homotoxikologie kann eine Hypophyseninsuffizienz durch früher „retoxisch" behandelte Infektionen entstanden sein. Diese früheren Infektionen sind unbedingt zu berücksichtigen, da die dabei abgetöteten Erreger einen Hinweis auf die erforderlichen Nosoden ergeben.

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Ignatia-Homaccord [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Symptomenbezogene Therapie
Ovarium compositum (Amp.) [bei Frauen)
Testis compositum N Ampullen [bei Männern]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[Regeneration der Sulfidfermente]
Nosoden-Injeele:
siehe unter „Besondere Hinweise"
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Acidum fumaricum, Acidum DL-malicum, Acidum L(+)-asparagicum, Acidum succinicum, Baryum oxalsuccinicum, Natrium pyruvicum
Suis-Organpräparate-Injeele: Hypophysis suis
Begleittherapie
evtl. Konstitutionsbehandlung
Mikrobiologische Therapie

Hypothyreose (latente)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Formen der Hypothyreose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!
  Bei Frauen an Hashimoto Strumitis lymphomatosa denken!
  Hormonsubstitution!

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel forte NF (Tropf.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Thyreoidea compositum [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [teigige blasse ödematöse Schwellungen]
Fucus vesiculosus [Jodmangelkropf; Adipositas]
Graphites [Adipositas; psychische und stoffwechselmäßige Verlangsamung (herabgesetzter Grundumsatz!)]
Jodum [Regulierung der Schilddrüsenfunktion]
Spongia
[Struma colloides et parenchymatosa mit Räusperzwang]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula thyreoidea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Schilddrüse und Schilddrüsenpole

Hypotonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  HVL- bzw. Nebennierenrindeninsuffizienz,
  kardiovaskuläre Hypotonie,
  infektiös-toxische Hypotonie, Hypovolämie, orthostatische Dysregulation

Basistherapie
Orale Therapie:
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Parenterale Therapie:
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.)
[Hypotonie als Folge von Herzschwäche]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [bei Herzschwäche, z.B. Folgen von Herzmuskelschädigungen, infektiös-toxische Myokardschwäche, Angina pectoris, Zustand nach Myokardinfarkt]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neigung zu Kollapszuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Herz- und Gefäßwirkung]
Tabacum [Hypotonie mit Schwindelzuständen]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Aorta suis, Arteria suis, Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen und sonstige balneologische Verfahren
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sport

Impetigo contagiosa

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Dermatosen bei Infektionskrankheiten (Masern, Röteln, Varizellen), Erythema exsudativum multiforme, akutes Ekzem, Erysipeloid
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Dermatologische Abklärung! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber, u.a. auch bei Hautkrankheiten]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Disposition zu einer Vielzahl von Schleimhaut- und Hautkrankheiten]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: Lymphatismus, exsudative Diathese, Neigung zu (eitrigen) Hautaffektionen]
Cinnabaris [pustulöse Hautaffektionen]
Hepar sulfuris [bei Suppurationen und Pyodermien]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Dermatitis und Dermatosen]
Nosoden-Injeele:
Bacillinum, Staphylococcus [Impetigo Bockhart], **Streptococcus haemolyticus** [Impetigo Tilbury-Fox], **Tuberculinum**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Sonnenbäder
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, HOT, Symbioselenkung, evtl. Antibiotika

Impotenz

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Organische Störungen unbedingt vorher ausschließen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Testis compositum N Ampullen [Libido- und Potenzstörung, allgemeine Schwächezustände]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Tonico-Injeel (Amp.) [Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Phosphorus S [Parenchymmittel, große Erregbarkeit und Nervenschwäche], **Ginseng** [Erschöpfungszustände], **Damiana** [Impotenz, Neurasthenie], **Muira puama** [Tonisierung des ZNS]
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus, [Verbesserung der Fermentfunktionen], **Acidum fumaricum, Acidum α-ketoglutaricum, Acidum DL-malicum, Acidum succinicum, Natrium oxalaceticum** [jeweils als Zwischenmittel]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Ductus deferens suis, Testis suis
Begleittherapie
Psychotherapie oftmals sinnvoll.
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Induratio penis plastica

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Oftmals ist eine operative Korrektur erforderlich.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Testis compositum N Ampullen [Libido- und Potenzstörung, allgemeine Schwächezustände]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.) [Verbesserung der Durchblutung]
Engystol (Tabl., Amp.) [Umstimmungsmittel]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Anregung der Leberentgiftung]
Placenta compositum (Amp.) [Verbesserung der Durchblutung]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Anregung der Bindegewebsfunktionen]
Tonsilla compositum N Ampullen [Stimulation des Lymphsystems]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [allgemeines Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum, Pyodermie-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Katalysatoren-Injeele: **Acidum DL-malicum**
Suis-Organpräparate-Injeele: **Funiculus umbilicalis suis, Testis suis**
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Weitere Verfahren:
Oftmals sind Packungen aus einer Mischung von Traumeel S Salbe (Entzündungen) und Heilerde wirksam.

Inkontinenz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumorleiden abklären.

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Plantago-Homaccord (Tropf.) [Reizblase, Bettnässen, Inkontinenz]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Sabal-Homaccord (Tropf.) [Prostataadenom, Reizblase]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S [Reizblase, Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [altersbedingte Inkontinenz, Altersdemenz]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [zentrale Steuerung]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schmerzen bei Durchnässung und feuchtem Wetter]
Husteel (Tropf.) [Urinabgang beim Husten]
Mucosa compositum (Amp.) [Schleimhautmittel]
Populus compositum SR (Tropf.) [Prostataadenom]
Solidago compositum SN (Amp.) [Prostataadenom, Harnwegsentzündungen]
Tonico-Injeel (Amp.) [Erschöpfungszustände]

Einzelmittel-Injeele:
Causticum S [Blasenschwäche, unwillkürlicher Harnabgang beim Husten, Harnwegsentzündung mit Erschöpfung]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Ren suis, Vesica urinaria suis

Insektenstich

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Notfall (Kortikoidmedikation)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot N
[Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. entzündliche (Calor, Rubor) Schwellungen (Tumor) mit Schmerzen (Dolor)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Hautaffektionen, u.a. bei Quincke'schem Ödem]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Abszessen und Phlegmonen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten]
Schwef-Heel (Tropf.) [verschiedene, bes. juckende Dermatosen sowie Pyodermien]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [urtikarielle Dermatosen, Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[Ödeme und Weichteilschwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse, blasse Schwellungen mit stechenden, brennenden Schmerzen]
Lachesis S [Infektion mit septischen Symptomen (dunkelrote Verfärbung); Kapillarschädigung]
Ledum [Insektenstiche]
Urtica [juckende urtikarielle Dermatosen]
Vincetoxicum [Gefäß- und Sympathikuswirkung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Kalte Umschläge
Neuraltherapie: Procain-Unterspritzung

Interkostalneuralgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Trauma; Pleuritis, Zoster, Periostitis; Neoplasma, insbesondere Pancoast-Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ranunculus-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Ranunculus-Homaccord [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien (mit stechenden Schmerzen)]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.)
[Neuralgien der Zwischenrippennerven mit reflektorischer Muskelspastizität (muskulärer Hartspann, Myogelosen)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben sowie posttraumatische und postoperative Ödeme und Weichteilschwellungen (postoperative Interkostalneuralgien nach Thorakotomie bzw. Thorakozentese bzw. Pleurapunktion)]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[Neuralgien sowie Neuritiden mit lanzinierenden Schmerzen; schmerzhafte Rippenknorpel]
Bryonia S
[heftige Stiche und berstende Schmerzen beim Atmen und Sprechen]
Mezereum (forte S) [Herpes zoster, Neuralgien]
Ranunculus bulbosus
[Interkostalneuralgie, schmerzhafte Atmung, postherpetische neuralgische Beschwerden]
Nosoden-Injeele:
Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Musculus suis, Os suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Neuraltherapie:
Segment und Wurzel, Quaddelbehandlung im Bereich des Thorax und der Interkostalnerven; ggf. Störfeldbehebung
Weitere Verfahren: Fokussuche

Intertrigo

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Candidamykosen, Diabetes mellitus, Windeldermatitis = Intertrigo ammoniakalis (bes. bei Dyspepsie-Stühlen)

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Natrium-Homaccord (Tropf.) [Skrofulose, chronische Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lokale Therapie:
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Ekzemen, Allergie sowie bei Dermatomykosen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[Stimulation des weiblichen Inkretoriums: adipöse Frauen mit Intertrigo (bes. auch submammär)]
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen (wundmachende Sekrete)]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen, u.a. auch bei chronischen Hautaffektionen]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen bei verschiedenen Dermatosen sowie bei Pruritus]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[juckende und brennende ekzematöse Veränderungen]

Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Borax [Durchfälle sowie Harninkontinenz mit Intertrigo; generell bei psoriatiformen Dermatosen]
Kreosotum [ekzematöse Veränderungen mit Brennen und heftigem Juckreiz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[verschiedene Schweregrade von Dermatosen; insbesondere solche mit ätzenden, scharfen und eitrigen Sekreten (Erythema glutaeale vesiculosum bzw. pustulosum)]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele: **Psorinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Basische Kost; Reduktionskost bei Adipositas
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Iritis

- **BESONDERE HINWEISE:**
Augenfachärztliche Kontrollen sind bei Iritis und Verdacht auf Iritis unbedingt anzuraten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N [Bindegewebs- und Gelenkerkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Colchicum [bei rheumatischer Iritis]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Glandula suprarenalis suis [bei chronisch rezidivierenden Fällen],
Oculus totalis suis [bei chronisch rezidivierenden Fällen]

Ischialgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Myalgie, Myopathie,lumbosakrales Wurzelreiz-Syndrom bzw. Lumbago, Kompressions-Syndrom,
Tumor (im Bereich der Cauda equina bzw. im Becken)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Neurologische Abklärung! Cave: Bandscheibenprolaps!

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Discus compositum N [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien rheumatischer Genese]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Discus compositum N (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[wetterbedingte Verschlimmerung der Neuralgien]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.) [Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat (Osteochondrosis lumbalis!) sowie postoperative und posttraumatische Ödeme und Weichteilschwellungen (traumatisches Ischiassyndrom!]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Gnaphalium polycephalum
[Lumbo-Ischialgie bzw. Lumbago-Ischias-Syndrom
= Ischialgie + muskulärer Hartspann + vegetative Symptome (Ödeme, vasomotorische Störungen) sowie ferner Taubheitsgefühl, Parästhesien und Stiche]
Lathyrus sativus [spastische Paresen und Schwäche der unteren Extremitäten]
Rhus Tox S
[Lumbago; Ischias-Neuralgien und -Neuritiden; typisch: Verschlimmerung durch Nässe und Kälte sowie durch Ruhe, Besserung bei Bewegung, jedoch Anlauf- bzw. Startschmerz!]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Ernährung: Gewichtsreduktion, falls übergewichtig
Physikalische Therapie: Fangopackungen, Stangerbäder
Neuraltherapie: Triggerpunkte, Störfeldsuche (Zähne, Tonsillen), Mandelpol, Quaddeltherapie über dem Kreuzbein
Weitere Verfahren: Chirotherapie, Krankengymnastik

Kardiospasmus

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung, besonders Tumor-Ausschluss (Ösophagus- bzw. Kardia-Karzinom)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Atropinum compositum (Amp.)
Atropinum compositum S (Supp.)
[Gallenkoliken sowie Spasmen anderer glattmuskulärer Hohlorgane; jedoch kontraindiziert, falls gleichzeitig ein kongenitales oder sekundäres aganglionotisches Megakolon (Morbus Hirschsprung) vorliegt!]
Cardiacum-Heel (Tabl.)
[funktionelle pektanginöse Beschwerden, z.B. auch beim gastrokardialen Symptomenkomplex]
Erigotheel (Amp.)
[Ulcus ventriculi et duodeni – verbunden mit Supersekretion und Hypermobilität des Magens]
Einzelmittel-Injeele:
Cuprum [Krampfzustände glattmuskulärer Hohlorgane]
Magnesium phosphoricum [Krämpfe in den glattmuskulären Hohlorganen, z.B. auch bei diffusen Ösophagusspasmen]
Nosoden-Injeele: **Bacterium coli, Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cardia ventriculi suis, Glandula parathyreoidea suis, Oesophagus suis, Ventriculus suis

Begleittherapie
Physikalische Therapie: Lokale Wärmeanwendungen
Neuraltherapie: Plexus solaris, oberer Grenzstrang
Weitere Verfahren:
Akupunktur, ggf. Sprengung mit Starck' Dilatator oder pneumatische Dehnung sowie Kardio-Myotomie (nach Heller)

Karies

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Zahnärztliche Abklärung, Begleittherapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S [Zahnkaries, insbes. Zahnhalskaries]
Antimonium crudum [Zahnschmerz – bes. nachts – sowie mit Verschlimmerung durch Essen und kalte Getränke]
Calcium fluoratum [bei Zahnkaries zur Schmelzhärtung; Parodontose, Parodontitis]
Kreosotum [Zahnkaries mit schwarzfleckigen Zähnen, stinkenden Absonderungen und brennenden Zahnschmerzen]
Silicea [Konstitutionsmittel; Zahnkaries, empfindliche Zahnhälse; Anregung der Schmelzbildung]
Staphisagria [bei Schmerzen in kariösen (schwarzen) Zähnen]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Dens suis, Gingiva suis, Pulpa dentis suis
Begleittherapie
Ernährung: Mineralstoffe, Vitamine, zuckerfreie Ernährung (keine Mono- und Disaccharide)
Physikalische Therapie: Mundhygiene
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Katarakt

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie! Augenärztliche Abklärung betr. Art und Ursache! An medikamentenbedingten Katarakt sowie an Cataracta diabetica denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei vegetativer Dystonie sowie bei Arteriosklerose und bei sonstigen geriatrischen Indikationen (Alters-Katarakt)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (u.a. auch bei Therapieschäden)]
Oculoheel (Tabl.) [entzündliche Reizzustände des vorderen Augenabschnitts wie Konjunktivitis, Blepharitis und Dakryozystitis (besonders chronische Formen)]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht – auch in der Geriatrie: (vorzeitiger) Altersstar bei Frauen]
Syzygium compositum N (Tropf.) [Katarakt bei Altersdiabetes]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht: (vorzeitiger) Altersstar bei Männern]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Secale cornutum [Spasmophilie: Cataracta tetanica]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel; Chronizität]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Homöopathisierte Allopathika Injeele
bei entsprechender Anamnese
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus vitreum suis, Lens suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Ernährung: Kochsalz-Einschränkung
Neuraltherapie: Augenpunkte, Ganglion ciliare, Fokalherde
Weitere Verfahren: Operation; ggf. Zahnsanierung

Keloide

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Oft hormonell, altersmäßig oder familiär („fibroplastische Diathese") bzw. rassisch (bei dunkelhäutigen Personen relativ häufig und oft multipel = Keloidose!) bedingt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Stimulans der Drüsen- und der physiologischen Bindegewebsfunktionen; Präkanzerosen sowie Induratio penis plastica und Sklerodermie]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Bindegewebsindurationen]
Conium S [bei allen Verhärtungen]
Graphites
[erweichende Wirkung auf Narbengewebe; korpulente Typen]
Hydrocotyle asiatica [papulöse bzw. psoriatiforme Keloide]
Silicea [Bindegewebsmittel; Überempfindlichkeit gegenüber Berührung]
Staphisagria
[Keloide, bes. nach Operationen und Schnittverletzungen sowie nach Verbrennungen; Keloide als Fokus]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Umspritzung bzw. Unterspritzung der Keloide (u.a. auch mit Traumeel S Ampullen)

Keratitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenärztliche Kontrollen sind bei Keratitis unbedingt anzuraten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]

Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Lamioflur (Tropf.) [Lichtscheu, scharfe brennende Sekrete]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen (oberflächliche Formen)]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Phlyktaenen], **Argentum nitricum** [heftige Rötung und Schwellung], **Conium S** [Lichtscheu], **Kalium bichromicum** [ulzeröse Entzündungen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cornea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Klimakterische Beschwerden

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Gynäkologische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Klimakt-Heel (Tabl.) [Klimakterische Beschwerden]
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Ovarium compositum [Dysmenorrhoe, entzündliche und degenerative Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächemittel]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Osteochondrose, besonders HWS, neurale Störfelder; vertebragene Neuralgien; besonders auch Zervikalmigräne]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme; ggf. Revitalisierungsmittel]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Tachykardie und Extrasystolie sowie pektanginöse Beschwerden, bes. auch infolge von Schilddrüsenüberfunktion]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.) [klimakterische Neurosen; Vaginitis, Dysmenorrhoe, Zwischenschmerz]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung der peripheren Durchblutung]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht (z.B. auch bei Impotentia virilis): Klimakterium virile]
Tonico-Injeel (Amp.) [physische und psychische Erschöpfung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; ggf. Globusgefühl]
Einzelmittel-Injeele:
Cimicifuga S
[Klimakterium mit Depressionen; „klimakterische Migräne“]
Lachesis S [Klimakterium mit Brennschmerz und üblem Geruch sowie Hitzewallungen]
Sanguinaria [Hitzewallungen, „fliegende Hitze“]
Sepia [klimakterische, reizbare, launische Frauen; venöse Stauungen]
Suis-Organpräparate Injeele: **Hypophysis suis, Ovarium suis, Placenta suis, Testis suis** [Klimakterium virile]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Moorbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Plexus, gynäkologischer Raum
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, HOT, ggf. Psychotherapie

Koliken

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Abdominelle Erkrankungen, Entzündungen (Magen, Darm, Gallensystem, ableitende Harnwege) bzw. Tumoren; psychische Symptomatik
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum [Krämpfe und Koliken]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege, also bei Nieren- und Gallenkoliken]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.) [Gallenkoliken]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Erigotheel (Amp.) [Koliken bei Magen/Duodenum-Affektionen (mit und ohne Ulkus)]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberschäden sowie Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art wie cholangitische und cholezystitische Reizzustände ohne und mit Steinbildung]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus sowie im Bereich der ableitenden Harnwege]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Koliken, bes. nach Diätfehlern und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee); ggf. verbunden mit Meteorismus]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Koliken bei Gastroenteritis mit Kollapszuständen und kaltem Schweiß]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Gallenkoliken]
Cantharis [brennende Schmerzen im Bereich der Harnwege mit Strangurie]
Colocynthis S
[Magen-Darm-Koliken mit stechenden Schmerzen]
Magnesium phosphoricum
[Krämpfe glattmuskulärer Hohlorgane]
Nosoden-Injeele: (abhängig von Ursache der Koliken!): **Calculi bili, Calculi renales, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele organspezifisch, z.B.:
Cardia ventriculi suis, Coecum suis, Colon suis, Duodenum suis, Jejunum suis, Pyelon suis, Rectum suis, Ureter suis, Urethra suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Ernährung: Schonkost
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie: Schröpfen, Aderlass
Neuraltherapie: Grenzstrang, Plexus solaris, Segment-Behandlung
Weitere Verfahren: Akupunktur

Kolpitis (syn. Vaginitis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Kolpitis senilis (bzw. vetularum), Karzinomausschluss
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Mikrobiologisches Profil (u.a. Trichomonas, Candida, Chlamydien, Gonorrhoe)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus, Rhinitis, Sinusitis]
Gynäcoheel N (Tropf.) [Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [exsudative Diathese, Lymphatismus, u.a. auch Fluor albus, bes. bei kleinen Mädchen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Neurosen sowie ferner (post)klimakterische Kolpitis (Kolpitis senilis)]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Pruritus vulvae und Vulvitis (bullosa)]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der Drüsen- und Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht; u.a. indiziert im Klimakterium, bei Dysmenorrhoe, Endometritis, Metritis, Parametritis, bei Menorrhagien und Kraurosis vulvae
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[chronische Schleimhautentzündungen, u.a.Zervizitis]
Kalium bichromicum [Kolpitis und Vulvitis ulcerosa]
Kreosotum [ätzender übelriechender Fluor; Pruritus vulvae]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Trichomonaden-Fluor
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis, Ovarium suis, Salpinx uteri suis, Urethra suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Plexus, gynäkologischer Raum
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Konjunktivitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Dakryozystitis, Keratitis, Iritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenärztliche Ursachen-Abklärung und Kontrolluntersuchungen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen): virale Konjunktivitis – Keratokonjuktivitis epidemica = Schwimmbadkonjunktivitis; Masern-Konjunktivitis]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[akute und chronische Entzündungen/Eiterungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch der Bindehaut des Auges]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Ödeme der Bindehaut, Chemosis]
Belladonna S [Rötungen, Schwellungen]
Euphrasia [Lichtscheu, Tränenfluss, Chemosis]
Graphites [chronische Entzündungen des äusseren Auges]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele: **Cornea suis, Oculus totalis suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Eichenrindenabkochungen (Cortex quercus)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Konzentrationsstörungen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arteriosklerose (Zerebralsklerose), Traumata (Commotio, Contusio, Compressio cerebri, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen, Morbus Alzheimer (vor allem Kurzzeitgedächtnis betroffen!)

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus, Zerebralsklerose]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Selenium-Homaccord [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.)
[periphere arterielle Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [zur Herzstützung (Herzmuskelschädigungen, infektiös-toxische Myokardschwäche; Zustand nach Herzinfarkt, bes. beim Altersherz]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Procainum compositum (Amp.)
[Revitalisierungsmittel; Geriatrikum]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[Schwindelsymptomatik, besonders arteriosklerotisch bedingte Schwindelzustände; verlangsamte Hirnstammfunktion („lange Leitung“)]
Einzelmittel-Injeele:
Aurum jodatum [Arteriosklerose]
Kalium bromatum [Depressionen, Angst, Verwirrung, Unruhe]
Kalium phosphoricum [Apathie, depressive Zustände]
Selenium [Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit]
Sulfur (forte) S [Konstitutions- und Stoffwechselmittel; reizbare, pessimistische, depressive Stimmungslage verbunden mit Gedächtnisschwäche]
Thuja S [Konstitutionsmittel mit Angriff am ZNS: schwerfälliges Denken, Schludrigkeit, schlechtes Erinnerungswermögen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum frontalis suis, Cerebrum totalis suis, Hepar suis, Ovarium suis, Testis suis

A

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum; ggf. in Störfelder
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, „Gehirnjogging“

Kopfschmerzen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumor, Infektion, vertebragene Ursache, Trauma, Glaukom, Migräne, Hypertonie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung der Ursache! An Fokalherde sowie an „Analgetika-Kopfschmerz“ denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Parenterale Therapie:
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Kopfschmerzen bei grippalen Infekten und Fieber]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Regenerationsmittel bei postkommotionellen und geriatrischen Kopfschmerzen]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.) [Kopfschmerzen bei Leber-Galle-Leiden wie Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigung (Parenchymschäden), Stauungsikterus sowie Cholangitis und Cholezystitis]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien sowie Kopfschmerzmittel bei Migraine cervicale]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen: Leberkopfschmerzmittel]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden: Leberkopfschmerzmittel]
Melilotus-Homaccord N Tropfen
Melilotus-Homaccord (Amp.) [Kopfschmerzen bei präapoplektischen Zuständen sowie bei Hypertonie bzw. Plethora]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kopfschmerzen nach Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, z.B. bei Arteriosklerose, Endarteriitis obliterans sowie bei postenzephalitischen und postapoplektischen Residuen]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen, u.a. auch bei Migräne-Kopfschmerzen]
Rauwolfia compositum (Amp.) [Hypertoniker-Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Kopfschmerzen bei zerebralen Reizzuständen; hochroter Kopf]
Bryonia S [berstende Kopfschmerzen]
Cimicifuga S [heftige Kopfschmerzen, als ob Schädel zerspringt]
Glonoinum [Kopfschmerzen bei Meningismus]
Ignatia S [Migräne, spastische Kopfschmerzen]
Iris [„Sonntagsmigräne“]
Spigelia S [Schmerzen der Schläfen, über den Augen und über der Stirn; Trigeminusneuralgien]
Thuja S
[Nagelkopfschmerz; Kopfschmerzen bei Fokaltoxikosen]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Mastoiditis-Nosode, Osteomyelitis-Nosode, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus;
Acidum succinicum [anämische Kopfschmerzen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Antigenarme Ernährung; cave: Käse, Schokolade, Rotwein!
Physikalische Therapie:
TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum, Fokalherde
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Reflexzonen-Massage, Lymphdrainage, Krankengymnastik, Psychotherapie

Kraurosis vulvae

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Leukoplakie, Leukokeratose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Prädilektionsalter: Klimakterium und Senium.
  Cave: Präkanzerose! Abklärung notwendig!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Mezereum-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Parenterale Therapie:
Ovarium compositum [Dysmenorrhoe, entzündliche und degenerative Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr, u.a. bei Fluor albus und Kolpitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, u.a. auch bei Pruritus vulvae]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[chronische trockene Haut- und Schleimhautaffektionen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Beschwerden, u.a. auch (post)klimakterische Kraurosis vulvae]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. auch Neigung zu Infektanfälligkeit)]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen sowie allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Syzygium compositum N (Tropf.)
[Anregung der Abwehrsysteme und der Drüsenfunktionen bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen: Kraurosis vulvae bei Altersdiabetes]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse (Kraurosis vulvae [synonym: Lichen sclerosus et atrophicans vulvae] ist ein typischer degenerativer atrophischsklerosierender Schrumpfungsprozess!) an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel; Erkrankungen der Schleimhäute und Drüsen; Pruritus]
Kreosotum [Brennen und Jucken der Labien]
Sepia
[„Klimakterium-Mittel“; übelriechende Schweiße am Genitale]
Staphisagria [Pruritus vulvae]
Sulfur (forte) S [Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel; Brennen und Jucken der Haut und Schleimhaut]
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis, Ovarium suis, Salpinx uteri suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Krebserkrankungen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Selbstverständlich muss eine intensive Diagnostik zur genauen Diagnosestellung erfolgen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die antihomotoxische Therapie ist bei Krebserkrankungen als adjuvante Methode zu sehen. Erste Priorität haben die allgemein anerkannten onkologischen Standards.
  Die nachfolgenden Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise zu einer antihomotoxischen Standardtherapie geben. In jedem Fall ist es sinnvoll, ein auf den Patienten individuell abgestimmtes Behandlungsprogramm zusammenzustellen. Wir empfehlen in diesem Fall eine Kontaktaufnahme mit den Ärzten der Therapie-Hotline: (0 72 21) 5 01-1 11.
  Auf folgende Grundprinzipien der Therapie möchten wir hinweisen:
  1. Ausschaltung der weiteren Homotoxinzufuhr (Vollwerternährung, Alkohol- und Nikotinverbot).
  2. Vorsichtige Reiztherapie mit rückführenden und bindegewebsentschlackenden Präparaten.
  3. Anregung der blockierten Fermentfunktionen und Aufbesserung der Atmungsfermente.
  4. Anregung der Depolymerisation.
  5. Regulation entzündlicher Prozesse.
  6. Zur Stimulation der körpereigenen Abwehr.

Basistherapie
Orale Therapie:
Ausleitungs- und Entgiftungstherapie:
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Hepar compositum N [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Coenzyme compositum Ampullen [Biokatalysatorenpräparat zur Anregung des Zellstoffwechsels, bei Therapieblockaden und chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen [Biokatalysatorenpräparat zur Anregung des Zellstoffwechsels, bei Therapieblockaden und chronischen Erkrankungen]
Glyoxal compositum (seltene Gaben) [Biokatalysatorenpräparat zur Anregung des Zellstoffwechsels, bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [bei Bronchialkarzinomen]
Causticum compositum (Tropf., Amp.)
[zur Therapie von Strahlenschäden]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[bei Pankreas- und Colonkarzinomen]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Bronchialkarzinomen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei: Fieber und Entzündungen, (Pocken-) Impf-Enzephalitis, Grippe, Angina, Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen, Fokaltoxikosen, Gingivitis, Stomatitis, Sinusitis, Gastroenteritis, Enterocolitis, Zystitis, Pyelitis, Kolpitis, Glomerulonephritis, Fisteleiterungen, Osteomyelitis, Otitis media, chronischem Hirnabszess, Meningitis, Milzbrand, Karbunkel, Mononukleose, Hautkrankheiten, Mastitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [Erkältungskrankheiten und grippale Infekte]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
Euphorbium comp. Nasentropfen SN (Dosierspray)
[bei chronisch viralen Erkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[Zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Molybdän compositum (Tabl.)
[Regulierung des Mineral-Gleichgewichts]
Mucosa compositum (Amp.)
[zur Behandlung der Schleimhäute allgemein]
Procainum compositum (Amp.) [Stützung der Abwehrsysteme, insbesondere des Sympathikus und des Hypophysenvorderlappen-Nebennierenrinden-Systems. Revitalisierung bei zellulären Phasen jeder Art, Präkanzerose]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Blasen- und Prostataerkrankungen]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[zur allgemeinen Bindegewebsentgiftung und Reaktivierung]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp., Salbe)
[zur lokalen Therapie der chemotherapieinduzierten Mucositis]
Dosierung: bis zu 5 Amp./Tag oral]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Colonkarzinomen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Carcinoma bronchium, Carcinoma coli, Carcinoma hepatis, Carcinoma hepatis metastatis, Carcinoma laryngis, Carcinoma mammae, Carcinoma uteri, Cirrhosis hepatis-Nosode, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Diverticulose-Nosode, Gastritis-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Myoma uteri, Ovarialcyste, Ulcus ventriculi-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele:
der vom Karzinom betroffenen Organe
Begleittherapie
Karzinompatienten benötigen regelmäßig und hochdosierte Behandlungen mit den Biokatalysatoren Coenzyme compositum Ampullen und Ubichinon compositum Ampullen, 1 bis 2 wöchentlich, initial auch häufiger bzw. Gabe der Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus, auch als Infusion mit allen 10 Ampullen 1 bis 2 x wöchentlich.
Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin C hochdosiert, Selen, Vitamin E, Vitamin A oder b-Carotin, Spurenelemente
Enzymtherapie, z.B. mit Wobe-Mugos
Thymustherapie, Misteltherapie
Bei den Karzinompatienten ist eine bioelektronische Diagnostik und Therapie mit den ausgetesteten Präparaten zu empfehlen.

Laryngitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Krupp, Pseudokrupp, Karzinom, Tbc,
  Laryngitis subglottica, Glottisödem,
  Reinke-Ödem (= subepitheliales, oft allergisches, meist beiderseitiges Ödem der Stimmbänder), bes. bei Rauchern und Rednern.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Laryngitis acuta (viral oder bakteriell) meist schmerzhaft;
  Laryngitis chronica (SMOG, Tabakrauch, trockene Luft) meist schmerzlos! Cave: Larynxkarzinom!
  HNO-ärztliche Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Phosphor-Homaccord (Tropf.) [Heiserkeit, Laryngitis, Pharyngitis, Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte im Anfangsstadium]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme einschl. Glottisödeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. auch Rötung und Schwellung des Kehlkopfes]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronischer Raucherhusten oft verbunden mit Kehlkopfkatarrh und Tracheitis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen (besonders indiziert bei bakteriellen Laryngitiden)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen: besonders indiziert bei viralen Laryngitiden)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen: bes. bei Laryngitis chronica indiziert!]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Laryngitis bei Grippe und grippalen Infekten sowie bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten]
Husteel (Tropf.)
[bei heftigem Reizhusten; z.B. bei Erkältungskrankheiten; laryngealer Husten]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus – d.h. Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Bereich der oberen (und unteren) Luftwege]
Tartephedreel N (Tropf.)
[„absteigende" Katarrhe der Atemwege; d.h. schneller Übergang einer Laryngitis in eine Bronchitis]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [chronische Laryngitis und chronische Heiserkeit mit „Splitterschmerz"]
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel; schmerzlose Heiserkeit]
Jodum [Glottiskrampf, Krupphusten]
Manganum aceticum [chronisch rezidivierende Laryngitiden mit Heiserkeit und quälendem Husten]
Phosphorus S [schmerzhafte Heiserkeit]
Spongia
[Räusperzwang; bellender, trockener kruppartiger Husten]

Nosoden-Injeele:
Polypus laryngis, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode, Tuberculinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Larynx suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Spülungen, Gurgeln
Neuraltherapie: Nervus maxillaris, Ganglion sphenopalatinum
Weitere Verfahren: Akupunktur, ggf. Rede- und Singverbot

Lebererkrankungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung der Ursache und Art!
  (Tropf.)-Präparate enthalten Alkohol, entsprechende Präparate sind bei Leberschäden besser als Trinkampullen einzusetzen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Parenterale Therapie:
Hepeel [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Hepar compositum N
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]

Symptomenbezogene Therapie
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[Oberbauch-Syndrom; Pankreopathie]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Hepatitis acuta et chronica, Leberschädigung (Parenchymschäden); ggf. mit Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen, gestörten Drüsenfunktionen, bei degenerativen Erkrankungen (zellulären Phasen)]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern); Meteorismus, Pfortaderstauung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [fettige Degeneration der Leber; Schwäche, Abmagerung, Hinfälligkeit, Durchfälle]
Chelidonium [Leber-Galle-Mittel; acholische Stühle]
Cynara scolymus
[Leberentgiftungsmittel; Anregung der Diurese]
Dolichos pruriens [Pruritus hepaticus]
Insektizid (Parathion) [Leberschäden nach Spritzmitteln]
Lycopodium S
[chronische Hepatopathie, Trommelbauch (Meteorismus)]
Natrium sulfuricum [chronische Hepatopathie, Meteorismus, hepatogene Durchfälle]
Phosphorus S [Hepatitis und sonstige Leberparenchymschäden mit Leberschwellung]
Taraxacum [Hepatopathie mit und ohne Ikterus; Anorexie, Flatulenz, Pfortaderstauung]

Nosoden-Injeele: **Bacterium coli, Carcinoma hepatis, Carcinoma hepatis metastatis, Cirrhosis hepatis-Nosode, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus**

Intermediäre Katalysatoren:
Cystein [besonders bei Therapieschäden],
Histamin [bei allergischen Erkrankungen sowie bei Gastritis und Duodenitis mit und ohne Ulkus (hepatogene Ulzera!)]
Hydrochinon [bei toxischen Belastungen des Leberparenchyms], Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Ernährungstherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Leberzirrhose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tuberkulose, Bauchfellkarzinose, Stauungszirrhose (Cirrhose cardiaque; chronische Rechtsherzinsuffizienz, Einflussstauungen)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufigste Ursachen: Alkoholabusus, Medikamentenabusus, posthepatitisch, biliär (Cholestase).
  Tropfen-Präparate enthalten Alkohol. Diese Präparate sind bei Leberschäden besser in Form der Trinkampullen-Medikation einzusetzen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]

L

Parenterale Therapie:
Hepeel [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Injeel-Chol [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen]
Symptomenbezogene Therapie
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[beim Oberbauchsyndrom sowie ferner bei Pankreopathien (Milzschwellungen)]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden); Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Stoffwechselverbesserung; chronische Leberaffektionen mit Stauungssymptomen wie Pfortaderstauung]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[petechiale Blutungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel; Übelkeit, Pruritus]
Arsenicum album S [Kachexie, Unruhe, Pruritus]
Chelidonium
[Leber- und Gallenblasen-Affektionen; graufarbige Kittstühle]
Cynara scolymus [Leberentgiftung]
Natrium sulfuricum [Leber- und Galle-Mittel]
Nux vomica S [Magen-Darm-Leber-Mittel]
Phosphorus S [Leberschäden (Parenchymmittel)]
Taraxacum [Hepatopathien mit und ohne Ikterus; Meteorismus, Flatulenz; Pfortaderstauungen]
Nosoden-Injeele:
Cirrhosis hepatis-Nosode, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (forte) und **D200** Einzelpotenz
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Eiweißbilanzierte Ernährung, Alkoholkarenz, Fettreduktion
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Oberer Grenzstrang, rechter Rippenbogen, Plexus solaris
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, HOT, Ammoniakbinder (bei portokavaler Enzephalopathie)

Leukämie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen, Verlaufsformen und Arten von Leukämie.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung! Kontrolluntersuchungen! Biotherapeutika-Antihomotoxika als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Drüsenschwellungen, Infektanfälligkeit]
Hepeel (Tabl.) [Anregung der Leberentgiftung]
Molybdän compositum (Tabl.) [zur Regulierung des Mineralgleichgewichts
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Drüsenschwellungen, Infektanfälligkeit]
Hepar compositum N [Anregung der Leberentgiftung]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders auch bei Viruserkrankungen (virusinduzierte Leukämien; onkogene Viren)]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, besonders auch bei Präkanzerosen, Karzinomen und Sarkomen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
China S [bei Erschöpfungszuständen, Schwäche und Appetitlosigkeit; Blutungsneigung]
Lachesis S [gestörte Leukozytenabwehr, Blutungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosode, Pyodermie-Nosode, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum succinicum, Cystein, Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Splen suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Onkologische Behandlung

Lichen ruber planus

Basistherapie
Orale Therapie:
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Hepeel [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Cutis compositum N (Amp.)
[Hautfunktionstherapeutikum bei Therapieresistenz oder schleppendem Verlauf]
Engystol (Tabl., Amp.) [Umstimmungsmittel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Zwischenmittel], **Cinnabaris** [Papeln mit übelriechendem Sekret], **Sulfur S** [Zwischenmittel]
Katalysatoren-Injeele:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Ernährungsumstellung
Mikrobiologische Therapie
Körperpflege!
Weitere Verfahren: Heilerdeumschläge

Lichtdermatosen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Bei jeder Lichtdermatose ist eine eingehende Arzneimittelanamnese erforderlich (photoallergische bzw. phototoxische Reaktionen!).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis und Dermatosen sowie bei Allergie und Quincke'schem Ödem, und zwar nach Abklingen der akuten Erscheinungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie zur Anregung der Leberzellfunktionen, u.a. auch bei Dermatitis, Dermatosen, Neurodermitis, Lupus erythematodes sowie auch bei toxischen Exanthemen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S
[Ekzeme (bes. vesikulöse und pustulöse), Pruritus]
Antimonium crudum [verschiedene Dermatosen; Pruritus]
Apis S [ödematöse und urtikarielle Schwellungen; auch bei Sonnenbrand]
Belladonna S [erysipeloide Dermatosen]
Cantharis [bullöse und pemphiginöse Dermatitis mit Brennschmerz]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: UVA/UVB dosiert
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Lumbago („Hexenschuss")

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Bandscheibenprolaps und sonstige LWS-Affektionen bzw. Osteopathien (Instabilitas intervertebralis), intraabdominelle Erkrankungen bzw. Tumoren, Entzündung
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Sorgfältige diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen, Akroparästhesien]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung – und zwar Verschlimmerung vor und bei Nasswetter]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Lumbago und Ischialgie]
Aesculus [Beschwerden in der Kreuzbein-Region (Lumbosakralschmerzen); Parästhesien]
Calcium fluoratum [Lumbago bei exostotischen LWS-Veränderungen; Startschmerz = Anlaufschmerz]
Gnaphalium polycephalum [Lumbo-Ischialgie mit Parästhesien, Taubheitsgefühl und Stichen]
Ledum [Lumbago mit schmerzhaften Muskelverspannungen]
Rhus Tox S [Ischiasneuralgien und Lumbago; typisch: Startschmerz = Anlaufschmerz!]
Suis-Organpräparate Injeele: **Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Musculus suis, Os suis**
Begleittherapie
Ernährung:
Purinarme Kost; bei Adipositas Gewichtsreduktion
Physikalische Therapie: Stangerbäder, Fangopackungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: LWS-Quaddeln, unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Manuelle Therapie, Krankengymnastik

Lupus erythematodes

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lymphomyosot N [Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.)
[Ekzeme, Erytheme, Hyperkeratosen sowie Rhagaden und Hyperhidrosis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]

Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen, u.a. indiziert bei toxischen Exanthemen sowie bei Lupus erythematodes]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (lupoide Hepatitis]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aurum [lupöse Veränderungen]
Lachesis S
[Entzündungen mit düsterroter bzw. blauroter Verfärbung]
Silicea [Bindegewebsmittel]
Nosoden-Injeele:
Bacillinum, Bacterium coli, Bacterium proteus, Medorrhinum, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Tuberculinum
Homöopathisierte Allopathika Injeele
bei medikamenteninduziertem Lupus erythematodes (Anamnese!): Doxycyclin, Penicillin, Tetracyclin-Injeele forte
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, HOT, Symbioselenkung

Lymphangitis, Lymphadenitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungszustände sowie pustulöse und bullöse Ekzeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. bei Abszessen, Phlegmonen und Furunkeln]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenum jodatum [skrofulöse Drüsenschwellungen]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: pastös-lymphatische Pykniker, exsudative Diathese]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen]
Lachesis S [bei Neigung zu septischen Prozessen; bläulichrote Schwellungen]
Phytolacca S [bei Entzündungen und Entzündungsneigung, bes. auch peritonsillär]
Nosoden-Injeele: **Tuberculinum**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Glandula lymphatica suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Lymphatismus

= Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe („Drüsenschwellungen“), Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit (exsudative Diathese)

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, lymphatische Diathese]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Tonsilla compositum N Ampullen
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei (geistigen) Entwicklungsstörungen der Kinder]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, z.B. bei Angina tonsillaris, Furunkulose, Abszessen, Phlegmonen]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp., Nasentropfen)
[Rhinitis und Sinusitis; Sinubronchiales Syndrom; ggf. mit Hilusdrüsenschwellungen sowie ferner Tubenkatarrhe des Ohres; ggf. Mittelohrhydrops]
Hepeel (Tropf., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen, u.a. auch bei Pyodermien sowie juckenden Ekzemen und anderen Dermatosen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenum jodatum [skrofulöse Drüsenschwellungen]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus und exsudativer Diathese (bes. im Kindesalter)]
Calcium fluoratum
[bei Drüsenschwellungen mit Indurationen/Verhärtungen]
Calcium phosphoricum [skrofulöse „Hilusdrüsenkinder“]
Dulcamara S
[„Nasswettermittel“, „hydrogenoide Konstitution“ (Grauvogl)]
Natrium muriaticum [chronische Drüsenaffektionen]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Bacterium lactis aerogenes, Otitis media-Nosode, Polypus nasalis, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Sinusitis-Nosode, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Glandula lymphatica suis, Tonsilla pharyngica suis, Tonsilla suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie, abhärtende Maßnahmen bei der stets vorhandenen großen Infektanfälligkeit

Lymphödem

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Primäres und sekundäres Lymphödem, lymphostatisches Ödem (Insuffizienz der Lymphgefäße) oder lymphodynamisches Ödem (Erhöhung der lymphpflichtigen Last), sekundäres Ödem nach Erysipel, nach Exstirpation oder Bestrahlung von Lymphknoten bei Tumorerkrankungen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
Eine besondere pathogenetische Bedeutung kommt den im Bereich der Endstrombahn filtrierten Eiweißstoffen zu, die ausschließlich auf dem Lymphwege abtransportiert werden können. Sie verhindern eine einfache Resorption und Ausschwemmung der Ödemflüssigkeit und induzieren möglicherweise eine interstitielle Fibrose. Unbehandelt kann das Lymphödem deshalb zu einer fortschreitenden Zunahme und Verhärtung des Ödems führen. Der Einsatz von Diuretika ausschließlich ist aus diesem Grunde nicht zu empfehlen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.)
[bei exsudativer Diathese]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[bei peripheren Durchblutungsstörungen]
Cutis compositum N (Amp.)
[bei ödembedingten Dermatitiden, Dermatosen, Elephantiasis]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[bei Entzündungen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[zur Unterstützung der Leberentgiftung]
Tonsilla compositum N Ampullen
[zur Stimulation des Lymphapparates allgemein]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[bei postoperativen und posttraumatischen Ödemen und Weichteilschwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus
Calcium phosphoricum
[Konstitutionsmittel bei Lymphatismus]
Cistus canadensis [Entzündung der Lymphdrüsen]
Hepar sulfuris
[Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute, zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Lymphdrüsenentzündungen]
Silicea [chronische Entzündungen der Lymphdrüsen]
Spongia [Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie Lymphdrüsen]
Sulfur jodatum
[Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie Lymphdrüsen]
Nosoden-Injeele:
Appendicitis-Nosode [chronische Lymphdrüsenschwellungen], **Osteomyelitis-Nosode, Sutoxol**
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Tonsilla pharyngica suis, Tonsilla suis

Begleittherapie
Therapie der Wahl ist die mechanische Entstauung (komplexe mechanische Entstauungstherapie nach Prof. Földi, therapeutische Lymphdrainage nach Asdong und Bartezko)
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen und Bewegung
evtl. kurzfristige entwässernde Therapie mit Brennesseltee oder Spargelpräparaten

Masern

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Ausschluss anderer mit Exanthemen einhergehenden Infektionskrankheiten.
- **BESONDERE HINWEISE:**
Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium) oft verbunden mit Unruhe, Husten; ferner Fieber vor Ausbruch des Exanthems]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen; zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen mit den Symptomen Rubor, Calor, Dolor, Tumor]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Bronchiolitis und spastische/asthmatoide Bronchitis]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Otitis media, (Mittelohrentzündung relativ häufig bei Masern!) sowie bei Enzephalitis]
Oculoheel (Tabl.) [Konjunktivitis, Blepharitis, Lichtscheu]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S
[Fieberzustände mit hochrotem Gesicht und heißen dampfenden Schweißen; Neigung zu deliranten Zuständen]
Bryonia S
[Kopfschmerzen, Reizhusten, pleuritische Symptomatik]
Pulsatilla S [Konjunktivitis, Blepharitis, Rhinitis, Otitis media]
Zincum metallicum [zerebrale Reizzustände, Unruhe]
Zincum valerianicum [motorische Unruhe, Nervosität]
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Heiße Bäder; cave kalte Wadenwickel (und andere fiebersenkende Maßnahmen) vor Ausbruch des Exanthems: Gefahr von „nach innen geschlagenen Masern“!

Mastitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung!
Ggf. Antibiotika und chirurgischer Eingriff

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Bryaconeel (Tabl.) [neuralgiforme Schmerzen]
Cruroheel S (Tabl.)
[Fisteleiterungen (häufig bei Mastitis phlegmonosa]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Drüsenschwellungen, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht: Mastitis adolescentium (prae- bzw. parapubertär) und Mastitis chronica älterer Frauen (z.B. im Klimakterium) sowie ferner Mastodynie]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S
[Wöchnerinnen-Mastitis, bes. als Folge von Milchstauung]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen, Phlegmone-Tendenz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[eitrige, ätzende scharfe Absonderungen]
Myristica sebifera
[fördert Einschmelzung, „homöopathisches Messer"]
Phytolacca S [bei subakuten und chronischen Entzündungen; „Brust schwer wie Stein" (Milchstauung)]
Silicea [Konstitutionsmittel; dünnflüssiger wässriger Eiter; Neigung zur Chronizität]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Quark-Umschläge
Neuraltherapie: Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Lymphdrainage

Mastopathie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Mastodynie, Zysten, Neoplasma (Mammakarzinom), Hormonstörungen (z.B. prämenstruell und beim männlichen Geschlecht als Pubertätsmakromastie bzw. als Gynäkomastie)

Basistherapie
Orale Therapie:
Cimicifuga-Homaccord (Tropf.) [Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Parenterale Therapie:
Cimicifuga-Homaccord [Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Ovarium compositum [Dysmenorrhoe, entzündliche und degenerative Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Bryaconeel (Tabl.)
[stechende neuralgische Schmerzen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Interkostalneuralgien]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht; deshalb u.a. indiziert bei Pubertätsmakromastie bzw. bei Gynäkomastie (Ursache: Überwiegen von Östrogenen gegenüber der Testosteron-Konzentration!)]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen (z.B. auch bei Adipositas indiziert); ferner Präkanzerosen (viele Mastopathieformen sind Präkanzerosen!)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [bei Schwellungen]
Bryonia S [heftige Stiche beim Atmen]
Cimicifuga S [Hypophysenunterfunktion; „Frauenmittel"; prämenstruelle Verschlimmerung]
Conium S [Verhärtungen und Knoten („hart wie Stein")]
Hydrastis [Drüsenmittel; Mammaverhärtungen]
Lachesis S [bei ödematösen Prozessen sowie im Klimakterium]
Phytolacca S [bei Milchstauung („Brüste schwer wie Stein") sowie bei Brustknoten]
Scrophularia nodosa [Entzündungen und Schwellungen der Mammae sowie Brustknoten]
Nosoden-Injeele: **Adenoma mammae, Mastopathia cystica-Nosode, Medorrhinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Hypophysis suis, Mamma suis, Ovarium suis, Placenta suis, Testis suis [beim männl. Geschlecht]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Gynäkologischer Raum, Frankenhäuser-Ganglien, Cubitalvene im Wechsel, zirkulär um die Brustdrüse

Menièrescher Symptomenkomplex

- **BESONDERE HINWEISE:**
HNO-ärztliche und neurologische Abklärung!
Ausschluss eines Kleinhirnbrückenwinkel-Tumors bzw. eines Akustikusneurinoms!

Basistherapie
Orale Therapie:
Vertigoheel (Tropf., Tabl.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Parenterale Therapie:
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei arteriosklerotischen und postkommotionellen zerebralen Durchblutungsstörungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Neigung zur Ödembildung (endolymphatischer Hydrops bzw. Labyrinthhydrops beim Menière) und zur Infektanfälligkeit]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Arteriosklerose und Diabetes mellitus sowie bei apoplektischen Zuständen und bei Innenohrschwerhörigkeit]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Hydrops des Labyrinthes]
Conium S [Schwindel, insbesondere Drehschwindel]
Gelsemium S [Schwindel, Benommenheit, Sehstörungen]
Glonoinum [zerebrales Erbrechen, Kopfschmerzen und Stenokardie]
Secale cornutum [Gefäßkrisen, Erbrechen]
Tabacum [angiospastische Zustände, Nausea, Herzangst und Ohrensausen]

Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Os petrosum suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie:
Ganglion stellatum; **Vertigoheel** und **Lymphomyosot N** beiderseits am Mastoid
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Symbioselenkung, manuelle Therapie; Vermeidung von Nikotin, Kaffee, Alkohol

Menorrhagie, Metrorrhagie

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung; insbesondere Neoplasma-Ausschluss!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.) [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Parenterale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen, u.a. auch bei Endometritis mit Gebärmutterblutungen]
Gynäcoheel N (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis = Oophoritis und Salpingitis), Endometritis und Para-Myometritis sowie Kolpitis]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Menorrhagien und Metrorrhagien bes. bei venöser Stase]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität]
Lamioflur (Tropf.) [Schleimhauterkrankungen, u.a. Fluor albus]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen bei Dysmenorrhoe sowie bei Endometritis, Metritis, Parametritis und im Klimakterium; ggf. verbunden mit Uterusblutungen]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S
[hellrote Gebärmutterblutungen bei Metritis und Parametritis]
Crotalus [bes. auch klimakterische Uterusblutungen]
Hamamelis [Menorrhagien; Dysmenorrhoe]
Hydrastis [Menorrhagien und Metrorrhagien, bes. auch Myomblutungen]
Ipecacuanha [hellrote Uterusblutungen]
Sabina [Abortus imminens; Blutungen post abortum bzw. post partum]
Vipera berus [Blutungen aus Körperöffnungen]
Nosoden-Injeele:
Myoma uteri, Trichomonaden-Fluor, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung

Meteorismus

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Erigotheel [Ulcus ventriculi et duodeni]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Duodenoheel (Tabl.) [Blähsucht bei Hyperazidität sowie bei Duodenitis ohne und mit Ulkus]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden: Blähsucht bei Hepatitis und anderen Lebererkrankungen incl. Cirrhosis hepatis]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern), – oft verbunden mit Meteorismus (Blähbauch) – sowie bei Pfortaderstauung = portale Hypertension (häufig bei Cirrhosis hepatis]
Momordica compositum N (Amp.)
[Affektionen der Bauchspeicheldrüse verbunden mit Oberbauchbeschwerden]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis und Kollapszustände]
Ypsiloheel N (Tabl.) [Meteorismus bei vegetativer Dystonie, ggf. verbunden mit Globusgefühl]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [Blähbauch und gastrokardialer Symptomenkomplex verbunden mit Globusgefühl und Singultus; meist nächtliche Verschlimmerung]
Carbo vegetabilis [bei schwerstem Meteorismus mit Kollapszuständen und Dyspnoe]
Chamomilla [Dyspepsie mit Meteorismus]
Lycopodium S
[Hepatopathie mit Obstipation und Meteorismus]
Mandragora e radice siccato [Völlegefühl und Blähungen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus, Gastritis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Wärme, Kolonmassagen

Metritis, Parametritis

- **HINWEIS:**
Adjuvante Theapie, evtl. Schwangerschaftsdiagnostik.

Basistherapie
Orale Therapie:
Gynäcoheel N (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Spascupreel (Tabl.) [bei Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, u.a. auch des Uterus; deshalb auch indiziert bei Parametropathia spastica = Pelvic congestion]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei ödematösen Schwellungen (ggf. verbunden mit stechenden, brennenden Schmerzen)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei allen lokalisierten Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]

Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.) [funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums; deshalb indiziert bei hormonellen Dysfunktionen, z.B. auch bei Dysmenorrhoe]
Lamioflur (Tropf.) [bei Fluor albus]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht: außer bei Endometritis, Metritis und Parametritis auch indiziert im Klimakterium sowie bei Menorrhagien und Kraurosis vulvae]
Spascupreel (Amp.) **Spascupreel S** (Supp.) [bei Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, u.a. auch des Uterus; deshalb auch indiziert bei Parametropathia spastica = Pelvic congestion]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [schmerzhaftes Ziehen im Unterleib – auch bei Zwischenschmerz]
Aurum jodatum [gynäkologische Affektionen, z.B. auch Myome und Ovarialzysten]
Cuprum [Dysmenorrhoe bei (Para)Metritis]
Lachesis S
[bei Metritis, Salpingitis, Oophoritis mit Dysmenorrhoe]
Lilium tigrinum [Uterussenkung, Dysmenorrhoe]
Sepia [Entzündungen des Uterus (mit Senkungsbeschwerden) und der Adnexe]
Thuja S [Metritis polyposa, Fluor albus, Dysmenorrhoe]

Nosoden-Injeele:
Fluor albus-Nosode, Psorinum, Trichomonaden-Fluor, Tuberculinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Salpinx uteri suis, Uterus suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, physikalische Therapie

Migräne

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen (u.a. Fokaltoxikosen), Arten und Verlaufsformen der Migräne incl. Migraine rouge (Horton-Syndrom = Histamin-Kopfschmerz bzw. „Männer-Migräne“).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Cervicalmigräne, Gefäßkopfschmerz]
Parenterale Therapie:
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord [Cervicalmigräne, Gefäßkopfschmerz]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen (verbunden mit Hyperämie: Migraine rouge!)]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen; deshalb indiziert bei digestiver Migräne]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [Osteochondrose, -besonders der HWS: Migraine cervicale, Hinterhauptschmerz]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Zervikalsyndrom sowie Zervikalmigräne mit Hinterhauptschmerzen und Ausstrahlung zu den Augen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, chronische Hepatitiden, Leberfunktionsstörungen: Migräne bei Gallen- und Leberaffektionen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Genussmittel (Nikotin, Alkohol, Kaffee)- bzw. digestive Migräne]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht, u.a. auch im Klimakterium und bei Dysmenorrhoe: „gynäkologische“ Migräne]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[Schwindel verschiedener Genese]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel; bei „allergischer Migräne“]
Belladonna S [bei zerebralen Reizzuständen]
Bryonia S [berstende Kopfschmerzen]
Cimicifuga S [„klimakterische“ Migräne]
Coffea [Schlaflosigkeit, „nervöse“ Migräne]
Gelsemium S [Schmerzen im Hinterkopf und Auge]
Iris [„Sonntagsmigräne“ mit anhaltendem, massiven, sauren Erbrechen]
Natrium muriaticum [chronische klopfende Kopfschmerzen und Migräne; neurasthenische Typen]
Sanguinaria [„klimakterische“ Migräne]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Schwäche- und Erschöpfungszuständen sowie Depressionen]

Nosoden-Injeele:
Appendicitis-Nosode, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosode, Mastoiditis-Nosode, Medorrhinum, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Sinusitis-Nosode

Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (hohe Potenzen) [bei Migraine rouge],
Serotonin [bei Migraine rouge],
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Discus intervertebralis suis, Hepar suis, Ovarium suis, Vena suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum, Mandelpol, Zähne
Weitere Verfahren: Akupunktur, Fokalherdsuche, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Milchschorf (Crusta lactea)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Der Milchschorf ist eine frühkindliche Manifestation bzw. Lokalisation einer Neurodermitis atopica.

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
(eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]

Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Traumeel S (Salbe) (lokale Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.)
[Ekzeme, Hyperhidrosis, Intertrigo, Hyperkeratosen]
Calcoheel (Tabl.)
[exsudative Diathese, Lymphatismus]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Drüsenschwellungen]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzeme und Dermatosen. Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel; exsudative Diathese, pastös-lymphatische Kinder; Kopfschweiße]
Graphites [Hautschuppen, trockene Ekzeme, Adipositas]
Silicea [Konstitutionsmittel: exsudative und skrofulöse Kinder]
Viola tricolor [Milchschorf, exsudative Diathese, Lymphatismus, skrofulöse Ekzeme]
Nosoden-Injeele: **Psorinum, Vaccininum**
Intermediäre Katalysatoren:
Chinhydron [nässende und trockene Ekzeme; Elefantenhaut (Pseudo-Ichthyose), Pruritus]
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**
Begleittherapie
Ernährung: Allergenfreie Kost (insbesondere keine Kuhmilch!)
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Mononukleose, infektiöse

(Monozyten-Angina/Pfeiffer-Drüsenfieber)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Angina tonsillaris, Angina Plaut-Vincent, Diphtherie, Leukämie, Tbc, Lymphom, Arzneimittelallergie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Serologische Abklärung!
  EBV (Epstein-Barr-Virus)-Antikörper!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
(eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Angin-Heel SD (Tabl.) [Angina tonsillaris, Tonsillarpfröpfe]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungszustände, zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen (z.B. Angina tonsillaris): Rubor-, Tumor-, Calor-, Dolor-Symptome]
Bryaconeel (Tabl.) [Fieber, rheumatische Neuralgien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber (febrile Verlaufsform häufig bei Kindern!) und Entzündungen, u.a. auch bei Angina tonsillaris (anginöse Verlaufsform [Monozyten-Angina] häufig bei Erwachsenen), Mononukleose und meningitischen Reizzuständen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen („Pfeiffer-Hepatitis“) sowie bei toxischen Exanthemen (exanthematische Zustände bei Mononucleosis infectiosa nicht allzu selten!); zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden: „Pfeiffer-Hepatitis“]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr u.a. auch bei Lymphatismus, postenzephalitischen Residuen (Meningoenzephalitis als Komplikation bei infektiöser Mononukleose!)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [akute Infektionen mit Zerschlagenheitsgefühl und Benommenheit]
Belladonna S [zerebrale und meningeale Reizzustände („Pfeiffer-Meningitis“)]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [akute und chronische Entzündungen des gesamten lymphatischen Apparates]
Vincetoxicum [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Viruserkrankungen sowie Lymphadenitis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula lymphatica suis, Hepar suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: 3. Mandelpol

Multiple Sklerose (Sclerosis multiplex)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aletris-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen; MS als fragliche Virusinfektion [Slow virus])]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen; MS als fragliche Virusinfektion [Slow virus])]
Euphorbium comp. SN [Virusbelastungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[neuralgische Schmerzen bei MS!]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Anregung von Entgiftungsmechanismus]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich]
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Solidago compositum SN [Anregung der Nierenausscheidung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege), Spastizität der quergestreiften Muskulatur (muskulärer Hartspann, Myogelosen]

Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel; neuralgische Schmerzen]
Argentum nitricum
[Unruhe, Schwindel, Tremor, lanzinierende Schmerzen]
Causticum S [Lähmung von Blase und Mastdarm sowie der Gesichtsnerven]
Gelsemium S [Paresen peripherer Nerven incl. der Augenmuskeln, Sprachstörungen]
Lathyrus sativus [Schwäche und spastische Lähmungen (bes. der unteren Extremitäten)]
Manganum aceticum [Muskelschwäche, Zittern]
Plumbum metallicum [Paresen, Muskelatrophie]
Secale cornutum [Parästhesien, polyneuritische Symptomatik, Krampf- und Lähmungszustände der Extremitäten, insbesondere Streckkrämpfe]

Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Pyodermie-Nosode

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus, **Cortison, Ubichinon**

Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum frontalis suis, Cerebrum occipitalis suis, Cerebrum totalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Nervus opticus suis, Sanguis suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Diät nach Evers
Elektroakupunktur nach Voll zur Testung.

Mumps

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave Komplikationen: u.a. Orchitis sowie Pankreatitis. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Bryaconeel (Tabl.) [akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]

Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Pulsatilla compositum [Aktivierung der mesenchymalen Funktionen]

Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. bei Stomatitis (Mumps-Stomatitis!) und Glomerulonephritis (Mumps-Nephritis)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[bei Suppurationen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Rhododendron
[Orchitis, Epididymitis; Hydrozele; rheumatoide und polyneuritische Beschwerden]
Sulfur jodatum
[chronische Tonsillitis und chronische Parotisentzündungen sowie Schwellungen im Bereich der Glandulae submandibulares, submaxillares und lacrimales]

Nosoden-Injeele:
Mumps-Nosode [nach überstandener Krankheit],

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula submandibularis suis, Pankreas suis, Parotis suis, Testis suis

Begleittherapie
Neuraltherapie:
Segmenttherapie, Störfeldsuche

Muskelrheumatismus (extraartikulärer Rheumatismus)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ausschluss einer Fokaltoxikose

Basistherapie
Orale Therapie:
Rheuma-Heel (Tabl.)
[Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie (fokusbedingter Weichteilrheumatismus?)]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtisch-rheumatische Beschwerden]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane bei einer Vielzahl von Durchblutungsstörungen sowie ferner bei Erythema nodosum (häufig Streptokokkeninfekt!) und bei Erythema (exsudativum) multiforme (rheumatoide Beschwerden, Fieber; häufig auch nach Angina und Grippe]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Adipositas sowie bei Myxödem, Sklerodermie, bei Elephantiasis und Induratio penis plastica]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [entzündlicher Weichteilrheumatismus mit Neuralgien und Neuritiden]
Bryonia S [entzündlicher Muskel- und Gelenkrheumatismus]
Colchicum (forte S) [Gelenk- und Muskelrheumatismus mit Herzbeteiligung (Peri-, Myo-, Endokarditis)]
Colocynthis S [stechende Schmerzen mit Taubheitsgefühl und Parästhesien]
Conium S [verschiedene Muskelbeschwerden, wie Muskelkrämpfe und Muskelschwäche sowie Muskelverhärtungen]
Cuprum [Krämpfe in den Muskeln mit Muskelrigidität]

Curare [Lähmungen und Schwächezustände der Muskulatur, bes. nach Überanstrengungen]
Dulcamara S [Muskel- und Gelenkrheumatismus als Folge von Erkältungen bzw. mit Nasswetterverschlimmerung]
Kalium carbonicum (forte N) [Muskelschwäche sowie Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern mit Hyperhidrosis]
Rhododendron [Muskelrheumatismus mit reißenden Schmerzen und motorischer Unruhe]
Rhus Tox S [diffuse rheumatische Schmerzen in Bändern, Sehnen, Muskelansätzen und Muskeln]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Placenta suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Iontophorese
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung

Mykosen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Ekzeme, superinfizierte Ekzeme.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Bei Mykosen muss in allererster Linie das Terrain behandelt werden, da der Organismus an den Stellen des Pilzbefalls jene Sekretionsprodukte liefert, die den Pilzen ein günstiges Wachstum ermöglichen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Hepeel [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]

Symptomenbezogene Therapie
Abropenol N (Tabl.) [ekzematöse Veränderungen]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Pilzflechten an den Füßen]
Cutis compositum N (Amp.) [zur Konstitutionstherapie]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungsmittel]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.) [Regeneration der Sulfidfermente]
Einzelmittel-Injeele:
Natrium muriaticum [Rhagaden, Nageltrichophytie],
Petroleum [nässende Ekzeme],
Sulfur S [Konstitutionsmittel]
Nosoden-Injeele:
Nagelmykose-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis

Begleittherapie
Ernährungsumstellung
Mikrobiologische Therapie
Körperpflege!
Weitere Verfahren: Heilerdeumschläge

Myoma uteri

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasien: Uteruskarzinom (gehäuft auftretend bei Uterusmyomen), Uterussarkom (maligne Entartung eines Myoms)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung, Kontrolluntersuchungen; ggf. OP-Indikation beachten!

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Strumeel forte NF (Tropf.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gynäcoheel N (Tropf.) [entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis = Oophoritis, Salpingitis), Para-Myo-Endometritis, Kolpitis]
Hormeel SN (Tropf., Amp.) [regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus, u.a. auch Dysmenorrhoe; cave: verstärkte Blutungsneigung!]
Lamioflur (Tropf.) [Fluor (albus)]
Ovarium compositum (Amp.) [Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht, u.a. auch bei Dysmenorrhoe, Menorrhagien, Endometritis, Metritis, Parametritis, Kraurosis vulvae und im Klimakterium]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Dysmenorrhoe und bei Endometritis]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, besonders auch bei Präkanzerosen, Karzinomen und Sarkomen]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [ziehende Schmerzen im Unterleib, ödematöse Schwellungszustände]
Aurum jodatum [bei Myomen, bes. im Senium]
Conium S [bei allen Verhärtungen (steinharte Myomknoten)]
Hydrastis [bei Uterusblutungen (Menorrhagien, Metrorrhagien sind häufig bei Uterus myomatosus)]
Ipecacuanha [hellrote, gussweise Gebärmutterblutungen]
Kreosotum [Menorrhagie, Metrorrhagie mit stinkendem Fluor]
Platinum metallicum [bei Myomblutungen mit Dysmenorrhoe; Pruritus vulvae]
Sulfur (forte) S [Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Myoma uteri, Trichomonaden-Fluor
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Placenta suis, Salpinx uteri suis, Uterus suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Gynäkologischer Raum, Frankenhäuser-Raum

Neuralgien / Neuritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neuropathien (z.B. Polyneuropathia diabetica sive alcoholica), Vitaminmangelzustände, para- und postinfektiöse Neuralgien, paraneoplastisches Syndrom, Fokaltoxikose

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.) [akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]

Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien (bes. HWS-bedingte) sowie sonstige neurale Störfelder]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie; Tonsillen als Fokus]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schulter-Arm-Syndrom mit abstrahlenden Neuralgien in die Arme]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kopfneuralgien; Migraine cervicale bzw. Zervikalmigräne und Zervikalsyndrom sowie Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Arteriosklerose (Neuralgia angio- sive arteriosclerotica), Diabetes mellitus und postapoplektischen Residuen]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien; Zosterneurlagien; pleuritische Schmerzen (Interkostalneuralgien sind relativ häufig bei Zoster sowie bei Pleuritis]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[Kopfschmerzen und Kopfneuralgien]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [bes. Trigeminusneuralgie und Ischias]
Bryonia S [stechende Schmerzen bei Muskel- und Gelenkrheumatismus sowie bei Neuralgien im Trigeminus- und im Interkostalgebiet]
Ranunculus bulbosus [Interkostalneuralgien]
Rhododendron
[Trigeminusneuralgie; Verschlimmerung vor Wetterwechsel]
Rhus Tox S [Neuritiden und Neuralgien (incl. Ischias sowie interkostal); „Nasswettermittel"]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Kieferostitis-Nosode, Mastoiditis-Nosode, Osteomyelitis-Nosode, Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamin B-reiche Kost
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Neuraltherapie: Fokalherde, Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, manuelle Therapie

Neurodermitis

- **BESONDERE HINWEISE:**

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Hepar compositum N [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, z.B. bei exsudativer Diathese, Lymphatismus]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Hepatitis acuta und chronica; Stauungsikterus; Leberschädigungen (Parenchymschäden)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit: cave bakterielle Sekundärinfektionen [Pyodermien] bei Neurodermitis!); Drüsenschwellungen]
Schwef-Heel (Tropf.)
[zur Anregung der Abwehrmechanismen; Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [lichenifizierte Dermatosen und Ekzeme]
Berberis aquifolium [Ekzeme, Psoriasis, Pityriasis; Pruritus, bes. am Abend und nachts]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus bzw. exsudativer Diathese, Milchschorf]
Formica rufa [Hautjucken, urtikarielle allergische Exantheme; Umstimmungsmittel]
Galphimia [allergische Hautaffektionen und Rhinitis]
Graphites [trockene, rissige Haut; Seborrhoe; Adipositas]
Natrium muriaticum [ekzematöse und pustulöse Exantheme, Rhagaden, Eczema flexuarum (= neurodermitische Hauptlokalisation im Schulkindesalter!)]
Rhus Tox S [pustulöse und bullöse Hautausschläge mit Brennen und Jucken; Ruhe verschlimmert!]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions- und Reaktionsmittel zur Umstimmung]
Viola tricolor [impetiginöse Ekzeme im Gesicht und an den Ohren; Milchschorf]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium pyocyaneus, Psorinum, Pyodermie-Nosode, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: „Suchkost", allergenfreie Kost
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie, EAP-Testung

Neurosen

(siehe psychische Symptome)

N

Obstipation

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Neoplasma-Ausschluss! Cave: Laxantien-Abusus!

Basistherapie
Orale Therapie:
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Spascupreel S
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Erigotheel (Amp.)
[Verstopfung bei Ulcus ventriculi et duodeni]
Gastricumeel (Tabl.)
[Obstipation bei Gastritis acuta et chronica ohne und mit Ulkus, oft kombiniert mit Sodbrennen sowie mit Meteorismus und gastrokardialem Symptomenkomplex]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen (z.B. Cholangitis, Cholezystitis) sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden – oft verbunden mit Meteorismus, Appetitlosigkeit]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; chronische Hepatitiden; Leberfunktionsstörungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus (z.B. Colitis]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Meteorismus, Pfortaderstauung mit Darmträgheit]
Graphites
[Konstitutionstyp: „träge, gefräßig, verstopft“ (herabgesetzter Grundumsatz); meist atonische Obstipation]
Hydrastis [Meteorismus, atonische Obstipation]
Lycopodium S [Leberleiden mit Meteorismus und Obstipation]
Nux vomica S [spastische Obstipation]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Flatulenz und proktogener Obstipation mit harten Stuhlknollen]
Taraxacum [Hepatopathie mit hartnäckiger Obstipation; oft im Wechsel mit Diarrhoe]
Nosoden-Injeele:
Appendicitis-Nosode, Asthma-Nosode, Bacterium coli, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Coecum suis, Colon suis, Hepar suis, Jejunum suis, Rectum suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Schlacken- und ballaststoffreiche Kost bei vorwiegend atonischer Obstipation;
gut gleitende Kost (Apfelmus, Leinsamensuppe, Butter, Sahne, Eigelb, Olivenöl) bei vorwiegend spastischer Obstipation
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Ödeme (allergische)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Iatrogen, Medikamentenallergie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Anaphylaxie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Aktivierung der mesenchymalen Funktionen]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. auch bei entzündlichen Ödemen mit Calor, Rubor, Tumor, Dolor]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Aktivierung der mesenchymalen Funktionen]
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei Allergien, bes. bei Asthma bronchiale, Urtikaria und Heufieber]
Apis S [Ödeme – auch der Augenlider (Lichtscheu, Chemosis) – mit Hitze, Rötung und Brennen]
Urtica [urtikarielle Exantheme]
Nosoden-Injeele:
Bacterium proteus, Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (höhere Potenzen!),
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Ren suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Antigenfreie Ernährung
Ausleitende Therapie: Aderlass
Neuraltherapie: Mandelpol, Störfeldsuche
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung, Lymphdrainage

Ödeme (kardiale)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sekundärer Hyperaldosteronismus,
  Linksherzinsuffizienz (Lungenödem, Cor pulmonale), Rechtsherzinsuffizienz (periphere Ödeme incl. Aszites), kardiale Leberzirrhose bei Rechtsherzinsuffizienz (Cirrhose cardiaque), Leberzirrhose bei Lebererkrankungen, Pfortaderstauung
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Renale Ödeme, venöse Ödeme. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Cor compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]

Symptomenbezogene Therapie
Angio-Injeel (Amp.)
[pektanginöse Beschwerden, Herzmuskelschwäche, Koronardurchblutungsstörungen]
Aurumheel N Tropfen
[vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Herzrhythmusstörungen, Hypotonie]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Crataegus-Heel S (Tropf.)
[altersbedingte sowie infektiös-toxische Myokardschwäche mit Koronardurchblutungsstörungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung; Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis: Tonsillen ggf. als Foki für infektiös-toxische Herzmuskelschwäche mit konsekutiven kardialen Ödemen]
Solidago compositum SN (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung (= Diuretikum); nephrogene Hypertonie]
Strophanthus compositum (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Carbo vegetabilis [Lungenödem bei Herzmuskelschwäche mit Dyspnoe; nächtliche Verschlimmerung]
Digitalis [herzbedingte Ödeme incl. Stauungsleber und Stauungsgastritis]
Helleborus [Herzschwäche mit Ödemen sowie Stauungsbronchitis und Aszites]
Jaborandi [Lungenödem mit schaumigem Auswurf; Herzklopfen, Tachykardie, Herzangst]
Kalium carbonicum (forte N) [Herzmuskelschwäche mit Ödemneigung, bes. auch der Oberlider]
Strophanthus [Herz-Kreislauf-Dekompensation, Tachykardie]
Nosoden-Injeele: **Streptococcus haemolyticus**
Suis-Organpräparate Injeele: **Arteria suis, Cor suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Bei Übergewicht Gewichtsreduktion; stets NaCl-arme Kost, Safttage, Obsttage, Apfelreistage, Kartoffeltage
Neuraltherapie: Herzpunkte
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie; ggf. Bewegungstraining

Ödeme (renale)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache (Fokalherde!) abklären! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie, akute und chronische Nierenkrankheiten]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände ohne und mit Konkremente (Nephrolithiasis und Gicht: „Gichtniere“ [Uratnephropathie]) im Bereich des Urogenitaltraktes]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.) [konsekutive Myokardschwäche bei Nierenödemen, Hypertonie, Neigung zu Lungenödem]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen (hepatische Ödeme nach Einwirkung hepatotoxischer Substanzen bzw. Hepatonephritis bzw. hepatorenales Syndrom [Heyd] = „Schockniere“ bei schweren Leberstörungen; hepatogene Ödeme, bes. bei Cirrhosis hepatis]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit sowie Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis: Tonsillen ggf. als Foki für Glomerulonephritis mit konsekutiven renalen Ödemen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [teigige blasse Ödeme auch der Augenlider]
Solidago virgaurea [Nephritis/Nephrosen mit hydropischen Zuständen und Albuminurie]
Nosoden-Injeele:
Cystopyelonephritis-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Pyelon suis, Ren suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Flüssigkeitsbeschränkung, NaCl-arm; stets Eiweißbilanzierung
Physikalische Therapie: Lymphdrainage
Neuraltherapie:
Grenzstrang, paravertebrale Quaddelbehandlung

Ösophagitis / Refluxösophagitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hiatushernie, Neoplasma im Kardiabereich, Postgastrektomiesyndrom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung durch Gastroösophagoskopie! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Erigotheel [Ulcus ventriculi et duodeni]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität; Duodenitis, Ulcus duodeni]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gastroenteritis sowie bei Enterocolitis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Schleimhautentzündungen mit Geschwürsneigung (Ösophagitis erosiva bzw. ulcerosa); „Splitterschmerz“]
Belladonna S [entzündliche Prozesse; Singultus]
Iris [brennende Schmerzen, Sodbrennen, saures Erbrechen]
Nosoden-Injeele: **Gastritis-Nosode, Ulcus ventriculi-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele: **Cardia ventriculi suis, Duodenum suis, Mucosa nasalis suis, Oesophagus suis, Ventriculus suis**
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung

Orchitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumor, Tbc, Syphilis, Parotitis epidemica (Mumps), Hodentorsion, Epididymitis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Hodentorsion = Notfallsituation!

Basistherapie
Orale Therapie:
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen, z.B. metastatische Virus-Orchitis [Parotitis epidemica])]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum; allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen, z.B. auch bei Impotentia virilis und Ejaculatio praecox]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aurum jodatum [Adjuvans bei Hoden-Tbc]
Pulsatilla S [Epididymitis und Orchitis]
Spongia
[unspezifische Orchitis und Epididymitis mit Drüsenschwellungen]
Sulfur jodatum
[Resoptionsmittel; Lymphdrüsenschwellungen, Parotitis]
Thuja S
[Konstitutionsmittel; proliferative Prozesse, Chronizität; Abwehrsteigerung]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Medorrhinum, Mumps-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum fumaricum [entzündliche Erkrankungen der männlichen (und weiblichen) Genitalorgane]
Suis-Organpräparate Injeele:
Ductus deferens suis, Parotis suis, Testis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Hochlagerung, Suspensorium

Orthostase-Syndrom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  HVL- bzw. Nebennierenrindeninsuffizienz, kardiovaskuläre Hypotonie, infektiös-toxische Hypotonie, Hypovolämie, orthostatische Dysregulation

Basistherapie
Orale Therapie:
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Parenterale Therapie:
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.)
[Hypotonie als Folge von Herzschwäche]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [bei Herzschwäche, z.B. Folgen von Herzmuskelschädigungen, infektiös-toxische Myokardschwäche, Angina pectoris, Zustand nach Myokardinfarkt]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neigung zu Kollapszuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Herz- und Gefäßwirkung]
Tabacum [Hypotonie mit Schwindelzuständen]
Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Aorta suis, Arteria suis, Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen und sonstige balneologische Verfahren
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sport

Osteochondrose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Bandscheibendegeneration, Bandscheibenprolaps, Lumboischialgien.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Da es im Rahmen der Bandscheibendegeneration auch einmal zu einem akuten Discusprolaps kommen kann, sollte bei jedem akut aufgetretenem Schmerz sorgfältig nach motorischen oder sensiblen Ausfällen gesucht und in jedem Zweifelsfall eine entsprechende Spezialuntersuchung veranlasst werden, da in diesen Fällen oft nur eine Operation eine irreparable Nervenschädigung verhindern kann.

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.) [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Colocynthis-Homaccord (Tropf.) [Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf.) [Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Parenterale Therapie:
China-Homaccord S [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Colocynthis-Homaccord [Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Cimicifuga-Homaccord [Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Symptomenbezogene Therapie
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen im Nacken und in den Schultern]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Beschwerden im Bereich der Brustwirbelsäule, Interkostalneuralgien]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.) [zur Entkrampfung der Muskulatur]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[LWS-Beschwerden, entzündliche Begleiterscheinungen]
Einzelmittel-Injeele:
Ammonium muriaticum [bei Kreuzschmerzen],
Rhododendron [bei Wetterempfindlichkeit]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus
[Gefühl von Vibrieren in der Wirbelsäule beim Liegen und Aufstampfen mit den Füßen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Glandula suprarenalis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Krankengymnastik, Massagen (evtl. mit Traumeel S Salbe) (Entzündungen, Verletzungsfolgen)
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Schröpfkopfmassagen, Kneippsche Therapie
Mikrobiologische Therapie
Eigenbluttherapie inkl. Auto-Sanguis-Stufentherapie

Osteoporose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Osteomalazie und andere Osteopathien sowie Karzinom-metastasen und Bandscheibenerkrankungen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Calcoheel (Tabl.)
[Kalkstoffwechselstörungen, lymphatische Diathese]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Parenterale Therapie:
Ovarium compositum (bei Frauen)
Testis compositum N Ampullen (bei Männern
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.)
[Fisteleiterungen]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel (Tabl.)
[klimakterische Beschwerden]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Interkostalneuralgien; pleuritische Schmerzen]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluoricum S [destruktive Veränderungen in den langen Röhrenknochen sowie der WS]
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel mit Wirkung auf die Knochen: Tendenz zu Rachitis, Osteoporose, Osteomalazie]
Calcium fluoratum [ossale Veränderungen – z.B. auch Exostosen – an der Wirbelsäule und an anderen Knochen]
Calcium phosphoricum
[Konstitutionsmittel („weiche Knochen"); Knochenschmerzen]
Hekla Lava [nekrotische Knochenprozesse; Exostosen]
Manganum aceticum [Knochenschmerzen in der Nacht]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus, **Cortison** [bei allen Knochenentkalkungen], **Guanidin**
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Os suis, Ovarium suis, Testis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Milch- und Käseprodukte
Physikalische Therapie: Bewegungstherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Otitis externa

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist bakteriell, mykotisch oder viral bedingt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Hyperhidrosis, Hyperkeratosen]
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, bei Abszessen und Phlegmonen sowie bei Otitis media und bei Hautkrankheiten sowie Osteomyelitis (Osteomyelitis des Schläfenbeins ist Komplikation bei Otitis externa!)]
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S
[äußerliche und innerliche Entzündungen incl. Furunkulosen]
Borax [bes. bei chronischem Verlauf]
Cinnabaris [übelriechende Sekrete]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Phlegmone-Tendenz (Otitis externa diffusa mit Perichondritis!)]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Neigung zur Chronizität bei Otitis externa (und media)]
Thuja S [chronische proliferative Hautaffektionen]
Nosoden-Injeele:
Adeps suillus (forte S), Otitis media-Nosode, Sinusitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Ductus auricularis externus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Zuckerfreie Ernährung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Quaddeltherapie am Mastoid
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Otitis media, akute

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ggf. adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fistelbildung]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Angina und Grippe sowie bei Otitis media]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe (Grippe-Otitis) und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastös-lymphatischen Pyknikern]
Chamomilla [Otitis media, bes. bei neuropsychopathischen Kindern mit Schmerzüberempfindlichkeit]
Ferrum phosphoricum [bei beginnender akuter Otitis media]
Pulsatilla S [akute und chronische Otitis media; pulsierende stechende Schmerzen]
Thuja S [Neigung zur Chronizität]
Nosoden-Injeele: **Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Mastoiditis-Nosode, Mumps-Nosode, Otitis media-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Physikalische Therapie:
Wärme lokal
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Quaddeltherapie am Mastoid
Weitere Verfahren: Symbioselenkung
Traumeel S Ampullen-Lösung in den Gehörgang instillieren (Entzündungshemmung)

Otitis media, chronische

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Cholesteatom, Mastoiditis, akute Otitis media, Seromukotympanon, Mittelohr-Tbc

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterung]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. (Poly)Sinusitis, Rhinitis acuta et chronica: chronische Mittelohrentzündung bei Rhinitis]
Einzelmittel-Injeele:
Cinnabaris
[Otitis media mit Polysinusitis; übelriechende Sekrete]
Ferrum phosphoricum
[akute Exazerbation einer chronischen Mittelohrentzündung]
Pulsatilla S [akute und chronische Otitiden]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Neigung zur Chronizität einer Otitis media (und externa)]
Thuja S [chronische – proliferative – Folgezustände von Eiterungen und Infektionen]
Nosoden-Injeele: **Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Mastoiditis-Nosode, Mumps-Nosode, Otitis media-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus**
Suis-Organpräparate Injeele: **Ductus auricularis externus suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenkarenz
Physikalische Therapie: Rotlicht
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Störfeldsuche, Zähne, Mandeln, Nebenhöhlen
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, HOT, Symbioselenkung, Fokussanierung; **Traumeel S** Ampullen-Lösung ins Ohr instillieren [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Ozaena

(Rhinitis atrophicans cum foetore; „Stinknase“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Rhinosklerom
Besondere Hinweise:
Ggf. adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Naso-Heel SN (Tropf.)
[chronische und akute Rhinitis mit und ohne Sinusitis]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen: die Ozaena ist (meist) die Folge einer Autoinfektion auf geschädigter Schleimhaut verbunden mit Abwehrschwäche]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [stinkende Sekrete]
Aurum jodatum
[Ozaena mit stinkenden Entzündungen und Verschorfungen]
Kalium bichromicum [Rhinitis chronica et ulcerosa; dick-zähe und fadenziehende Absonderungen]
Luffa operculata [Rhinitis atrophicans; Kopfschmerzen]
Silicea [Konstitutionsmittel, bes. bei genuiner bzw. primärer Ozaena (Gynäkotropie!) indiziert; generell: reaktionsträge schmierende, ätzende und stinkende Absonderungen; ggf. Geruchsüberempfindlichkeit]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Mucosa nasalis suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen und Spülungen
Neuraltherapie: Mandeln, Ganglion sphenopalatinum
Weitere Verfahren: Symbioselenkung; ggf. Operation (Reduktionsplastik)

Panaritium

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Panaritium parunguale (= Paronychie!),
Panaritium (sub)cutaneum, subunguale, periostale, ossale, articulare, tendinosum; Hohlhandphlegmone, Schwielenabszess
- **BESONDERE HINWEISE:**
Cave: Osteomyelitis, Fistelbildung, Mykosis!
Stets Ruhigstellung; ggf. chirurgische Intervention!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen]
Echinacea compositum (forte) SN [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen, Fisteleiterungen sowie bei Hautkrankheiten und Osteomyelitis]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Hautentzündungen, Geschwulstbildung, osteomyelitische Prozesse; Blutungsneigung; „Splitterschmerz“]
Arnica S [generelles Entzündungsmittel; Verschlimmerung durch Bewegung und Erschütterung]
Graphites [chronisches Panaritium incl. chronische Paronychie]
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse; Phlegmone-Tendenz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[bes. bei beginnenden Eiterungen]
Myristica sebifera [Pyodermie; als „homöopathisches Messer“ bei Panaritien, Abszessen]
Silicea [dünnflüssig-wässriger Eiter sowie zur Beendigung der Eiterung]
Staphisagria
[schlecht abklingende Eiterungen; Neigung zu Keloiden]
Sulfur (forte) S [Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Pyodermie-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Pankreatitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Bei akuter Pankreatitis: Mesenterialer Gefäßverschluss, Enteritis, Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, Ulkus-Perforation, Herzinfarkt (Hinterwand), Milzinfarkt, Volvulus, Obturationsileus, rupturiertes Aortenaneurysma, Bleikolik, Trauma.
Bei chronischer Pankreatitis: Pankreaskarzinom, zystische Fibrose (Mukoviszidose).
- **BESONDERE HINWEISE:**
Bei (per)akuter Pankreatitis fehlt oft Bauchdeckenspannung!
Adjuvante Therapie! Trinkampullenmedikation!

Basistherapie
Orale Therapie:
Leptandra compositum (Tropf.) [Oberbauchsyndrom, Leber- und Pankreaserkrankungen]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.) [Oberbauchsyndrom, Pankreaserkrankungen]
Parenterale Therapie:
Momordica compositum N [Oberbauchsyndrom, Entzündungen und Funktionsstörungen des Pankreas]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden), Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Gastricumeel (Tabl.) [Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen; Meteorismus]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Carbo vegetabilis [Meteorismus, Flatulenz sowie Dyspepsie, Foetor ex ore; Speisenunverträglichkeit (Unverträglichkeit von Fett und Milch sowie von Alkohol); Kollapsneigung]
Leptandra [Pankreatitis, Leberaffektionen, Meteorismus; stinkende Stühle]
Podophyllum [Aufstoßen, Erbrechen von galligen Massen, stinkende profuse gussartige Durchfälle („Hydrantenstühle“); Verschlimmerung nach jedem Essen]
Nosoden-Injeele: **Bacterium lactis aerogenes, Mumps-Nosode, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi**
Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Jejunum suis, Pankreas suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Initial Nahrungskarenz (ggf. parenterale Ernährung); nach Abklingen des (per)akuten Stadiums stets fettarm, Vermeidung/Reduzierung von Kaffee und Tee;
Cave: Alkohol!
Neuraltherapie: Oberer Grenzstrang beiderseits, Plexus solaris
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, ggf. Fermentsubstitution

Papillome (der Blase)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung! Rezidivneigung; ggf. Tendenz zur malignen Entartung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Psorinoheel N [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes]

Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Plantago-Homaccord (Tropf.)
[Enuresis nocturna; Incontinentia urinae; Reizblase]
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizblase]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei akuten und chronischen Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis, Zystopyelitis, Enuresis nocturna, sowie bei Incontinentia urinae, 1. Stadium des Prostata-Adenoms, Harnröhrenstrikturen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Cantharis [Zystitis mit starkem Harndrang und brennenden Schmerzen sowie Hämaturie]
Causticum S [Lähmungen der Blase, schmerzhafte brennende Blasenschwäche]
Crotalus [Hämaturie]
Hydrastis [Schleimhautentzündungen mit gelblich-fadenziehenden Absonderungen und Blutungsneigung]
Thuja S [bei allen proliferativen Prozessen wie Papillomen, Polypen, Epitheliomen]
Vipera berus [Hämaturie, Harninkontinenz]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Cystopyelonephritis-Nosode, Medorrhinum, Polypus laryngis

Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus pineale suis, Funiculus umbilicalis suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung (wie bei Zystitis/Zystopyelitis):
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr; laktovegetabile gewürzarme Kost; ggf. „Schaukeldiät“
Weitere Verfahren: Neuraltherapie

Paresen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Neurologische und ätiologische Abklärung: spastische = zentrale Lähmung bzw. schlaffe = periphere Lähmung. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Arteriosklerose, nach Commotio cerebri, bei Neuralgien sowie bei amyotrophischer Lateralsklerose, multipler Sklerose und Parkinsonscher Schüttellähmung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Arteriosklerose und Diabetes mellitus sowie bei postenzephalitischen und postapoplektischen Residuen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Causticum S [Fazialisparese, Lähmungen der Stimmbänder, der Schlingmuskel und Augenlider sowie von Blase und Mastdarm; Schwäche mit Unsicherheit beim Gehen]
Colocynthis S [Ischiasneuralgien; stechende Schmerzen mit spastischen Zuckungszuständen]
Conium S [aufsteigende Lähmungen, Ataxie]
Crotalus [halbseitige Lähmungen mit Schmerzzuständen]
Curare [schlaffe Lähmungen der Muskulatur]
Gelsemium S [Ptosis der Augenlider, Augenmuskellähmungen; (postdiphtherische) Paresen der peripheren Nerven]
Lathyrus sativus [Schwäche und spastische Lähmungen der unteren Extremitäten]
Manganum aceticum
[Rigor der Muskulatur (MS, Parkinsonismus), bes. Beinparesen]
Plumbum metallicum
[Paresen mit Muskelatrophie und Abmagerung]

Intermediäre Katalysatoren:
Naphthochinon [postapoplektische Lähmungen],
Para-Benzochinon [poliomyelitische Lähmungen],

Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus; hieraus bes. indiziert:
Acidum succinicum, Acidum DL-malicum, Acidum α-ketoglutaricum [postapoplektische Paresen],

Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Hepar suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Sympathicus suis**

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Elektrotherapie, Krankengymnastik
Weitere Verfahren: Akupunktur

Parkinson‘sche Erkrankung (Paralysis agitans)

- **DIFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere degenerative Erkrankungen des zentralen Nervensystems, postenzyphalitische, toxische oder medikamenteninduzierte Parkinsonoide, Tremor unterschiedlicher Genese.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig findet sich eine Trias von Tremor (nicht obligat), muskulärer Rigidität oder Erhöhung des extrapyramidalen Tonus und Akinesie. Charakteristisch sind rhythmische Bewegungen und primäre Bewegungsautomatismen, sog. Zahnradphänomen. Erste Zeichen sind oft Mimikstarre (Maskengesicht), seltener Lidschlag, das Gangbild zeigt kleine Schritte, die Füße schleifen, Rumpf und Kopf werden nach vorne gebeugt, die Arme sind angewinkelt und anliegend, jede Änderung der Richtung und Geschwindigkeit dauert lange. Man findet vegetative Symptome wie Salbengesicht, vermehrter Speichelfluss, vermehrte Schweißbildung. Oft bestehen wirbelsäulenabhängige und muskuläre Schmerzzustände.
  Die Antihomotoxische Therapie ist als adjuvante Therapie aufzufassen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]

Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien verschiedener Lokalisation incl. neuralgische Kopfschmerzen]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur (muskulärer Hartspann), Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege)]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Schilddrüsendysfunktionen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben; Commotio cerebri: posttraumatischer Parkinson]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Schwindel bei zerebralsklerotischem und posttraumatischem Parkinson]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [zerebrale Reizzustände]
Cantharis [Strangurie mit brennenden Schmerzen]
Manganum aceticum
[Muskelschwäche und Zittern, Vergesslichkeit]
Phosphorus S
[Neurasthenie, Kopfschmerzen, erschwertes Denken]
Tarantula [motorische Unruhe mit Zittern und Zuckungen]
Thuja S
[migräneartige (Nagel)Kopfschmerzen, Sprachstörungen, insbesondere Wortfindungsstörungen; „Salben-Gesicht“]
Zincum metallicum
[zerebrale Reizzustände, Muskelzuckungen, Muskelkrämpfe]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Cerebrum suis, Cerebrum occipitalis suis, Cerebrum totalis suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, physikalische Therapie, Krankengymnastik

Parodontose / Parodontitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
Relativ häufig bei Diabetes mellitus, bei Glomerulonephritis sowie beim Myxödem und bei der Akromegalie. Die Parodontose kann ein Fokalherd sein. Bei Entzündungsneigung – z.B. bei Abwehrschwäche – häufig Aufpfropfung einer Parodontitis auf einer Parodontose! Zahnärztliche Verlaufskontrolle!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Traumeel S Ampullen zur lokalen Pinselung
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, z.B. bei exsudativer Diathese, Skrofulose, Lymphatismus]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gingivitis und Stomatitis sowie bei Fokaltoxikosen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen; Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Diabetes mellitus sowie bei gangränösen Ulcera]
Tonsilla compositum N Ampullen [Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S [Zahn- und Knochenkaries, Periostitis; vermehrter (nächtlicher) Speichelfluss (Ptyalismus)]
Asa foetida [stinkende Sekrete]
Calcium fluoratum [Knochenkaries, Knochenfisteln; Periostitis; Bindegewebsschwäche]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [akute und chronische Entzündungen; Gingivitis, Pulpitis, Peridontitis; vermehrter Speichelfluss (bes. nachts); Foetor ex ore]
Silicea [Bindegewebsmittel, dystrophische Zustände (Parodontose = Paradontopathia dystrophica!)]
Nosoden-Injeele: **Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele: **Dens suis, Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vollwertkost, Rohkost
Physikalische Therapie: Mundduschen, Zahnfleischmassagen
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Zahnsteinentfernung; ggf. Entfernung von Amalgamfüllungen!

Paronychie

(= Panaritium parunguale; „Umlauf“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
acute: meist Staphylokokkeninfektion!
chronische: Nagelmykosen (Candida; oft bei Akrozyanose!), luetischer Primäraffekt!

- **BESONDERE HINWEISE:**

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Dermatitis, Dermatosen sowie bei Dermatomykosen einschl. Interdigitalmykosen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen und Fisteleiterungen sowie bei Hautkrankheiten und Osteomyelitis]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische; zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [chronische Paronychie; stinkende Absonderungen]
Graphites
[chronische Paronychie; reaktionsträge rissige trockene Haut]
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei Neigung zu septischen Prozessen; düsterrote Verfärbung]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[akute und chronische Entzündungen]
Natrium muriaticum [Nageltrichophytie]
Silicea
[Konstitutionsmittel bei akuten und chronischen Eiterungen]
Sulfur (forte) S [Konstitutionsmittel bei chronischen Krankheiten sowie Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele: **Nagelmykose-Nosode, Pyodermie-Nosode, Staphylococcus**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Onyx suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Parulis

(meist von einer Parodontitis ausgehender Zahnfleischabszess an der Zahnwurzel; „dicke Backe“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Karzinom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Abszessen, Fisteleiterungen, Phlegmonen, Gingivitis sowie bei Stomatitis und Osteomyelitis]
Osteoheel S (Tabl.) [Exostosen und Periostitis]
Tonsilla compositum N Ampullen [Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [bei Eiterprozessen mit Phlegmone-Tendenz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Entzündungen des gesamten lymphatischen Apparates incl. Pulpitis, Parodontitis, Stomatitis, Gingivitis; Foetor ex ore, Speichelfluss (Ptyalismus)]
Myristica sebifera [bescheunigt Einschmelzung bei Abszessen: „homöopathisches Messer“]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Bindegewebsschwäche; Neigung zu Chronizität und Drüsenschwellungen]
Staphisagria [Parodontose, Zahnkaries; Gesichtsneuralgien]
Nosoden-Injeele: **Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus**
Suis-Organpräparate Injeele: **Dens suis, Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Pulpa dentis suis**
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Spülungen
Neuraltherapie: Mandelpol
Weitere Verfahren: Zahnärztliche Behandlung, Operation

Periarthritis humeroscapularis

(Duplay-Schultersteife)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Schulter-Hand-Syndrom (Algodystrophie), Sudecksches Dystrophiesyndrom, entzündliche und degenerative Prozesse des Schultergelenkes, Humeruskopfnekrose, Pancoast-Bronchialkarzinom, Metastasen, (Spontan)Frakturen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Rö-Untersuchung der Halswirbelsäule in 3 Ebenen; ggf. zusätzliche Therapie wie bei Bandscheibenerkrankungen

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Zeel comp. N [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken (bekanntlich oft verbunden mit rechtsseitigen Schulterbeschwerden!)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom, Epicondylitis]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Zervikalsyndrom; Migraine cervicale = Zervikalmigräne (Osteochondrose – der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis (bekanntlich oft verbunden mit rechtsseitigen Schulterschmerzen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]

Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Überempfindlichkeit gegenüber Bewegungen, Erschütterungen und Berührung; ödematöse Schwellungen]
Ferrum metallicum [Schulter-Arm-Syndrom links]
Ferrum phosphoricum [Schulter-Arm-Syndrom rechts]
Guajacum [bes. linksseitige Periarthritis humeroscapularis; Bewegungsüberempfindlichkeit; Gefühl: „Muskeln wie zu kurz"]
Hekla Lava [Exostosen sowie Zacken- und Spangenbildung der WS (hyperostotische Spondylose!)]
Sanguinaria
[neuralgisch-rheumatoide brennende Schmerzen, bes. rechts in Arm und Schulter, meist mit nächtlicher Verschlimmerung]
Spigelia S [neuralgisch-rheumatische Schmerzen, bes. in der linken Schulter und im linken Arm]
Spiraea ulmaria (forte S)
[Verschlimmerung durch Bewegung und Nässe]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Placenta suis

Begleittherapie
Ernährung: Ggf. purinarme Kost
Physikalische Therapie:
In Abhängigkeit des Krankheitsbildes bzw. der Beschwerden: Kälte, Wärme, Elektrotherapie, Krankengymnastik
Neuraltherapie: Tonsillenpol, periartikulär, HWS-Quaddel
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Störfeldsuche

Periarthritis humeroscapularis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Duplay-Schultersteife, Impingement-Syndrom, zervikale Degenerationen, Bandscheibenschäden und Neuralgien.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Paravertebral lässt sich im Bereich der unteren Halswirbelsäule bis zum thorakalen Übergang eine vermehrte Muskelspannung auch mit Gelosen feststellen. Im Bereich des 4. Halswirbelkörpers kann ein erhöhter Sympathikotonus zu der Periarthritis beitragen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Discus compositum N (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]

Parenterale Therapie:
Zeel comp. N [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Discus compositum N [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[insbesondere bei Nasswetterverschlimmerung]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [alle Formen von Schulter-Arm-Syndromen, besonders rechtsseitig]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus, periarthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]

Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [akuter und chronischer Rheumatismus]
Hypericum
[Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems]
Mezereum (forte S) [Nervenschmerzen, Knochenschmerzen und andere Schmerzzustände]
Ranunculus bulbosus
[Rheumatismus im Brustkorbbereich, Nervenschmerzen]
Rhododenron [Rheumatismus, Nervenschmerzen, insbesondere nach Überlastung]
Rhus Tox S [rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln]
Spigelia S [pectanginöse Beschwerden, Nervenschmerz]

Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode**

Suis-Organpräparate-Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus suis, Os suis

Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Lokale Kältetherapie, Reizstrombehandlungen, Ultraschalltherapie, Stoßwellentherapie bei Verkalkungen
Manuelle Medizin
Weitere Verfahren:
Neuraltherapeutische Infiltrationen, Magnetfeldtherapie
Gabe von Antioxidantien, insbesondere Vitamin E
Enzymtherapie evtl. operative Behandlung notwendig

Periostitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Osteoid-Osteom, Lues, Aktinomykosen, Tbc, Marie-Bamberger-Syndrom (= Periostitis bei verschiedenen überwiegend intrathorakalen Grundleiden), Periostitis (post)traumatica (haemorrhagica bzw. purulenta)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Auch an periostitische Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule (hyperostotische Spondylose!) denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Discus compositum N (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]

Parenterale Therapie:
Discus compositum N [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei gangränösen Ulcera und Dekubitus]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[Verletzungen wie Prellungen und Knochenbrüche sowie posttraumatische Ödeme und Weichteilschwellungen; entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat (Styloiditis, Epicondylitis)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S
[posttraumatische Periostitis mit Zerschlagenheitsgefühl]
Asa foetida [stechende Knochenschmerzen (ggf. Knochenkaries) mit periostitischer Berührungsüberempfindlichkeit]
Eupatorium perfoliatum
[„Beinheil"; Knochenschmerzen, bes. der Schienbeine]
Hekla Lava [Exostosen (Periostitis hyperplastica)]
Kalium bichromicum [Periostitis mit Kälteverschlimmerung]
Kalmia S [rheumatische und neuralgische Schmerzen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Periostitis mit nächtlicher Verschlimmerung]
Mezereum (forte S) [periostitische Knochenschmerzen]
Rhus Tox S [Verschlimmerung bei feuchtkaltem Wetter, nach Durchnässung sowie in der Ruhe („erethische Unruhe"); Startschmerzen bzw. Anlaufschmerzen]
Silicea [Bindegewebsmittel]
Symphytum [„Arnica der Knochen", Periostschädigungen]
Nosoden-Injeele: **Osteomyelitis-Nosode, Tuberculinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Funiculus umbilicalis suis, Os suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Ggf. Kälteanwendungen
Weitere Verfahren: Neuraltherapie

Pertussis

(Keuchhusten; whooping cough)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hilustuberkulose, Laryngospasmus, Pseudokrupp, aspirierter Fremdkörper, Mukoviszidose, Parapertussis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Drosera-Homaccord (Tropf.)
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Droperteel (Tabl.) [(spastische) Bronchitis]
Parenterale Therapie:
Drosera-Homaccord
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung (Augenhämatome bei Pertussis!)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Husteel (Tropf.) [Husten, z.B. bei Erkältungskrankheiten, spastischer Bronchitis, Pleuritis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege und der Bindehaut des Auges]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane]
Tartephedreel N (Tropf.)
[Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, Asthma bronchiale; Husten, der sich nur schwer löst; langwieriger Husten skrofulöser Kinder. Bronchialkatarrhe, Kehlkopfkatarrhe verschiedener Art; gewisse Formen von Keuchhusten; das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt]
Tonsilla compositum N Ampullen [Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr bei exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder, bei postenzephalitischen Residuen (toxische Enzephalitis im akuten Ablauf von Pertussis: „Pertussis-Gehirn") sowie bei Therapieschäden]
Einzelmittel-Injeele:
Coccus cacti [Hustenanfälle mit Kurzatmigkeit und zähem/strähnigem/glasigem Schleim]
Drosera [krampfhafter salvenartiger Reizhusten („Attackenhusten") – bes. nachts – mit Brechneigung und Erstickungszuständen]
Hyoscyamus [trockener Kitzelhusten beim Hinlegen und nachts; Delirien (Pertussis-Encephalitis)]
Ipecacuanha [pertussisartige Zustände mit Erstickungssymptomen und feuchten Rasselgeräuschen; Übelkeit und Erbrechen; Chemosis]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Pertussis-Nosode [nach überstandener Krankheit]
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis [Pertussis-Bronchiektasen],
Cerebrum totalis suis [„Pertussis-Gehirn"],
Pulmo suis [Pertussis-Bronchiektasen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Atemtherapie
Neuraltherapie: Thorax-Quaddel, Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Akupunktur, evtl. Antibiotika

Phantomschmerzen

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei vegetativer Dystonie sowie bei Depressionen, Arteriosklerose, Neuralgien und nervöser Erschöpfung]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [neurale Störfelder]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Nervoheel N (Tabl.) [psychosomatische Leiden]
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [posttraumatische Zustände]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Hauptmittel bei traumatischen Affektionen incl. posttraumatischen Schmerzzuständen]
Chamomilla [tiefe reißende Schmerzen; nervöse Überempfindlichkeit, Unruhezustände]
Hypericum [Folgen von Nervenquetschungen und posttraumatische Neuralgien: „Arnica der Nerven"]
Ranunculus bulbosus
[krampfartige neuralgische Hirn- und Rückenmarkaffektionen]
Rhododendron
[Parästhesien und reißende Schmerzen (schlimmer in Ruhe); Wetterfühligkeit, Nasswetterverschlimmerung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Elektrotherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Pharyngitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Stets Abklärung! Pharyngitis acuta (Viren, Bakterien), Pharyngitis chronica (Klima-Anlagen, Mundatmung), Pharyngitis simplex bzw. Pharyngitis hyperplastica (= granulosa = lymphatica) bzw. Pharyngitis sicca (= atrophicans) [Raucher, Staubinhalationen]. Da der Pharynx der gemeinsame Teil des Luft- und Speisewegs darstellt, sind für Pharyngitiden oft Polysinusitiden und Rhinitiden mit behinderter Nasenatmung – Rhinopharyngitis, ggf. verbunden mit Angina retronasalis (z.B. bei Rachenmandelhypertrophie mit Mundatmung; [morgendliche] Schleim- und Eiterstraße an der hinteren Rachenwand!) verantwortlich zu machen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Heiserkeit, Pharyngitis, Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein; Ohrtubenkatarrh, Mittelohrhydrops]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte und zur Steigerung der körpereigenen Abwehr bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus, im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Tartephedreel N (Tropf.) [das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Causticum S [Schleimhautentzündungen des Rachens (und Kehlkopfes); Empfindung „wie rohes Fleisch“]
Lachesis S [Erstickungsgefühl – bläulichrote ödematöse Schwellungen! – mit Kitzel und Wundheit im Hals]
Phosphorus S [Blutungsneigung; brennende Schmerzen und Heiserkeit bis zur Aphonie]
Phytolacca S [dunkelrote Entzündungserscheinungen der Tonsillen und des Rachenraumes]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Polypus laryngis, Streptococcus haemolyticus, Tuberculinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Larynx suis, Mucosa nasalis suis, Tonsilla pharyngica suis, Tonsilla suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Spülungen, Inhalationen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Mandelpol
Weitere Verfahren: Ggf. Zahnsanierung

Phlebitis

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.)
[Varizen, venöse Stase, variköses Ekzem, Hämorrhoiden (Hämorrhoidalthrombose; ggf. septische Thrombophlebitis der Pfortader!)]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatitis und Dermatosen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Drüsenschwellungen]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Elephantiasis sowie bei Diabetes mellitus, Dekubitus und gangränösen Ulcera]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Durchblutungsstörungen, Varizen]
Apis S [entzündliche Ödeme incl. Phlegmasia alba dolens (Becken- und Oberschenkelvenenthrombose)]
Belladonna S [Rubor-Calor-Dolor-Tumor-Symptome]
Hamamelis [venöse Stase, Varizen mit ausgeprägter Thrombophlebitis-Tendenz, Ulcus cruris varicosum]
Lachesis S
[ödematöse blau-rote entzündliche Schwellungen]
Pulsatilla S [Venostasen]
Silicea
[Konstitutions- und Bindegewebsmittel; entzündliche Prozesse]
Vipera berus [Thrombophlebitis; Schweregefühl in den Beinen; Ulcus cruris]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kompressionsverbände; Quarkwickel
Ausleitende Therapie: Blutegel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

P

Phlegmone

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Erysipel, Erysipeloid, Lyme-Borreliose (Erythema migrans, Lymphadenosis cutis benigna;
  Dermatosen, Abszess
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[entzündliche Hautaffektionen, Neigung zu Chronizität]
Baptisia S [septisches Fieber]
Belladonna S [Rubor-Tumor-Dolor-Calor-Symptomatik]
Echinacea [septische Prozesse mit Neigung zu Lymphangitis und Lymphadenitis]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen mit ödematösen lividen Schwellungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[bei akuten, bes. im Beginn, und chronischen Entzündungen]
Myristica sebifera [fördert Einschmelzung bei Abszessen, Phlegmonen; „homöopathisches Messer"]
Rhus Tox S [Erysipel, Furunkel, Karbunkel mit Phlegmone-Tendenz und dunkler Röte]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Bindegewebsschwäche und Reaktionsträgheit]
Nosoden-Injeele: **Pyodermie-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Am Rande der Phlegmone im Gesunden quaddeln
Weitere Verfahren: Chirurgische Intervention

Phobien (siehe psychische Symptome)

Pityriasis versicolor

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Allergisches Kontaktekzem, Mykosen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Eine Hyperhidrosis fördert die Entstehung der Kleienpilzflechte (Malassezia rubra bzw. furfur), die stets eine Tendenz zur Rezidivierung zeigt!
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Psorinoheel N (Tropf.) [Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Sklerodermie, Elephantiasis]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [generelles Umstimmungsmittel, auch bei Hautjucken und bei urtikariellen Exanthemen]
Acidum nitricum
[bei Dermatosen; insbesondere bei rissiger, wunder Haut]
Borax [psoriatiforme Dermatosen; Seborrhoe]
Graphites [unreine, trockene, rissige, schuppige, seborrhoische Haut; Adipositas-Neigung]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Dystrophie, Lymphatismus, exsudativer Diathese und überempfindlicher Haut]
Nosoden-Injeele: **Bacillinum, Bacterium coli**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Plethora

„Rotblütigkeit" = Vermehrung der Gesamtblutmenge = Plethora sanguinea = Plethora vera

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Polyzythämie (Plethora polycythaemica),
  Hypertonie („roter Hochdruck")

Basistherapie
Orale Therapie:
Melilotus-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck]
Parenterale Therapie:
Melilotus-Homaccord [Bluthochdruck]
Symptomenbezogene Therapie
Cactus compositum S (Tropf.),
Cactus compositum (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Koronardurchblutungsstörungen, nach Myokardinfarkt, bei Myokardschwäche sowie bei Angina pectoris, Emphysem, Herzrhythmusstörungen, gastrokardialem Symptomenkomplex, Hypertonie und Endarteriitis obliterans]
Glonoin-Homaccord N Tropfen (Amp.) [bei pektanginösen Beschwerden und Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion]

P

Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen; Hypercholesterinämie]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus (ggf. verbunden mit Abdominal-Plethora); Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen, u.a auch im Klimakterium sowie bei verschiedenen Stoffwechselstörungen, auch in der Geriatrie]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Endarteriitis obliterans sowie bei Innenohrschwerhörigkeit und postapoplektischen Residuen]
Syzygium compositum N (Tropf.)
[Anregung der Abwehrsysteme und der Drüsenfunktionen bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der männlichen Organfunktionen, u.a. auch bei Erschöpfungszuständen sowie bei Diabetes mellitus]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, besonders auch bei Hypernephrom, Myxödem sowie bei Adipositas und Asthma bronchiale]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[Schwindel verschiedener Genese (besonders arteriosklerotisch bedingter)]

Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus (forte S)
Aurum [gestaute Pykniker mit Plethora, „Weintrinker-Facies"; Präapoplexie; Angst und Depressionen]
Cholesterinum
Lachesis S [allgemeine Neigung zur Thrombose und Embolie; Hitzewallungen]
Sanguinaria
[Kongestionen zum Kopf (rotes Gesicht), Kopfschmerzen]
Sulfur (forte) S [Hepatopathie mit Pfortaderstauung; Verlangen nach frischer Luft; Chronizität]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Colon suis, Cor suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Ggf. Gewichtsreduktion

Ausleitende Therapie: **Lymphomyosot** (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme], Aderlass

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Störfeldsuche

Pleuritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen (u.a. Pneumonie, Lungeninfarkt, Herzinsuffizienz, rheumatische Polyserositis, Tbc, Lungen- und Pleuratumoren, Bornholmer Krankheit [Pleurodynie]) und Formen (u.a. Pleuritis sicca, adhaesiva, transsudativa, serosa, exsudativa, purulenta, haemorrhagica, carcinomatosa) der Rippenfellentzündung.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung! Pleurapunktion!

Basistherapie

Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Ranunculus-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Intercostalneuralgien]

Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Ranunculus-Homaccord [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]

Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Husteel (Tropf.)
[Husten, z.B. bei Erkältungskrankheiten, spastischer Bronchitis, Pleuritis (pleuritischer Reizhusten!)]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Heiserkeit; Laryngitis; Pharyngitis; petechiale Blutungen]
Tartephedreel N (Tropf.)
[das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt, u.a. auch bei Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, Asthma bronchiale sowie bei Husten, der sich nur schwer löst]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr bei exsudativer Diathese]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Pleuritis exsudativa/serosa; stechende und brennende Schmerzen; Atemnot]
Arsenicum jodatum
[Resorptionsmittel bei Pneumonie und Pleuritis]
Bryonia S [Entzündungen der serösen Häute (Polyserositis), u.a. heftige Stiche beim Atmen und Sprechen, schmerzhafter Reizhusten (oft bei Pleuritis sicca!)]
Cantharis [Pleuritis (und Perikarditis); hämorrhagische Entzündungszustände]
Kalium carbonicum (forte N) [harter trockener Husten, Neigung zu Ödemen; Nachtschweiße; „Schwächemittel"]
Phosphorus S [fieberhafte Bronchopneumonie oder Pneumonie; Blutungsneigung]
Ranunculus bulbosus
[Pleuritis sicca et exsudativa mit konsekutiven Adhäsionen]

Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Tuberculinum

Suis-Organpräparate Injeele: **Pulmo suis, Ren suis**

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Atemtherapie

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Neuraltherapie:
Lungenfeld, Thorax-Quaddeln, Cubitalvene im Wechsel

Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie

Pneumonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Nicht infektiöse Pneumonien (z.B. physikalisch-chemische Ursachen, eosinophiles Lungeninfiltrat [Allergie]), infektiöse Pneumonien: nicht bakterielle = „atypische Pneumonien" (z.B. Viren, Mykoplasmen, Chlamydien), bakterielle = „klassische Pneumonien" (z.B. Pneumo- oder Staphylokokken) sowie ferner Nosokomialininfektionen (z.B. Bacterium pyocyaneus, Bacterium proteus), sekundäre Pneumonien (als Folge von anderen pulmonalen Erkrankungen)

P

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave „absteigende Katarrhe der Atemwege“: Beginn mit Schnupfen und schnellen Übergang in Tracheitis – Bronchitis – Bronchopneumonie – Pneumonie. Sehr häufig beim Säugling und im Senium! Stets Ausschluss eines Malignoms sowie einer Tbc und von AIDS (Pneumocystitis carinii)! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Aletris-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Aurumheel N Tropfen
[vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Hypotonie; Herzrhythmusstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Tartephedreel N (Tropf.) [das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt, u.a. bei Kehlkopfkatarrhen sowie bei Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, bei Asthma bronchiale und generell bei Husten, der sich nur schwer löst]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Asthma bronchiale und Adipositas]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum benzoicum
[hochgradige Atemnot bei Pneumonie, trockener Reizhusten]
Aconitum S [anfängliche akute Fieberzustände mit Schüttelfrösten und Tachykardie]
Adeps suillus (forte S)
Arsenum jodatum
[Resorptionsmittel bei Pneumonie und Pleuritis]
Bryonia S
[Pneumonie mit hartem trockenem Husten, Pleuritis]
Carbo vegetabilis [hochgradige Atemnot (Dyspnoe, Orthopnoe); kachektisch geschwächte Menschen]
Jodum [besonders Oberlappenpneumonie mit Dyspnoe]
Kalium carbonicum (forte N) [Affektionen des Atemtraktes mit Luftnot, Ödemneigung (Lungenödem); „Schwächemittel“]
Phosphorus S [Parenchymmittel; Bronchopneumonie, lobäre Pneumonie; Blutungsneigung]
Vincetoxicum (enth. in Engystol)
[Wanderpneumonie, fehlende kritische Entfieberung (beides häufig bei Virus-Pneumonien!)]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Pertussis-Nosode, Salmonella typhi, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus, Tuberculinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen, Wickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Lungenfeld, Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Antibiotika

Polyarthritis, akute

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Para- und postinfektiöse Arthritiden,
  Spondylitis ankylosans (Bechterew) und andere Spondylarthritiden („Wirbelsäulen-Rheumatismus“)
  Morbus Reiter, Morbus Behçet,
  Löfgren-Syndrom (akute Form der Boeck-Krankheit),
  Lupus erythematodes, Gicht (Arthritis urica)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.) [akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Angio-Injeel (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien]
Discus compositum N (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom; Epicondylitis]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum benzoicum
[fokalinfektiöse Polyarthritiden mit Herzsensationen (Tachykardie, Herzklopfen)]
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel, bes. bei subakuten (bis chronischen) Arthritiden]
Bryonia S [akute Polyarthritis (Synovitis) mit heißen schmerzhaften Gelenken; Bewegung verschlimmert]
Colchicum (forte S)
[wandernde Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen wechselnd zwischen rot und blass; Verschlimmerung durch Nässe und Kälte; Herzbeteiligung (Endokarditis): Herzklopfen, Herzstiche, Tachykardie bei kleinem weichem Puls]
Dulcamara S [„Nasswettermittel“]
Kalmia S [fokale Infektarthritis]

Rhododendron
[besonders kleine Gelenke befallen sowie generell rheumatische Schmerzen an Muskel-, Binde- und Knochengewebe]
Rhus Tox S [akuter und subakuter Gelenkrheumatismus]
Spiraea ulmaria
[wandernde Gelenkschmerzen, Schweiße, Herzklopfen]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Psorinum, Streptococcus haemolyticus, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Glandula suprarenalis suis, Medulla ossis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Ggf. Kälte- oder Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme], Aderlass
Neuraltherapie: Störfeld, Gelenkumspritzung
Weitere Verfahren: Störfeldsuche

Polyarthritis, (primär) chronische

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Infektarthritis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Es handelt sich um eine häufig in Schüben chronisch verlaufende entzündliche Gelenkerkrankung unbekannter Ätiologie mit Erkrankungsgipfel meist im mittleren Lebensalter (35 bis 50 Jahre). Der Beginn ist oft schleichend und gekennzeichnet durch Schwellung und Bewegungseinschränkungen einer oder mehrerer Metacarpophalangeal- und/oder Interphalangealgelenke bzw. Schmerzen eines großen Gelenkes. Häufige Allgemeinsymptome sind Adynamie, Anorexie, Myalgie, hypochrome Anämie. Extraartikuläre Symptome sind Muskelatrophien, Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen, periphere Gefäßverschlüsse durch obliterative Vaskulopathie. Man unterscheidet klinisch vier Phasen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei ödematösen Schwellungen]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtig-rheumatische Diathese]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[bei ödematösen Schwellungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[weichteilrheumatische und arthritische Beschwerden]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[weichteilrheumatische und periarthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Entzündungen der Gelenke, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten]
Caulophyllum thalictroides
[Rheumatismus der Finger- und Zehengelenke]
Colchicum (forte S)
[akute und chronische Gicht, akuter Gelenkrheumatismus]
Dulcamara S
[Entzündungen der Gelenke ausgelöst durch Kälte und Nässe]
Ledum [Gicht und Gelenkrheumatismus]
Manganum aceticum [Knochen- und Gelenkschmerzen]
Rhus Tox S [rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Folgen von Verletzung und Überanstrengung]
Silicea [Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke]
Viscum album [Verschleißkrankheiten der Gelenke]
Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Tonsillitis-Nosode**
Suis-Organpräparate-Injeele: **Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus suis, Os suis**
Begleittherapie
Weitere Verfahren: Neuraltherapeutische Injektionen, homöosiniatrische Behandlungen
Ausleitungstherapie mit:
Hepar compositum N [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Leberkrankheiten],
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten],
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz],
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Gabe der Biokatalysatorenpräparate **Coenzyme compositum Ampullen** und **Ubichinon compositum Ampullen**
Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin E
Enzympräparate
Mikrobiologische Diagnostik und Therapie
Physikalische Therapie: Kältetherapie

Polyneuropathie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neuritis, Neuralgien, Guillain-Barré-Syndrom (= akute Polyradikulitis u.a. bei/nach verschiedenen Infektionskrankheiten, bei immunologischen Erkrankungen, nach Applikation von artfremden Eiweiß [Impfungen], bei Fokalherden).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Relativ häufig bei Diabetes mellitus, Alkoholikern, Arteriosklerose, rheumatoider Arthritis, Periarteriitis nodosa, Intoxikation mit Quecksilber (Amalgam), Arsen, Blei und Thallium.

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Neuralgien und Arteriosklerose und bei sonstigen geriatrischen Indikationen (arteriosklerotische „geriatrische“ Polyneuropathie)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, z.B. bei Raucherbeinen, bei chronisch kalten Füßen, sowie bei Endarteriitis obliterans, Diabetes mellitus und Arteriosklerose (auch Polyneuropathie als Ischämiefolge!)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei verschiedenen Neuritiden und Neuropathien]
Aconitum S [Parästhesien]
Colocynthis S [neuralgische stechende Schmerzen, Parästhesien]
Gelsemium S [Paresen peripherer Nerven, Muskelschwäche]
Phosphorus S [brennende Schmerzen; Schwäche mit Gliederzittern (Tremor alcoholicus)]
Rhus Tox S [Neuritiden und Neuralgien, bes. nach Überanstrengung; erethische Unruhe; Gliederschmerzen]
Thuja S [Impf-Polyneuropathie und Neuritiden/Neuropathien nach Infektionen sowie bei Fokalherden]

Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Hypophysis suis, Medulla spinalis suis, Medulla oblongata suis, Musculus suis, Placenta suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Bewegungstherapie und sonstige Physiotherapien
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Polyposis coli

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Neoplasma, Peutz-Jeghers-Syndrom (= Polyposis intestinalis (Magen, Darm) – Entartungsrisiko relativ gering! – + Lentiginose der Haut und Schleimhäute), Gardner-Syndrom (= hereditäre Adenomatosis mit Atheromen + Rektum/Colonpolyposis; zu 85% maligne Entartung!), Polyposis familiaris (= Adenomatosis coli = eine obligate Präkanzerose).
- **BESONDERE HINWEISE:**
Bei allen Polypen besteht stets eine Tendenz zur malignen Entartung! Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Hormeel SN (Tropf., Amp.) [funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Schleimhautaffektionen mit Neigung zu Ulzerationen und Polypenbildung]
Graphites [Neigung zu Adipositas, chronische (besonders atonische) Obstipation]
Hydrastis [Blutungsneigung, Schleimhautaffektionen; Verdacht auf maligne Entartung; Kräfteverfall]
Thuja S [bei allen proliferativen Prozessen, wie Papillomen, Papillomatosis, Polypen und Polyposis]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Coecum suis, Colon suis, Duodenum suis, Jejunum suis, Rectum suis, Ventriculus suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung; evtl. Operation

Proktitis, Periproktitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Gonorrhoe, Tbc, Lymphogranulomatosis inguinalis (= Lymphopathia venerea), Prokto-Sigmoiditis (= Komplikation bei Thrombophlebitis eines inneren Hämorrhoidalknotens)

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Proktitis ulcerosa!)]
Paeonia comp.-Heel (Tabl.)
[Hämorrhoiden, Fissura und Ekzema ani]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Incontinentia ani; Pfortaderstauung, Abdominal-Plethora]
Colocynthis S
[stechende Schmerzen, Durchfall mit Tenesmen]
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Nux vomica S [spastische Obstipation; Hämorrhoiden; Verschlimmerung durch Kaffee, Alkohol, Nikotin]
Podophyllum [Hämorrhoiden; spritzende Stühle („Hydrantenstuhl"); Neigung zu Prolapsus ani]
Nosoden-Injeele: **Appendicitis-Nosode, Bacterium coli, Medorrhinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Hepar suis, Rectum suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Störfeld

Prostataadenom (Prostatahypertrophie)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Prostatakarzinom (hart, ggf. höckerig), Prostatitis (Konsistenz weich und ungleichmäßig, schmerzhafte Druckpunkte), Prostataabszess (palpatorische Fluktuation, sehr schmerzhaft)
- **BESONDERE HINWEISE:**
Vorsorgeuntersuchungen! Rektale Kontrollen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Sabal-Homaccord (Tropf.) [Prostataadenom, Reizblase]
Populus compositum SR (Tropf.) [Entzündungen und Reizzustände im Harnwegssystem]
Parenterale Therapie:
Sabal-Homaccord [Prostataadenom, Reizblase]

Solidago compositum SN
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]

Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes ohne und mit Konkrementen (Prostatasteine!)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der Organfunktionen, u.a. bei Ejaculatio praecox, Impotentia virilis sowie bei Enuresis nocturna und Erschöpfungszuständen]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, besonders auch bei Präkanzerosen und Karzinomen sowie bei Adipositas]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Conium S [bei Verhärtungen; Strangurie; Geriatrikum]
Digitalis [Ischurie sowie Ischuria paradoxa und andere Miktionsstörungen bei Prostatahypertrophie]
Sabal serrulatum [Harnträufeln, Ischuria paradoxa; „homöopathischer Katheter“]

Nosoden-Injeele: **Adenoma prostatae**

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Prostata suis, Testis suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Neuraltherapie: Injektion an die Prostata

Weitere Verfahren: Cave: Alkohol; evtl. Operation

Prostatitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Epidydimitis, Harnwegsinfekt

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Sabal-Homaccord (Tropf.) [Prostataadenom, Reizblase]

Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Sabal-Homaccord [Prostataadenom, Reizblase]

Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Populus compositum SR (Tropf.) [Albuminurie sowie bei Reizzuständen im Harnwegesystem – wie Zystitis, Zystopyelitis; als Nebenmittel auch bei Bakteriurie; insbesondere auch bei Miktionsstörungen (1. Stadium des Prostata-Adenoms]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen, u.a. bei Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis, Zystopyelitis, Prostata-Adenom (1. Stadium), Enuresis nocturna sowie Harnröhrenstrikturen und Incontinentia urinae]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Cantharis
[Prostatitis mit starkem Harndrang und brennenden Schmerzen sowie Hämaturie und Albuminurie]
Ignatia S [Polychrest mit vielen psychischen Beziehungen: „Kongestionsprostatitis“ (Posner) sowie „Prostatopathie“ (Alken); ggf. verbunden mit Prostatorrhoe]
Sabal serrulatum [Prostatitis mit Harnträufeln, Ischuria paradoxa; „homöopathischer Katheter“]

Nosoden-Injeele:
Adenoma prostatae, Cystopyelonephritis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Prostata suis, Testis suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen

Neuraltherapie: Injektion an die Prostata

Weitere Verfahren: Evtl. Antibiotika

Pruritus

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären, u.a. auch Pruritus bei Dermatosen, Allergie, Neurodermitis sowie bei Diabetes mellitus und im Klimakterium; ferner als Pruritus senilis, leucaemicus, hepaticus und renalis sowie als „Pruritus sine materia“ (neurasthenisch bzw. psychogen) von differentialdiagnostischem und differentialtherapeutischem Interesse!

Basistherapie
Orale Therapie:
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzeme, Juckreiz, Entzündungen der Haut]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]

Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Perniones, Intertrigo, Ekzeme, Hyperhidrosis sowie ferner Hyperkeratosen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a auch bei Dermatitis, Dermatosen, Allergie, Sklerodermie sowie bei Dermatomykosen, Interdigitalmykosen, Mikrosporie, Quincke‘schem Ödem, Neurodermitis, Crusta lactea (= Milchschorf)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Hepar compositum N (Amp.)
[bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfuktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatitis, Dermatosen und bei Neurodermitis]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Syzygium compositum N (Tropf.) [Anregung der Abwehrsysteme und der Drüsenfunktionen bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei allergischen und urtikariellen Hautaffektionen sowie bei exsudativer Diathese]

Antimonium crudum
[juckende Ekzeme mit Hyperkeratosen und Rhagaden]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus bzw. exsudativer Diathese]
Cinnabaris [Nasenjuckreiz bei Rhinitis und Polysinusitis]
Dolichos pruriens
[Pruritus verschiedener Genese, insbesondere Alters- und Schwangerschaftspruritus sowie Pruritus hepaticus]
Fagopyrum
[Pruritus mit Petechienbildung und ekzematösen Ausschlägen; besonders betroffen sind unbedeckte Hautstellen und das Gesicht (Fotoallergie); Verschlimmerung durch Sonne und Wärme]
Formica rufa
[Umstimmungsmittel bei allergischen Hautaffektionen]
Ignatia S [Pruritus als Folge von bzw. mit psychischer Belastung sowie bei vegetativer Dystonie („Pruritus sine materia")]
Rhus Tox S [verschiedene Dermatitiden mit Brennen und Juckreiz; große Rezidivneigung]
Sulfur (forte) S
[Reaktionsmittel bei chronischen trockenen Ekzemen mit starkem, bes. nächtlichem, Juckreiz]
Zincum metallicum
[unterdrückte Exantheme mit nächtlichen Unruhezuständen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum, Trichomonaden-Fluor
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (Hochpotenzen!),
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus;
Acidum L (+)-asparagicum-Injeel
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis, Mucosa suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, physikalische Therapie

Pseudokrupp

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Echter Krupp bei Diphtherie, „Grippekrupp", Laryngitis, Bronchitis, akute subglottische Einengung, Epiglottitis, Pertussis, Asthma bronchiale/cardiale
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: evtl. akuter lebensbedrohlicher Notfall (Laryngotracheobronchitis maligna)! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aconitum-Homaccord (Tropf.) [grippale Infekte, Akutmittel]
Drosera-Homaccord (Tropf.) [asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Parenterale Therapie:
Aconitum-Homaccord [grippale Infekte, Akutmittel]
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; zerebrale Reizzustände]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Husteel (Tropf.) [Husten, z.B. bei Erkältungskrankheiten, spastischer Bronchitis]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Laryngitis, Pharyngitis, Heiserkeit, petechiale Blutungen]
Tartephedreel N (Tropf.) [Kehlkopfkatarrhe verschiedener Art, gewisse Formen von Keuchhusten]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Entzündungsneigung sowie Krupphusten durch kalte und trockene Luft]
Ignatia S [„Seufzer-Atmen"; kann nicht durchatmen; vegetative Dystonie: spastischer – nicht infektiöser – Pseudokrupp]
Spongia [Krupphusten; nächtliche asthmatische Zustände mit Heiserkeit (Laryngitis) und trockenem, hartem bellendem Husten]
Nosoden-Injeele: **Pertussis-Nosode**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Atemgymnastik
Neuraltherapie: Thorax-Quaddeln
Weitere Verfahren: Ggf. Psychotherapie

Psoriasis

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Dermatosen]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch bei Dermatosen indiziert]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht (Psoriasis-Gipfel oft im Klimakterium bzw. in der Menopause!)]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Naevi und Adipositas]

Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat, z.B. Arthrosen der Hüft-, Knie- und kleinen Gelenke (Psoriasis-Arthropathie!)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel bei Hautjucken; urtikarielle Exantheme]
Arsenicum album S [Dermatosen und Dermatitiden mit Schuppen, Jucken und Brennschmerz]
Borax [psoriatiforme Dermatosen, Parapsoriasis (= Pityriasis-ähnliche Krankheitsbilder)]
Hydrocotyle asiatica
[Psoriasis, bes. der Nägel („Tüpfelnägel"); juckende Ekzeme und schuppende psoriatiforme Dermatosen]
Thuja S [Nagelpsoriasis: weiche, spröde, rissige, verkrüppelte, leicht brüchige Nägel]

Nosoden-Injeele:
Crinis humanus, Medorrhinum, Psorinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Onyx suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie: Lichttherapie (z.B. UVA)

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, Darmsanierung

Psychische Symptome

(psychosomatische Affektionen und Alterationen bzw. psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände).

Einige der wichtigsten Biotherapeutika-Antihomotoxika werden hier alphabetisch mit Hauptindikationen aufgeführt.

Orale Therapie:
Aletris-Heel (Tabl.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände; Basistherapeutikum bei Osteochondrose]
China-Homaccord S (Tropf.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.)
[Zervikalsyndrom); Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Ignatia-Homaccord (Tropf.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Selenium-Homaccord (Tropf.)
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globus hystericus]

Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM
[Anregung der Abwehrsysteme bei Depressionen, Arteriosklerose, nach Commotio cerebri sowie bei Neuralgien; ferner bei Erregungszuständen sowie bei nervöser Erschöpfung und Gedächtnisschwäche und bei sonstigen geriatrischen Indikationen sowie bei vegetativer Dystonie]
China-Homaccord S [Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Gelsemium-Homaccord
[Zervikalsyndrom; Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepar compositum N
[Anregung der Leberzellfunktionen, u.a. auch bei Hypercholesterinämie]
Ignatia-Homaccord
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Ovarium compositum
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht, u.a. auch bei Hyperemesis, im Klimakterium und in der Geriatrie]
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Selenium-Homaccord
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen bei Männern, u.a. auch bei Erschöpfungszuständen sowie bei Ejaculatio praecox und Impotentia virilis]
Tonico-Injeel
[Erschöpfungszustände physischer, aber auch psychischer Art; geistige Entwicklungsstörungen der Kinder]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S [Depressionen mit geduldigem Ertragen aller Leiden („wie ein armer Tropf")]
Aconitum S [Zustände von akuter Todesangst; psychotische Erscheinungen als Folge von Schreck und Ärger]
Agnus castus
[Neurasthenie, Depressionen mit Todesgedanken, Hypochondrie]
Antimonium crudum
[Verdrießlichkeit, traurig-melancholische Verstimmung]
Argentum nitricum [Melancholie; Zwangsneurosen, z.B. Platzangst (Agoraphobie)]
Arsenicum album S [Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, Unruhe, Angst; nächtliche Exazerbation aller Beschwerden]
Aurum [Basistherapeutikum bei Melancholie, Lebensüberdruss und Depressionen; religiöse Manie; innere Hast und Unruhe; Wutanfälle]
Belladonna S [Wahnvorstellungen, Halluzinationen]
Coffea [Überempfindlichkeit; Schlaflosigkeit; psychotische Erscheinungen als Folge plötzlicher Freude]
Colocynthis S [allgemeine Reizbarkeit; psychotische Erscheinungen als Folge von Ärger oder Wut]
Gelsemium S [Angst vor der Zukunft; „Zitter-Mittel"; Zerschlagenheitsgefühl; Kopfschmerzen]
Hyoscyamus [fixe Ideen, Wahnvorstellungen; Vergiftungsfurcht; Eifersucht; Zwangsweinen; ferner delirante Zustände mit Benommenheit, bes. auch im Alter!]
Ignatia S [Neigung zum Weinen; Pavor nocturnus]
Natrium muriaticum [psychotische Erscheinungen als Folge von Kränkungen; Gereiztheit]
Nux vomica S
[Morgenverschlimmerung; Durchschlafstörungen; Zornausbrüche, die hinterher nicht leid tun, sondern Mittel zum Zweck sind]
Phosphorus S
[Angst, stets etwas oder alles falsch gemacht zu haben]
Platinum metallicum [Überheblichkeit, zänkisches Wesen]
Pulsatilla S [Abendverschlimmerung; Zuspruch bessert; wechselnde, sprunghafte Beschwerden ohne organischen Befund (= kontradiktorische Symptome); prämenstruelle Verschlechterung; ängstliche depressive Patientinnen]
Sepia [Morgen- und Abendverschlimmerung; Depressionen und Erschöpfung, Müdigkeit und allgemeine Unlust; „Klimakterium-Mittel"]
Staphisagria
[Reizbarkeit, Ärgerlichkeit, Überempfindlichkeit; psychotische Erscheinungen als Folge verbissener Kränkung (auch beruflicher Art), Zornausbrüche aus Pessimismus (sinnlos aufbrausend)]
Stramonium [geschwätziges Delirium, Angst, Halluzinationen, Erregungszustände; Hydrophobie; Furcht vor Vergiftungen]
Sulfur (forte) S
[Größenwahn; religiöse Manie; Einschlaf- und Durchschlafstörungen („Katzenschlaf"); Zornausbrüche, die hinterher leid tun]
Valeriana [neurasthenische und hysterische Zustände; Unruhe und Schlaflosigkeit]
Veratrum S
[psychotische und delirante Zustände; Gewalttätigkeit]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [pessimistische Grundstimmung]
Psorinum [depressive Verstimmung, Hoffnungslosigkeit, Melancholie, Traurigkeit, Angst- und Furchtzustände infolge chronischen Kummers]
Intermediäre Katalysatoren:
Coenzyme compositum Ampullen [Fermentfunktionen]
Ubichinon compositum Ampullen [Fermentfunktionen]

Pyelitis, Pyelonephritis

Basistherapie
Orale Therapie:
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände mit und ohne Konkremente im Bereich des Urogenitaltraktes]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen; nicht nur indiziert bei Pyelitis und Zystitis/Zystopyelitis sondern auch bei Glomerulonephritis und Fokaltoxikosen]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [kaum löschbarer Durst; Albuminurie, Zylindrurie; nephrogene Ödeme; Periodizität]
Baptisia S [septische Prozesse mit septischem Fieber (u.a. Schüttelfröste) und Benommenheit]
Cantharis [Nephritis, Pyelitis, Zystitis mit Albuminurie, Hämaturie (bes. bei akuten Stadien)]
Hepar sulfuris [bei eitrigen Prozessen; speziell auch bei Scharlach-Nephritis]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Neigung zur Chronizität und pyelonephritischer Schrumpfniere]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Calculi renales, Coxsackie-Virus-A_9, Cystopyelonephritis-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme],
Teekuren (harntreibende Tees)
Neuraltherapie: Oberer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Evtl. Antibiotika

Pylorospasmus

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Beim Erwachsenen neurogen oder allergisch bedingt sowie mechanisch (= Stenose) durch Neoplasma oder Ulcus ([prae]pyloricum bzw. duodeni).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Hypertrophe Pylorusstenosen der Säuglinge (meist männliches Geschlecht)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Duodenoheel (Tabl.)
[Entzündungen und Reizzustände des Duodenums]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Atropinum compositum [kontraindiziert bei mechanischen Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals!]
Spascupreel
Suppositorien:
Atropinum compositum S [kontraindiziert bei mechanischen Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals!]
Spascupreel S
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis; Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica; Leberschädigungen (Parenchymschäden); Stauungsikterus]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[zur Langzeittherapie bei Narben]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Einzelmittel-Injeele:
Anacardium
[Hunger- und Nüchternschmerz beim Pylorus-Syndrom]
Chamomilla [bei neuro- bzw. psychopathischen Kindern]
Cuprum [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane]
Magnesium phosphoricum [Krämpfe und Koliken in den Hohlorganen (besonders im Kindesalter)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Duodenum suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Neuraltherapie: Oberer Grenzstrang, Plexus solaris
Weitere Verfahren: Akupunktur; evtl. Operation

Rachenmandelhypertrophie („Rachenpolypen“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Leukoplakie, Karzinom, Papillom, Fibrom
- **BESONDERE HINWEISE:**

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, lymphatische Diathese]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Entwicklungsstörungen der Kinder und bei Legasthenie sowie bei Gedächtnisschwäche und Erregungszuständen]

Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Tonsillarhypertrophie; Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Sinusitis sowie bei Grippe, Otitis media und Fokaltoxikosen]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein, Ohrtubenkatarrh, Mittelohrhydrops]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Naso-Heel SN (Tropf.) [Rhinitis acuta und chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr bei exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder, Dystrophia adiposo-genitalis]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei pastösem Habitus und Lymphdrüsenschwellungen]
Calcium phosphoricum [neurasthenische hagere unterentwickelte Kinder mit Lymphatismus]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Neigung zur Abszedierung]
Thuja S [chronische proliferative Prozesse; Verschlimmerung durch Nässe und Kälte]

Nosoden-Injeele:
Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula lymphatica suis, Tonsilla pharyngica suis

Begleittherapie
Neuraltherapie: 3. Mandelpol

Reisekrankheiten (Kinetosen)

Basistherapie
Orale Therapie:
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]

Symptomenbezogene Therapie
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[bei Schwäche- und Erschöpfungszuständen]
Vomitusheel (Tropf.)
[Erbrechen und Brechreiz verschiedener Genese]

Einzelmittel-Injeele:
Conium S [Schwindel bei jeder Lageveränderung, bes. Drehschwindel; zittrige Schwäche]
Tabacum [migräneartige Kopfschmerzen; Todesangst; Übelkeit, Brechreiz, Schwäche und Kollapsneigung (Hypotonie bei Kinetosen!); Besserung in frischer Luft und nach Erbrechen]
Viscum album [Kongestionen mit (meist plötzlichen) Schwindelanfällen]

Suis-Organpräparate Injeele: **Cerebellum suis**

Begleittherapie
Neuraltherapie:
Mastoid beiderseits, beide Cubitalvenen im Wechsel
Weitere Verfahren: Akupunktur

Reitersches Syndrom

= Trias: Arthritis, Urethritis, Konjunktivitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  U.a. Polyarthritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Androtropie: bevorzugt 2.-4. Lebensjahrzehnt!
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme (bei Reiter gelegentlich auch pustulöse Exantheme!)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der ableitenden Harnwege („Reiter-Urethritis"; ggf. auch „Reiter-Zystitis/Zystopyelitis"), im Verdauungstrakt („Reiter-Enteritis bzw. -Colitis") sowie im Bereich der Bindehaut des Auges („Reiter-Konjunktivitis")]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Weichteilrheumatismus und arthritische Beschwerden]
Oculoheel (Tabl.) [Konjunktivitis, Blepharitis, Dakryozystitis]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei akuten und chronischen Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis/Zystopyelitis, Harnröhrenstrikturen, Incontinentia urinae; generell zur Anregung der Nierenausscheidung bei Fehlfunktionen wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S [bei ödematösen Schwellungszuständen der Gelenke, der Schleimhäute incl. der Bindehaut]
Arnica S [Myalgien und sonstige rheumatische Affektionen mit Zerschlagenheitsschmerzen]
Bryonia S [Entzündungen der serösen Häute (Synovitis/ Synovialitis) sowie generell bei Muskel- und Gelenkrheumatismus]
Euphrasia
[Blepharo-Konjunktivitis, Chemosis, iritische Reizzustände]
Kalmia S [rote, heiße, geschwollene Gelenke; iritische Reizzustände (Iridozyklitis bei Reiter' Konjunktivitis!)]
Ledum
[rheumatische Entzündungen der Gelenke (meist) ohne Fieber]
Rhus Tox S
[akute und subakute Arthritiden und Konjunktivitiden]

Nosoden-Injeele:
Bacillinum, Bacterium coli, Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus, Medorrhinum, Psorinum, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Colon suis, Hepar suis, Musculus suis, Oculus totalis suis, Os suis, Ren suis, Urethra suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Reizblase

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.)
[Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago compositum SN
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Suppositorien:
Spascupreel S [Krampfzustände, Tenesmen]
Atropinum compositum S [Krampfzustände, Tenesmen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel (Zystitis, Zystopyelitis als hämatogene Infektion im Rahmen anderer entzündlicher Prozesse), Karbunkel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie]
Plantago-Homaccord (Tropf.)
[Reizblase, Incontinentia urinae, Enuresis nocturna]
Populus compositum SR (Tropf.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Störungen der Nierenfunktion und -exkretion bei Albuminurie sowie bei Reizzuständen im Harnwegesystem, z.B. auch bei Zystitis/Zystopyelitis; bei Hydronephrose und Nephrolithiasis, insbesondere auch bei Miktionsstörungen (1. Stadium des Prostata-Adenoms; als Nebenmittel auch bei Bakteriurie]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reizblase; im 1. Stadium des Prostataadenoms (sog. Prostatahypertrophie)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Nephritis; brennende Schmerzen]
Cantharis [Zystitis, Urethritis; Harndrang, Strangurie]
Hepar sulfuris [bei eitrigen Prozessen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Cystopyelonephritis-Nosode, Medorrhinum, Staphylococcus, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ausreichende Flüssigkeitszufuhr; laktovegetabile gewürzarme Kost; ggf. „Schaukeldiät“
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Restless legs (Wittmaack-Ekbom-Syndrom)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache weitgehend unbekannt! Gynäkotropie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. bei Endarteriitis obliterans, Arteriosklerose und Diabetes mellitus, bei chronisch kalten Füßen (z.B. „Raucherbeinen“), Elephantiasis sowie bei vegetativer Dystonie und postapoplektischen Zuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Gnaphalium polycephalum
[Taubheitsgefühl und Ameisenlaufen (Parästhesien) bis zu den Zehen, oft verbunden mit Waden- und Fußkrämpfen]
Platinum metallicum (forte S) [rheumatoide und neuralgiforme Schmerzen in den Extremitäten mit Parästhesien]
Rhus Tox S [große Unruhe in den Beinen mit Bewegungsdrang; alles wird in Ruhe schlimmer]
Tarantula
[(nächtliche) Extremitätenunruhe mit Zittern und Zuckungen]
Valeriana
[nächtliche Unruhezustände mit Bewegungsdrang und Insomnie]
Zincum valerianicum [Muskelzuckungen und Muskelkrämpfe, bes. auch „Autofahrerbeine“]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Medulla spinalis suis, Musculus suis, Vena suis
Begleittherapie
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang

Rhagaden

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Eisenmangelanämie
- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären! Besonders häufig am Übergang von der Schleimhaut in die Haut bzw. in der Umgebung natürlicher Körperöffnungen: Lippen, Mundwinkel, Anus sowie ferner am Lidwinkel und in Gelenkbeugen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. bei Hautkrankheiten (Rhagaden entzündlicher Genese!) sowie bei Osteomyelitis und Fisteleiterungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Suppurationen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt und der Bindehaut]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S
[Haut- und Schleimhauteinrisse bei chronischen Affektionen]
Acidum nitricum
[Rhagaden am Übergang zwischen Haut und Schleimhaut (Mund, Nase, After, Harnröhre, Vulva) mit „Splitterschmerz“]
Borax [besonders bei schlechter Heilungstendenz und Entzündungsneigung von Rhagaden]
Calcium fluoratum
[hyperkeratotische Veränderungen; spröde und rissige Haut, herabgesetzte Elastizität der Haut und des Bindegewebes]
Cistus canadensis [harte Haut (Hyperkeratosen) mit Finger- und Hohlhandrhagaden (leicht blutend)]
Graphites
[trockene, rissige Haut; Einrisse, bes. an Körperöffnungen]
Mezereum (forte S) [Bläschen mit Krustenbildung und Juckreiz (Herpes simplex und Zoster]
Natrium muriaticum
[rissige Mundwinkel, Lippenrhagaden, Nasenrhagaden]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis, Placenta suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Symbioselenkung; ggf. Eisentherapie

Rhinitis, akute und chronische

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Rhinitis vasomotorica, Ozaena

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Naso-Heel SN (Tropf.)
[chronische und akute Rhinitis mit und ohne Sinusitis]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Sinusitis, bei Angina, Grippe und Otitis media]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [bei Grippe und grippalen Infekten]
Luffeel comp. (Tabl.) [bei allergischer Komponente]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (= Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Tonsillarhypertrophie incl. Rachenmandelhypertrophie und chronische Tonsillitis; Drüsenschwellungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Natrium-Homaccord (Tropf.)
[chronische Schleimhautkatarrhe; Skrofulose]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr bei exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [trockene Schleimhäute, ätzende, brennende Nasensekrete]
Eupatorium perfoliatum [„Grippe-Schnupfen“]
Euphorbium (forte S) [Nasenkatarrh mit heftigem Niesreiz; Ohrtubenkatarrh, Mittelohrhydrops]
Kalium bichromicum [chronische Rhinitiden mit zähen, strähnigen Absonderungen; Neigung zu Ulzerationen]
Kalium jodatum [Rhinitis (grüne, übelriechende, scharfe Sekrete), (Poly)Sinusitis)]
Luffa operculata [Rhinitis atrophicans mit Kopfschmerzen]
Natrium muriaticum [chronische Rhinitiden mit Nasenbluten und Geruchsstörungen]
Pulsatilla S [(chronische) Rhinitis mit dicken gelblich-grünen, nicht ätzenden Schleimabsonderungen]
Sanguinaria [Katarrhe der oberen Luftwege mit „absteigender“ Tendenz, Übergang in Tracheitis, Bronchitis]
Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A$_9$, Grippe-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Nervus olfactorius suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Inhalationen, Kurzwellen

Rhinopathia vasomotorica

- **BESONDERE HINWEISE:**

Basistherapie
Orale Therapie:
Naso-Heel SN (Tropf.)
[chronische und akute Rhinitis mit und ohne Sinusitis]
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Luffeel comp. Heuschnupfenspray
[bei allergischer Komponente]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[asthmatoide Bronchitis sowie Bronchiolitis und Pertussis; vasomotorische Rhinitiden mit konsekutiven spastischen Bronchitiden (Heuschnupfen, Heufieber, Heuasthma)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Luffeel comp. (Tabl.) [bei allergischer Komponente]

Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen; Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Bereich der oberen und unteren Luftwege und der Bindehaut des Auges]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Chlorum [Rhinitis vasomotorica mit Stimmritzenkrampf]
Galphimia [Rhinopathia allergica, allergisches Asthma; desensibilisierend, desallergisierend]
Kalium bichromicum [Neigung zur Chronizität]
Luffa operculata [allergische (Heuschnupfen) und vasomotorische Rhinitis mit Kopfschmerzen]
Natrium muriaticum
[Rhinitis vasomotorica (Heuschnupfen, Heufieber)]
Sanguinaria
[Katarrhe der oberen Luftwege mit „absteigender" Tendenz]
Vincetoxicum [Gefäß- und Sympathikuswirkung]

Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Polypus nasalis-Nosode, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Intermediäre Katalysatoren: **Histamin** (Hochpotenzen)

Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Mucosa nasalis suis, Nervus olfactorius suis, Tonsilla suis**

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Allergenarme Kost

Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung; Desensibilisierung

Rhinophym („Pfundnase", „Knollennase")

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, Rhinosklerom (Klebsiella pneumoniae- bzw. Klebsiella rhinoscleromatis-Infektion!)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Betr. Talgdrüsenhypertrophie
  Androtropie! Oft kombiniert mit Akne rosacea. Evtl. Operation.

Basistherapie

Orale Therapie:
Cruroheel S (Tabl.)
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatosen sowie bei Sklerodermie, Erythematodes sowie bei Akne und Ekthyma]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; bei Hypercholesterinämie, Erythematodes sowie bei Dermatosen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht, u.a. auch im Klimakterium]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung (fibroangiomatöses Rhinophym mit Teleangiektasien!) sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Endarteriitis obliterans, Arteriosklerose, Diabetes mellitus sowie bei Erythema nodosum et multiforme]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden; allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der Organfunktionen bei Dystrophia adiposo-genitalis (Männer), Ejaculatio praecox, Impotentia virilis sowie bei Erschöpfungszuständen]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Sklerodermie und Adipositas]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Thuja S [bei allen proliferativen Prozessen]

Nosoden-Injeele:
Psorinum, Tuberculinum

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Fleischarme Kost, Alkoholverbot

Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung

Roemheld-Syndrom (Gastrokardialer Symptomenkomplex)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache der pathologischen Gasansammlung (= Meteorismu) im Magen (Aerophagie?) bzw. im Darm (Flatulenz) abklären!
  Je nach Grundleiden abdominelle Symptome!
  Sehr häufig Ulkus-, Leber-, Galle- und Pankreasbeschwerden!

Basistherapie

Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pectanginöse Beschwerden, auch vertebragener Ursache]
Ceanothus-Homaccord [Oberbauchsyndrom, Pankreaserkrankungen]

Parenterale Therapie:
Cor Compositum N (Tropf.) [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]

Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
Angio-Injeel (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen, Herzstiche und Herzschmerzen, nervöse Herzstörungen sowie Angina pectoris und Altersherz]
Diarrheel S (Tabl.)
[akute und chronische Diarrhoe; Gastroenteritis oft mit folgenden Symptomen verbunden: Tympanie, Meteorismus, Dyspepsie]
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität, Duodenitis, Ulcus duodeni]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi/duodeni]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden]

Leptandra compositum (Tropf., Amp.) [Oberbauchsyndrom bei Leber- und bei Pankreasaffektionen chronischer Art sowie auch bei akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern), Meteorismus]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreaserkrankungen und Oberbauchbeschwerden, Pankreatitis sowie Störungen der Pankreasfunktion]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Podophyllum compositum (Tropf., Amp.)
[gastrokardialer Symptomenkomplex bei Colitis]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [Magenspätschmerz und Nüchternschmerz]
Asa foetida [Gastritis mit Blähungskoliken]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: pastöse Lymphatiker]
Lycopodium S [Leberleiden mit „Trommelbauch"]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Schleimhautmittel für Gastrointestinaltrakt]
Natrium sulfuricum
[Blähungskoliken und morgendliche Durchfälle]
Intermediäre Katalysatoren:
Chinhydron [Anazidität, Anregung der Pankreassaft- und Gallensekretion],
Histamin [allergische Gastritis mit Magen-Darm-Spasmen],
Indol bzw. **Scatol** [intestinale Intoxikationserscheinungen, Darmdystonie]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährungstherapie: Vermeidung blähender Speisen und kohlensäurehaltiger Getränke
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Herz, Xiphoid (Schwertfortsatz des Brustbeins), Magenpunkte, oberer Grenzstrang, Quaddelbehandlung: Thorax, kleine Wirbelgelenke
Weitere Verfahren: Physikalische Therapie

Rosacea

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hepeel (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Hepar compositum N
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [akute Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Cruroheel S (Tabl.) [eitrige Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen), Umstimmungsmittel]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ekzematöse Veränderungen]
Gynäcoheel N (Tropf.) [bei Patientinnen interponieren]
Hepar compositum N (Amp.) [Leberentgiftung]
Hormeel SN (Tropf., Amp.) [bei Patientinnen interponieren]
Ovarium compositum (Amp.)
[Verbesserung der hormonellen Funktionen bei Frauen]
Placenta compositum (Amp.)
[Verbesserung der peripheren Durchblutung]
Syzygium compositum N (Tropf.) [bei Diabetes mellitus]
Testis compositum N Ampullen
[Verbesserung der hormonellen Funktionen bei Männern]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Anregung der körpereigenen Abwehr]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Psorinum-Injeel [Umstimmungsmittel],
Pyodermie-Nosode [Hauteiterungen],
Staphylococcus [Hauteiterungen],
Tuberculinum [Konstitutionsnosode]
Katalysatoren-Injeele:
Acidum DL-malicum [katalytische Wirkung]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Heilerdeauflagen
Mikrobiologische Therapie
Ernährungsumstellung

Röteln (Rubeolae, „German Measles")

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Scharlach, Masern
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Schwangerschaft: Rötelnembryopathie (Gregg-Syndrom) sowie Rötelfetopathie (geistige und körperliche Retardierung im Kindesalter!).
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme („Rubeola morbillosa"); zerebrale Reizzustände]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch bei Viruserkrankungen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [zu Beginn der Fieberphase; Schüttelfröste]
Belladonna S
[Rötungen und Schwellungen mit Fieber und Unruhezuständen]
Dolichos pruriens [juckende Exantheme; Verschlimmerung durch Bettwärme und Kratzen]
Ferrum phosphoricum [initiale Fieber- und Entzündungszustände]
Scrophularia nodosa [entzündliche Lymphdrüsenschwellungen]
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Bäder

Samenstrangneuralgien (Neuralgia spermatica bzw. testicularis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gonorrhoe, Lues, benigne und maligne Tumoren (Sarkom, Metastasen von Hodentumoren), Folgen von Hodentorsionen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]

Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Testis compositum N Ampullen [Libido- und Potenzstörung, allgemeine Schwächezustände]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (auch im Bereich der ableitenden Harnwege; Neuralgia spermatica/testicularis auch bei Steinkolik – nicht allzu selten!)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [antineuralgische Wirkung]
Arsenicum album S [Neuritiden und Neuralgien mit Unruhe und brennenden Schmerzen]
Berberis vulgaris [Samenstrangneuralgien bei Uretersteinabgang]
Magnesium phosphoricum [Neuralgien mit krampfhaften Schmerzen]
Rhododendron [Hoden- und Nebenhodenschmerzen]
Sabal serrulatum [Samenstrangneuralgien bei Prostataaffektionen und Epididymitis]
Zincum valerianicum [nervöse Störungen (Insomnia nervosa) und neuralgische Beschwerden]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Suis-Organpräparate Injeele:
Ductus deferens suis, Epididymis suis, Testis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Ggf. Suspensorium, örtliche Wärme
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Scharlach

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Angina tonsillaris, Ausschluss anderer exanthematischer Infektionskrankheiten wie Masern, Röteln, Ringelröteln (Erythema infectiosum acutum), Exanthema subitum (Roseola infantum).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Begleit- und Folgeerkrankungen wie Otitis media, Myokarditis, Nephritis, rheumatoide Gelenkerkrankungen. Antibiotikatherapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie, z.B. auch bei akuter und chronischer Glomerulonephritis (Scharlach-Nephritis!)]
Angin-Heel SD (Tabl.)
[Tonsillarpfröpfe; Angina tonsillaris (Scharlach-Angina!)]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Sickerblutungen; Blutungsneigung (Scharlach-Purpura, Scharlach-Nephritis und embolische Herdnephritis!)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [infektiös-toxische Myokardschäden bzw. Folgen von Herzmuskelschädigungen (Scharlach-Myokarditis!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders auch bei unklaren fieberhaften Infekten]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[initiale akute Fieberzustände mit Schüttelfrösten]
Apis S [ödematöse Zustände; Scharlach-Nephritis; Scharlach-Angina]
Baptisia S [akute Infektionen mit hohem Fieber und Somnolenz bzw. Delirien sowie Sepsis-Tendenz]
Belladonna S [lokalisierte Entzündungen (Scharlach-Angina!) mit Rubor-, Tumor-, Calor-, Dolor-Symptomatik]
Colchicum (forte S) [rheumatoide „springende“ bzw. „wandernde“ Gelenkbeschwerden (Scharlach-Rheumatoide!); Endokarditis/Myokarditis, Scharlach-Nephritis mit Ödemen]
Ferrum phosphoricum [Sofortmittel bei Fieber- und Entzündungszuständen incl. Otitis media]
Lachesis S [bei septischen Prozessen mit Kapillarschädigung (Scharlach-Purpura)]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[entzündliche Prozesse, wie Angina tonsillaris, Otitis media, aber auch Nephritis und Albuminurie]
Stramonium [Erregungszustände, Delirien, Fieberkrämpfe, heiße Schweiße (ohne Erleichterung!) bei Infektionskrankheiten]
Nosoden-Injeele nach überstandener Krankheit bzw. zur Nachbehandlung:
Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Homöopathisierte Allopathika Injeele: **Penicillin**
Suis-Organpräparate Injeele: **Cor suis, Cutis suis, Hepar suis, Ren suis, Tonsilla suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Evtl. kalte Halswickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung bei Rezidividen bzw. Rückfällen

Schlafstörungen (Insomnie)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache und Art (Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen) abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Nervoheel N (Tabl.) [nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Valerianaheel (Tropf.) [Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Suppositorien:
Viburcol N [bei Kindern]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Erregungszuständen sowie bei vegetativer Dystonie, bei Depressionen und Arteriosklerose und bei sonstigen geriatrischen Indikationen („Greisenschlaf“ = Durchschlafstörungen mit vorzeitigem Erwachen) sowie nach Commotio cerebri]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien, besonders Ischias]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen (z.B. Cholangitis, Cholezystitis) sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatosen und Neurodermitis (besonders nächtlicher quälender Pruritus!)]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.) [Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische und Bandscheibenbeschwerden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss; Meteorismus]

Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen, u.a. auch bei Enuresis (Mädchen), Kraurosis vulvae und im Klimakterium]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globus hystericus]

Einzelmittel-Injeele
Chamomilla [nächtliche Unruhe- und Erregungszustände, bes. bei Erethismus im Kindesalter sowie bei Agrypnia laeta]
Coffea [Insomnie (Einschlafstörungen) infolge hellwacher Gedanken; fehlendes Schlafbedürfnis]
Hyoscyamus [delirante (bes. nächtliche) Ruhelosigkeit mit Verwirrungszuständen]
Nux vomica S [Durchschlafstörungen mit nächtlichem Erwachen ca. zwischen 3 und 7 Uhr (physiologische nächtliche Säureflut)]
Rhododendron [Insomnie bei motorischer Unruhe]
Sulfur (forte) S [Einschlafstörungen sowie Durchschlafstörungen („Katzenschlaf") mit Erwachen zwischen 3 und 4 Uhr nachts]
Valeriana [Schlaflosigkeit als Folge von Aufregungen, Überarbeitung und Stress; ggf. verbunden mit Kopfschmerzen]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [nacht schlaflos, morgens müde]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Ovarium suis, Pankreas suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie: Baldrianbäder

Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Schmerzen

Ein gegen Schmerzen jeder Art allgemein wirksames Biotherapeutikum existiert nicht, da Schmerzen der Ausdruck dessen sind, dass (je nach Art des Schmerzes) wechselnd bzw. verschiedene Homotoxine an verschiedenen neuralen Rezeptoren im Sinne der Imprägnationsphasen zur Auswirkung kommen. Durch Darreichung von Analgetika wird die Homotoxinlage nicht verbessert, im Gegenteil meist im Sinne zusätzlicher Retoxineffekte bzw. einer Imprägnationswirkung verschlechtert; d.h. nicht kausal beeinflusst.
Mit Darreichung des Syndrom-gemäß indizierten Biotherapeutikums wird die der Entstehung des Schmerzes zugrunde liegende Homotoxinlage beeinflusst (kurativer Effekt).
Jedes Antihomotoxikum-Biotherapeutikum kann damit indirekt als Schmerzmittel wirken. Häufig indiziert sind die im folgenden kurz charakterisierten Präparate (alphabetisch aufgelistet).
Hierbei sollten diese Mittel bei oraler Applikation initial – etwa über 2 Stunden – stoßtherapeutisch eingesetzt werden, also etwa alle 15 Minuten jeweils 8-10 Tropfen bzw. 1 Tablette als ED.
Bei parenteraler Medikation empfiehlt es sich, bei Schmerzzuständen 2-3mal täglich als ED jeweils 1 Ampulle zu applizieren.

Atropinum compositum (Amp.)
Atropinum compositum S (Supp.)
[Schmerzen bei Gallen- und Nierenkoliken sowie Nabelkoliken der Kinder, spastischer Husten und Dysmenorrhoe]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen bei lokalisierten Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel, Karbunkel]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen bei Reiz- und Entzündungszuständen (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.) [Schmerzen bei Gallenkoliken sowie bei Cholangitis, Cholezystitis]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias, Osteochondrose, besonders der LWS]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Herzschmerzen und Herzstiche]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Duodenoheel (Tabl.) [Schmerzen bei Hyperazidität sowie bei Duodenitis und Ulcus duodeni]
Gastricumeel (Tabl.) [Magenschmerzen bei Gastritis acuta und chronica sowie bei Sodbrennen und Meteorismus]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation, Zervikalsyndrom, Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich sowie bei Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Pectus-Heel (Tabl.) [pektanginöse Beschwerden]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien und pleuritische Schmerzen sowie Herpes zoster]
Reneel N (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege); Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]

Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[Schmerzüberempfindlichkeit; neuralgiforme und fieberbedingte Schmerzen]
Apis S [stechende brennende Schmerzen]
Arsenicum album S [brennende Schmerzen mit Kältegefühl]
Asa foetida [Knochenschmerzen]
Aurum [Knochenschmerzen]
Belladonna S
[diffuse und entzündungsbedingte Schmerzen mit Pulsieren und Klopfen]
Bryonia S [stechende Schmerzen]
Cantharis [brennende Schmerzen, bes. in der Blase und in den Ovarien]
Carbo vegetabilis [brennende Schmerzen]
Chamomilla [Schmerzüberempfindlichkeit; erethische Unruhe]
Chelidonium [Schmerzen im Leber-Gallenbereich]
Coffea [Schmerzüberempfindlichkeit; Ruhelosigkeit; Insomnie]
Colocynthis S [krampfhafte Schmerzen]
Cuprum [krampfhafte Schmerzen]
Eupatorium perfoliatum [Knochenschmerzen]
Ferrum metallicum
[klopfende rheumatische Schmerzen; bes. links lokalisiert]
Ferrum phosphoricum
[Schmerzen bei Fieber und Entzündungszuständen; bes. rechts lokalisiert]
Gelsemium S [heftige Kopfneuralgien]
Glonoin [Herzschmerzen sowie klopfende bzw. pulsierende Kopfschmerzen]
Kalmia S [Herz- und Gelenkschmerzen]
Kalium carbonicum [stechende Schmerzen]
Ledum [Schmerzen in den Gelenken]
Magnesium phosphoricum
[krampfhafte Schmerzen; incl. Kopfschmerzen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Knochenschmerzen]
Phosphorus S [brennende Schmerzen]
Pulsatilla S [wandernde Schmerzen]
Rhus Tox S
[diffuse rheumatische Gelenk- und Muskelschmerzen]
Silicea [Knochenschmerzen]
Sulfur (forte) S [brennende Schmerzen]
Symphytum [Periost- und Knochenschmerzen]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [Schmerzen mit brennender Hitze an Händen und Fußsohlen]
Tuberculinum [wandernde Schmerzen]

Schwindel

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!
  Differentialdiagnostisch sind hauptsächlich folgende Schwindelzustände zu unterscheiden, wobei auch Überschneidungen der einzelnen Ursachen beim „Leitsymptom Schwindel" vorkommen: otogener, okulärer, vertebragener bzw. zervikaler, zirkulatorischer (= diffuser Hirnschwindel), neurogener, psychogener Schwindel sowie anoxämischer Schwindel, Schwindel bei Durchblutungsstörungen und Schwindel bei Intoxikationen

Basistherapie
Orale Therapie:
Vertigoheel (Tropf., Tabl.) [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Parenterale Therapie:
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.)
[Arteriosklerose, besonders Zerebralsklerose]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Arteriosklerose und nach Commotio cerebri sowie bei Neuralgien und Depressionen, bei vegetativer Dystonie sowie bei multipler Sklerose und Parkinsonscher Schüttellähmung, bei Gedächtnisschwäche und nervöser Erschöpfung]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[Kinetosen, Erschöpfungszustände nach Überarbeitung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Myokardschwäche, Altersherz]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom; Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS)]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen und Schwindel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ambra [psychogen bedingter Schwindel]
Conium S [zerebraler (Alters)Schwindel; Schwindel bei Lageveränderung, Drehschwindel]
Tabacum [heftige Schwindelzustände mit Übelkeit und Schwächegefühl sowie kalten Schweißen]
Viscum album [zerebrale Kongestionen (Hypertonie) mit Schwindelanfällen und Kopfschmerzen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum totalis suis, Cor suis, Os petrosum suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Zervikalsyndrombehandlung bei vertebragenem Schwindel
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie; manuelle Therapie bei vertebragenem Schwindel

Seborrhoe

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Sowohl die Seborrhoea oleosa (ölige Hautbeschaffenheit) als auch die Seborrhoea sicca/squamosa (kleienförmige fettige Schuppung) fördern das Entstehen einer Akne vulgaris/conglobata/rosacea

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Intertrigo, Ekzeme, Hyperhidrosis]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Seborrhoe bei „Salbengesicht" beim Morbus Parkinson]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Allergie, Impetigo contagiosa, Akne vulgaris, sowie bei Dermatomykosen, Neurodermitis und Crusta lactea, bei Sklerodermie und Erythematodes und bei Haarausfall (Alopezie: Seborrhoea capitis = Alopecia sicca bzw. pityroides = Haarausfall mit kleienförmiger Schuppung!)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Hypercholesterinämie sowie bei Dermatosen und Neurodermitis]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch indiziert bei Myxödem sowie bei Sklerodermie, Elephantiasis und Adipositas]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus (forte S)
Calcium carbonicum [nässende seborrhoische Ekzeme (Seborrhoea oleosa) bei Lymphatismus bzw. bei exsudativer Diathese]
Graphites [Seborrhoe mit Hautschuppen (= Seborrhoea sicca bzw. squamosa) und Haarausfall; Neigung zur Fettsucht und Obstipation]
Hepar sulfuris [bei Neigung zu eitrigen Prozessen]
Selenium
[Beziehungsmittel zu Hautfunktionen (Akne) und Haarausfall]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel bei seborrhoischen (trockenen) Ekzemen (= Seborrhoea sicca bzw. squamosa)]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Vermeidung stark gesalzener und gewürzter sowie geräucherter/gepökelter und fetthaltiger Speisen
Physikalische Therapie: UVA-Bestrahlung, Hydrotherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Singultus („Schluckauf“)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache [keinesfalls „ösophagusspezifisch“, sondern auch durch lokale Krankheitsprozesse oder operative Eingriffe hervorgerufene Kontraktionen des Zwerchfells aber auch intrathorakaler bzw. intraabdominaler Organe; ferner zentralnervöse Ursachen (Enzephalitis, Schädel-Hirn-Traumen) sowie rein psychogen] abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Parenterale Therapie:
Atropinum compositum [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.)
[Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom (d.h. Erbrechen, Brechreiz bzw. Vomitus, Singultus)]
Cardiacum-Heel (Tabl.)
[funktionelle pektanginöse Beschwerden]
Duodenoheel (Tabl.)
[Hyperazidität sowie Duodenitis und Ulcus duodeni]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen; Meteorismus]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus sowie im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Anacardium [Hunger- und Nüchternschmerz]
Argentum nitricum [Völlegefühl, Aufstoßen bessert; „Splitterschmerz“]
Colocynthis S [Koliken mit stechenden Schmerzen; der Patient muss sich einkrümmen]
Hyoscyamus [Zusammenschnürungsgefühl im Schlund; erschwertes Schlucken mit Singultus]
Ignatia S [Gefühl eines Klumpen im Hals und im Ösophagus mit unerschöpflichem Singultus sowie „Seufzer-Atmen“ (kann nicht durchatmen)]
Ipecacuanha [Gastroptose, Übelkeit, Brechreiz und Vomitus]
Magnesium phosphoricum
[Koliken mit Luftaufstoßen und Brechwürgen]
Nux vomica S [spastische Gastritiden incl. Gastritis alcoholica]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cardia ventriculi suis, Oesophagus suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie (in Reflexzonen)

Sinusitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sinusthrombose, Orbitalphlegmone, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig, bes. bei Kindern, auch als Sinubronchiales Syndrom auftretend: Rhinitis, Rachenmandelhypertrophie, Tonsillarhypertrophie, adenoide Vegetationen, Lymphangitis und Lymphadenitis, Lymphatismus, Tracheitis, Bronchitis, Bronchiektasen. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr, u.a. auch bei Grippe und Otitis media sowie bei Sinusitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Naso-Heel SN (Tropf.) [Rhinitis acuta et chronica mit und ohne Nasennebenhöhlenbeteiligung]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Adipositas und Asthma bronchiale]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Cinnabaris [subakute und chronische Sinusitis und Rhinitis mit übelriechenden Sekreten]
Euphorbium (forte S) [Schleimhautkatarrhe der oberen Luftwege sowie Ohrtubenkatarrhe, Mittelohrhydrops und Bronchialkatarrhe („Katarrhlunge“ beim Sinubronchialen Syndrom mit Hilusdrüsenanschwellung)]
Hepar sulfuris
[eitrige Nasennebenhöhlenaffektionen; Phlegmone-Tendenz]
Hydrastis [dicke, zähe, strähnige fadenziehende Sekrete]
Kalium bichromicum [chronische Nasenaffektionen und Sinusitis mit zähen strähnigen Absonderungen]
Luffa operculata [allergische und vasomotorische Rhinitis und Sinusitis mit (Stirn)Kopfschmerzen]
Manganum aceticum
[chronische Schleimhautkatarrhe der Luftwege]
Rhododendron [Wetterverschlimmerung]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Grippe-Nosode, Otitis media-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Nervus olfactorius suis, Tonsilla suis, Tonsilla pharyngica suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Rotlicht

S

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Bergsmann-Punkte, Glabella
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Ozontherapie, Fokussuche (Polysinusitis als Fokus!), Punktion bzw. Operation, Symbioselenkung

Sjögren-Syndrom (Dakryo-Sialo-Adenopathia atrophicans)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chronische Polyarthritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  ferner: Xerostomie, Parotisaffektionen, Gelenkbeteiligung (in 2/3 der Fälle chronische Polyarthritis)

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen].
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische (Xerodermie); zur Langzeittherapie bei Keloiden]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen (häufig chronische Cholezystopathie beim Sjögren-Syndrom) sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[vesikulöse Ekzeme, Pruritus; Herpes zoster]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen, u.a. auch bei HVL-Insuffizienz beim weiblichen Geschlecht (Gynäkotropie des Sjögren-Syndroms mit Maximum im Klimakterium!)]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ambra [Trockenheit (Xerosis) der Mund- und Nasenschleimhaut]
Belladonna S [Trockenheit der Schleimhäute incl. Xerostomie]
Bryonia S
[bitterer Mundgeschmack; Gelenkaffektionen (Synovitis)]
Causticum S [Trockenheit der Augen (Xerophthalmie) und Lichtscheu („Sandgefühl")]
Chlorum [Trockenheit der Zunge]
Graphites [Blepharo-Konjunktivitis; chronische Polyarthritis]
Magnesium carbonicum
[Trockenheit der Schleimhäute (Augen, Nase, Rachen)]
Mandragora e radice siccato
[Trockenheit der Mundschleimhaut (Xerostomie)]
Natrium muriaticum [trockene Zunge; Foetor ex ore; Geruchs- und Geschmacksstörungen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosoden, Mumps-Nosode, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Lingua suis, Medulla oblongata suis, Mucosa nasalis suis, Oculus totalis suis, Parotis suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vollwertkost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie, augenfachärztliche Untersuchung und Kontrollen

Sklerodermie

(zirkumskripte [lilac ring!] und diffuse/progressive = progressive systemische Sklerose = Autoagressionskrankheit!)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere Kollagenosen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.) [Ekzeme, besonders trockene, chronische; zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Graphites-Homaccord [Ekzeme, besonders trockene, chronische; zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hormeel SN (Tropf., Amp.) [funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Placenta compositum (Amp.) [Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung (Raynaud-Syndrome bei progressiva systemischer Sklerose!)]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsen- und physiologischen Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Sklerodermie]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Rhagaden an Haut- und Schleimhautübergängen, z.B. am Mundwinkel; hyperkeratotische Hautveränderungen („hornige Verdickung")]
Causticum S [Polychrest: brennende Schmerzen, Schwäche und Zittern, Wundheitsgefühl (wie „rohes Fleisch")]
Conium S [bei allen Verhärtungen und Indurationen]

Graphites [bei allen Verhärtungen und Indurationen]
Hydrocotyle asiatica [sklerodermische Hautverdickungen (mit Pruritus und Schuppungen)]
Thuja S [Konstitutionsmittel, bes. bei Krankheiten mit Neigung zu indurativen/proliferativen Prozessen; ferner verkrüppelte leicht abbrechende Nägel, verschiedene Hautaffektionen und Beschwerden rheumatischer Art (Gelenkschmerzen bei diffuser/progressiver Sklerodermie!)]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis, Placenta suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleisch- und allergenarme Kost
Weitere Verfahren: Neuraltherapie, physikalische Therapie

Sodbrennen (Pyrosis)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären (meist verursacht durch peptischen Mageninhalt bei „Ulkus-Krankheit“)

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.)
[Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom; Vomitus (matutinus)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[Oberbauchsyndrom; Pankreopathie]
Duodenoheel (Tabl.) [Duodenitis; Ulcus duodeni; Hyperazidität]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Gastritis (acuta) mit Dyspepsie und Völlegefühl; Alkoholunverträglichkeit; kalkweiß belegte Zunge; gereizter, mürrischer „Magenmensch“]
Argentum nitricum [Gastritis und andere Schleimhautaffektionen mit und ohne Ulkus; vorzeitig gealterte abgemagerte Typen!]
Arsenicum album S [brennende Magenschmerzen; Periodizität]
Carbo vegetabilis [Dyspepsie, Flatulenz, Magenbrennen; Alkoholunverträglichkeit; gastrokardialer Symptomenkomplex]
Iris [Sodbrennen (Gastritis hyperacida) und Speichelfluss; Übelkeit, saures Erbrechen]
Nux vomica S [Gastritis mit Sodbrennen – besonders als Folge von Alkohol-, Kaffee- und Nikotinabusus]
Pulsatilla S [schleimig-eitrige Gastritiden]
Nosoden-Injeele: **Duodenitis-Nosode, Gastritis-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cardia ventriculi suis, Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Oesophagus suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Ernährung: Basische Kost, laktovegetabile Vollwertkost, mehrere kleine Mahlzeiten
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Sonnenbrand

(Erythema solare, Dermatitis solaris), Sonnenstich (Insolation)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Cave: Schocksymptomatik! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Causticum compositum (Tropf.)
[Sonnenbrand, Strahlenschäden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Causticum compositum
[Sonnenbrand, Strahlenschäden, Erschöpfungszustände]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Allergie, Dermatosen sowie Quincke‘schem Ödem]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Tachykardie; pektanginöse Beschwerden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss (ggf. alles verbunden mit Übelkeit und Brechreiz/Erbrechen (= Vomitus)]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S [pustulöse und blasige Hauteruptionen; Hautjucken und Hautbrennen]
Apis S [meningeale Reizzustände; ödematöse Schwellungen]
Arnica S
[tonisierende Gefäßwirkung; generell bei Entzündungen]
Belladonna S [Hirnhyperämie; Fieber]
Causticum S [brennende Schmerzen, „wie rohes Fleisch“]
Glonoinum [meningeale Reizzustände, Hirnhyperämie]
Helleborus
[meningeale Reizzustände, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen]
Veratrum S [Kreislaufschwäche, Kollapszustände; Hautjucken]
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**
Begleittherapie
Ernährung: Flüssigkeitszufuhr
Physikalische Therapie: Kalte Kompressen, kühle Bäder

Soor (Candida, Moniliasis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Leukoplakie, Mischinfektionen
- **BESONDERE HINWEISE:**
Pilzkultur! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

S

Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Stomatitis, Gastroenteritis, Enterocolitis (Soor im Bereich des Verdauungstraktes!), Zystitis, Pyelitis, Kolpitis, Fluor albus (Candidosis urogenitalis!) sowie bei Hautkrankheiten]
Lamioflur (Tropf.)
[Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.)
[Adnexitis, Endometritis, Parametritis, Dysmenorrhoe]
Syzygium compositum N (Tropf.) [Anregung der Abwehrsysteme und der Drüsenfunktionen bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen (also z.B. als Adjuvans indiziert bei Haut-Soor [Intertrigo], Soor-Urethritis, Soor-Balanitis, Soor-Vulvovaginitis des Alters-Diabetes)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Borax [Magen-Darm-Katarrhe; Mundschleimhautaffektionen, pilzartige Hautaffektionen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Schleimhautentzündungen der Mundhöhle (Stomatitis, Gingivitis) und des Magen-Darm-Kanals mit Foetor ex ore bei Soormykosen]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Tonsillitis-Nosode, Tuberculinum

Homöopathisierte Allopathika Injeele:
u.a. **Chloramphenicol, Doxycyclin, Erythromycin**

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Coecum suis, Colon suis, Cutis suis, Gingiva suis, Lingua suis, Mucosa nasalis suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung:
Laktovegetabile Vollwertkost, hefearm; ggf. Antipilz-Diät nach Dr.med. Rieth und Dr.rer.nat. R. Hauss

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Weitere Verfahren: Ozontherapie, Symbioselenkung

Staublunge (Silikose)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Boeck, Stauungslunge, Lymphangiosis carcinomatosa, Ornithose, Adenomatose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache der Staublunge eruieren! Benigne (z.B. Eisenstaublunge) und maligne (z.B. Silikose, Asbestose – progressive fibrotische Veränderungen) Verlaufsformen differenzieren! Ggf. Berufskrankheit! Adjuvante Therapie!
  Herzstützung: Rechtsherzinsuffizienz infolge pulmonaler Hypertonie (Cor pulmonale).

Basistherapie

Orale Therapie:
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronische Bronchitis, Emphysem]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung]

Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Droperteel (Tabl.) [Bronchitis verschiedener Genese, besonders auch als Adjuvans bei Stauungsbronchitis]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Bronchiolitis; asthmatoide Bronchitis]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Präkanzerosen, Karzinomen und Sarkomen sowie bei Asthma bronchiale]
Tonsilla compositum N Ampullen [Stimulation des Lymphapparates. Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [Lungenaffektionen; pleuritische Reizerscheinungen]
Conium S [Indurationen und Verhärtungen]
Echinacea [Fieber und Beteiligung des Lymphapparates (Lymphangitis, Lymphadenitis)]
Graphites [narbige Veränderungen]
Phosphorus S [Parenchymmittel bei (broncho)pneumonischen Zuständen; Blutungsneigung]
Silicea [Bindegewebsmittel, Neigung zu Chronizität, dystrophische Zustände, Hilusdrüsenschwellungen]

Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Klebsiella pneumoniae, Pertussis-Nosode

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Funiculus umbilicalis suis, Pulmo suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie: Atmungstherapie, Inhalationen

Neuraltherapie: Lungenfeld

Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, HOT

Strahlenkater, Strahlenschäden

Basistherapie

Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Causticum compositum (Tropf.)
[Sonnenbrand, Strahlenschäden, Erschöpfungszustände]

Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Causticum compositum
[Sonnenbrand, Strahlenschäden, Erschöpfungszustände]

Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. bei vegetativer Dystonie, bei nervöser Erschöpfung und bei sonstigen geriatrischen Indikationen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Dermatosen und Allergie sowie bei Elephantiasis, Quincke'schem Ödem und Haarausfall]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Glomerulonephritis, Enterocolitis]

Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatosen und toxischen Exanthemen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.) [Lymphatismus (u.a. Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer, aber auch psychischer Art]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Abrotanum [Appetitlosigkeit und allgemeine Schwäche; Abmagerung bei Heißhunger; Halonierung der Augen (dunkle „Augenränder“ als Symptom bei Störungen des Gesamtbefindens), faltiges, trockenes, blasses Gesicht]
Arnica S [Zerschlagenheitsgefühl; Muskelkater]
Arsenicum album S
[Schwäche, Abmagerung; unlöschbarer Durst; Angst; Unruhe]
Bryonia S [Muskelbeschwerden; großer Durst]
Causticum S
[Muskelschmerzen; brennende Schmerzen (wie „rohes Fleisch“)]
China S [Erschöpfungs- und Schwächezustände]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus, **cAMP**

Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis, Glandula thyreoidea suis, Hepar suis, Ren suis, Splen suis**

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamine, Vollwertkost, Mineralien, Spurenelemente
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie

Stress

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache(n) eruieren, behandeln bzw. eliminieren!
  Symptomatische Behandlung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]

Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Hypotonie; Herzrhythmusstörungen]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei vegetativer Dystonie, bei Depressionen, nervöser Erschöpfung, Gedächtnisschwäche und nach Commotio cerebri sowie auch bei Erregungszuständen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Pectus-Heel (Tabl.) [pektanginöse Beschwerden]
Pulsatilla compositum (Amp.)
[Aktivierung der mesenchymalen Abwehr; Stimulierung der Abwehrsysteme, speziell der Bindegewebsfunktion; zur Wirkungssteigerung biologischer Injektionspräparate sowie zur Therapie von zellulären Phasen und zur Reaktivierung geschädigter Abwehrsysteme, auch postoperativ]
Strophanthus compositum (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens, zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis, Kollapszustände]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Folgen von Überanstrengungen; Zerschlagenheitsschmerz, Muskelschmerzen]
Ignatia S [„Seufzer-Atmen“ (kann nicht durchatmen); Verschlimmerung durch körperliche und geistige Überanstrengung sowie durch Kummer, Aufregung, Schreck und Furcht]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel bei allen chronischen Krankheitszuständen; Reizbarkeit]
Veratrum S [depressive und manische Psychosen; Neigung zu Gewalttätigkeiten; Angst und Kreislaufschwäche]

Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Psorinum**

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Toxinarme Kost, Einschränkung von Reiz- und Genussmitteln
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Mineralsubstitution, Stressabbau, Autogenes Training

Struma

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Karzinom (Struma maligna; Metastasen)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Hormonelle (hypothyreot, euthyreot, hyperthyreot) und morphologische (diffus, knotig, zystisch; Hashimoto Strumitis lymphomatosa) Abklärung! Evtl. Hormonsubstitution!
  Anmerkung: Die individuelle Jodempfindlichkeit bei Kropfträgern ist sehr unterschiedlich! Im allgemeinen besteht im Norden der Bundesrepublik eine größere Jodempfindlichkeit als im Süden!

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel T (Tabl.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
[1 Tablette enthält 9,3 µg Jod]
Strumeel forte NF (Tropf.) [10 Tropfen enthalten 70 µg Jod]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. bei Depressionen und nervöser Erschöpfung sowie bei Erregungszuständen und vegetativer Dystonie sowie bei Gedächtnisschwäche und bei sonstigen geriatrischen Indikationen („Alters-Hypothyreose“)]

Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr]
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Tachykardie, Schilddrüsenüberfunktion; pektanginöse Beschwerden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Arteriosklerose und Diabetes mellitus sowie bei vegetativer Dystonie]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen, u.a. auch angezeigt beim Myxödem]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]

Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Drüsenverhärtungen; Riedel‘ eisenharte Struma durch Verschwielung bei chronischer Thyreoiditis]
Conium S [steinharte Knoten]
Fucus vesiculosus [Jodmangelkropf;, Adipositas]
Glonoinum [Herzklopfen bis zum Hals, Tachykardie]
Ignatia S [Polychrest mit vielen psychischen Beziehungen (vegetative Dystonie, Globus hystericus u.a.)]
Lycopus virginicus [Hyperthyreose, Morbus Basedow, Tachykardie]
Spongia [Struma colloides et parenchymatosa; „Strumaherz“; strumabedingter Räusperzwang]

Nosoden-Injeele:
Struma cystica, Struma nodosa, Struma parenchymatosa

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis, Tonsilla pharyngica suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Strumige Faktoren in Wirsingkohl, Weißklee, Raps und anderen thiozyanathaltigen Gemüsen beachten!
Ggf. jodreiche Ernährung.
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Sudeck‘sche Erkrankung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Anamnestisch (meist) Traumen (bes. Frakturen), aber auch Folge von Entzündungen, Nervenschädigungen und Operationen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, z.B. Fersensporn]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Elephantiasis sowie bei Arteriosklerose, Diabetes mellitus, bei chronisch kalten Füßen und gangränösen Ulcera
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum fluor S
[Knochenschmerzen, Knochenkaries, bes. im Bereich der langen Röhrenknochen; Parästhesien in Armen und Beinen]
Apis S [Brennen, Stechen; ödematöse Zustände]
Arnica S
[Folgen von Verletzungen jeder Art, wie Distorsionen, Kontusionen, Hämatomen, Frakturen]
Arsenicum album S [Haut juckend und brennend]
Calcium phosphoricum [Gliederschmerzen und Knochenschmerzen, bes. bei Wetterwechsel]
Dulcamara S [„Nasswettermittel“]
Natrium sulfuricum
[Nasswetterverschlimmerung; Gelenkknacken; Dyshidrosis]
Phosphorus S [Knochenatrophie, Knochennekrosen; brennende Schmerzen, Hitzegefühl]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele: **Arteria suis, Cutis suis, Glandula parathyreoidea suis, Medulla ossis suis, Musculus suis, Os suis, Sympathicus suis**

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Laktovegetabile Kost
Physikalische Therapie: Mobilisation, Krankengymnastik
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Tachykardie, paroxysmale

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache (u.a. vegetative Dysregulation, Herzinfarkt, Herzfehler, Myokarditis, Herzinsuffizienz (Überlastung der Vorhöfe), Basedow, Digitalis-Intoxikation, postinfektiöse und fokal-toxische Myokardschwäche, alternierendes Sick-Sinus-Syndrom) und Art (supraventrikulär, ventrikulär) abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cardiacum-Heel (Tabl.) [funktionelle pectanginöse Beschwerden, auch vertebragener Ursache]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Bluthochdruck, Tachycardie, pectanginöse Beschwerden]
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
Angio-Injeel
[Koronardurchblutungsstörungrn, pectanginöse Beschwerden]

Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [Herzrhythmusstörungen bei Hypotonie; vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris (Tonsillen ggf. als Streuherd)]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [nervöse Herzstörungen; Herzstiche; infektiös-toxische Herzmuskelschwäche; Altersherz sowie Zustand nach Myokardinfarkt]

Crataegus-Heel S (Tropf.) [Koronardurchblutungsstörungen; altersbedingte und infektiös-toxische Myokardschwäche]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen, paroxysmale Tachykardie z.B. bei Coxsackie-Virus-Infektionen!)]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen; Meteorismus]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom; Migraine cervicale, Osteochondrose der HWS
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Strophanthus compositum (Amp.)
[antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]

Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[Tachykardie mit Angstzuständen und Vernichtungsgefühl]
Adonis vernalis
[(anfallsweise) Tachykardie, bes. bei Hyperthyreose („Basedow-Herz“) sowie bei Myokardschwäche und Vitium cordis]
Digitalis
[Angriff am Reizleitungssystem des Herzens (Wechsel zwischen Bradykardie und Tachykardie; Sick-Sinus-Syndrom!)]
Glonoinum [Herzklopfen bis zum Hals, Extrasystolie; Hypertonie; Besserung an frischer Luft]
Kalium carbonicum (forte N)
[Herzmuskelschäden und Ödemneigung mit Arrhythmie]
Lycopus virginicus [Tachykardie, Arrhythmie; Herzangst (bes. bei Hyperthyreose)]
Rhododendron
[Herzklopfen; Verschlimmerung vor Wetterwechsel]
Spigelia S [stürmisches Herzklopfen, Extrasystolie, Herzstiche]
Tabacum [Herzklopfen mit Tachykardie; Übelkeit, Blässe, Todesangst, kalter Schweiß]

Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Fel suis, Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Tuberculinum**

Suis-Organpräparate Injeele: **Cor suis**

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Tendovaginitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Karpaltunnel-Syndrom (bei Sehnenscheidenentzündung der Beuger des Unterarms), Epicondylitis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ausschluss einer spezifischen Genese: Tbc, Gonorrhoe, Syphilis.

Basistherapie

Orale Therapie:
Discus compositum N (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Parenterale Therapie:
Discus compositum N [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien; neurale Störfelder]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden (Tendovaginitis hypertrophicans/stenosans/crepitans!)]
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus (Tendovaginitis oft als Weichteilrheumatismus auftretend, bei Kindern oft mit schmerzhaften Knötchen in Flexoren- und Extensorensehnen = Rheumatismus nodosus infantum!) und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei verschiedenen Tendinitiden/Tendovaginitiden]
Apis S [ödematöse Schwellungen mit stechenden Schmerzen]
Arnica S
[Verschlimmerung durch jede Bewegung und Erschütterung]
Asa foetida [stechende Knochenschmerzen; Periostitis]
Bryonia S [entzündliche weichteilrheumatische Affektionen]
Kalium jodatum [entzündliche Prozesse an Gelenkbändern und Gelenkkapseln incl. Tendovaginitis; Verschlimmerung durch Nässe und Kälte]
Rhus Tox S
[diffuse rheumatische Schmerzen an Bändern, Muskeln, Muskelansätzen und Sehnen; Nasswetterverschlimmerung]
Ruta [Überlastungsschäden im Bereich der Handgelenke incl. Ganglion!]
Symphytum
[Affektionen der Sehnen, Bänder und des Periosts]

Nosoden-Injeele: **Medorrhinum, Tuberculinum**

Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie:
Ruhigstellung, Vermeidung von Überlastungen, Lymphdrainage, Reizstrom

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Tetaniforme Zustände

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hyperventilationssyndrom = normokalzämische Tetanie; normokalzämisch ist auch die „Magentetanie“ (durch häufiges Erbrechen) und die Magnesiummangeltetanie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Kalziumstoffwechsel beachten (Hypokalzämie z.B. bei Hypoparathyreoidismus und bei chronischer Niereninsuffizienz [Hyperphosphatämie!]). Psychogene Ursache!

Basistherapie

Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]

Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum [Krämpfe und Koliken]

Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]

T

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Thyreoidea compositum (Amp.) [Schilddrüsendysfunktionen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S
[Fieberkrämpfe; zerebrale Erregungs- und Reizzustände]
Calcium carbonicum [Krampfdiathese; Verschlimmerung bei körperlichen und geistigen Anstrengungen]
Ignatia S [Polychrest mit psychischer Beziehung: u.a. „Seufzer-Atmen“ mit Lufthunger (DaCosta-Syndrom)]
Nosoden-Injeele: **Pertussis-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele: **Glandula parathyreoidea suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Milchprodukte
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie;
psychische Führung bei Hyperventilationstetanie (oft bei Konflikt- und Belastungssituationen)

Therapieschäden

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (ohne und mit Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Cholangitis; Cholezystitis; Gallenkoliken, Stauungsikterus; Leberschädigungen (Parenchymschäden), Hepatitis acuta und chronica; als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen, z.B. toxischen Exanthemen und Dermatosen sowie bei Erythematodes (u.a. auch Medikamenten-indizierter LE!); Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Pulsatilla compositum (Amp.)
[Aktivierung der mesenchymalen Abwehr; Stimulierung der Abwehrsysteme, speziell der Bindegewebsfunktion; zur Wirkungssteigerung biologischer Injektionspräparate sowie zur Therapie von zellulären Phasen; Reaktivierung geschädigter Abwehrsysteme, auch postoperativ]
Schwef-Heel (Tropf.)
[zur Anregung der Abwehrmechanismen; Pyodermien, Dermatosen, besonders juckende Ekzeme]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei: akuten und chronischen Erkrankungen der Nieren und Harnwege wie Zystitis/Zystopyelitis, Nephrolithiasis, Glomerulonephritis sowie bei Hydronephrose, Nephrose, Nephrosklerose und Hypertonie; Anregung der Nierenausscheidung bei sonstigen Fehlfunktionen wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, besonders auch bei Präkanzerosen, Karzinomen und Sarkomen sowie beim Hypernephrom; u.a. ferner angezeigt bei Myxödem, Induratio penis plastica, Naevi, Sklerodermie, Elephantiasis sowie bei Asthma bronchiale und Adipositas]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr, u.a. auch bei Therapieschädigungen wie Granulopenie, Agranulozytose und Leukämie sowie ferner bei Sklerodermie, Elephantiasis, toxischen Exanthemen, Erythema nodosum et multiforme]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Berberis vulgaris
[bei toxischer Überlastung der Ausscheidungsorgane Niere, Leber, Haut sowie der Nebenniere (Erschöpfungszustände, Halonierung der Augen)]
Nux vomica S [Therapieschäden im Verdauungstrakt]
Solidago virgaurea [Nierenschäden; diuretische Wirkung]
Homöopathisierte Allopathika Injeele:
Deren Auswahl ist abhängig zu machen von einer gezielten Anamnese oder/und den entsprechenden Medikamententestungen
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus,
Chinhydron,
Cystein,
Guanidin [Schäden nach Anwendung oraler Antidiabetika (Biguanide)],
Indol [medikamentenbedingte Darmdysbiose],
Scatol [medikamentenbedingte Darmdysbiose]
Suis-Organpräparate Injeele:
Abhängig zu machen von speziellem Organbefall bei Therapieschäden; generell **Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Ren suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Toxinarme Kost, Fasten
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Lymphdrainage

Thrombophlebitis (= Varikothrombose)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Phlebothrombose (= „tiefe Varikothrombose“ = Thrombosierung der Venenlichtung ohne wesentliche entzündliche Wandveränderungen; initial: meist „stumm“ und größte Emboliegefahr!)

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

T

Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.)
[Varizen, venöse Stase, variköses Ekzem, Hämorrhoiden (Hämorrhoidalthrombose; ggf. septische Thrombophlebitis der Pfortader!)]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatitis und Dermatosen]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Drüsenschwellungen]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Elephantiasis sowie bei Diabetes mellitus, Dekubitus und gangränösen Ulcera]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Durchblutungsstörungen, Varizen]
Apis S [entzündliche Ödeme incl. Phlegmasia alba dolens (Becken- und Oberschenkelvenenthrombose)]
Belladonna S [Rubor-Calor-Dolor-Tumor-Symptome]
Hamamelis [venöse Stase, Varizen mit ausgeprägter Thrombophlebitis-Tendenz, Ulcus cruris varicosum]
Lachesis S [ödematöse blau-rote entzündliche Schwellungen]
Pulsatilla S [Venostasen]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; entzündliche Prozesse]
Vipera berus [Thrombophlebitis; Schweregefühl in den Beinen; Ulcus cruris]

Nosoden-Injeele: **Staphylococcus**

Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Vena suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kompressionsverbände; Quarkwickel
Ausleitende Therapie: Blutegel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Tic nerveux

- **BESONDERE HINWEISE:**
Differentialdiagnostische Abklärung: u.a. psychogen (bei Konversions- bzw. Konfliktneurosen),
als extrapyramidales = striäres Syndrom (z.B. Tourette-Syndrom = Tic impulsif bei Myoklonie);
ferner bei Chorea minor (= Chorea rheumatica), als Tic douloureux bei Trigeminusneuralgie

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.) [Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]

Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Gelsemium-Homaccord
[Kopfschmerzen, Neuralgien]

Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Neuralgien, Depressionen, nach Commotio cerebri, bei Arteriosklerose, Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung sowie bei sonstigen geriatrischen Indikationen („Alters-Tic") und bei Erregungszuständen sowie ferner bei multipler Sklerose und Parkinsonscher Schüttellähmung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]

Einzelmittel-Injeele:
Cina [nervöse Erregungszustände, krampfartige Zuckungen, Zähneknirschen]

Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus

Begleittherapie
Ernährung: Vitamine, Mineralstoffe
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Autogenes Training

Tinnitus aurium

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Ohrgeräusche treten meist nicht als eigenständiges Krankheitsbild auf, sondern sind in der Regel ein Symptom für eine zugrundeliegende Störung. Als Ursachen kommen u.a. Reizung und Entzündung des Labyrinthes, Zerebralaffektionen, Intoxikationen und kardiovaskuläre Erkrankungen in Frage.

- **BESONDERE HINWEISE:**
Vielfach scheint Tinnitus ein kortikal-zerebrales Übererregbarkeitsphänomen zu sein.
Eine eingehende HNO-ärztliche und neurologische Abklärung sollte nach Möglichkeit vor Beginn der Behandlung durchgeführt werden.

Basistherapie
Orale Therapie:
Vertigoheel (Tabl., Tropf.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]

Parenterale Therapie:
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Symptomenbezogene Therapie
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[bei pulssynchronen Ohrgeräuschen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei toxischen Belastungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[zur Drainage der Kopflymphe]
Valerianaheel (Tropf.) [für psychisch labile Patienten]

Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten]
Cimicifuga S
[nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände]
Tabacum [Beschwerden bei Blutdruckabfall, Verbesserung der Durchblutung allgemein]

Begleittherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Psychotherapie, autogenes Training
Physikalische Geräuschverdeckung durch sog. Tinnitus-Masker, Retraining-Behandlung
Manuelle Therapie
Gabe von Antioxidantien

Tonsillarhypertrophie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Kalt- und Nasswetterverschlimmerung, Tonsillarhypertrophie]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Angina und Fokaltoxikosen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein bzw. Polysinusitis); Mittelohrhydrops, Ohrtubenkatarrh]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Tonsilla compositum N Ampullen
[Stimulation des Lymphapparates; Steigerung der körpereigenen Abwehr bei exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastös-lymphatischen Pyknikern]
Calcium phosphoricum
[unterentwickelte magere Kinder mit Lymphatismus incl. „Hilusdrüsen-Kinder“]
Dulcamara S
[„Nasswettermittel“; auch bei rheumatischen Beschwerden]
Hepar sulfuris
[bei Neigung zu Eiterungen (wiederholte akute Anginen!)]
Lachesis S
[bei ödematösen dunkelroten Schwellungszuständen und Neigung zu septischen Prozessen]
Scrophularia nodosa [Lymphdrüsenschwellungen]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel]
Thuja S [Konstitutionsmittel bei allen proliferativen Vorgängen]
Nosoden-Injeele: **Bacillinum, Grippe-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Tonsillarpfröpfe, Tonsillitis-Nosode, Tuberculinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Glandula lymphatica suis, Tonsilla pharyngica suis, Tonsilla suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Wenig Milchprodukte
Weitere Verfahren: Neuraltherapie, Symbioselenkung

Torticollis

(Caput obstipum)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist muskulär bzw. rheumatisch.
  Ausschluss einer otogenen, okulären sowie striären (Torsionsdystonie mit Krämpfen!) Ursache!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Basistherapeutikum bei Osteochondrose sowie ferner Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Tonsillarhypertrophie (ggf. auch Grisel-Syndrom); Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Torticollis mit Muskel- und Zerschlagenheitsschmerz; Verschlimmerung durch Bewegung und Erschütterung]
Bryonia S [akut-entzündlicher Schiefhals]
Cimicifuga S [blitzartig einschießende Schmerzen; arthralgisch-myalgisch-neuralgischer Symptomenkomplex]
Colchicum (forte S) [„rheumatoider“ Schiefhals]
Colocynthis S [stechende Schmerzen; Parästhesien; Verschlimmerung durch Bewegung, Ärger und Schreck]
Ferrum metallicum
[Schulter-Arm-Syndrom (links) mit rheumatoiden Schmerzen]
Ferrum phosphoricum [Schulter-Arm-Syndrom (rechts) mit rheumatoiden Schmerzen]
Magnesium phosphoricum
[Torticollis spasticus vor allem beim Schlucken]
Rhododendron [Muskelbeschwerden; Neuralgien]
Rhus Tox S [Torticollis mit Nackensteifigkeit; Verschlimmerung in Ruhe („erethische Unruhezustände“); Anlaufschmerz („Startschmerz“), dann Besserung bei Bewegung]
Spiraea ulmaria (forte S) [Muskelrheumatismus]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Chirotherapie, physikalische Therapie

Tracheitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Meist als Laryngo-Tracheo-Bronchitis auftretend

Basistherapie
Orale Therapie:
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Katarrh, Atemnot]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]

Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (bes. im Anfangsstadium)]
Droperteel (Tabl.) [Bronchitis verschiedener Genese, besonders auch als Adjuvans bei Stauungsbronchitis, Pertussis]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Pertussis; Bronchiolitis; asthmatoide Bronchitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein); Mittelohrhydrops, Ohrtubenkatarrh]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Heiserkeit, Laryngitis, Pharyngitis, petechiale Blutungen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [bei Entzündungen der Luftwege]
Bryonia S [trockener Husten mit Stichen]
Causticum S
[absteigender Reizhusten mit brennendem Wundheitsgefühl]
Coccus cacti [Krampfhusten mit zähem, strähnigem Schleim]
Drosera [krampfhafter Reizhusten (bes. nachts) mit Retrosternalschmerzen]
Dulcamara S [Tracheitis mit Heiserkeit und Verschleimung]
Hepar sulfuris [bei Krupphusten mit wenig Auswurf]
Hyoscyamus [trockener Kitzelhusten bei Pharyngo-Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis (bes. nachts mit Unruhezuständen, Besserung beim Aufsitzen)]
Sanguinaria
[Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis mit Krampfhusten]
Spongia
[Heiserkeit mit bellendem trockenem Husten (Tracheitis sicca)]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Medorrhinum, Tuberculinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Bronchus suis, Larynx suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Gurgeln, Wärme

Trigeminusneuralgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Migräne, Arteriitis temporalis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären, u.a. Diabetes mellitus, Polysinusitis), postherpetisch, Intoxikation, Zahnerkrankungen, Fokaltoxikosen

Basistherapie
Orale Therapie:
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Stauungsikterus, Leberschädigungen (Parenchymschäden), Hepatitis acuta und chronica]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Trigeminusneuralgien durch Herpes zoster incl. postherpetische Neuralgien des 5. Hirnnerven]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.) [Umstimmungstherapeutikum bei Leberschäden; allgemein bei chronischen Erkrankungen]
Rhododendroneel S (Tropf.) [Neuralgien, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Trigeminusneuralgie (anästhesierender Aconitin-Effekt!)]
Argentum nitricum [neuralgische Kopfschmerzen mit Magenbeschwerden]
Bryonia S [heftige berstende Kopfschmerzen (bes. bei rechtsseitiger Lokalisation einer Trigeminusneuralgie) mit Reizhusten]
Cimicifuga S [heftige Kopfschmerzen (als wolle der Schädel zerspringen), bes. auch bei klimakterischen Frauen]
Colocynthis S [stechende Schmerzen, Parästhesien, Taubheitsgefühl; Periodizität]
Ferrum phosphoricum
[migräneartige Schmerzzustände; Periodizität]
Gelsemium S [Kopfneuralgien (Okzipital- und Trigeminusneuralgien) mit Benommenheit und Schwindel]
Gnaphalium polycephalum
[Neuralgien mit stechenden Schmerzen und Parästhesien]
Kalium bichromicum
[periodische Schmerzen über der Nasenwurzel und über den Augen mit Flimmerskotom (= Migräne-Symptom)]
Silicea [bes. bei linksseitiger Lokalisation]
Spigelia S [alle 3 Äste des Nervus trigeminus befallen – verbunden mit Nasoziliarneuralgie (= Charlin-Syndrom = meist einseitiger anfallartiger Schmerz am inneren Augenwinkel, (einseitige) Rhinitis, Tränenfluss, Konjunktivitis; ggf. Gesichtsrötung)]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Mastoiditis-Nosode, Sinusitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Nervus olfactorius suis, Pulpa dentis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.), **Mercurius** (Amp.) bei Amalgambelastung
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie; Fokussuche, ggf. Herdsanierung

Ulcus cruris

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache meist eine Varikosis bzw. Thrombophlebitis
  Stets Ausschluss eines Ulcus cruris arteriosum, z.B.
  bei Diabetes mellitus, bei Endarteriitis obliterans,
  bei Periarteriitis nodosa, bei Perniones
  sowie bei Hypertonie = Ulcus cruris hypertonicum Martorell

Basistherapie
Orale Therapie:
Cruroheel S (Tabl.) [Ulcus cruris]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lokale Therapie:
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen; variköses Ekzem]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Abszessen, Phlegmonen, Furunkeln und Fisteleiterungen sowie bei Osteomyelitis und bei Hautkrankheiten]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[vesikulöse Ekzeme, Pruritus; Herpes zoster]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[wetterbedingte Verschlimmerung]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung bei Fehlfunktionen der Nieren wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen]
Syzygium compositum N (Tropf.) [Anregung der Abwehrsysteme und der Drüsenfunktionen bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Ulcera cruris mit indurierten Rändern (Ulcus callosum), die sich bis zum Periost ausbreiten]
Carbo vegetabilis [Ulcus cruris varicosum, venöse Stase, schlechte Heilungstendenz]
Hamamelis [venöse Stasen, (Thrombo)Phlebitis, Ulcus cruris mit venösen Blutungen]
Kalium bichromicum [ausgestanzte tieffressende Ulzera]
Lachesis S [bei Neigung zu septischen Prozessen; düsterrote Entzündungszustände]
Lycopodium S [venöse Stase in den Beinvenen und Ulcus cruris bei Leberleiden]
Silicea [Bindegewebsmittel bei akuten und chronischen Eiterungen mit schlechter Heilungstendenz]
Vipera berus [Thrombophlebitis; lochartige Ulzera; Schweregefühl in den Beinen]
Nosoden-Injeele: **Pyodermie-Nosode, Staphylococcus**
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele: **Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Placenta suis, Vena suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Toxinarme Kost, Stoffwechselförderung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, Kompressionsverbände (z.B. Zinkleim)

Ulcus duodeni et ventriculi

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave Blutungen sowie Penetration und Perforation!
  Diagnostische Abklärung! „Medikamenten-Ulkus“ (Cortison, Phenylbutazon, Salizylate u.a.) ausschließen!
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Duodenoheel (Tabl.)
[Entzündungen und Reizzustände des Duodenums]
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Parenterale Therapie:
Erigotheel [Ulcus ventriculi et duodeni]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Suppositorien:
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.)
[Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom (Vorkommen nach allen Formen der Magenoperationen [Billroth I und II, Gastrojejunostomie] mit u.a. folgenden Symptomen: Tachykardie, Blässe, Schweiß, Übelkeit, Singultus, Vomitus], gegenregulatorische Hypoglykämie), Vomitus (matutinus)]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen als Ursache (hepatogenes Ulcus ventriculi/duodeni!) oder Folge sonstiger Erkrankungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (hepatogenes Ulkus!)]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden; regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Anacardium
[allgemeine Überreiztheit; Hunger- und Nüchternschmerz mit Besserung nach dem Essen (typisch für Ulcus duodeni!)]
Argentum nitricum
[abgemagerte, melancholische, nervöse Ulkus-Patienten]
Arsenicum album S [Brennschmerzen im Gastrointestinaltrakt; Periodizität; Unruhe, Angst, Verzweiflung]
Bismutum subnitricum
[Ulcus duodeni et ventriculi mit Meteorismus, Brechreiz und Durchfällen; Magenschmerzen besser durch Rückwärtsbeugen]
Graphites
[kallöses Ulkus, Ulkusvernarbungen; chronische (atonische) Obstipation]
Ipecacuanha
[Übelkeit und Brechwürgen; Blutungsneigung bei Ulkus]
Jodum [Heißhunger, Nüchternschmerz (typisch für Ulcus duodeni!); Abmagerung trotz guten Appetits; unruhige und gereizte Patienten]
Kalium bichromicum
[Entzündungen der Schleimhäute mit Geschwürsbildung]
Mandragora e radice siccato
[Hepatopathien und Ulcus duodeni (hepatogenes Ulkus); dabei Völlegefühl mit Luftaufstoßen; Besserung durch Rückwärtsbeugen, Verschlimmerung durch Vorwärtsbeugen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus, Duodenitis-Nosode, Gastritis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cardia ventriculi suis, Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Jejunum suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Reizstoffarme Kost; Einschränkung von konzentriertem Alkohol, Nikotinverbot
Physikalische Therapie: Leichte Wärme
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung

Urethritis, unspezifische

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung: u.a. Chlamydien, Mykoplasmen, Trichomonas, Candida, postgonorrhoisch;
  ferner auch beim Reiterschen Syndrom sowie bei Diabetes mellitus und bei Allergien

Basistherapie

Orale Therapie:

Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Populus compositum SR (Tropf.)
[Entzündungen und Reizzustände im Harnwegssystem]

Parenterale Therapie:

Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]

Suppositorien:

Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie

Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Zystitis, Pyelitis sowie bei Kolpitis (bei weiblicher Urethritis non specifica häufig auch als Vulvovaginitis klinisch in Erscheinung tretend!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen; Urethritis herpetica!)]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der ableitenden Harnwege]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei akuten und chronischen Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis/Zystopyelitis, Enuresis nocturna, Prostata-Adenom (1. Stadium) sowie bei Incontinentia urinae und Harnröhrenstrikturen]

Einzelmittel-Injeele:

Cantharis
[Zystitis und Urethritis mit Blasentenesmen, Harnzwang und Brennen in der Urethra nach der Miktion]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[chronische Schleimhautentzündungen (ätzende, scharfe, eitrige Absonderungen)]
Pulsatilla S [Schleimhautkatarrhe mit gelblich-grünlichen dickflüssigen Absonderungen]
Sepia [bei chronischen Schleimhauterkrankungen]
Solidago virgaurea
[Dysurie, Strangurie; dunkler, schleimig-blutiger Urin]
Thuja S [bei chronischen Zystitiden und Urethritiden mit Proliferationen (Urethritis fibroplastica mit hyperplastischen polypösen/papillomatösen Schleimhautveränderungen!); Verschlimmerung bei Nässe und Kälte]

Nosoden-Injeele:

Bacterium lactis aerogenes, Bacterium proteus, Bacterium pyocyaneus, Medorrhinum, Trichomonaden-Fluor

Suis-Organpräparate Injeele: **Funiculus umbilicalis suis, Ren suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis**

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Cave: Ethanol, scharf gewürzte Speisen, kalte CO_2-haltige Getränke

Physikalische Therapie: Wärme

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Urolithiasis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Glomerulonephritis, Nephritis urica („Gichtniere“ = Uratnephropathie)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nephrolithiasis (Harnsäure-Steine!) bei ca. 10-20% aller Gichtpatienten

Basistherapie

Orale Therapie:

Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Populus compositum SR (Tropf.)
[Entzündungen und Reizzustände im Harnwegssystem]

Parenterale Therapie:

Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Solidago compositum SN [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]

Suppositorien:

Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie

Albumoheel S (Tabl.) [Albuminurie, z.B. auch bei akuter und chronischer Glomerulonephritis und bei nephrotischen Krankheiten (d.h. beim Nephrotischen Syndrom: hierbei typisch Proteinurie/Albuminurie und ausgeprägte Ödeme)]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.) [kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung, also bei Hämaturie]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der ableitenden Harnwege]
Reneel N (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege – ohne und mit Konkrementbildung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Kollapszustände (mit kaltem Schweiß)]

Einzelmittel-Injeele:

Acidum benzoicum [harnsaure Diathese, Gicht; ammoniakalischer „Pferdeharn-Geruch“; Tenesmen]
Acidum oxalicum [Oxalurie; schmerzhafter Harndrang]
Arsenicum album S [Albuminurie, Zylindrurie]
Berberis vulgaris [uratische Diathese mit Nephrolithiasis, Uratsteine bzw. Ziegelmehlsediment (Heminatriumurat)]
Equisetum arvense
[uratische Diathese, Nierensteinbildung, Reizblase]
Lithium carbonicum [harnsaure Diathese; Blasentenesmen]
Solidago virgaurea [diuretisches bzw. regulierendes Nierenmittel, Dysurie, Strangurie, Albuminurie]
Veratrum S
[„homöopathisches Analeptikum“ bei Kollapszuständen]

Nosoden-Injeele: **Calculi renales, Cystopyelonephritis-Nosode**

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula parathyreoidea suis, Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung) mit **Lymphomyosot N**

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Ist abhängig zu machen von der Zusammensetzung des Steines und vom Harn-pH!
Anmerkung: bei eiweiß- und fettarmer, aber wasserreicher Kohlenhydratkost sind Nierensteine selten!

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Neuraltherapie:
Oberer Grenzstrang, Quaddelung paravertebral

U

Urtikaria

• **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären, u.a. Allergie sowie „Medikamenten-Urikaria“ (Azetylsalizylsäure u.a.), „Kosmetika-Urtikaria“, „Licht-Urtikaria“ und „Kälte-Urtikaria“ (= Urtikaria e frigore). Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Dermatitis, Dermatomykosen, Impetigo contagiosa sowie bei Quincke‘schem Ödem]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (intestinogene Urtikaria!)]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Solidago compositum SN (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung bei Hyperhidrosis, Fußschweiß und Ekzemen]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei Allergien]
Apis S [bei blassen ödematösen Schwellungen]
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastös-lymphatischen Pyknikern]
Formica rufa
[Umstimmungsmittel bei allergischen Reaktionslagen]
Urtica [urtikarielle juckende Dermatosen]
Nosoden-Injeele: **Tuberculinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (Hochpotenzen)
[allergische Erkrankungen der Haut]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Fleisch- und toxinarme Kost
Physikalische Therapie:
Kalte Umschläge
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme],
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]

Vaginitis / Vulvovaginitis

• **BESONDERE HINWEISE:**
Mikrobiologisches Profil
(u.a. Trichomonas, Candida, Chlamydien, Gonorrhoe)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lamioflur (Tropf.) [Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus, Rhinitis, Sinusitis]
Gynäcoheel N (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [exsudative Diathese, Lymphatismus, u.a. auch Fluor albus, bes. bei kleinen Mädchen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel (Tabl.) [klimakterische Neurosen sowie ferner (post)klimakterische Kolpitis (Kolpitis senilis)]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Pruritus vulvae und Vulvitis (bullosa)]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen- und Bindegewebs- und Abwehrfunktionen beim weiblichen Geschlecht; u.a. indiziert im Klimakterium, bei Dysmenorrhoe, Endometritis, Metritis, Parametritis, bei Menorrhagien und Kraurosis vulvae
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[chronische Schleimhautentzündungen, u.a. Zervizitis]
Kalium bichromicum [Kolpitis und Vulvitis ulcerosa]
Kreosotum [ätzender übelriechender Fluor; Pruritus vulvae]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Trichomonaden-Fluor
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis, Ovarium suis, Salpinx uteri suis, Urethra suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Plexus, gynäkologischer Raum
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Varikosis

• **BESONDERE HINWEISE:**
Operationsindikation abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Aesculus-Heel (Tropf.) [Varicen]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Placenta compositum
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus
[venöse (variköse) Durchblutungsstörungen; Parästhesien]
Apis S [ödematöse Entzündungs- und Schwellungszustände mit Stechen und Brennschmerz; Wärme verschlimmert]
Hamamelis [Venenstau, venöse Blutungen; Neigung zu Thrombophlebitis und Ulcus cruris varicosum]

Lachesis S
[Varikosis mit Neigung zu Ödemen und Thrombophlebitis]
Pulsatilla S [Krampfaderbeschwerden, Anschwellung der Unterschenkel; schlimmer in der Wärme]
Secale cornutum [Parästhesien und Gefäßkrämpfe mit brennenden Schmerzen]
Sepia [Venostase in den Becken- und Beinvenen mit Varikosistendenz; Wärme verschlimmert; „Klimakterium-Mittel"]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Ernährung: Gewichtskontrolle
Physikalische Therapie: Kompressionsverbände, Quarkwickel, Kneippsche Anwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Training

Varizellen (Windpocken)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene andere mit Hautaffektionen einhergehende Infektionskrankheiten sowie Strophulus infantum
  (= Nahrungsmittelallergie bzw. als „Zahnpocken" auftretend)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave Embryopathia und Fetopathia varicellosa!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Hautaffektionen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Stomatitis (auch Schleimhautbläschen im Mund bei Varizellen!) und Otitis media (Mittelohrentzündung bei Varizellen!) sowie bei Abszessen, Phlegmonen (häufige Sekundärinfektionen bei Windpocken!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]

Vegetative Dysregulation

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache (u.a. auch Fokalherde) eruieren und behandeln!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[zerebrales Regenerationsmittel – besonders für geriatrische Patienten und postkommotionelle Zustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art, Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie sowie ferner wechselnde Stimmungslage]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis. Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden]
Ovarium compositum (Amp.)
[Stimulationsmittel für die weiblichen Sexualdrüsen, u.a. auch bei Dysmenorrhoe und im Klimakterium indiziert]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung der Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, z.B. – außer bei vegetativer Dystonie – auch bei Arteriosklerose, Dysmenorrhoe]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Testis compositum N Ampullen
[Stimulationsmittel für die männlichen Sexualdrüsen, u.a. auch angezeigt bei Impotentia virilis und bei Erschöpfungszuständen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Einzelmittel-Injeele:
Ignatia S [Weinerlichkeit; nervöser Husten, „Seufzer-Atmen"; Globusgefühl; Stimmungslabilität]
Insektizid [Störungen nach Intoxikation mit Spritzmitteln]
Veratrum S [Erregungszustände, Gewalttätigkeiten]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum, Tuberculinum
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Gymnastik, Massagen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Schilddrüse, gynäkologischer Raum, Cubitalvene (im Wechsel)
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, intensives Biofeedback, Fokussuche (Amalgam), Psychotherapie

Verbrennungen (Grad I-II)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Schocksituationen! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Causticum compositum (Tropf.)
[Sonnenbrand, Strahlenschäden, Erschöpfungszustände]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Parenterale Therapie:
Causticum compositum
[Sonnenbrand, Strahlenschäden, Erschöpfungszustände]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Dermatosen]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [urtikarielle und entzündliche Ödeme mit Brennen, Stechen, Juckreiz]
Ferrum phosphoricum
[Fieber- und Entzündungszustände im Anfangsstadium]
Thuja S [Infektionen mit Haut- und Schleimhautveränderungen]
Nosoden-Injeele (nicht im akuten Stadium verabreichen, sondern nach überstandener Krankheit!):
Herpes zoster-Nosode, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**

Verletzungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Art der Verletzung genauestens abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Drüsenschwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen verschiedener Art mit stechenden und brennenden Schmerzen]
Arnica S [Verletzungen jeder Art, z.B. Quetschungen, Kontusionen, Luxationen, Distorsionen, Hämatome; zur Unterstützung der Frakturbehandlung]
Calcium phosphoricum
[Förderung der Kallusbildung bei Knochenbrüchen]
Cimicifuga S
[stechende neuralgische sowie Muskelschmerzen]
Hypericum
[Nervenquetschungen und -verletzungen sowie Nervenschmerzen bei und nach Verletzungen]
Ledum [Ekchymosen mit dunkelblauen Flecken durch Quetschungen]
Ruta [Periostblutungen]
Symphytum [Förderung der Kallusbildung bei Knochenbrüchen; Periostreizungen]
Veratrum S [Kollapsneigung, kalter Schweiß]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Kälteanwendungen, Ruhe

Viruserkrankungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ggf. als Begleittherapie

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl.) [grippale Infekte]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Euphorbium comp. SN (Tropf.) [antiviraler Effekt]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum (forte) SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris (Virus-Anginen wie Herpangina; Angina monocytotica]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.) [chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein)]
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[chronische Sinusitiden, zur unterstützenden Behandlung bei Ozaena; Rhinitis verschiedener – u.a. auch viraler! – Genese]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (Virus-Hepatitiden!)]
Naso-Heel SN (Tropf.)
[Rhinitis acuta et chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [initiale akute Fieberzustände]
Arsenicum album S [Erschöpfungszustände mit Angst; kalte Schweiße, Blässe, Zyanose]
Baptisia S [hohes septisches Fieber, Benommenheit]
Belladonna S [zerebrale Reizzustände; ggf. mit heißen dampfenden Schweißen]
Echinacea [Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Ferrum phosphoricum [fieberhafte Initialzustände]
Vincetoxicum [bei allen viral bedingten Krankheiten]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode.
Diese und weitere Virusnosodenzubereitungen, z.B. **Herpes simples-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Mumps-Nosode.**
Ferner: **Psorinum** (Reaktionsmangel, verzögerte Rekonvaleszenz, Chronifizierung einer akuten Krankheit),
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon, Glyoxal compositum
Suis-Organpräparate Injeele: Je nach Organbefall
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Toxinarme, vitaminreiche Kost
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen

V

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Vitiligo

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Pigmentverschiebungen anderer Ursachen (toxische Reaktionen), Ekzeme und Verletzungsfolgen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Durch Degeneration der Melanozyten bedingte Depigmentierung von Hautarealen, seltener auch die Schleimhäute und den behaarten Kopf betreffend. Ursächlich wird eine Autoimmunerkrankung diskutiert. In einem Drittel der Fälle liegt eine familiäre Disposition vor. Eine Vitiligo ist überdurchschnittlich bei Krankheiten mit Vitamin-B12-Resorptionsstörungen zu beobachten, es wird aber auch über eine Häufung von Alopecia areata, Diabetes mellitus, Hepatosen und Schilddrüsenstörungen bei Vitiligo berichtet. Eine wirksame Therapie der Vitiligo ist bisher nicht bekannt. Der Patient sollte Sonnenexposition möglichst meiden, um die Pigmentierung der gesunden Haut zu verhindern. Kosmetisch kann man die Vitiligoherde überdecken (Camouflage) oder die Hornschicht anfärben, z.B. mit Viticolor).

Basistherapie
Orale Therapie (adjuvant):
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Symptomenbezogene Therapie
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[zur allgemeinen Umstimmungstherapie]
Einzelmittel-Injeele:
Sepia [chronische Hauterkrankungen]
Silicea [Bindegewebserkrankungen allgemein]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin C, Vitamin E und β-Carotin, Vitamin B_{12}

Wadenkrämpfe

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Gastroenteritis (Wasser- und Elektrolytverluste mit konsekutiven Wadenkrämpfen); Kollapszustände (Wadenkrämpfe als Folge lokaler Zirkulationsstörungen]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Spascupreel
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Arnica-Salbe-Heel S
[Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[venöse Stase; variköses Ekzem (Varizen oft Krampi auslösend); thrombophlebitische Zustände]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane bei Arteriosklerose, Raucherbeinen, Endarteriitis obliterans, Diabetes mellitus sowie bei chronisch kalten Füßen, bei Elephantiasis, vegetativer Dystonie und bei postapoplektischen Residuen]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[wetterbedingte Verschlimmerung]
Veratrum-Homaccord (Amp.)
[Gastroenteritis (Wasser- und Elektrolytverluste mit konsekutiven Wadenkrämpfen); Kollapszustände (Wadenkrämpfe als Folge lokaler Zirkulationsstörungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [Permeabilitätsstörungen der Gefäßendothelien; venöse Stase; Parästhesien]
Colocynthis S [stechende Schmerzen, Taubheitsgefühl]
Conium S [arteriosklerotische Gefäßveränderungen mit Hypoxie sowie Muskelkrämpfen und Paresen; Verschlimmerung durch Kälte und nachts]
Gnaphalium polycephalum [Parästhesien und Taubheitsgefühl mit stechenden Schmerzen, bes. in den Unterschenkeln]
Rhododendron
[Verschlimmerung in der Ruhe und nachts: Crampi nocturni]
Veratrum S [nächtliche Muskelkrämpfe; Verschlimmerung bei Bettwärme und in der Ruhe]
Zincum valerianicum [Muskelzuckungen und Muskelkrämpfe; motorische Unruhe der Beine; Restless legs]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Musculus suis, Placenta suis, Vena suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Mineralstoffhaushalt beachten
(Wadenkrämpfe z.B. auch bei Hypokalzämie)
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie
Hinweis: Vermeidung von Nässe und Kälte sowie von körperlichen Überanstrengungen.
Hypoxie begünstigt Wadenkrämpfe!

Warzen

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [Virusinfekte]
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Thuja-Injeel [Warzenbildungen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Hyperkeratosen]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Hautaffektionen, u.a. auch bei Naevi und bei Kondylomen (Condylomata acuminata = Feig- oder Feuchtwarzen, eine terrainbedingte Variante der Verrucae vulgares bei fast ausschließlich genito-analer Lokalisation)]
Engystol (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, auch bei Viruserkrankungen: „Warzen-Virus“ (Common-wart-Virus) = Papilloma-Virus (HPV = humanes Papillom-Virus) mit Untergruppen]

Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [bes. bei warzigen Veränderungen an Übergängen von Haut zu Schleimhäuten; „Splitterschmerz"; Neigung zu Blutungen]
Antimonium crudum [Hyperkeratosen, Warzen, Rhagaden]
Causticum S [Warzen, bes. im Gesicht und an den Fingern]
Galium aparine [Präkanzerosen]
Natrium muriaticum
[Lokalisation besonders auf den Handflächen]
Thuja S
[Konstitutionsmittel bei allen proliferativen Veränderungen]
Vincetoxicum [generell bei Virusaffektionen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Ätzen, ggf. chirurgische Intervention

Weichteilrheumatismus (extraartikulärer Rheumatismus)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ausschluss einer Fokaltoxikose

Basistherapie
Orale Therapie:
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie (fokusbedingter Weichteilrheumatismus?)]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtisch-rheumatische Beschwerden]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane bei einer Vielzahl von Durchblutungsstörungen sowie ferner bei Erythema nodosum (häufig Streptokokkeninfekt!) und bei Erythema (exsudativum) multiforme (rheumatoide Beschwerden, Fieber; häufig auch nach Angina und Grippe]
Rhododendroneel S (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Thyreoidea compositum (Amp.)
[Schilddrüsendysfunktionen; Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, u.a. auch bei Adipositas sowie bei Myxödem, Sklerodermie, bei Elephantiasis und Induratio penis plastica]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [entzündlicher Weichteilrheumatismus mit Neuralgien und Neuritiden]
Bryonia S [entzündlicher Muskel- und Gelenkrheumatismus]
Colchicum (forte S) [Gelenk- und Muskelrheumatismus mit Herzbeteiligung (Peri-, Myo-, Endokarditis)]
Colocynthis S
[stechende Schmerzen mit Taubheitsgefühl und Parästhesien]
Conium S
[verschiedene Muskelbeschwerden, wie Muskelkrämpfe und Muskelschwäche sowie Muskelverhärtungen]
Cuprum [Krämpfe in den Muskeln mit Muskelrigidität]
Curare [Lähmungen und Schwächezustände der Muskulatur, bes. nach Überanstrengungen]
Dulcamara S [Muskel- und Gelenkrheumatismus als Folge von Erkältungen bzw. mit Nasswetterverschlimmerung]
Kalium carbonicum (forte N)
[Muskelschwäche sowie Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern mit Hyperhidrosis]
Rhododendron [Muskelrheumatismus mit reißenden Schmerzen und motorischer Unruhe]
Rhus Tox S [diffuse rheumatische Schmerzen in Bändern, Sehnen, Muskelansätzen und Muskeln]
Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Placenta suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Iontophorese
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung

Wundbehandlung

- **BESONDERE HINWEISE:**
Desinfektion, Abgrenzung; ggf. Wundausschneidung (nach Friedrich); Schutzimpfung (Starrkrampf).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Allergie, Dermatosen, Impetigo contagiosa]
Echinacea compositum (forte) SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen und Fisteleiterungen]

Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Drüsenschwellungen; Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit (posttraumatische Lymphödeme und sonstige ödematöse Schwellungszustände]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S
[bei Schwellungen mit stechenden Schmerzen; Stichwunden]
Arnica S [Quetschungen, Kontusionen, Hämatome; Distorsionen; Anregung der Wundheilung]
Hamamelis [Wunden mit starker Blutungsneigung]
Hypericum [Wunden – insbes. Stichverletzungen – mit konsekutiven Nervenschmerzen]
Ledum [nach Bienen- und Wespenstichen]
Ruta [Folgen von Traumen, insbes. von Quetschungen, Kontusionen, Distorsionen; gefäßabdichtend]
Staphisagria [Schnittwunden, Neigung zu Keloiden]
Symphytum [Stumpfbeschwerden, Hämatome]

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Physikalische Therapie: Ruhigstellung

Wurmerkrankungen, rezidivierende

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika aus symptomatischer Sicht bzw. zur Milieuänderung/Terrainumstimmung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Tanacet-Heel (Tropf.)
[Wurmerkrankungen, nervöse Reizzustände]

Parenterale Therapie:
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]

Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]

Symptomenbezogene Therapie
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]

Einzelmittel-Injeele:
Abrotanum
[Wechsel von Durchfall und Obstipation; Appetitlosigkeit oder Abmagerung trotz guten Appetits (Heißhunger); Halonierung der Augen]
Artemisia vulgaris
[Störungen im Verdauungstrakt mit Konvulsionen als Folge von Wurmtoxinen]
Cina
[bei Verwurmung (bes. Ascariden) mit – bes. nächtlichen – Unruhezuständen, Schreien, Zähneknirschen]
Natrium sulfuricum
[hepatogene Diarrhoe; bitterer Geschmack]
Spigelia S
[bei Wurmerkrankungen mit häufigem Harndrang und Kopfschmerzen]

Suis-Organpräparate Injeele:
Coecum suis, Colon suis, Duodenum suis, Jejunum suis, Rectum suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Zerebrale Ischämie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Apoplexie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung notwendig!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aesculus-Heel (Tropf.) [Durchblutungsförderung]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörung]

Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, z.B. auch Gefäßspasmen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäßwirkung]
Plumbum metallicum [Arteriosklerose; Gefäßspasmen]
Tabacum [angiospastische Zustände]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Placenta suis, Vena suis (evtl. als Mischspritze)

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Nikotinkarenz
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Krankengymnastik

Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Zerebralsklerose

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Risikofaktoren: familiäre Belastung,
  Diabetes mellitus,
  Hypertonie, Hyperlipidämie

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus, Zerebralsklerose]
Ginseng compositum N (Tropf.) [Schwächemittel, Geriatrikum]

Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Placenta compositum
[zentrale und periphere Durchblutungsstörung]

Symptomenbezogene Therapie
Angio-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden]
Cactus compositum (Amp.)
Cactus compositum S (Tropf.),
[pektanginöse Beschwerden, bes. bei Hypertonie]
Carbo compositum (Amp.)
[Apoplexie- und Myokardinfarkt-Prophylaxe]
Cardiacum-Heel (Tabl.)
[pektanginöse Beschwerden]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Zerebralsklerose mit den entsprechenden Symptomen wie Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung, Erregungszuständen, Depressionen u.a.]

Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor compositum N (Amp.) [arteriosklerotische, degenerative Herzaffektionen, Hypertonie]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Herzinsuffizienz]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[chronische degenerative Krankheiten]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychische Erschöpfungszustände und depressive Stimmungslage]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[arteriosklerotische zerebrale Leistungsschwäche]
Tonico-Injeel (Amp.)
[physische und psychische Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[arteriosklerotisch bedingter (Alters-)Schwindel]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Herz- und Gefäßtonisierung; Zerschlagenheitsgefühl; Apoplexiefolgen]
Aurum jodatum [Arteriosklerosemittel]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Aorta suis, Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Risikoarme Ernährung
Physikalische Therapie: Kneippkuren, Training
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatumblockade
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Zervikalmigräne (Migraine cervicale)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.)
[Kopfschmerzen, Neuralgien]
Spigelon (Tropf., Tabl.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen]
Parenterale Therapie:
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Suppositorien:
Spascupreel S
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien; neurale Störfelder]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane bei einer Vielzahl von arteriellen Durchblutungsstörungen (Irritationen der Arteria vertebralis bei Zervikalmigräne!), u.a. auch bei der Arteriosklerose sowie bei der vegetativen Dystonie und bei postapoplektischen Residuen]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Einzelmittel-Injeele:
Calcium phosphoricum
[Schwächemittel für unterentwickelte Kinder mit Haltungsfehlern; Schulkopfschmerzen]
China S [Schwächemittel; Ohrensausen und Schwindelgefühl; Osteochondrose]
Cimicifuga S
[HWS-Syndrom: blitzartige schießende Schmerzen, vom Nacken bis über den Kopf in die Nasenflügel ausstrahlend]
Gelsemium S [Migräne (ggf. mit Benommenheit und Schwindel); Okzipitalneuralgien]
Secale cornutum [migräneartige Zustände; Gefäßkrämpfe]
Sepia [Erschöpfungszustände und Haltungsschwäche mit migräneartigen Zuständen; „Klimakterium-Mittel“]
Spigelia S
[Migräne und Neuralgien (Okzipital- und Frontal-Neuralgien; z.B. des Trigeminus)]

Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Os suis, Vena suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenfreie Kost
Physikalische Therapie: Strecken, Massage, Krankengymnastik
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Autogenes Training, Haltungskorrektur nach Alexander

Zervikalsyndrom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Migraine cervicale, vertebragene Angina pectoris, Schulter-Arm-Syndrom, Periarthritis humeroscapularis, Osteochondrose, Discusprolaps, Gefäßerkrankungen, Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Sorgfältige Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf.) [Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N (Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel [Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Basistherapeutikum bei Osteochondrose; Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien; Osteochondrose]

Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom; Epicondylitis]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane bei einer Vielzahl von arteriellen Durchblutungsstörungen (vegetativ-vaskuläre Störungen durch Kompression der – vorgeschädigten – Arteria vertebralis!), u.a. auch bei Arteriosklerose sowie bei vegetativer Dystonie und bei postapoplektischen Residuen]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Cimicifuga S [bei Erschöpfung]
Ferrum phosphoricum [Nacken- bzw. Schulterbeschwerden]

Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla spinalis suis, Musculus suis

Begleittherapie
Ernährung: Gewichtsreduktion bei Übergewicht
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Neuraltherapie:
Triggerpunkte, Ganglion stellatum, HWS-Quaddel
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Autogenes Training, manuelle Therapie (Chiropraktik), TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)

Zungenbrennen (Glossodynie)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung! U.a. Plummer-Vinson-Syndrom = hypochrome bzw. sideropenische Anämie, perniziöse Anämie (Möller-Hunter-Glossitis), Diabetes mellitus, Sjögren-Syndrom; psychogen! Zahnsanierung, Mundbatterie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Galium-Heel N (Tropf.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Psorinoheel N (Tropf.)
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Psorinoheel N
[Umstimmungstherapeutikum allgemein bei chronischen Erkrankungen, besonders bei Haut- und Lebererkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Gallenkoliken; Cholangitis; Cholezystitis; Leberschädigungen (Parenchymschäden), Hepatitis acuta und chronica; Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar compositum N (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SN (Tropf., Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Glossitis dissecans bzw. Lingua dissecata mit tiefen Einrissen der Zungenoberfläche)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[Zungenbrennen bei Neurasthenie sowie ferner bei Gastritis und sonstigen chronischen Schleimhautkatarrhen sowie bei Dyspepsie]
Bismutum subnitricum
[Zungenbrennen verbunden mit bitterem Mundgeschmack]
Borax
[Zungenbrennen bei Stomatitis aphthosa]
Cantharis
[Zungenbrennen bei katarrhalischen Rachenaffektionen]
Causticum S [generell bei allen Brennschmerzen]
Sulfur (forte) S [Zungenbrennen und Zungenjucken]

Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Lingua suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamine, Vermeidung scharf gewürzter Speisen
Physikalische Therapie: Spülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Zwischenschmerz (Mittel- bzw. Intermenstrualschmerz)

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SN (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Ovarium compositum [Dysmenorrhoe, entzündliche und degenerative Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Atropinum compositum S [Krämpfe und Koliken]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gynäcoheel N (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis, Salpingitis), Para-Myo-Endometritis, Kolpitis]
Lamioflur (Tropf.)
[Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus (Spotting = fadenziehender Zwischenschmerz-Fluor)]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.)
[außer Mittelschmerz = Zwischenschmerz ferner noch Adnexitis, Para-Endometritis, Dysmenorrhoe sowie Vaginitis (= Kolpitis) und klimakterische Neurosen]

Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Endometritis und Dysmenorrhoe sowie bei vegetativer Dystonie]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus
[katarrhalische Schleimhautaffektionen; schmerzloser Fluor albus; ggf. Spotting = Ovulationsblutung bei/mit Zwischenschmerz (schmerzhaftes Ziehen im Unterleib)]
Apis S
[entzündliche ödematöse Reizzustände: Bauchfellreizung durch Plazten der Follikel]
Cimicifuga S [Dysmenorrhoe mit Krampfschmerzen]
Lachesis S [Eierstocksschmerzen (Ovarialgien); Dysmenorrhoe; Blutungsneigung; depressive Kranke]
Pulsatilla S [besonders „Menarche-Mittel"; Wirkung auf Uterus und Adnexe]
Sepia [besonders „Klimakterium-Mittel"; u.a. auch präklimakterische Senkungsbeschwerden der Beckenorgane mit wehenartigen Schmerzen]

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Hypothalamus suis, Ovarium suis, Salpinx uteri suis, Uterus suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Akupunktur, Neuraltherapie

Zysten (verschiedene Formen und Lokalisationen)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie

Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.)
[allgemeines Zystenmittel, Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [allgemeines Zystenmittel, Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Oedeme]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Tropf., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ovarium compositum (Amp.)
[Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen, u.a. auch bei Endometritis, Metritis, Parametritis, bei Dysmenorrhoe und Menorrhagien sowie im Klimakterium sowie bei Mastodynie]
Placenta compositum (Amp.)
[Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane, u.a. auch bei Dysmenorrhoe und Endometritis]
Psorinoheel N (Tropf., Amp.)
[Umstimmungstherapeutikum bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen und Schmerzen]
Galium aparine [Präkanzerosen]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Mastopathia cystica-Nosode, Medorrhinum, Ovarialcyste, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Struma cystica, Trichomonaden-Fluor

Intermediäre Katalysatoren:
Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Mamma suis, Ovarium suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Weitere Verfahren:
Ggf. Punktion (nicht bei Echinokokkuszysten!), Operation

Fachinformation

für Therapeuten

und Apotheker

Die Fachinformationen zu den Arzneimitteln wurden freundlicherweise von der Firma Heel, Biologische Heilmittel GmbH, Baden-Baden zur Verfügung gestellt.

Inhalt

Fachinformation für Therapeuten und Apotheker

1 KOMBINATIONSPRÄPARATE 171

2 LISTE DER EINZELBESTANDTEILE IN KOMBINATIONSPRÄPARATEN 233

3 HOMÖOPATHISCHE EINZELMITTEL IN POTENZENACCORDEN 238

4 LISTE DER NEUEN BEZEICHNUNGEN FÜR HOMÖOPATHISCHE WIRKSTOFFE 369

5 BESTELLUNG VON ARZNEIMITTELN 371

6 HALTBARKEIT DER HEEL-PRÄPARATE 371

7 PHARMAZENTRALNUMMERN UND APOTHEKENVERKAUFSPREISE 372

Stand der Information: April 2002

1 Kombinationspräparate

Abropernol® N

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045534.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Artemisia abrotanum Trit. D4, Pulsatilla pratensis Trit. D4, Calcium fluoratum Trit. D12 jeweils 0,060 mg; Petroleum rectificatum Trit. D6, Agaricus (HAB 34) Trit. D5 (HAB, Vorschrift 3a), Acidum nitricum Trit. D8, Hamamelis virginiana Trit. D4 jeweils 0,030 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: entzündliche und ekzematöse Hauterkrankungen.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Schwangerschaft; nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern und in der Stillzeit.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Einnahme dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Abrotanum (Eberraute)
Chronische Entzündungen. Hauterkrankungen.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Schlafstörungen. Nervöse Störungen.
Petroleum rectificatum (Steinöl)
Verschiedene Hautkrankheiten.
Agaricus (Fliegenpilz)
Erregungszustände. Folgen von Drogen- und Medikamentenmissbrauch.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Gut- und bösartige Gewebewucherungen.
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.

Aconitum-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Dil. D2, Aconitum Dil. D10, Aconitum Dil. D30, Aconitum Dil. D200, Eucalyptus Dil. D2, Eucalyptus Dil. D10, Eucalyptus Dil. D30 jeweils 0,4 g; Ipecacuanha Dil. D2, Ipecacuanha Dil. D10, Ipecacuanha Dil. D30, Ipecacuanha Dil. D200 jeweils 0,2 g. Die Bestandteile 1-9 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Dil. D4, Aconitum Dil. D10, Aconitum Dil. D30, Aconitum Dil. D200, Eucalyptus Dil. D4, Eucalyptus Dil. D10, Eucalyptus Dil. D30 jeweils 4,4 µl; Ipecacuanha Dil. D4, Ipecacuanha Dil. D10, Ipecacuanha Dil. D30, Ipecacuanha Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Eucalyptus (Fieberbaum)
Entzündung der Luftwege, der Nieren, der ableitenden Harnwege.
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung. Kreislaufstörungen.

Aesculus-Heel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG** Zul.-Nr.: 6045563.00.00

Zusammensetzung: 10 g (10,5 ml) enth.: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Aesculus hippocastanum Dil. D2 10 g.Enthält 70 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Das Anwendungsgebiet entspricht dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten; Hämorrhoiden.
Hinweis: Das Arzneimittel dient der unterstützenden Behandlung von Erkrankungen der Beinvenen. Es ersetzt nicht vom Arzt verordnete Maßnahmen, wie z.B. die Kompressionstherapie.
Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert. Blut im Stuhl bzw. aus dem Darm-After-Bereich bedürfen der Abklärung durch einen Arzt.
Gegenanzeigen: Nicht bekannt
Nebenwirkungen: Nicht bekannt.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden können. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Dauer der Anwendung: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweis: Bei Weiterbestehen der Symptome über mehr als 6-8 Wochen sowie bei Verschlimmerung der Symptome empfehlen wir die Rücksprache mit dem Therapeuten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden.

Albumoheel® S

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Trit. D4, Phosphorus Trit. D6, Ignatia Trit. D4, Veratrum Trit. D4, Hydrargyrum bichloratum Trit. D8 jeweils 30 mg; Terebinthina Trit. D8 90 mg; Nux moschata Trit. D6 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Albuminurie, z.B. auch bei akuter und chronischer Glomerulonephritis und bei nephrotischen Krankheiten.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen (also generell bei ödematösen Schwellungszuständen). Allergien.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane (u.a. auch Nephritis mit Hämaturie und Zylindurie sowie mit Gesichtsödemen). Schwere Infektionskrankheiten. Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen (z.B. Erschöpfungszustände, vegetative Dystonie). Verstimmungszustände (bzw. Depressionen).
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Nervenschmerzen.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Entzündungen der Nieren (mit Albuminurie) und der ableitenden Harnwege.
Nux moschata (Muskatnuss)
Verdauungsschwäche mit Blähsucht. Wahrnehmungsstörungen (z.B. Benommenheit, Stupor, Delirien).

Aletris-Heel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aletris farinosa Trit. D4, Kalium carbonicum Trit. D4, Cocculus Trit. D4, Helonias dioica Trit. D4 jeweils 45 mg; Acidum picrinicum Trit. D6, Chininum arsenicosum Trit. D6 jeweils 15 mg; Sepia Trit. D6 60 mg; Natrium chloratum Trit. D6 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Erschöpfungs- und Schwächezustände.
Gegenanzeigen: Chininüberempfindlichkeit. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aletris farinosa (Sternwurzel)
Gynäkologische Erkrankungen mit Erschöpfung („China des weiblichen Genitale"). Magen- und Verdauungsschwäche (Durchfall wechselnd mit Obstipation).
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Chronische Entzündung der Atemwege, des Rippenfells. Herzerkrankungen. Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems. Allgemeine Schwäche. Menstruationsstörungen. Erkrankungen in der Schwangerschaft.
Cocculus (Kockelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel)
Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Acidum picrinicum (Pikrinsäure)
Geistige und nervöse Erschöpfungszustände. Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Chininum arsenicosum (Chininarsenit)
Schwächezustände. Blutarmut. Nervenschmerzen.
Sepia (Tintenfisch)
Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (bes. im Klimakterium).
Natrium chloratum (Natrium muriaticum)
Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände (bes. Verschlossenheit, mürrisches Wesen). Erkrankungen des Stützgewebes.

Anacardium-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anacardium Dil. D6, Anacardium Dil. D10, Anacardium Dil. D30, Anacardium Dil. D200 jeweils 0,4 g; Jodum Dil. D30, Jodum Dil. D200, Jodum Dil. D1000, Ipecacuanha Dil. D4, Ipecacuanha Dil. D10, Ipecacuanha Dil. D30, Ipecacuanha Dil. D200 jeweils 0,3 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom; Vomitus (matutinus).
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.

Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Anacardium/Semecarpus anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Verstimmungszustände.
Jodum (Jod)
Schilddrüsenüberfunktion (d.h. Abmagerung trotz guten Appetits; Heißhunger, Besserung nach dem Essen [typisch für Duodenitis und Ulcus duodeni!])
Ipecacuanha/Cephaelis ipecacuanha (Brechwurzel)
Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung.

Angin-Heel® SD

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046203.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum bicyanatum Trit. D8, Phytolacca americana Trit. D4, Apis mellifica Trit. D4, Arnica montana Trit. D4 jeweils 30 mg; Hepar sulfuris Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6), Atropa bella-donna Trit. D4 jeweils 60 mg. Die Bestandteile werden über die letzten 2 Stufen als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Mandelentzündungen.
Hinweis: Bei häufig wiederkehrenden Mandelentzündungen und länger als 3 Tage anhaltendem oder über 39 °C ansteigendem Fieber sollte wie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Angin-Heel SD ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler nicht anzuwenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Säuglinge 0-12 Monate	nach Rücksprache mit dem Arzt 2 mal tägl. ½ Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einehmen lassen	nach Rücksprache mit dem Arzt alle 1-2 Stunden, höchstens ½ Tablette 8 mal tägl., zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen
Kleinkinder 1-5 Jahre	3 mal tägl. ½ Tablette langsam im Mund zergehen lassen	alle 1-2 Stunden, höchstens 12 mal tägl., ½ Tablette langsam im Mund zergehen lassen
Schulkinder 6-11 Jahre	2 mal tägl. 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen	alle 1-2 Stunden, höchstens 8 mal tägl., 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosierung	Erwachsenendosierung

Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hydrargyrum bicyanatum (Quecksilbercyanid)
Diphtherieartige Entzündungen (Diphtherioide) der Mandeln, des Gaumens, des Rachens und des Kehlkopfes.
Phytolacca americana (Kermesbeere)
Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises (Tonsillitis als Fokus!).
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben (ödematöse Schwellungszustände).
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Schleimhäute wie Mandelabszess und chronische Mittelohrvereiterung. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung.
Atropa bella-donna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, der Haut und der Gelenke.

Angio-Injeel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum formicicum Dil. D10, Acidum formicicum Dil. D30, Acidum formicicum Dil. D200, Asclepias tuberosa Dil. D10, Asclepias tuberosa Dil. D30, Asclepias tuberosa Dil. D200, Cactus Dil. D10, Cactus Dil. D30, Cactus Dil. D200, Castoreum sibiricum Dil. D10, Castoreum sibiricum Dil. D30, Castoreum sibiricum Dil. D200, Crataegus Dil. D10, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200, Plumbum jodatum Dil. D10, Plumbum jodatum Dil. D30, Plumbum jodatum Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Glonoinum Dil. D10, Glonoinum Dil. D30, Glonoinum Dil. D200, Spigelia Dil. D10, Spigelia Dil. D30, Spigelia Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum formicicum (Ameisensäure)
Allergien.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze)
Nervenschmerzen im Brustbereich (z.B. Interkostalneuralgien – „abstrahlende bzw. ausstrahlende Herzschmerzen“).
Cactus (Königin der Nacht)
Krämpfe der Gefäße. Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Castoreum sibiricum (Sibirisches Bibergeil)
Nervöse Verstimmungs- und Erschöpfungszustände.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Plumbum jodatum (Bleijodid)
Allgemeine Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.
Spigelia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris (bes. auch vertebragene!). Nervenschmerz. Kopfschmerz.

A

Apis-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D2, Apis mellifica Dil. D10, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200, Apis mellifica Dil. D1000 jeweils 0,1 g; Apisinum Dil. D6, Apisinum Dil. D30, Scilla Dil. D2, Scilla Dil. D10, Scilla Dil. D30 jeweils 0,25 g; Tartarus stibiatus Dil. D2, Tartarus stibiatus Dil. D10, Tartarus stibiatus Dil. D30, Tartarus stibiatus Dil. D200 jeweils 0,4 g. Die Bestandteile 1-11 werden mit Ethanol 43 % (m/m), die Bestandteile 12 und 13 mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D4, Apis mellifica Dil. D10, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200, Apis mellifica Dil. D1000 jeweils 1,1 µl; Apisinum Dil. D8, Apisinum Dil. D30, Scilla Dil. D4, Scilla Dil. D10, Scilla Dil. D30 jeweils 2,75 µl; Tartarus stibiatus Dil. D4, Tartarus stibiatus Dil. D10, Tartarus stibiatus Dil. D30, Tartarus stibiatus Dil. D200 jeweils 4,4 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände.
Gegenanzeigen: Bienengiftüberempfindlichkeit.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Apisinum (Bienengift)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Scilla (Meerzwiebel)
Herzschwäche (und zwar insbes. mit Neigung zu kardialen Ödemen = „feuchte Herzinsuffizienz“).
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege (erschwerte Expektoration) mit Kreislaufschwäche. Eitrige Hauterkrankungen.

Arnica-Salbe-Heel S

Zul.-Nr.: 24863.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica montana Urtinktur 10 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB 9 mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol 96 %. Enthält 17,7 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören Myalgien nach Überlastung, Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems. Schmerzen, Rötungen, Schwellungen oder Überwärmen im Bereich der Arterien oder Venen können Ausdruck einer schwerwiegenden Erkrankung sein und erfordern die umgehende Rücksprache mit dem Arzt.
Bei länger als 1-2 Wochen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Arnika oder anderen Korbblütlern. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Wie alle Arzneimittel sollen auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
1-2 mal täglich auf die betroffene Hautstellen auftragen.
Bei der Anwendung als Salbenverband nur luftdurchlässige Materialien (z.B. Baumwolle) verwenden.
Das Arzneimittel ist nur zu äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden soll vermieden werden.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Myalgie. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Arteria-Heel® N

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046321.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Secale cornutum Dil. D4, Viscum album Dil. D4, Barium iodatum Dil. D6, Arnica montana Dil. D12 jeweils 1,0 g; Nicotiana tabacum Dil. D8, Phosphorus Dil. D8 jeweils 2,0 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 Gew.-%.
Sonstige Bestandteile: Äthanol, Gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Periphere Durchblutungsstörungen.
Hinweis: Bei anhaltendem Schmerz, Blässe, Kälte und Kribbelgefühl in dem betroffenen Arm/Bein ist sofort ein Arzt aufzusuchen, da es sich um einen plötzlich aufgetretenen Verschluss der zuführenden Blutgefäße handeln kann, der notfallmäßiges Eingreifen erfordert.
Gegenanzeigen: Arteria-Heel N ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Wegen des Alkoholgehaltes soll Arteria-Heel N bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Arteria-Heel N in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der chronischen Dosierung bis zu 0,38 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.
Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 10 Tropfen.
Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung:
Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.
Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml Flasche werden etwa 8,3 g, bei der 100 ml Flasche etwa 27,5 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Secale cornutum (Mutterkorn)
Muskelkrämpfe, Krampfleiden, Lähmungen, Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten (arterielle Durchblutungsstörungen), Blutungsneigung.
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.
Barium jodatum (Bariumjodid)
Bluthochdruck und Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Phosphorus (Phosphor)
Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten. Nerven- und Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.

Atropinum compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Atropinum compositum S

- **ZÄPFCHEN**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung zur Injektion: 2,2 ml enth.: Bryonia Ø 0,44 µl; Cuprum aceticum D2, Berberis Ø, Pareira brava Ø, Colocynthis Ø, Veratrum Ø, jeweils 0,22 µl; Baptisia Ø, Chelidonium Ø jeweils 66 nl; Thuja Ø, Clematis Ø jeweils 6,6 nl; Acidum benzoicum e resina D2 2,2 nl; Argentum nitricum D1 0,22 nl; Atropinum sulfuricum D4 2,198 ml; Acidum arsenicosum D4 0,22 µl; Cantharis D5, Medorrhinum D10 jeweils 22 nl. Die Bestandteile 14 bis 16 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Zäpfchen: 1 Zäpfchen (= 2,0 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Ø 0,22 mg; Cuprum aceticum D2, Berberis Ø, Pareira brava Ø, Colocynthis Ø, Veratrum Ø, Acidum arsenicosum D4 jeweils 0,11 mg; Baptisia Ø, Chelidonium Ø jeweils 0,033 mg; Cantharis D5, Medorrhinum D10 jeweils 0,011 mg; Thuja Ø, Clematis Ø jeweils 3,3 µg; Acidum benzoicum e resina D2 1,1 µg; Argentum nitricum D1 0,11 µg; Atropinum sulfuricum D3 0,011 g.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung zur Injektion: Gallenkoliken; Nierenkoliken; Nabelkoliken der Kinder, spastischer Husten; Pertussis; Dysmenorrhoe.
Zäpfchen: Gallenkoliken; Nierenkoliken; Nabelkoliken der Kinder, spastischer Husten; Keuchhusten; schmerzhafte Regelblutung.
Gegenanzeigen: Flüssige Verdünnung zur Injektion: Säuglinge und Kleinkinder. Glaukom und atonische Blasenentleerungsstörungen, z.B. bei Prostataadenom. Mechanische Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals. Megacolon. Tachyarrhythmie.
Zäpfchen: Engwinkelglaukom. Prostataadenom mit Restharnbildung. Mechanische Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals. Megacolon. Tachyarrhythmie.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei Kindern können in seltenen Fällen Mydriasis und Mundtrockenheit auftreten.
Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Zäpfchen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., langsam i.v.
Bei Schmerzzuständen und Koliken kann die Einzeldosis je nach der individuellen Verträglichkeit bis auf 3 Ampullen erhöht werden. Tageshöchstdosis für Erwachsene 6 Ampullen, für Kinder 3 Ampullen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Zäpfchen: Soweit nicht anders verordnet, 2-3 mal täglich 1 Zäpfchen, bei Schmerzzuständen und Koliken mehrmals 1/2 stündlich 1-2 Zäpfchen in den After einführen bis zur Besserung. Tageshöchstdosis für Erwachsene 12 Zäpfchen, für Kinder von 6-12 Jahren 5 Zäpfchen, für Kinder von 3-5 Jahren 3 Zäpfchen, für Kleinkinder von 3 Monaten bis 2 Jahren 2 mal 1 Zäpfchen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Zäpfchen: Packungen mit 12 und 60 Zäpfchen zu 2,0 g.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündungen der Atemorgane, des Rippenfells, des Bauchfells, der Leber.
Cuprum aceticum (Kupferazetat)
Erkrankungen mit Krampfneigung. Wadenkrämpfe. Asthma. Keuchhusten. Angina pectoris (also Krämpfe bes. der glatten Muskulatur).
Berberis (Berberitze)
Leber- und Gallenleiden.
Pareira brava (Grieswurz)
Harnblasenentleerungsstörungen, Harnwegsentzündungen. Vergrößerung der Prostata.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankungen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung (ggf. Neigung zur Gewalttätigkeiten).
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verstimmungszustände (bes. Hoffnungslosigkeit und Unruhe)
Baptisia (Wilder Indigo)
Schwere, fiebrige Infektionen. Verwirrtheitszustände.
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems. Entzündung der Atemorgane und des Rippenfelles.

Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen der Schleimhäute, des Harn- und Geschlechtsapparates, des Magen-Darm-Kanals.
Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)
Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane, der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Pessimismus, Eigensinn und andere Charakterstörungen). Voralterung.
Thuja (Lebensbaum)
Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Verstimmungszustände.
Clematis (Aufrechte Waldrebe)
Entzündung der Harnblase, der Harnröhre.
Acidum benzoicum e resina (Benzoesäure)
Harnwegserkrankungen.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Atropinum sulfuricum (Atropinsulfat)
Kongestive Entzündungen der oberen Atemwege. Entzündungen der Ausscheidungsorgane.

Aurumheel® N Tropfen

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046344.00.00

Zusammensetzung: 10,0 g (= 10,6 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium tetrachloroauratum Dil. D6 1,0 g; Valeriana officinalis Dil. D1 0,5 g; Cytisus scoparius Dil. D1, Convallaria majalis Dil. D2 jeweils 0,2 g; Arnica montana Dil. D1 0,1 g; Crataegus Dil. Ø 6,0 g. Sonstige Bestandteile: Äthanol, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervös bedingte Herz- und Kreislaufstörungen.
Hinweis: Bei unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder Wasseransammlungen in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.
Gegenanzeigen: Aurumheel N Tropfen sind bei Alkoholkranken und bei Überempfindlichkeit gegen Arnika und andere Korbblütler nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes sollen Aurumheel N Tropfen bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
In Schwangerschaft und Stillzeit sollten Aurumheel N Tropfen auch wegen des Alkoholgehaltes nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb – auch wegen des Alkoholgehaltes – bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält 45 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der chronischen Dosierung bis zu 0,5 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht unter anderem bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.
Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml/100 ml werden etwa 10,9 g/36,2 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Natrium tetrachloroauratum (Goldchlorid-Chlornatrium)
Chronische Lebererkrankungen.
Valeriana officinalis (Baldrian)
Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen.
Cytisus scoparius (Besenginster)
Herzrhythmusstörungen. Herzschwäche (mit konsekutiver Hypotonie).
Convallaria majalis (Maiglöckchen)
Herzrhythmusstörungen. Herzschwäche.
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems. Myalgie nach Überlastung.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Barijodeel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium carbonicum Trit. D12, Ignatia Trit. D6, Stramonium Trit. D4, Kalium phosphoricum Trit. D6, Arnica Trit. D4 jeweils 30 mg; Causticum Hahnemanni Trit. D6, Anacardium Trit. D6, Aconitum Trit. D12 jeweils 45 mg; Calcium jodatum Trit. D4 15 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Arteriosklerose, besonders Zerebralsklerose; Lymphatismus.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Barium carbonicum (Bariumkarbonat)
Entwicklungsverzögerung bei Kindern. Chronische Entzündung der Mandeln und der oberen Atemwege (Lymphatismus). Bluthochdruck. Gefäßverkalkung.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Stramonium (Stechapfel)
Krampfzustände. Krankheiten mit Beeinträchtigung seelischer Funktionen (z.B. Unruhe- und Erregungszustände, geschwätziges Delirium).
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände.
Arnica (Bergwohlverleih)
Myalgien. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Causticum Hahnemanni
Chronische Ekzeme. Krampfleiden. Lähmungen. Verstimmungszustände.

Anacardium (Malakkanuss)
Hautausschläge. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Calcium jodatum (Kalziumjodid)
Lymphknotenvergrößerung sowie Mandelschwellung mit Erkältungsneigung (Lymphatismus).

Belladonna-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D2, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000, Echinacea Dil. D10, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D4, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000, Echinacea Dil. D10, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel, Karbunkel.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Steigerung der körpereigenen Abwehr).

Berberis-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis Dil. D2, Berberis Dil. D10, Berberis Dil. D30, Berberis Dil. D200 jeweils 0,4 g; Colocynthis Dil. D2, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200, Veratrum Dil. D3, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 0,3 g. Die Bestandteile 1-9 werden mit Ethanol 43 % (m/m), die Bestandteile 10 und 11 mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis Dil. D4, Berberis Dil. D10, Berberis Dil. D30, Berberis Dil. D200 jeweils 4,4 µl; Colocynthis Dil. D4, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200, Veratrum Dil. D5, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung : Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Berberis (Berberitze)
Leber- und Gallenleiden.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Durchfallerkrankungen.

Bronchalis-Heel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Trit. D4, Sticta Trit. D4, Tartarus stibiatus Trit. D4, Kreosotum Trit. D5, Ipecacuanha Trit. D4, Lobelia inflata Trit. D4 jeweils 30 mg; Hyoscyamus Trit. D4, Bryonia Trit. D4 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Bronchitis, besonders chronischer Raucherkatarrh.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Atemorgane.
Sticta (Lungenflechte)
Akute Entzündungen der Atemwege.
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Atemwege. Blutungsneigung. Verhaltensstörungen bei Kindern (Geistesabwesenheit). Altersbedingte Erkrankungen (z.B. auch Appetitlosigkeit, Kachexie; Alterspruritus, Depressionen).
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten.
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie)
Störungen des vegetativen Nervensystems (z.B. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Dyspnoe, Bronchialspasmen, Reizhusten, Singultus). Heuschnupfen. Asthma bronchiale.
Hyoscyamus (Bilsenkraut)
Spastische Zustände der Atemwege. Unruhe und Erregungszustände. Schlafstörungen.
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündungen der Atemorgane und des Rippenfells (pleuritischer Reizhusten).

Bryaconeel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046433.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Trit. D4 120 mg; Aconitum napellus Trit. D4 150 mg; Phosphorus Trit. D5 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe gemäß HAB, Vorschrift 40c.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: akuter und chronischer Rheumatismus.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder wiederkehrenden Beschwerden ist ärztliche Abklärung erforderlich.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollte Bryaconeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung des Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Bei diesem Präparat sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung und Anwendungsfehler: Bei der Einnahme größerer Mengen (z.B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündungen der Atemorgane sowie des Rippenfells und des Bauchfells (also der serösen Häute) und der Leber. Akuter und chronischer Rheumatismus.
Aconitum napellus (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen (Neuralgien und Neuritiden). Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Herzschwäche, Herzschmerzen und Kreislaufstörungen. Nerven- und Kopfschmerzen (sowie generell bei Rheumatismus). Genesungsstörungen (verzögerte bzw. verlängerte Rekonvaleszenz!) und Erschöpfungszustände.

Cactus compositum

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D2, Spigelia Dil. D5, Kalium carbonicum Dil. D5, Cactus Dil. D3 jeweils 22 µl; Glonoinum Dil. D5 13,2 µl. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, zur Langzeitbehandlung 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.v., gegebenenfalls auch i.c. (neural) injizieren. Bei akuten Beschwerden 1 Ampulle i.v.; diese Dosierung kann bei Bedarf nach 2-3 Stunden wiederholt werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Cactus compositum S

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG** Reg.-Nr.: 18349.00.00

Zusammensetzung: 1 g flüssige Verdünnung enth.: Wirksame Bestandteile: Selenicereus grandiflorus Dil. D1, Spigelia anthelmia Dil. D3, Kalium carbonicum Dil. D3 jeweils 0,01 g; Nitroglycerinum Dil. D3 0,006 g; Crataegus Dil. D1 0,964 g. Enthält 51 Vol.-% Alkohol.
Gegenanzeigen: Nicht bekannt.
Nebenwirkungen: Nicht bekannt.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cactus/Selenicereus grandiflorus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Krämpfe der Gefäße. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung (Endo-, Myo-, Perikarditis). Angina pectoris (auch vertebragene!). (Ausstrahlende) Nervenschmerzen. Kopfschmerzen.

Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen mit Wasseransammlung in Geweben. Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris!). Allgemeine Schwäche.
Glonoinum/Nitroglycerinum (Nitroglyzerin)
Bluthochdruck. Kopfschmerzen. Angina pectoris.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Calcoheel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D8 180 mg; Dulcamara Trit. D6, Chamomilla Trit. D4 jeweils 30 mg; Carbo vegetabilis Trit. D12 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Kalkstoffwechselstörungen, z.B. bei exsudativer Diathese, Skrofulose, Lymphatismus.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.
Dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Infekte. Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harnwege, der Gelenke, der Haut, ausgelöst durch Kälte und Nässe („Nasswettermittel“).
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden (Dentitio difficilis). Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane. Heftige Schmerzzustände (infolge nervöser Überempfindlichkeit). Reizbare Verstimmungszustände (Unruhe und Erregung).
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Krampfaderleiden. Entzündung der Atemwege. Heiserkeit. Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht (Meteorismus). Schleimhautblutung (bes. des Zahnfleisches). Herz- und Kreislaufschwäche.

Calendula-Salbe-Heel S

Zul.-Nr.: 24864.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Calendula officinalis Ø 10,0 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB 10 mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol. Enthält 14,7 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Quetsch-, Riss- und Defektwunden; Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Nebenwirkungen: Im Einzelnen können allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung und Juckreiz) auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautbezirke auftragen.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Calendula (Ringelblume)
Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Quetsch-, Riss- und Defektwunden; Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.

Cantharis compositum S

- **INJEKTIONSLÖSUNG** Zul.-Nr.: 6045876.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lytta vesicatoria Dil. D4, Acidum arsenicosum Dil. D8, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8, Hepar sulfuris (HAB 1934) Dil. D8 (HAB, Vorschriften 6 und 40b) jeweils 22,0 mg. Die Bestandteile 1 und 2 sowie 3 und 4 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Begleittherapie bei Entzündungen der Harnorgane.
Hinweis: Bei Blut im Urin, bei Fieber, bei akuter Behinderung des Harnabflusses oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollte Cantharis compositum S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Aus der homöopathischen Literatur zu dem Präparatebestandteil Mercurius solubilis Hahnemanni ist bekannt, dass die nachfolgend aufgeführten Nebenwirkungen auftreten können. Diese sind allerdings in Zusammenhang mit Cantharis compositum S noch nicht beobachtet worden.
Nach Anwendung kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Hinweis: In der homöopathischen Literatur wird beschrieben, dass durch die vorangehende oder folgende Gabe von Coffea arabica (Coffea) eine Beeinträchtigung der therapeutischen Wirkung von Lytta vesicatoria (Cantharis) auftreten kann.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. oder i.v., bei chronischen Verlaufsformen 1 Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Lytta vesicatoria/Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen der Schleimhäute, des Harn- und Geschlechtsapparates. Ergüsse in Körperhöhlen.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen.

Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane (Pyelitis, Zystitis, Urethritis). Nierenentzündungen (Glomerulonephritis). Entkräftende Krankheiten.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen der Schleimhäute (z.B. Pyelitis, Zystitis, Urethritis). Mandelabszess. Nervöse Überempfindlichkeit (bes. gegenüber Schmerzen und Kälte).

Carbo compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo vegetabilis Dil. D10, Lachesis Dil. D10, Melilotus officinalis Dil. D8, Belladonna Dil. D6, Arnica Dil. D6 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Antihomotoxischer Regulationseffekt bei Apoplexia cerebri und Herzinfarkt.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, im allgemeinen täglich (bis 3 mal wöchentlich) 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Herz- und Kreislaufschwäche (mit Kreislaufversagen, Kollapszuständen, Dyspnoe).
Lachesis (Buschmeister)
Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Rheumatismus. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen (geschwätzig, misstrauisch; delirant) und Verstimmungszustände (Stimmungswechsel, Depressionen, Gedächtnisschwäche).
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (als Folge eines roten Blutdruckes bzw. bei Plethora).
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Gehirnhäute.
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Cardiacum-Heel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia Trit. D4 60 mg; Gelsemium Trit. D4, Glonoinum Trit. D5, Sulfur Trit. D12, Cactus Trit. D4, Kalium carbonicum Trit. D4, Castoreum sibiricum Trit. D6, Arnica Trit. D4, Ranunculus bulbosus Trit. D6 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Spigelia (Wurmkraut)
Angina pectoris (auch vertebragener Genese). Nervenschmerzen (ausstrahlende). Kopfschmerzen.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verstimmungszustände.
Cactus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben (Anasarka). Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris!). Allgemeine Schwäche.
Castoreum sibiricum (Sibirisches Bibergeil)
Nervöse Verstimmungs- und Erschöpfungszustände.
Arnica (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Ranunculus bulbosus (Knollenhahnenfuß)
Rheumatismus im Brustkorbbereich (z.B. Osteochondrose der BWS mit konsekutiven ausstrahlenden Schmerzen). Nervenschmerzen.

Causticum compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni D3, Natrium oxalaceticum D8, 2-Oxoglutarsäure D10, Fumarsäure D10, Acidum arsenicosum D10, Sulfur D12, Arnica D4, Pulsatilla D6, Embryo suis D10, Histamin D18 jeweils 1 g. Die Bestandteile 1-8 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D3, Natrium oxalaceticum Dil. D8 aquos, 2-Oxoglutarsäure Dil. D10, Fumarsäure Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D10, Sulfur Dil. D12, Arnica Dil. D4, Pulsatilla Dil. D6, Embryo suis Dil. D10, Histamin Dil. D18 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 9 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Therapie bei Verbrennungen jeder Art; Röntgenkater; Beschwerden nach Radiumeinlagen, Telekobalt, radioaktiven Isotopen; Erschöpfungszustände.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, im Allgemeinen 3 mal täglich 10 Tropfeneinnehmen, bei akuten Zuständen anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Causticum Hahnemanni
Lähmungen. Verstimmungszustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Gutartige sowie bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Entzündungen der Atemwege. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Histamin (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Niedriger Blutdruck. Herzbeschwerden.

Ceanothus-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ceanothus americanus Dil. D10, Ceanothus americanus Dil. D30, Ceanothus americanus Dil. D200, Lachesis Dil. D10, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Oberbauchsyndrom; Pankreopathie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ceanothus americanus (Säckelblume)
Drüsenerkrankungen. Milzvergrößerung (mit „Knäuelgefühl“ im linken Oberbauch, Atemnot).
Lachesis (Buschmeister)
Herz- und Kreislaufschwäche. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Cerebrum compositum NM

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum suis Dil. D8, Embryo suis Dil. D10, Hepar suis Dil. D10, Placenta suis Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D6, Selenium Dil. D10, Thuja Dil. D6, Ignatia Dil. D8, Acidum phosphoricum Dil. D10, China Dil. D4, Manganum phosphoricum Dil. D8 aquos, Magnesium phosphoricum Dil. D10, Anacardium Dil. D6, Conium Dil. D4, Hyoscyamus Dil. D6, Aconitum Dil. D6, Cocculus Dil. D4, Ambra Dil. D10, Sulfur Dil. D10, Kalium bichromicum Dil. D8, Gelsemium Dil. D4, Ruta Dil. D4, Arnica Dil. D28, Aesculus Dil. D4 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1-17 und 19-24 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Abwehrsysteme bei Entwicklungsstörungen der Kinder, Legasthenie, vegetativer Dystonie, Depressionen, Arteriosklerose; nach Commotio cerebri; nach Enzephalitis; bei Neuralgien, Erregungszuständen, amyotrophischer Lateralsklerose, multipler Sklerose, Parkinsonscher Schüttellähmung, Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung, bei sonstigen geriatrischen Indikationen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls auch i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände. Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.
Selenium (Selen)
Verdauungsschwäche. Schwächezustände.
Thuja (Lebensbaum)
Verdauungsschwäche. Verstimmungszustände.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
China (Chinarinde)
Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Nervenschmerzen.
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Nervenschmerzen. schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals.
Anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose mit hypoxämischen zerebralen Schwindel). Lähmung und Lähmigkeit. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Hyoscyamus (Bilsenkraut)
Unruhe und Erregungszustände. Schlafstörungen. Spastische Zustände der Atemwege und der Verdauungswege.
Aconitum (Eisenhut)
Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Cocculus (Kockelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Hinterhauptkopfschmerz. Krämpfe. Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.

Ambra (Grauer Amber)
Nervöse Übererregbarkeit und nervöse Erschöpfung. Schlafstörungen. Fehlsteuerungen des vegetativen Nervensystems. Traurige Verstimmungszustände. Gefäßverkalkung. Voralterung.
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Kalium bichromicum (Kaliumdichromat)
Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, des Harnsystems. Chronische Geschwüre der Haut. Nervenschmerz und Rheumatismus.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Lähmungen und Krampfleiden.
Ruta (Weinraute)
Körperliche Überanstrengung (z.B. auch Kopfschmerzen und Asthenopie nach Überanstrengung der Augen).
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Aesculus (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden. Lenden-Kreuzbeinschmerz.

C

Chelidonium-Homaccord® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10, Chelidonium Dil. D30, Chelidonium Dil. D200 jeweils 0,6 g; Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000 jeweils 0,3 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10, Chelidonium Dil. D30, Chelidonium Dil. D200 jeweils 6,6 µl; Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Cholangitis; Cholezystitis; Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica; Stauungsikterus; Leberschädigung (Parenchymschäden). Als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen des Magen-Darm-Kanals.

China-Homaccord® S

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:: China Dil. D2, China Dil. D10, China Dil. D30, China Dil. D200 jeweils 0,6 g; Sepia Dil. D6, Sepia Dil. D30, Sepia Dil. D200, Sepia Dil. D1000 jeweils 0,4 g. Die Bestandteile 1-6 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: China Dil. D4, China Dil. D10, China Dil. D30, China Dil. D200 jeweils 6,6 µl; Sepia Dil. D6, Sepia Dil. D30, Sepia Dil. D200, Sepia Dil. D1000 jeweils 4,4 µl. Die Bestandteile 1-7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Erschöpfungs- und Schwächezustände. Basistherapeutikum bei Osteochondrose.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
China (Chinarinde)
Fieberanfälle. Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Schleimhautblutungen. Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Nervenschmerzen (auch als Folge von pathologischen Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule).
Sepia (Tintenfisch)
Verschiedene, besonders chronische Hauterkrankungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Rheumatische Erkrankungen. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).

Cimicifuga-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga Dil. D2, Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 0,8 g; Strontium carbonicum Dil. D8, Strontium carbonicum Dil. D30, Strontium carbonicum Dil. D200 jeweils 0,2 g. Die Bestandteile 1-5 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.

Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga Dil. D4, Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 8,8 µl; Strontium carbonicum Dil. D8, Strontium carbonicum Dil. D30, Strontium carbonicum Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Die Bestandteile 1-6 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien; neurale Störfelder.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Injektionslösung: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cimicifuga (Wanzenkraut)
Rheumatischer und wirbelsäulenbedingter Muskelschmerz. Krampfschmerz des Herzens (vertebragene Angina pectoris), des Magen-Darm-Kanals, der Gallenblase und im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.
Strontium carbonicum (Strontiumkarbonat)
Rheumatischer Schmerz (z.B. auch bei Arthrosen und Osteoporose).

Cinnamomum-Homaccord® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinnamomum Dil. D1 1 g; Cinnamomum Dil. D10, Cinnamomum Dil. D30, Cinnamomum Dil. D200, Hamamelis Dil. D3, Hamamelis Dil. D10, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 0,1 g; Millefolium Dil. D4, Millefolium Dil. D10, Millefolium Dil. D30, Millefolium Dil. D200 jeweils 0,8 g. Die Bestandteile 1-10 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinnamomum Dil. D3 11 µl; Cinnamomum Dil. D10, Cinnamomum Dil. D30, Cinnamomum Dil. D200, Hamamelis Dil. D3, Hamamelis Dil. D10, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Millefolium Dil. D4, Millefolium Dil. D10, Millefolium Dil. D30, Millefolium Dil. D200 jeweils 8,8 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei Blutungen anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei Blutungen 2 mal täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cinnamomum (Ceylon-Zimt)
Gebärmutterblutungen.
Hamamelis (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen (und zwar besonders venöse Blutungen).
Millefolium (Scharfgarbe)
Hellrote Blutungen (und zwar besonders präkapillare arteriovenöse [Anastomosen] Sickerblutungen). Krampfaderleiden.

Circulo-Injeel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum Dil. D10, Argentum Dil. D30, Argentum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Barium jodatum Dil. D10, Barium jodatum Dil. D30, Barium jodatum Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200, Solanum nigrum Dil. D10, Solanum nigrum Dil. D30, Solanum nigrum Dil. D200, Tabacum Dil. D10, Tabacum Dil. D30, Tabacum Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Secale cornutum Dil. D6, Secale cornutum Dil. D10, Secale cornutum Dil. D30, Secale cornutum Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Argentum (Silber)
Geistige Erschöpfung und Störungen des Nervensystems (z.B. Gedächtnisschwäche, Unruhe, Schwindel, Tremor) mit Lähmigkeit und Krämpfen der Gliedmaßen.

Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Verschleißkrankheiten. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände.
Barium jodatum (Bariumjodid)
Bluthochdruck und Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen (z.B. Lymphatismus bzw. exsudative Diathese mit feuchtkalten Händen und Füßen).
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)
Hirn- und Hirnhautreizungen (und zwar auch als Folge von zerebralen Durchblutungsstörungen mit konsekutiver Demenz und Verwirrungszuständen).
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Secale cornutum (Mutterkorn)
Muskelkrämpfe, Krampfleiden, Lähmungen, Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten.

C

Cocculus-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cocculus Dil. D4, Cocculus Dil. D10, Cocculus Dil. D30, Cocculus Dil. D200, Petroleum Dil. D6, Petroleum Dil. D10, Petroleum Dil. D30, Petroleum Dil. D200 jeweils 0,5 g. Die Bestandteile 1 bis 7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Kinetosen; Erschöpfungszustände nach Überarbeitung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cocculus (Kokkelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Reisekrankheit, -übelkeit. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Hinterhauptkopfschmerz. Krämpfe und Lähmungen. Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Petroleum (Steinöl)
Schwindel.

Coenzyme compositum Ampullen

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coenzym A Dil. D8, Ascorbinsäure Dil. D6, Thiaminchloridhydrochlorid Dil. D6, Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O Dil. D6, Pyridoxinhydrochlorid Dil. D6, Nicotinamid Dil. D6, Acidum cis-aconiticum Dil. D8, Acidum citricum Dil. D8, Fumarsäure Dil. D8, 2-Oxoglutarsäure Dil. D8, DL-Äpfelsäure Dil. D8, Acidum succinicum Dil. D8, Barium oxalsuccinicum Dil. D10, Natrium oxalaceticum Dil. D6 aquos, Natriumpyruvat Dil. D8, L-Cystein Dil. D6, Pulsatilla Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10, Sulfur Dil. D10, Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz Dil. D10, Nadid Dil. D8, Manganum phosphoricum Dil. D6 aquos, Magnesiumorotat Dil. D6 aquos, Cerium oxalicum Dil. D8 aquos, (±)-æ-Liponsäure Dil. D6 aquos, Beta vulgaris rubra Dil. D4 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1-21 und 22-26 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. injizieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Acidum citricum (Zitronensäure)
Zahnfleischbluten. Auszehrende Krankheiten.
Acidum succinicum (Bernsteinsäure)
Heuschnupfen.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Cerium oxalicum (Ceroxalat)
Erbrechen, Krampfhusten.

Colchicum compositum mite S

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum Dil. D6, Conium Dil. D4, Galium aparine Dil. D4, Podophyllum Dil. D4, Hydrastis Dil. D4 jeweils 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Zur prä- und postoperativen Ergänzungstherapie bei Neoplasien.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Colchicum (Herbstzeitlose)
Ergüsse in Körperhöhlen. Entzündung des Magen-Darm-Kanals (mit Brechreiz und Erbrechen schon beim Geruch oder Anblick der Speisen).
Conium (Gefleckter Schierling)
Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Galium aparine (Klebkraut)
Nierensteinleiden. Geschwüre besonders der Zunge.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Brechdurchfall (oft mit stinkenden spritzenden Stühlen = „Hydrantenstühle“).
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.

Colocynthis-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis Dil. D2, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200 jeweils 0,8 g; Gnaphalium polycephalum Dil. D1, Gnaphalium polycephalum Dil. D10, Gnaphalium polycephalum Dil. D30, Gnaphalium polycephalum Dil. D200 jeweils 0,2 g. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis Dil. D4, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200 jeweils 8,8 µl; Gnaphalium polycephalum Dil. D3, Gnaphalium polycephalum Dil. D10, Gnaphalium polycephalum Dil. D30, Gnaphalium polycephalum Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Colocynthis (Koloquinte)
Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.
Gnaphalium polycephalum (Vielköpfiges Ruhrkraut)
Rheumatismus. Ischiasschmerz. Nervenschmerzen.

Cor compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cor suis Dil. D8, Hepar suis Dil. D8, Crataegus Dil. D6, Arnica Dil. D4, Ignatia Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D8, g-Strophanthin 8 H_2O Dil. D8, Ranunculus bulbosus Dil. D6, Cactus Dil. D3, Glonoinum Dil. D4, Kalium carbonicum Dil. D4, Kalmia Dil. D4, Spigelia Dil. D10, Carbo vegetabilis Dil. D18, Natrium oxalaceticum Dil. D8 aquos, 2-Oxoglutarsäure Dil. D8, Fumarsäure Dil. D8, DL-Äpfelsäure Dil. D8, Acidum sarcolacticum Dil. D6 jeweils 22 µl.
Die Bestandteile 1 bis 18 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Abwehrsysteme bei Koronardurchblutungsstörungen, nach Herzinfarkt, bei Myokardschwäche, Herzinsuffizienz, Endarteriitis obliterans, Hypertonie, gastrokardialem Symptomenkomplex, Neigung zu Lungenödem, post emboliam, bei Emphysem, Arrhythmia cordis, Angina pectoris, Sportherz.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen sowie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Verstimmungszustände.
Ranunculus bulbosus (Knollenhahnenfuß)
Erkrankung des Brustfelles. Rheumatismus im Brustkorbbereich (mit stechenden Brustschmerzen). Nervenschmerzen.
Cactus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Bluthochdruck. Angina pectoris.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben (Anasarka). Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris). Allgemeine Schwäche.
Kalmia (Berglorbeer)
Rheumatische und andere Herzerkrankungen. Nervenschmerzen.
Spigelia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris. Nervenschmerz.

Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Blähsucht. Herz- und Kreislaufschwäche.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.

Cralonin® Tropfen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG** Zul.-Nr.: 9054.00.00

Cralonin®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Zul.-Nr.: 6046574.00.00

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 ml flüssige Verdünnung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Ø 70 ml; Spigelia anthelmia Dil. D2, Kalium carbonicum Dil. D3 jeweils 1 ml.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D2 8,8 mg; Spigelia anthelmia Dil. D1, Kalium carbonicum Dil. D2 jeweils 1,1 mg.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Altersherz, nervöse Herzstörungen; Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Angina pectoris).
Hinweis: Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen oder Schweißausbrüchen verbunden sind und sich nicht innerhalb einer halben Stunde verbessern, ist notfallmäßig ein Arzt hinzuzuziehen. Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme andere vom Arzt verordneter Arzneimittel.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Altersherz, nervöse Herzstörungen, Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Angina pectoris).
Hinweis: Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über 6 Wochen oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen empfehlen wir die Rücksprache mit Ihrem Arzt. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cralonin Tropfen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cralonin in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 45 Vol.-% Alkohol.
Zur Anwendung von Cralonin Tropfen bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierte Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Flüssige Verdünnung: In Einzelfällen kann es im Sinne einer homöopathischen Erstverschlimmerung zu einer vorübergehenden Hautrötung im Gesicht (Flush), zu Herzjagen und Pulsfrequenzerhöhung, zu Ödembildung oder auch zu Schwindel, Übelkeit und leichten Magenbeschwerden kommen.
Hinweis: Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde höchstens 12 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Beschwerden täglich (auch alle 6-8 Stunden), sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Spigelia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris. Nervenschmerz.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben (Anasarka). Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris). Allgemeine Schwäche.

Crataegus-Heel® S

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Extr. Crataegi e fol. c. flor. spir. spiss. (stand. auf einen Mindestgehalt von 1,5 % Flavonoide, berechnet als Hyperosid) 8,0 g. Extr. Crataegi e fruct. spir. spiss. (4:1) 4,0 g.
Sonstige Bestandteile: Sorbitlösung; Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Nachlassende Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend der Stadien I bis II nach Nyha. Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend. Noch nicht digitalisbedürftiges Altersherz. Leichte Formen von bradykarden Herzrhythmusstörungen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Aus der verbreiteten Anwendung von Weißdorn als Arzneimittel und aus tierexperimentellen Untersuchungen haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 30 Tropfen.
Nach Rücksprache mit dem Arzt sollte die Dauer der Anwendung mindestens 6 Wochen betragen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Cruroheel® S

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046657.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum oxydatum rubrum Trit. D8 (HAB, Vorschrift 6), Apis mellifica Trit. D4, Lycopodium clavatum Trit. D4, Acidum silicicum Trit. D6 jeweils 30 mg; Hamamelis virginiana Trit. D4, Carbo vegetabilis Trit. D8, Pulsatilla pratensis Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür).

Hinweis: Cruroheel S dient der unterstützenden Behandlung und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Maßnahmen wie z.B. eine Kompressionsbehandlung der Beine. Bei Rötung der Wundränder sowie bei unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cruroheel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hydrargyrum oxydatum rubrum (Rotes Quecksilberoxyd)
Haut- und Schleimhauteiterungen.
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben. Allergien.
Lycopodium clavatum (Bärlapp)
Krampfaderleiden. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen.
Acidum silicicum (Silicea)
Chronische Entzündungen. Eiterungen und Fistelbildung der Haut, der Knochen und Gelenke. Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke.
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hautblutungen.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Krampfaderleiden.
Pulsatilla pratensis (Kuhschelle)
Krampfaderleiden. Schlafstörungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Cutis compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cutis suis Dil. D8, Hepar suis Dil. D10, Splen suis Dil. D10, Placenta suis Dil. D10, Glandula suprarenalis suis Dil. D10, Funiculus umbilicalis suis Dil. D10, Thuja Dil. D8, Galium aparine Dil. D6, Selenium Dil. D10, Thallium sulfuricum Dil. D13, Ignatia Dil. D6, Sulfur Dil. D10, Cortisonacetat Dil. D28, Urtica urens Dil. D4, Acidum phosphoricum Dil. D6, Calcium fluoratum Dil. D13, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D13, Aesculus Dil. D6, Ichthyolum Dil. D28, Ledum Dil. D4, Arctium lappa Dil. D6, Acidum formicicum Dil. D198, 2-Oxoglutarsäure Dil. D10, Fumarsäure Dil. D10, Natrium oxalaceticum Dil. D10 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Allergie, Sklerodermie, Akne vulgaris, Erythematodes, Dermatomykosen, Crusta lactea, Kondylomen, Ekthyma, Impetigo contagiosa, Neurodermitis, Mikrosporie, Interdigitalmykosen, Dekubitus, Dupuytren'scher Kontraktur, Haarausfall, Naevi, Quincke'schem Ödem, Elephantiasis.
Gegenanzeigen: Bei bekannter Allergie gegen Ammoniumbituminosulfonat soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen (bes. bei Neigung zu proliferativen Prozessen wie Warzen, Papillomen, Naevi). Verstimmungszustände.
Galium aparine (Klebkraut)
Geschwüre (besonders der Zunge).
Selenium (Selen)
Hautausschläge, fettige Haut. Verdauungsschwäche.
Thallium sulfuricum (Thalliumsulfat)
Haarausfall.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen (vor allem bei unreiner Haut mit Pruritus und schlechtem Körpergeruch). Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden. Nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Urtica urens (Kleine Brennnessel)
Nesselsuchtartige Hauterkrankungen.
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände. Kalkstoffwechselstörungen.
Calcium fluoratum (Calciumfluorid)
Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Hauterkrankungen. Lymphdrüsenentzündungen. Entkräftende Krankheiten.
Aesculus (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden.
Ichthyolum (Ammoniumbituminosulfonat)
Eiternde Hautentzündungen.
Ledum (Sumpfporst)
Stich- und Bissverletzungen (auch Folgen von Insektenstichen – Bienen, Wespen, Hornissen – bzw. Ameisen- oder Hummelbissen). Haut- und Schleimhautblutungen.
Arctium lappa (Klette)
Nässende Hautausschläge.
Acidum formicicum (Ameisensäure)
Ekzeme. Allergien.

Diarrheel® S

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitricum Trit. D8, Acidum arsenicosum Trit. D8, Colchicum Trit. D6, Colocynthis Trit. D6, Hydrargyrum bichloratum Trit. D8, Podophyllum Trit. D6, Veratrum Trit. D4 jeweils 30 mg; Tormentilla Trit. D2 60 mg. Die Bestandteile 1-7 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1-8 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.

Anwendungsgebiete: Akute und chronische Diarrhoe; Gastroenteritis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Verstimmungszustände.
Colchicum (Herbstzeitlose)
Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung des Dick- und Enddarmes.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Brechdurchfall.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Kreislaufversagen. Durchfallerkrankung.

Discus compositum N

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046367.00.00,
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6046338.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalmia latifolia Dil. D8, Hydrargyrum oxidatum rubrum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Asa foetida Dil. D8 jeweils 0,1 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalmia latifolia Dil. D8, Hydrargyrum oxidatum rubrum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Asa foetida Dil. D8 jeweils 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemäß HAB.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Gelenk- und Bindegewebserkrankungen.
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuauftretenden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Mischung: Discus compositum N ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes soll Discus compositum N bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte wegen des Alkoholgehaltes Discus compositum N nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb – auch wegen des Alkoholgehaltes – bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Wie alle Arzneimittel sollte Discus compositum N in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Gegenmaßnahmen: Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wechselwirkungen: Bei diesem Präparat sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich 5 bis 10 Tropfen einnehmen.
Anwendungshinweis bei Kindern: Bei Säuglingen bis zum 1. Lebensjahr 10 Tropfen, bei Kleinkindern bis zum 6. Lebensjahr 20 Tropfen, bei Kindern zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr 30 Tropfen in ein halbes Glas Wasser geben. Davon 1 bis 3 mal täglich, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich, jeweils 1 Teelöffel geben.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. oder i.v. Bei chronischen Verlaufsformen 1 Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Mischung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml Flasche werden 8,3 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Kalmia latifolia (Berglorbeer)
Rheumatische und andere Herzerkrankungen. Rheumatismus. Nervenschmerzen.
Mercurius praecipitatus ruber (Rotes Quecksilberoxyd)
Haut- und Schleimhauteiterungen.
Asa foetida (Stinkasant)
Knochenerkrankungen.

Droperteel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046746.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Trit. D4 90 mg; Lachesis mutus Trit. D12, Carbo vegetabilis Trit. D12 jeweils 75 mg; Dactylopius coccus Trit. D4, Kalium carbonicum Trit. D12 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Bronchitis, Begleittherapie bei Keuchhusten.
Hinweis: Bei länger als 3 Tage anhaltendem oder über 39 °C ansteigendem Fieber, bei eitrigem oder blutigem Hustenauswurf, bei Atemnot sowie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, 1 Tablette, im Mund zergehen lassen.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
0-3 Jahre	2 mal tägl. ½ Tablette	4 mal tägl. ½ Tablette
4-6 Jahre	3 mal tägl. ½ Tablette	6 mal tägl. ½ Tablette
7-11 Jahre	2 mal tägl. 1 Tablette	6 mal tägl. ½ Tablette

Die Tabletten im Mund zergehen lassen.

Bei Säuglingen und Kleinkindern kann die entsprechende Einzeldosis auch mit etwas Flüssigkeit vermischt eingegeben werden.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Drosera (Sonnentau)
Entzündungen der Atemwege und besonders Keuchhusten.
Lachesis mutus (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute. Infektionskrankheiten. Herz- und Kreislaufschwäche.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Entzündung der Atemwege. Heiserkeit. Herz- und Kreislaufschwäche.
Dactylopius coccus/Coccus cacti (Cochenille)
Entzündungen der Atemwege (typisch: Krampfhusten mit zähem, strähnigem, fadenziehendem Schleim).
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Chronische Entzündung der Atemwege und des Rippenfells. Wasseransammlung in Geweben. Allgemeine Schwäche.

Drosera-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Dil. D2, Drosera Dil. D10, Drosera Dil. D30, Drosera Dil. D200, Cuprum aceticum Dil. D4, Cuprum aceticum Dil. D10, Cuprum aceticum Dil. D30, Cuprum aceticum Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Dil. D4, Drosera Dil. D10, Drosera Dil. D30, Drosera Dil. D200, Cuprum aceticum Dil. D6, Cuprum aceticum Dil. D10, Cuprum aceticum Dil. D30, Cuprum aceticum Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Pertussis; Bronchiolitis; asthmatoide Bronchitis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Drosera (Sonnentau)
Entzündungen der Atemwege und besonders Keuchhusten.
Cuprum aceticum (Kupferazetat)
Erkrankungen mit Krampfneigung. Asthma. Keuchhusten.

Dulcamara-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Dulcamara Dil. D2, Dulcamara Dil. D10, Dulcamara Dil. D30, Dulcamara Dil. D200, Aranea diadema Dil. D6, Aranea diadema Dil. D10, Aranea diadema Dil. D30, Aranea diadema Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden. Tonsillarhypertrophie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Infekte. Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harnwege, der Gelenke, der Haut, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Aranea diadema (Kreuzspinne)
Periodisch auftretende Nervensschmerzen. Anfallsweise Fieber. Gefühlsempfindungsstörung (allgemeine Frostigkeit). Schmerzhafte Gelenkerkrankung.

Duodenoheel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045209.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Semecarpus anacardium Trit. D4, Argentum nitricum Trit. D6, Cephaelis ipecacuanha Trit. D4, Iodum Trit. D6 jeweils 30 mg; Lachesis mutus Trit. D12, Petroleum rectificatum Trit. D6, Robinia pseudacacia Trit. D4 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.

E

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Magenübersäuerung, zur unterstützenden Behandlung von Entzündungen und Geschwüren des Zwölffingerdarms.
Hinweis: Bei Blut im Stuhl (Teerstuhl), bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten sowie bei allen unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Säuglingen und Kleinkindern. Bei Jodüberempfindlichkeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Im allgemeinen 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Semecarpus anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Verstimmungszustände.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege.
Cephaelis ipecacuanha (Brechwurzel)
Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung.
Iodum (Jod)
Schilddrüsenüberfunktion.
Anmerkung: Hierfür ist charakteristisch Heißhunger sowie Abmagerung trotz guten Appetits, also Symptome, die auch betr. Duodenitis mit und ohne Ulkus typisch sind (Nüchternschmerz, Besserung durch Essen).
Lachesis mutus (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Petroleum rectificatum (Steinöl)
Entzündungen des Magen-Darm-Kanals.
Robinia pseudacacia (Scheinakazie)
Magenübersäuerung. Durchfall.

Echinacea compositum SN
Echinacea compositum forte SN

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Echinacea compositum SN: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D3, Aconitum Dil. D3, Sanguinaria Dil. D4, Sulfur Dil. D8, Baptisia Dil. D4, Lachesis Dil. D10, Bryonia Dil. D6, Eupatorium perfoliatum Dil. D6, Pulsatilla Dil. D8, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8, Thuja Dil. D8, Phosphorus Dil. D8, Cortisonacetat Dil. D13, Streptococcinum Dil. D18, Staphylococcinum Dil. D18, Phytolacca Dil. D6, Zincum metallicum Dil. D10, Gelsemium Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D4, Arnica Dil. D4, Acidum arsenicosum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D8, Euphorbium Dil. D6 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Echinacea compositum forte SN: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D3 0,44 ml; Aconitum Dil. D5, Sanguinaria Dil. D6, Sulfur Dil. D10, Baptisia Dil. D6, Lachesis Dil. D12, Bryonia Dil. D8, Eupatorium perfoliatum Dil. D8, Pulsatilla Dil. D10, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8, Thuja Dil. D10, Grippe-Nosode Dil. D15, Phosphorus Dil. D10, Cortisonacetat Dil. D15, Streptococcinum Dil. D20, Staphylococcinum Dil. D20, Phytolacca Dil. D8, Zincum metallicum Dil. D12, Gelsemium Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D12, Rhus toxicodendron Dil. D6, Arnica Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D10, Euphorbium Dil. D8 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der körpereigenen Abwehr bei: Fieber und Entzündungen, (Pocken-)Impf-Enzephalitis, Grippe, Angina, Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen, Fokaltoxikosen, Gingivitis, Stomatitis, Sinusitis, Gastroenteritis, Enterocolitis, Zystitis, Pyelitis, Kolpitis, Fluor albus, Adnexitis, Glomerulonephritis, Fisteleiterungen, Osteomyelitis, Otitis media, chronischem Hirnabszess, Meningitis, Milzbrand, Karbunkel, Mononukleose, Hautkrankheiten, Mastitis.
Gegenanzeigen: Echinacea compositum SN: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler und Giftsumachgewächse. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Echinacea compositum forte SN: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).
In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, zur allgemeinen Anregung der Abwehrsysteme 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren. Die intramuskuläre oder intravenöse Injektion und die jeweilige Dosierung müssen individuell dem Krankheitsfall und der Reaktion des Patienten angepasst werden. Ist eine schnelle und ausgeprägte Reaktion erwünscht, so ist Echinacea compositum forte SN zu verabreichen. Eine mildere Reaktion sollte bei bereits fiebernden Patienten mit Echinacea compositum SN angestrebt werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Sanguinaria (Kanadische Blutwurzel)
Migränöse Kopfschmerzen. Entzündungen der Atmungsorgane. Rheumatismus.

Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Baptisia (Wilder Indigo)
Schwere, fiebrige Infektionen. Allgemeine Blutvergiftung (Sepsis bzw. Septikämie häufig bei Abwehrschwäche). Verwirrtheitszustände.

Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Drüsenerkrankungen. Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung. Venenentzündungen. Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Rheumatismus. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells, des Bauchfells (also der serösen Häute) sowie der Leber. Akuter und chronischer Rheumatismus (Synovitis, Synovialitis!).

Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf)
Grippe, grippeähnliche fieberhafte Erkrankungen. Fieberhafte Erkrankungen des Leber-Galle-Systems. Rheumatismus.

Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der Augen, der Mundhöhle, der Mandeln, des Dick- und Enddarmes, der Nieren, der ableitenden Harnwege, der Scheide.

Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.

Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen. Rheumatismus. Nerven- und Kopfschmerzen. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane, Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Phytolacca (Kermesbeere)
Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen, besonders der Atemorgane. Entzündung und Erkrankung der Brustdrüse. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

Zincum metallicum (Zink)
Krämpfe und Nervenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule, des Gehirns und des Rückenmarks. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände. Schlafstörungen.

Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Infektionskrankheiten. Lähmungen und Krampfleiden.

Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute wie Furunkel, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.

Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Juckende Hautkrankheiten. Fieberhafte Infektionskrankheiten mit Benommenheit. Entzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Entzündungen der Augen. Regelstörungen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Lähmigkeiten, Lähmungen. Schwindel. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.

Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Verstimmungszustände.

Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.

Euphorbium (Euphorbium)
Akute Entzündung der Haut. Entzündung der Atemwege (und zwar besonders der oberen Luftwege: Rhinitis, Sinusitis).

Engystol®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 44442.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Trit. D6, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D10, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D30 jeweils 75 mg; Sulfur Trit. D4, Sulfur Trit. D10 jeweils 37,5 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten und grippale Infekte.
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden, unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Engystol in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von Engystol Tabletten können in einzelnen Fällen Hautausschläge auftreten. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und der behandelnde Arzt aufzusuchen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal täglich 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen. Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Kleinkinder 1-6 Jahre	nach Rückspr. m. d. Arzt 3 mal tägl. ½ Tabl. unter der Zunge zergehen lassen	nach Rückspr. m. d. Arzt alle ½ bis ganze Stunde, bis zu 12 mal tägl., ½ Tabl. unter der Zunge zergehen lassen
Schulkinder 6-12 Jahre	2 mal tägl. 1 Tabl. unter der Zunge zergehen lassen	alle ½ bis ganze Stunde, bis zu 8 mal tägl., 1 Tabl. unter der Zunge zergehen lassen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Die Tabletten unter der Zunge zergehen lassen. Bei Kleinkindern kann die entsprechende Einzeldosis auch mit etwas Flüssigkeit vermischt eingegeben werden.
Engystol sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche eingenommen werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung:
Bei einer erheblichen Überschreitung der vorgesehenen Dosierung kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

E

Engystol®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Zul.-Nr.: 6045221.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Dil. D6, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D10, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D30 jeweils 6,6 mg; Sulfur Dil. D4, Sulfur Dil. D10 jeweils 3,3 mg. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten und grippale Infekte.
Hinweis: Bei anhaltenden und unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollte Engystol in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von Engystol kann es in seltenen Fällen zu juckenden Hautausschlägen kommen. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und der behandelnde Arzt aufzusuchen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Beschwerden 1 mal täglich 1 Ampulle (1,1 ml) bis zu einer Woche i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollen ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)
Virusinfektionen.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Erigotheel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Origanum vulgare Dil. D6, Origanum vulgare Dil. D10, Origanum vulgare Dil. D30 jeweils 6,6 µl. Erythraea centaurium Dil. D10, Erythraea centaurium Dil. D30 jeweils 4,4 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Ulcus ventriculi et duodeni.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Euphorbium comp. SN

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046781.00.01,
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6046781.00.00

Euphorbium comp. Nasentropfen SN

- **DOSIERSPRAY OHNE TREIBGAS**

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Luffa operculata Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Hydrargyrum biiodatum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D10, Euphorbium Dil. D3, Pulsatilla pratensis Dil. D2 jeweils 0,1 g. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla pratensis Dil. D2, Luffa operculata Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Euphorbium Dil. D4, Hydrargyrum biiodatum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D10 jeweils 22 mg. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Nasentropfen: 100 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphorbium Dil. D4, Pulsatilla Dil. D2, Luffa operculata Dil. D2, Mercurius bijodatus Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D10 jeweils 1 g. Die Bestandteile 1-3 werden über die letzte Stufe, die Bestandteile 4-6 über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke jeweils gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Mischung, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Sinusitis), Tubenkatarrhe.
Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Nasentropfen: Schnupfen unterschiedlicher Ursache (viral, bakteriell, allergisch), trockener Schnupfen, chronischer Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung, zur Erleichterung der Nasenatmung bei Heuschnupfen.
Gegenanzeigen: Mischung: Bei Schilddrüsenerkrankungen Euphorbium comp. SN nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphorbium comp. SN in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei Schilddrüsenerkrankungen Euphorbium comp. SN nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphorbium comp. SN in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nasentropfen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion, Nasentropfen: Keine.
Nebenwirkungen: Mischung, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Nasentropfen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen; bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Kinder erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Kleinkinder 1-6 Jahre	3 mal täglich 5 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 5 Tropfen einnehmen
Schulkinder 6-12 Jahre	3 mal täglich 7 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 7 Tropfen einnehmen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Zuständen täglich 1 Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle s.c., i.m., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Kinder ab 12 Jahre erhalten die Erwachsenendosierung.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Nasentropfen: Soweit nicht anders verordnet, 3-5 mal täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen, bei Kindern unter 6 Jahren 3-4 mal täglich 1 Sprühstoß. Das Präparat kann unbedenklich auch bei Säuglingen angewendet werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Nasentropfen: Dosierspray mit 20 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Euphorbium (Euphorbium)
Entzündung der Atemwege (und zwar besonders der oberen Luftwege: Rhinitis und Sinusitis).
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen des Auges (Konjunktivitis).Mittelohrentzündungen. Masern. Kopfschmerzen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Luffa operculata (Luffaschwamm)
Schnupfen. Heuschnupfen.
Hydrargyrum biiodatum/Mercurius bijodatus (Quecksilberjodid)
Eitrige Schleimhautentzündungen der Nase, des Rachens, der Mandeln und der Augen.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Schleimhäute, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Migräne.

Ferrum-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D8, Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D200, Ferrum phosphoricum Dil. D8, Ferrum phosphoricum Dil. D30, Ferrum phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,2 g; Ferrum sulfuricum Dil. D6, Ferrum sulfuricum Dil. D10, Ferrum sulfuricum Dil. D30, Ferrum sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,1 g; Ferrum sesquichloratum Dil. D4, Ferrum sesquichloratum Dil. D10, Ferrum sesquichloratum Dil. D30, Ferrum sesquichloratum Dil. D200 jeweils 0,05 g; Spiraea ulmaria Dil. D2, Spiraea ulmaria Dil. D10, Spiraea ulmaria Dil. D30, Spiraea ulmaria Dil. D200 jeweils 0,45 g. Die Bestandteile 1 bis 14 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m), die Bestandteile 15 bis 17 werden über die vorletzte Stufe mit gereinigtem Wasser und über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D10, Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D200, Ferrum phosphoricum Dil. D10, Ferrum phosphoricum Dil. D30, Ferrum phosphoricum Dil. D200 jeweils 2,2 µl; Ferrum sulfuricum Dil. D8, Ferrum sulfuricum Dil. D10, Ferrum sulfuricum Dil. D30, Ferrum sulfuricum Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Ferrum sesquichloratum Dil. D6, Ferrum sesquichloratum Dil. D10, Ferrum sesquichloratum Dil. D30, Ferrum sesquichloratum Dil. D200 jeweils 0,55 µl; Spiraea ulmaria Dil. D4, Spiraea ulmaria Dil. D10, Spiraea ulmaria Dil. D30, Spiraea ulmaria Dil. D200 jeweils 4,95 µl. Die Bestandteile 1 bis 17 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Schulter-Arm-Syndrom; Epicondylitis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ferrum metallicum (Eisen)
Nervenschmerzen.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke.
Ferrum sulfuricum (Eisensulfat)
Schilddrüsenüberfunktion.
Ferrum sesquichloratum (Ferrum muriaticum)
Rheumatismus der rechten Schulter .
Spiraea ulmaria (Mädesüß)
Rheumatismus (insbesondere auch Muskelrheumatismus und Epicondylitis; „Salicylsäure der Homöopathie“).

G

Galium-Heel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 g) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Galium aparine D3, Galium album D3 jeweils 4 g; Sedum acre D3, Sempervivum tectorum D4, Clematis D4, Thuja D3, Caltha palustris D3, Ononis spinosa D4, Juniperus communis D4, Hedera helix D4, Betula alba D2, Echinacea D5, Calcium fluoratum D8, Phosphorus D8, Aurum metallicum D10, Argentum D8, Apis mellifica D12, Acidum nitricum D6 jeweils 5 g; Urtica D3 2 g. Die Bestandteile 1 bis 16 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 62% (m/m) und die Bestandteile 1 bis 17 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 30% (m/m) sowie die Bestandteile 18 und 19 werden über die vorletzte Stufe mit Gereinigtem Wasser und über die letzte Stufe mit Ethanol 30% (m/m) jeweils gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Galium aparine Dil. D3, Galium album Dil. D3 jeweils 0,44 µl; Sedum acre Dil. D3, Sempervivum tectorum Dil. D4, Clematis Dil. D4, Thuja Dil. D3, Caltha palustris Dil. D3, Ononis spinosa Dil. D4, Juniperus communis Dil. D4, Hedera helix Dil. D4, Betula alba Dil. D2,Echinacea Dil. D5, Calcium fluoratum Dil. D8 aquos, Phosphorus Dil. D8, Aurum metallicum Dil. D10, Argentum Dil. D8 aquos, Apis mellifica Dil. D12, Acidum nitricum Dil. D6 jeweils 0,55 µl; Urtica Dil. D3 0,22 µl. Die Bestandteile 1-16 sowie 17-18 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen.
Gegenanzeigen: Flüssige Verdünnung: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Flüssige Verdünnung: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, anfangs täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Galium aparine (Klebkraut)
Nierensteinleiden. Geschwüre (fördert Granulationen!) besonders der Zunge.
Sedum acre (Mauerpfeffer)
Afterschmerzen (z.B. Hämorrhoiden und Fissura ani).
Sempervivum tectorum (Hauswurz)
Knotige Verhärtungen in Haut, Zunge und Brust. Warzen.
Clematis (Aufrechte Waldrebe)
Hautausschläge. Lymphdrüsenschwellung. Lid- und Bindehautentzündung. Entzündung der Harnblase, der Harnröhre, der Hoden, der Brustdrüse.
Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen (und zwar besonders bei Krankheiten mit Neigung zu proliferativen Prozessen wie Warzen, Kondylome, Papillome, Polypen). Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.
Caltha palustris (Sumpfdotterblume)
Hautausschläge (wie Pemphigus vulgaris und Pusteln).
Ononis spinosa (Hauhechel)
Wassersucht.
Juniperus communis (Wacholder)
Ausscheidungsstörungen der ableitenden Harnorgane. Dyspeptische Beschwerden.
Hedera helix (Efeu)
Akute Entzündungen der Atemwege (z.B. Nasen-[Nebenhöhlen]Katarrhe), der Verdauungsorgane. Schilddrüsenüberfunktion. Rheumatische Erkrankungen.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Steigerung der körpereigenen Abwehr).
Calcium fluoratum (Kalziumfluorid)
Entzündungen der oberen Luftwege und des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten. Rheumatismus, Wirbelsäulenbeschwerden. Knochenentzündungen und -entkalkungen. Nerven- und Kopfschmerzen, Lähmungen. Entwicklungsstörungen bei Kindern. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane, Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.
Aurum metallicum (Gold)
Schleimhauteiterungen. Knochen- und Knochenhautentzündungen. Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Angina pectoris. Verhärtung drüsiger Organe. Depressive Verstimmungszustände.
Argentum (Silber)
Chronische Rachen- und Kehlkopfentzündung. Geistige Erschöpfung und Störungen des Nervensystems mit Lähmigkeit und Krämpfen der Gliedmaßen. entzündliche Schwellung der Eierstöcke.
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.
Urtica urens (Kleine Brennnessel)
Nesselsuchtartige Hauterkrankungen. Nierenleiden. Gicht.

Gastricumeel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045333.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitricum Trit. D6, Acidum arsenicosum Trit. D6 jeweils 30 mg; Pulsatilla pratensis Trit. D4, Strychnos nux-vomica Trit. D4, Carbo vegetabilis Trit. D6, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Magenentzündung, Sodbrennen, Blähsucht.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Nicht bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, 1 Tablette, im Mund zergehen lassen.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände (wie Erschöpfung, Unruhe, Angst, Verzweiflung).
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche (generelles Schleimhautmittel). Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände (melancholischer Hypochonder mit erhöhter Reizbarkeit).
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht. Schleimhautblutungen.
Antimonium crudum (Schwarzer Spießglanz)
Verdauungsstörungen (wie Dyspepsie, Appetitlosigkeit mit Widerwillen gegen alle Speisen, Völlegefühl).

Gelsemium-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium Dil. D2, Gelsemium Dil. D10, Gelsemium Dil. D30, Gelsemium Dil. D200 jeweils 0,4 g; Rhus toxicodendron Dil. D3, Rhus toxicodendron Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D30, Rhus toxicodendron Dil. D200, Cimicifuga Dil. D2, Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 0,3 g. Die Bestandteile 1 bis 10 werden mit Ethanol 43 % (m/m), die Bestandteile 11 bis 12 mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium Dil. D4, Gelsemium Dil. D10, Gelsemium Dil. D30, Gelsemium Dil. D200 jeweils 4,4 µl; Rhus toxicodendron Dil. D5, Rhus toxicodendron Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D30, Rhus toxicodendron Dil. D200, Cimicifuga Dil. D4, Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Zervikalsyndrom; Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation.
Gegenanzeigen: Flüssige Verdünnung: Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen (besonders auch Okzipital- und Trigeminusneuralgien). Nervöse Störungen.
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Lähmigkeiten, Lähmungen. Schwindel. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.
Cimicifuga (Wanzenkraut)
Rheumatischer und wirbelsäulenbedingter Muskelschmerz. Krampfschmerz des Herzens und im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.

G

Ginseng compositum N

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ginseng Dil. Ø 20 g; Acidum sarcolacticum Dil. D2, Hydrastis Dil. D10, Conium Dil. D10, Colchicum Dil. D10, Pulsatilla Dil. D10, Kreosotum Dil. D10, Viscum album Dil. D8, Sulfur Dil. D10, China Dil. D10, Galium aparine Dil. D8, Sempervivum tectorum Dil. D8, Coenzym A Dil. D10, Natrium oxalaceticum Dil. D8, Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz Dil. D10, Nadid Dil. D10 jeweils 1 g. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die 2 letzten Stufen mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme, auch bei Neoplasien.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-6 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel" verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:

Ginseng (Ginsengwurzel)
Rheumatismus. Schwächezustände.

Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.

Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.

Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Lähmung und Lähmigkeit. Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.

Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.

Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Blutungsneigung. Verhaltensstörungen bei Kindern. Altersbedingte Erkrankungen.

Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.

Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

China (Chinarinde)
Entzündungen der Atemwege. Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Schleimhautblutungen. Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag. Nervenschmerzen.

Galium aparine (Klebkraut)
Nierensteinleiden. Geschwüre (fördert Granulationen) besonders der Zunge.

Sempervivum tectorum (Hauswurz)
Knotige Verhärtungen in Haut, Zunge und Brust. Warzen.

Glonoin-Homaccord® N Tropfen

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (106 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glonoinum Dil. D3, Glonoinum Dil. D10, Glonoinum Dil. D30, Lycopus virginicus Dil. D1, Lycopus virginicus Dil. D4, Lycopus virginicus Dil. D10, Lycopus virginicus Dil. D30 jeweils 0,1 g; Crataegus Ø 60 g. Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion; pektanginöse Beschwerden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 45 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:

Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.

Lycopus virginicus (Wolfsfuß)
Herzklopfen, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion.

Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Glyoxal compositum

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Methylglyoxal Dil. D10 22 µl; Glyoxal Dil. D10 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Giftabwehrmechanismen blockierter Fermentsysteme bei: Fermentfehlfunktionen, gestörten Drüsenfunktionen, bei degenerativen Erkrankungen (zellulären Phasen).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Evtl. auftretende kurzfristige Temperaturerhöhungen und lokale Schmerzzustände sind als Heilreaktionen zu werten. Diese sollten vor erneuter Injektion abgeklungen sein.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Graphites-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D10, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D10, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Ekzeme, besonders trockene, chronische. Zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Graphites (Reißblei)
Verdauungsschwäche (insbesondere chronische [atonische] Obstipation). Altersbedingte Erkrankungen. Ekzeme und andere Erkrankungen der Haut (z.B. Narben und Keloide). Entzündung der Schleimhäute.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.

Gripp-Heel®

- **TABLETTEN, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Trit. D4 120 mg; Bryonia Trit. D4, Lachesis Trit. D12 jeweils 60 mg; Eupatorium perfoliatum Trit. D3, Phosphorus Trit. D5 jeweils 30 mg. Die Bestandteile 1-4 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1-5 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Dil. D3 4,4 µl; Eupatorium perfoliatum Dil. D2, Phosphorus Dil. D4 jeweils 1,1 µl; Lachesis Dil. D11, Bryonia Dil. D3 jeweils 2,2 µl. Die Bestandteile 1-3 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Tabletten: Bei Grippe und grippalen Infekten, zur Steigerung der körpereigenen Abwehr bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Grippe und grippale Infekte.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3-5 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Injektionslösung: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells und des Bauchfells (also der serösen Häute) sowie der Leber. Akuter und chronischer Rheumatismus (Grippe-Rheumatoide).
Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Infektionskrankheiten. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf)
Grippe, grippeähnliche fieberhafte Erkrankungen. Fieberhafte Erkrankungen des Leber-Galle-Systems. Rheumatismus.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen (verzögerte Rekonvaleszenz!) und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen. Nerven- und Kopfschmerzen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Gynäcoheel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D4, Ammonium bromatum Dil. D4, Lilium tigrinum Dil. D4, Aurum jodatum Dil. D12, Crabro vespa Dil. D4, Helonias dioica Dil. D4, Palladium Dil. D12, Platinum metallicum Dil. D12 jeweils 10 g; Melilotus officinalis Dil. D3, Viburnum opulus Dil. D2 jeweils 5 g. Die Bestandteile 1-9 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 1-10 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis, Salpingitis), Para-Myo-Endometritis, Kolpitis.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Ammonium bromatum (Ammoniumbromid)
Entzündungen der Atemwege.
Lilium tigrinum (Tigerlilie)
Beschwerden bei Gebärmuttersenkung in den Wechseljahren. Entzündungen und Schmerzen der weiblichen Geschlechtsorgane. Reizbare Verstimmungszustände.
Aurum jodatum (Goldjodid)
Bluthochdruck; Beschwerden bei Schlagaderverkalkung. Verhärtung drüsiger Organe.
Crabro vespa (Hornisse)
Schleimhautschwellung. Entzündung der Harnorgane. Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel)
Gebärmuttersenkung. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Palladium (Palladium)
Eierstockerkrankungen. Gebärmuttersenkung. Verhaltensstörungen.
Platinum metallicum (Platin)
Nerven-, Kopf- und Krampfschmerzen. Erkrankungen und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Gesteigerte Erregbarkeit. Verstimmungszustände.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen. Krampfaderleiden.
Viburnum opulus (Schneeball)
Schmerzhafte Menstruationsblutung.

Hamamelis-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis Dil. D2, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 0,8 g; Carduus marianus Dil. D6, Carduus marianus Dil. D30, Carduus marianus Dil. D200 jeweils 0,2 g. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis Dil. D4, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 8,8 µl; Carduus marianus Dil. D6, Carduus marianus Dil. D30, Carduus marianus Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Venöse Stase; variköses Ekzem; thrombophlebitische Zustände.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hamamelis (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens). Hämorrhoiden.

Hamamelis-Salbe-Heel S

Zul.-Nr.: 19799.00.00

Zusammensetzung: 10,0 g enth.: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Hamamelis virginiana Ø 1,0 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB 10 mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol. Enthält 14,5 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Nebenwirkungen: Nicht bekannt.
Hinweis: Es können sogenannte Erstverschlimmerungen vorkommen, die jedoch unbedenklich sind.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt.
Anwendungsweise:
Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautbezirke auftragen.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen.

Hepar compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar suis Dil. D8, Cyanocobalaminum Dil. D4, Duodenum suis Dil. D10, Thymus suis Dil. D10, Colon suis Dil. D10, Vesica fellea suis Dil. D10, Pankreas suis Dil. D10, China Dil. D4, Lycopodium Dil. D4, Chelidonium Dil. D4, Carduus marianus Dil. D3, Histamin Dil. D10, Sulfur Dil. D13, Avena sativa Dil. D6, Natrium oxalaceticum Dil. D10, 2-Oxoglutarsäure Dil. D10, DL-Äpfelsäure Dil. D10, Fumarsäure Dil. D10, (±)-æ-Liponsäure Dil. D8 aquos, Orotsäure Dil. D6 aquos, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D28, Taraxacum Dil. D4, Cynara scolymus Dil. D6, Veratrum Dil. D4 jeweils 22 µl.

Die Bestandteile 1 bis 22 sowie 23 und 24 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen als Ursache oder Folge sonstiger Erkrankungen, bei Hypercholesterinämie, Erythematodes, toxischen Exanthemen, Dermatosen und Dermatitis, Neurodermitis sowie zur Anregung der Leberzellfunktionen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
China (Chinarinde)
Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag.
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen. Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens). Hämorrhoiden.
Histamin (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Niedriger Blutdruck. Herzbeschwerden.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Verdauungsschwäche. Hämorrhoiden und Blutungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände (auch bei verzögerter Rekonvaleszenz). Schlafstörungen (Insomnie) bei Überforderungen nach Krankheiten.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen.
Taraxacum (Löwenzahn)
Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.
Cynara scolymus (Artischocke)
Chronische Leber-Galle-Störungen.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Hepeel®

- **TABLETTEN, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopodium Trit. D3, Chelidonium Trit. D4, China Trit. D3, Nux moschata Trit. D4 jeweils 30 mg; Carduus marianus Trit. D2, Phosphorus Trit. D6 jeweils 15 mg; Veratrum Trit. D6 60 mg; Colocynthis Trit. D6 90 mg. Die Bestandteile 1-5 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1-8 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopodium Dil. D2, Chelidonium Dil. D3, China Dil. D2, Nux moschata Dil. D3 jeweils 1,1 µl; Carduus marianus Dil. D1, Phosphorus Dil. D5 jeweils 0,55 µl; Veratrum Dil. D5 2,2 µl; Colocynthis Dil. D5 3,3 µl. Die Bestandteile 1-4 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden.
Gegenanzeigen: Tabletten: Chininüberempfindlichkeit.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Lycopodium (Bärlapp)
Folgen von Infektionskrankheiten. Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Stoffwechselkrankheiten. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
China (Chinarinde)
Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag.
Nux moschata (Muskatnuss)
Verdauungsschwäche mit Blähsucht (Meteorismus).
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens).
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Verdauungsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals und des Gallensystems.

Homaccorde®

stellen eine Serie von Präparaten dar, die in Packungen zu 30 und 100 ml liquidum zur peroralen Medikation sowie in Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml zur parenteralen Injektion zur Verfügung stehen.
Die Homaccorde eignen sich besonders gut zur Therapie chronischer Erkrankungen, da neben den Tiefpotenzen auch die Hochpotenzen der verwandten Grundmittel als sogenannter „Potenzenaccord" in der Arzneilösung enthalten sind, wodurch der therapeutische Effekt verbreitert, vertieft und nachhaltig verstärkt wird. (3,7,9)
Durch die gleichzeitig in der Arzneilösung enthaltenen höheren und höchsten Potenzen werden dabei etwa mögliche Erstreaktionen abgedämpft. Nach Anwendung der Homaccorde werden daher praktisch auch keine bzw. nur sehr selten Erstverschlimmerungen festgestellt. (4,6,8,12,13,14)
Alle Homaccorde können untereinander und mit anderen peroralen und Ampullenpräparaten der Biotherapeutika-Heel im Wechsel oder in Mischung verabfolgt werden.
Bei den Ampullen-Zubereitungen der Homaccorde liegen die Grundpotenzen der einzelnen Bestandteile im allgemeinen 2-3 Potenzen höher als bei den Liquidum-Zubereitungen.
Die Homaccorde sind in diesem Index alphabetisch eingeordnet.
NB. Für die Rezeptur empfiehlt es sich, mit den Auslieferungsapotheken evtl. Abkürzungen für „Homaccord" zu vereinbaren (HA., Hcd., Hom. u.a.).
In den Potenzenaccorden behalten die einzelnen Potenzstufen, auch wenn sie miteinander vermengt sind, trotzdem ihre eigenständige Wirkung bei, so dass sich keine summarische Mittelwirkung der verschiedenen Potenzen ergibt. (1,2,4,5,10,11,15)

Literatur:

1. Bildet J, Bonini F, Gendre P, Aubin M, Demarque D, Quilichini R. Etude au microscope électronique de l´action de dilutions de Phosphorus 15CH sur l´hépatite toxique du rat. Ann Hom Fr, 19, 209-219 (1977)
2. Bildet J. Etude de l´action de differentes dilutions homeopathiques de Phosphorus sur l´hépatite toxique du rat. Extracto de la tesis doctoral, Bordeaux II, 28-72, (1975)
3. Cahis M. Die Homöopathie experimentell bewiesen; aus dem spanischen übersetzt von Dr. med. Kubasta und Sopie Kubasta, Berliner Homöopathische Zeitschrift Bd. IV (XXXII) (1913)
4. Frase W: Die Wirksamkeit homöopathischer Dilutionen in Form von Potenzenaccorden, Biol Med 1998;27(6):276-8
5. Gomez D, Jorge M. Aportación al estudio de la eficacia de diluciones homeopáticas de Phosphorus, Medicina Biologica 5, 1, 4-14 (1992)
6. Harisch, G., Dittmann, J., Untersuchungen zur Wirkung von Ubichinon Injeel und Injeel forte mit zellfreien Systemen, Biologische Medizin 1997; 26(3):99-104
7. Julian O. Materia medica der Nosoden, Haug-Verlag Heidelberg (1983)
8. Junker, H., Die Wirkung extremer Potenzverdünnungen auf Organismen. Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, 1928,219,647-672
9. Katz, J., Nachprüfung der Cahis'schen Versuche mit den sogenannten „homöopathischen Akkorden„, AHZ,1913,Jg.61, 323-349
10. Ludwig W.: Bioresonanztherapie. Von der Biochemie zur Biophysik – Die ultrafeinen Bioenergien des Organismus- Hufeland-Journal 6/1, Haug-Verlag Heidelberg, 1991
11. Popp F.A.: Biophotonen, Schriftenreihe Krebsgeschehen Bd. 3, Fischer-Verlag, Heidelberg, 1984
12. Reckeweg, H.-H., Das Problem der Hochpotenzen und der Potenzenakkorde, Biologische Medizin,2,5,291-303 (1973)
13. Sünder, K-H., Die Injeele, Fortschritte der Medizin, Nr.21, vom 03. November 1955
14. Veith, H., Naturwissenschaftlicher Wirkungsnachweis homöopathischer Zubereitungen in der Injeel-Form. Biologische Medizin, Heft 6/1978, 379-386
15. Vosgerau, M., Grundlagen und Ergebnisse der Therapie mit Potenzenakkorden, Homotoxin-Journal 9,6,135-143, 1970

Hormeel® SN

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum nitricum Dil. D4, Erigeron canadensis Dil. D3, Viburnum opulus Dil. D3, Pulsatilla Dil. D4, Sepia Dil. D6, Cyclamen Dil. D4, Ignatia Dil. D6 jeweils 5 g; Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8, Aquilegia Dil. D4, Majorana Dil. D4, Nux moschata Dil. D6 jeweils 10 g. Die Bestandteile 1 und 2 werden über die vorletzte Stufe mit Gereinigtem Wasser und über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m), die Bestandteile 3 bis 11 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m), und über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum nitricum Dil. D4, Erigeron canadensis Dil. D3, Viburnum opulus Dil. D3, Pulsatilla Dil. D4, Sepia Dil. D6, Cyclamen Dil. D4, Ignatia Dil. D6 jeweils 0,55 µl; Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8, Aquilegia Dil. D4, Majorana Dil. D4, Nux moschata Dil. D6 jeweils 1,1 µl. Die Bestandteile 1-9 sowie 10 und 11 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus. Zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität. Regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, initial täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute (incl. Urethra und Vulva) mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.
Erigeron canadensis (Berufskraut)
Blutungen der Gebärmutter (Menorrhagie, Metrorrhagie).
Viburnum opulus (Schneeball)
Schmerzhafte Menstruationsblutung.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Sepia (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände.
Cyclamen (Alpenveilchen)
Kopfschmerzen. Regelstörungen. Verstimmungszustände.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.
Aquilegia vulgaris (Akelei)
Schlafstörungen bei Nervosität.
Majorana (Majoran)
Gesteigerte sexuelle Erregbarkeit (sowie nervöse Reizbarkeit).
Nux moschata (Muskatnuss)
Nervöse körperliche Beschwerden. Verdauungsschwäche mit Blähsucht. Wahrnehmungsstörungen (wie Benommenheit).

Husteel®

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045586.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arsenum jodatum Dil. D6, Atropa bella-donna Dil. D4, Urginea maritima var. rubra Dil. D4 jeweils 2,0 g; Cuprum aceticum Dil. D6 1,0 g; Causticum Hahnemanni Dil. D6 (HAB, Sondervorschrift 5a) 3,0 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 Gew.-% gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Husten, z.B. bei Bronchitis oder Erkältungskrankheiten.
Hinweis: Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden, bei Atemnot, eitrigem oder blutigem Auswurf sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Husteel ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Wegen des Alkoholgehalts soll Husteel bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Husteel – auch wegen des Alkoholgehaltes – nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen soll das Arzneimittel bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.
Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
1-3 mal täglich 5-10 Tropfen. Bei Hustenanfällen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 5-10 Tropfen.
Kinder erhalten die in der Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Kleinkinder 1-6 Jahre	1-3 mal täglich 3 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 10 mal täglich 3 Tropfen
Schulkinder 6-12 Jahre	1-3 mal täglich 4 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 10 mal täglich 4 Tropfen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml/100 ml Flaschen werden etwa 8,3 g/27,5 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Arsenum jodatum (Arsentrijodid)
Schnupfen. Bronchitis (insbesondere trockener Reizhusten). Drüsenschwellungen (incl. der Hilusdrüsen). Altersherz.
Atropa bella-donna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Atemorgane.
Scilla (Meerzwiebel)
Herzschwäche (auch als Folge einer chronischen Stauungsbronchitis; Cor pulmonale).
Cuprum aceticum (Kupferazetat)
Erkrankungen mit Krampfneigung. Asthma. Keuchhusten. Angina pectoris.
Causticum Hahnemanni
Erkrankungen der Atemwege. Verstimmungszustände.

Ignatia-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ignatia Dil. D4, Ignatia Dil. D10, Ignatia Dil. D30, Ignatia Dil. D200, Moschus Dil. D6, Moschus Dil. D30, Moschus Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ignatia Dil. D6, Ignatia Dil. D10, Ignatia Dil. D30, Ignatia Dil. D200, Moschus Dil. D8, Moschus Dil. D30, Moschus Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei anfallsweisen Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei anfallsweisen Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Moschus (Drüsensekret des männlichen Moschustieres)
Nervöse Störungen (wie Angst, Schreckhaftigkeit, Ohnmachten).

Injeel-Chol®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10, Chelidonium Dil. D30, Chelidonium Dil. D200, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000 jeweils 2,2 µl; Carduus marianus Dil. D10, Carduus marianus Dil. D30, Carduus marianus Dil. D200, China Dil. D10, China Dil. D30, China Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Taraxacum Dil. D10, Taraxacum Dil. D30, Taraxacum Dil. D200, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 1,1 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Cholangitis; Cholezystitis; Cholelithiasis. Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen des Magen-Darm-Kanals.
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens).
China (Chinarinde)
Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Allgemeine Entkräftung.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.
Lycopodium (Bärlapp)
Folgen von Infektionskrankheiten. Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Stoffwechselkrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Taraxacum (Löwenzahn)
Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Durchfallerkrankung. Drohendes Kreislaufversagen. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Kamillen-Salbe-Heel S

Reg.-Nr.: 28793.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Chamomilla recutita Ø 10,0 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB 10 mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol 96 %. Enthält 14,8 Vol.-% Ethanol.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, Salbe 1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautbezirke auftragen.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Katalysatoren des Zitronensäurezyklus

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Sammelpackung (10 Ampullen) enthält je 1 Ampulle zu 1,1 ml: Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel, Natrium pyruvicum-Injeel, Natrium oxalaceticum-Injeel, Acidum citricum-Injeel, Acidum cis-aconiticum-Injeel, Baryum oxalsuccinicum-Injeel, Acidum α-ketoglutaricum-Injeel, Acidum succinicum-Injeel, Acidum fumaricum-Injeel, Acidum DL-malicum-Injeel.
Anwendungsgebiete: Alle Erkrankungen, die den zellulären Phasen zuzuordnen sind (Imprägnationsphasen, Degenerationsphasen, Dedifferenzierungsphasen) und damit durch enzymatische Fehlsteuerungen oder Blockierungen bzw. Störungen der Zellatmung gekennzeichnet sind, z.B.: Bewegungsschwäche, Nervenschmerzen, Nervenentzündungen, Migräne, Hautkrankheiten, Asthma, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Leber-, Nieren- und Pankreaserkrankungen, Herzmuskelschwäche, Herzschmerzen, Arterienverkalkung, Drüsenfunktionsschwäche (z.B. Diabetes, gestörte Schilddrüsenfunktion), Präkanzerosen. Zur Regeneration nach Röntgen- oder radioaktiver Bestrahlung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, eine Mischinjektion nach folgendem Dosierungsplan, 1-2 mal wöchentlich, im Abstand von 3 bis 7 Tagen, i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

1. Injektion	Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel + Natrium pyruvicum-Injeel + Natrium oxalaceticum-Injeel
2. Injektion	Acidum citricum-Injeel + Acidum cis-aconiticum-Injeel
3. Injektion	Baryum oxalsuccinicum-Injeel + Acidum α-ketoglutaricum-Injeel
4. Injektion	Acidum succinicum-Injeel + Acidum fumaricum-Injeel + Acidum DL-malicum-Injeel

Nach einer Pause von 2 bis 4 Wochen Wiederholung dieser Injektionsserie. Die einzelnen Säuren bzw. deren Salze können auch jeweils für sich allein in der Injeel oder Injeel-forte-Form wiederholt injiziert werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Angaben zu den Einzelmitteln in der Sammelpackung siehe unter den jeweiligen Einzelmittel-Injeelen (indermediärer Katalysator, Gruppe A), Kapitel 3. „Homöopathische Einzelmittel in Potenzenaccorden und Einzelpotenzen".

Klimakt-Heel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sanguinaria Trit. D3, Sepia Trit. D4, Sulfur Trit. D4, Ignatia Trit. D4, Cedron Trit. D4 jeweils 30 mg; Stannum Trit. D12 60 mg; Lachesis Trit. D12 90 mg. Die Bestandteile 2-7 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1-7 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Klimakterische Beschwerden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Sanguinaria (Kanadische Blutwurzel)
Migränöse Kopfschmerzen. Beschwerden der Wechseljahre.
Sepia (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders im Klimakterium).
Sulfur (Schwefel)
Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Cedron (Cedronsamen)
Periodische Nervenschmerzen (besonders Trigeminus- und Ziliarneuralgien).
Stannum (Zinn)
Nerven- und Kolikschmerzen. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Lachesis (Buschmeister)
Wechseljahrsbeschwerden. Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Lamioflur®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lamium album D4, Kreosotum D6, Geum urbanum D5, Alumina D12, Lapathum acutum D6, Platinum metallicum D12 jeweils 10 g; Alchemilla vulgaris D3, Natrium carbonicum D6, Asterias rubens D6, Hepar sulfuris kalinum D4, Acidum nitricum D6, Hydrastis D4, Mezereum D4, Viola tricolor D4 jeweils 5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Haut- und Schleimhauterkrankungen, z.B. Fluor albus, Rhinitis acuta et chronica, Sinusitis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Lamium album (Taubnessel)
Genitaler Ausfluss.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, der Harn- und Geschlechtsorgane. Altersbedingte Erkrankungen.
Geum urbanum (Nelkenwurz)
Entzündungen der Harnblase und Harnröhre.
Alumina (Tonerde)
Trockene Hautausschläge. Chronisch trockene Schleimhautentzündungen. Verstopfung. Voralterung.
Platinum metallicum (Platin)
Nerven-, Kopf- und Krampfschmerzen. Erkrankungen und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Gesteigerte Erregbarkeit. Verstimmungszustände.
Alchemilla vulgaris (Frauenmantel)
Weißfluss.
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Ausfluss. Verstimmungszustände.
Asterias rubens (Seestern)
Akne.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Polypen.
Mezereum (Seidelbast)
Juckende Hautreizungen und Hauteiterungen (meist Bläschen- und Pustelbildung). Nervenschmerzen.
Viola tricolor (Stiefmütterchen)
Ekzeme (besonders bei Lymphatismus bzw. exsudativer Diathese, z.B. Milchschorf).

Leptandra compositum

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045652.00.01,
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6045652.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veronica virginica Dil. D2, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D3, Podophyllum peltatum Dil. D3, Acidum arsenicosum Dil. D4, Carbo vegetabilis Dil. D10, Niccolum metallicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Phosphorus Dil. D6 jeweils 0,1 g. Die Bestandteile 1 bis 3 werden mit Ethanol 62 % (m/m) und die Bestandteile 4 bis 6 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veronica virginica Dil. D2, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D3, Podophyllum peltatum Dil. D3, Acidum arsenicosum Dil. D4, Carbo vegetabilis Dil. D10, Niccolum metallicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Phosphorus Dil. D6 jeweils 22 mg. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Leber-Galle-Störungen mit Verdauungsbeschwerden.
Bei Gelbsucht, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 10 Tropfen einnehmen. Kinder ab 12 Jahre erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt die Erwachsenendosis.
Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Veronica virginica (Virginischer Ehrenpreis)
Entzündungen der Leber, des Gallensystems. Diarrhoe.
Picrasma excelsa, Quassia amara (Bitterholz)
Lebererkrankungen. Verdauungsschwäche.
Podophyllum peltatum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Schwere Infektionen. Verstimmungszustände.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht (Meteorismus).
Niccolum metallicum (Nickel)
Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Verdauungsorgane (Phosphorus als Parenchymmittel: Leber, Pankreas). Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Lithiumeel® comp.

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045126.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lithium carbonicum Trit. D3, Colchicum autumnale Trit. D4, Ferrum phosphoricum Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6), Natrium carbonicum Trit. D4 jeweils 30 mg; Strychnos nux-vomica Trit. D6, Toxicodendron quercifolium e summitatibus rec. Trit. D6 (HAB, Vorschrift 2a) jeweils 90 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Gicht und rheumatische Erkrankungen.
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Lithium carbonicum (Lithiumkarbonat)
Gicht. Nierenleiden bei vermehrter Harnsäure im Blut (Gichtniere = Urat-Nephropathie sowie Urat-Nephrolithiasis). Rheumatische Erkrankungen.
Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung (auch gichtischer Genese!). Nierenentzündung.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke (Schulter-Arm-Syndrom!).
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Körperliche (z.B. Bänderschwäche) und geistige (z.B. Apathie) Schwäche. Verstimmungszustände.
Strychnos nux-vomica (Brechnuss)
Beschwerden durch Nahrungs- und Genussmittel. Kopfschmerzen. Nervenschmerzen und rheumatische Schmerzen. Muskelkrämpfe. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Toxicodendron quercifolium e summitatibus rec. (Giftsumach)
Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.

Luffeel® comp. Heuschnupfenspray

- **NASENTROPFEN** Zul.-Nr.: 45856.00.00

Zusammensetzung: 10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Luffa operculata Dil. D4, Luffa operculata Dil. D12, Luffa operculata Dil. D30, Thryallis glauca Dil. D4, Thryallis glauca Dil. D12, Thryallis glauca Dil. D30 jeweils 1,0 g; Histaminum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), Histaminum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Histaminum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a), Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit gereinigtem Wasser.
Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat; Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat; Natriumchlorid; Wasser für Injektionszwecke; Benzalkoniumchlorid-Lösung (Konservierungsmittel).
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Allergischer Schnupfen, insbesondere Heuschnupfen.
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden, unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Benzalkoniumchlorid sollten auf die Anwendung von Luffeel comp. Heuschnupfenspray verzichten.

Da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, sollte Luffeel comp. Heuschnupfenspray in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von Luffeel comp. Heuschnupfenspray kann es in seltenen Fällen zu Reizungen der Nasenschleimhaut mit Brennen, vermehrter Nasensekretion und Nasenbluten kommen. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Falle sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen.
Bei akuten Zuständen sollte Luffeel comp. Heuschnupfenspray ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche angewendet werden. Bei chronischen Verlaufsformen sollte eine Einzelgabe einmal im Monat erfolgen.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Sprühflasche mit 20 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Luffa operculata (Luffaschwamm)
Heuschnupfen.
Thryallis glauca (Galphimia glauca)
Haut- und Schleimhautallergien.
Histaminum (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen.
Sulfur (Schwefel)
Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane.

Luffeel® comp.

- **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 30887.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aralia racemosa Trit. D1, Arsenum iodatum Trit. D8, Lobelia inflata Trit. D6, Luffa operculata Trit. D12 jeweils 25 mg. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten beiden Stufen als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden alle 15 Minuten 1 Tablette im Mund zergehen lassen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile entspricht den homöopathischen Arzneimittelbildern gemäß der Aufbereitungsmonographien der Kommission D. Dazu gehören bei:

Aralia racemosa (Amerikanische Narde)
Allergische Erkrankung der Atemorgane wie Heuschnupfen und Asthma.
Arsenum iodatum (Arsentrijodid)
Bronchitis.
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie)
Störungen des Atemzentrums mit Blutdruckabfall. Heuschnupfen. Asthma bronchiale.
Luffa operculata (Luffaschwamm)
Heuschnupfen.

Lymphomyosot® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis Dil. D3, Veronica Dil. D3, Teucrium scorodonia Dil. D3, Pinus silvestris Dil. D4, Gentiana lutea Dil. D5, Equisetum hiemale Dil. D4, Sarsaparilla Dil. D6, Scrophularia nodosa Dil. D3, Calcium phosphoricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D4, Fumaria officinalis Dil. D4, Levothyroxin Dil. D12, Aranea diadema Dil. D6 jeweils 5 g; Geranium robertianum Dil. D4, Nasturtium aquaticum Dil. D4, Ferrum jodatum Dil. D12 jeweils 10 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 % (m/m).
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis Dil. D3, Veronica Dil. D3, Teucrium scorodonia Dil. D3, Pinus silvestris Dil. D4, Gentiana lutea Dil. D5, Equisetum hiemale Dil. D4, Sarsaparilla Dil. D6, Scrophularia nodosa Dil. D3, Calcium phosphoricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D4, Fumaria officinalis Dil. D4, Levothyroxin Dil. D12, Aranea diadema Dil. D6 jeweils 0,55 µl; Geranium robertianum Dil. D4, Nasturtium aquaticum Dil. D4, Ferrum jodatum Dil. D12 jeweils 1,1 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung: Bei Neigung zur Ödembildung (Flüssigkeitsansammlung im Gewebe) und Infektanfälligkeit. Drüsenschwellungen. Geschwollene Mandeln, chronische Mandelentzündung.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit). Drüsenschwellungen. Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 15-20 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Lymphomyosot®

- **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 30479.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis (HAB 34) Trit. D3 (HAB; Vorschrift 3a), Veronica officinalis Trit. D3, Teucrium scorodonia Trit. D3, Pinus sylvestris Trit. D4, Gentiana lutea Trit. D5, Equisetum hyemale ex herba rec. Trit. D4 (HAB, Vorschrift 2a), Smilax Trit. D6, Scrophularia nodosa Trit. D3, Juglans (HAB 34) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 3a), Calcium phosphoricum Trit. D12, Natrium sulfuricum Trit. D4, Fumaria officinalis Trit. D4, Levothyroxinum Trit. D12 (HAB, Vorschrift 6), Aranea diadema (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 4b) jeweils 15,0 mg; Geranium robertianum Trit. D4, Nasturtium officinale Trit. D4, Ferrum jodatum Trit. D12 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 30,0 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 3 Tabletten im Mund zergehen lassen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 100 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Myosotis arvensis (Vergissmeinnicht)
Chronische Bronchitis (auch bei „Hilusdrüsen-Kindern"; Lymphatismus bzw. exsudative Diathese!).
Teucrium scorodonia (Gamander)
Chronische Entzündungen der Atemwege (wie Rhinitis [polyposa]).
Pinus silvestris (Kiefer)
Entzündungen der Atemwege. Ekzeme und Nesselsucht.
Gentiana lutea (Gelber Enzian)
Verdauungsstörungen (wie Flatulenz, Meteorismus, Diarrhoe).
Equisetum hiemale (Winterschachtelhalm)
Nieren- und Harnwegserkrankungen.
Smilax/Sarsaparilla (Sarsaparille)
Juckende Hautausschläge. Entzündungen und Reizungen der Harnorgane. Rheumatismus.
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)
Schwächezustände. Drüsenverhärtungen. Milchschorf.
Juglans (Walnuss)
Eitrige Hautausschläge. Lymphknotenentzündungen. Leberstörungen.
Calcium phosphoricum (Kalziumphosphat)
Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Appetitstörungen. Kalkmangelzustände. Wirbelsäulenerkrankungen.
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Leber-Galle-Störungen. Bronchial-Asthma. Rheumatismus.
Fumaria officinalis (Erdrauch)
Chronisches, juckendes Ekzem bei Leberstörungen.
Aranea diadema (Kreuzspinne)
Periodisch auftretende Nervensschmerzen. Anfallsweise Fieber. Gefühlsempfindungsstörung. Schmerzhafte Gelenkerkrankung.
Nasturtium aquaticum/officinale (Brunnenkresse)
Reizzustände der ableitenden Harnwege (diuretische Wirkung).
Ferrum jodatum (Eisenjodid)
Kropfleiden bei Schilddrüsenüberfunktion. Nierenentzündungen. Chronische Lymphdrüsenschwellung.

Melilotus-Homaccord® N Tropfen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Melilotus-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (106 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Melilotus officinalis Dil. D1, Melilotus officinalis Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D10, Melilotus officinalis Dil. D30, Melilotus officinalis Dil. D200 jeweils 0,2 g; Crataegus Ø 60 g; Crataegus Dil. D10, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 0,8 g. Die Bestandteile 1 bis 7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Melilotus officinalis Dil. D2, Melilotus officinalis Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D10, Melilotus officinalis Dil. D30, Melilotus officinalis Dil. D200 jeweils 2,2 µl; Crataegus Dil. D2, Crataegus Dil. D10, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 8,8 µl. Die Bestandteile 1 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Plethora; präapoplektische Zustände; Hypertonie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (kongestive).
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Mercurius-Heel® S

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045184.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D10 90 mg; Hepar sulfuris Trit. D8, Lachesis mutus Trit. D12, Phytolacca americana Trit. D4, Ailanthus altissima Trit. D3, Echinacea Trit. D3 jeweils 30 mg; Atropa bella-donna Trit. D4 60 mg. Gemeinsame Potenzierung der letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung entzündlicher und eitriger Hauterkrankungen, wie Furunkel und Karbunkel, und unterstützende Behandlung von Entzündungen und Eiterungen der Mandeln.
Hinweis: Bei starker Entzündung oder Eiterungen von Haut oder Mandeln sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollte Mercurius-Heel S in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann aufgrund des Inhaltsstoffes Mercurius solubilis Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Aufgrund des Inhaltsstoffes Echinacea (Sonnenhut) können in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich eine Tablette im Mund zergehen lassen; bei akuten Beschwerden / bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Mercurius-Heel S sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Hauterkrankungen. Mandel-, Lymphdrüsen-, Leber- und Nierenentzündungen. Entzündungen anderer drüsiger Organe. Entkräftende Krankheiten.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute wie Furunkel, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung.
Lachesis mutus (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Drüsenerkrankungen. Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung.
Phytolacca americana (Kermesbeere)
Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen. Entzündung und Erkrankung der Brustdrüse.
Ailanthus altissima (Götterbaum)
Schwerste Infektionskrankheiten mit Übergang in allgemeine Blutvergiftung (Sepsis, Septikämie).
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Atropa bella-donna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.

Metro-Adnex-Injeel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D10, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200, Lachesis Dil. D10, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200, Lachesis Dil. D1000, Lilium tigrinum Dil. D10, Lilium tigrinum Dil. D30, Lilium tigrinum Dil. D200, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Hydrargyrum bichloratum Dil. D10, Hydrargyrum bichloratum Dil. D30, Hydrargyrum bichloratum Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Pulsatilla Dil. D10, Pulsatilla Dil. D30, Pulsatilla Dil. D200, Pulsatilla Dil. D1000, Crabro vespa Dil. D10, Crabro vespa Dil. D30, Crabro vespa Dil. D200 jeweils 1,65 µl; Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Adnexitis; Para-Endometritis; Vaginitis; Dysmenorrhoe; Mittelschmerz; klimakterische Neurosen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute. Wechseljahrsbeschwerden. Krämpfe. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Lilium tigrinum (Tigerlilie)
Beschwerden bei Gebärmuttersenkung in den Wechseljahren. Entzündungen und Schmerzen der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden. Reizbare Verstimmungszustände.
Lycopodium (Bärlapp)
Regelstörungen und Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der ableitenden Harnwege sowie der Scheide.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Crabro vespa (Hornisse)
Schleimhautschwellung. Entzündung der Harnorgane. Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane.
Cimicifuga (Wanzenkraut)
Krampfschmerz im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane (insbesondere prämenstruell). Regel-, Schwangerschaft- und Wechseljahrbeschwerden. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.

Mezereum-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum Dil. D2, Mezereum Dil. D10, Mezereum Dil. D15, Mezereum Dil. D30, Mezereum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D4, Acidum arsenicosum Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D15, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 0,5 g. Die Bestandteile 2 bis 11 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum Dil. D4, Mezereum Dil. D10, Mezereum Dil. D15, Mezereum Dil. D30, Mezereum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D15, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Anwendungsgebiete: Vesikulöse Ekzeme; Herpes zoster; Pruritus.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Mezereum (Seidelbast)
Juckende Hautreizungen und Hauteiterungen (vesikulär-pustulös). Nervenschmerzen. Knochenschmerzen und andere Schmerzzustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Verstimmungszustände.

Molybdän compositum

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Dinatriummolybdat 2 H_2O Trit. D3 15 mg, Zink-D-gluconat Trit. D3, Magnesium-L-hydrogenaspartat 2 H_2O Trit. D3, Eisen(II)-fumarat Trit. D4, Kobalt(II)-gluconat 2 H_2O Trit. D4, Cerium oxalicum Trit. D4, Kalium-L-aspartat Trit. D4, Mangan(II)-D-gluconat Trit. D4, Cuprum sulfuricum Trit. D6, Nickel(II)-acetat 4 H_2O Trit. D8, Rubidiumchlorid Trit. D8, Sulfur Trit. D6, Phosphorus Trit. D6 jeweils 3 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Regulierung des Mineral-Gleichgewichts.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, anfangs täglich, nachfolgend alle 2 Tage 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Cerium oxalicum (Ceroxalat)
Erbrechen, Krampfhusten. Schmerzhafte Regelblutung.
Cuprum sulfuricum (Kupfersulfat)
Krämpfe der (glatten und quergestreiften) Muskulatur. Nächtlicher Krampfhusten.
Sulfur (Schwefel)
Nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Phosphorus (Phosphor)
Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Momordica compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Momordica balsamina Dil. D6, Jodum Dil. D8, Podophyllum Dil. D6, Carbo vegetabilis Dil. D10, Lycopodium Dil. D6, Mandragora Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D12, Veratrum Dil. D4, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8 aquos jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 8 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden. Regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Momordica balsamina (Balsamapfel)
Durchfallerkrankungen (Diarrhoea pancreatica!). Blähungskoliken.
Jodum (Jod)
Schilddrüsenüberfunktion (Abmagerung trotz guten Appetits, Heißhunger). Furunkulose. Akne vulgaris.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Entzündungen drüsiger Organe. Entkräftende Krankheiten.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht.
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen (mit Dyspepsie und Meteorismus), Stoffwechselkrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Mucosa compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucosa naris suis Dil. D8, Mucosa oris suis Dil. D8, Mucosa pulmonis suis Dil. D8, Mucosa oculi suis Dil. D8, Mucosa vesicae felleae suis Dil. D8, Mucosa vesicae urinariae suis Dil. D8,

Mucosa pylori suis Dil. D8, Mucosa duodeni suis Dil. D8, Mucosa oesophagi suis Dil. D8, Mucosa jejuni suis Dil. D8, Mucosa ilei suis Dil. D8, Mucosa coli suis Dil. D8, Mucosa recti suis Dil. D8, Mucosa ductus choledochi suis Dil. D8, Ventriculus suis Dil. D8, Pankreas suis Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D6, Belladonna Dil. D10, Oxalis acetosella Dil. D6, Anacardium Dil. D6, Phosphorus Dil. D8, Lachesis Dil. D10, Ipecacuanha Dil. D8, Nux vomica Dil. D13, Veratrum Dil. D4, Pulsatilla Dil. D6, Kreosotum Dil. D10, Sulfur Dil. D8, Natrium oxalaceticum Dil. D8, Colibacillinum Dil. D28, Condurango Dil. D6, Kalium bichromicum Dil. D8, Hydrastis Dil. D4, Mandragora Dil. D10, Momordica balsamina Dil. D6, Ceanothus Dil. D4 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 35 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus, im Bereich der oberen und unteren Luftwege, der ableitenden Harnwege und der Bindehaut des Auges.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane.
Anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.
Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute (bläulich-düsterrote Schwellungszustände). Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung.
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen der Atemorgane. Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Harnwegserkrankungen. Krämpfe an Hohlorganen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Durchfallerkrankung. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Altersbedingte Erkrankungen.
Sulfur (Schwefel)
Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Condurango (Kondurangorinde)
Risse und Geschwüre an den Lippen und am After. Entzündung und Verengung der Speiseröhre.
Kalium bichromicum (Kaliumdichromat)
Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, des Harnsystems.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals.
Momordica balsamina (Balsamapfel)
Durchfallerkrankungen. Blähungskoliken.
Ceanothus americanus (Säckelblume)
Milzvergrößerung (mit „Knäuelgefühl“ im linken Oberbauch).

Naso-Heel® SN

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arum maculatum Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D3, Vinca minor Dil. D3, Veronica Dil. D3, Mercurius bijodatus Dil. D8, Ammonium carbonicum Dil. D3, Lemna minor Dil. D3 jeweils 5 g; Cinnabaris Dil. D8, Sticta Dil. D4, Phosphorus Dil. D6, Kalium bichromicum Dil. D5, Hydrastis Dil. D4 jeweils 10 g. Die Bestandteile 1-9 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 1-11 über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Rhinitis acuta und chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung.
Gegenanzeigen: Chromüberempfindlichkeit. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme können Speichelfluss und Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen einnehmen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Arum maculatum (Gefleckter Aronstab)
Entzündungen der oberen Atemwege. Nasenpolypen.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (kongestive; Nasenbluten bessert!).
Vinca minor (Immergrün)
Nässendes Entzündungen der oberen Atemwege. Nasenpolypen.
Mercurius bijodatus (Quecksilberjodid)
Eitrige Schleimhautentzündungen der Nase, des Rachens, der Mandeln und der Augen.
Ammonium carbonicum (Ammoniumkarbonat)
Entzündungen der Mundhöhle und der Atemwege.
Lemna minor (Wasserlinse)
Chronischer Schnupfen.
Cinnabaris (Zinnober)
Eitrige Bindehaut- und Nasennebenhöhlenentzündung.

Sticta (Lungenflechte)
Akute Entzündungen der Atemwege.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane. Kopfschmerzen. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane.
Kalium bichromicum (Kaliumdichromat)
Schleimhautentzündungen der Atemwege.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterungen auch mit Geschwürbildung. Polypen.

Natrium-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium carbonicum Dil. D10, Natrium carbonicum Dil. D30, Natrium carbonicum Dil. D200, Natrium chloratum Dil. D10, Natrium chloratum Dil. D30, Natrium chloratum Dil. D200, Natrium chloratum Dil. D1000 jeweils 0,3 g; Natrium nitricum Dil. D10, Natrium nitricum Dil. D15, Natrium nitricum Dil. D30 jeweils 0,4 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Chronische Schleimhautkatarrhe; Skrofulose.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Chronische Entzündungen der Atemwege. Ausfluss. Verdauungsschwäche. Verstimmungszustände.
Natrium chloratum (Natrium muriaticum)
Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände (Verschlossenheit, mürrisches Wesen).
Natrium nitricum (Natriumnitrat)
Infekte. Verdauungsschwäche. Schwächezustände.

Nervoheel® N

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045267.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum phosphoricum Trit. D4, Strychnos ignatii Trit. D4, Sepia officinalis Trit. D4 jeweils 60 mg; Kalium bromatum Trit. D4, Zincum isovalerianicum Trit. D4 jeweils 30 mg. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die vorletzte Stufe und die Bestandteile 1 bis 5 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erschöpfungszustände mit nervösen Beschwerden.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
Strychnos ignatii (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Sepia officinalis (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).
Kalium bromatum (Kaliumbromid)
Erregungszustände des Zentralnervensystems. Zerebrales Anfallsleiden. Alpdruck. Schlafwandeln und Schlaflosigkeit. Gedächtnisschwäche.
Zincum isovalerianicum (Zinkvalerianat)
Nervöse Schlafstörungen mit „unruhigen Beinen“. Nervenschmerzen.

Neuralgo-Rheum-Injeel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D10, Causticum Hahnemanni Dil. D30, Causticum Hahnemanni Dil. D200, Colchicum Dil. D10, Colchicum Dil. D30, Colchicum Dil. D200, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D10, Ferrum metallicum Dil. D30, Lithium benzoicum Dil. D10, Lithium benzoicum Dil. D30, Rhus toxicodendron Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D30, Spiraea ulmaria Dil. D10, Spiraea ulmaria Dil. D30 jeweils 1,1 µl; Gnaphalium polycephalum Dil. D6, Gnaphalium polycephalum Dil. D10, Gnaphalium polycephalum Dil. D30 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Causticum Hahnemanni
Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Lähmungen. Verstimmungszustände.

Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung.
Colocynthis (Koloquinte)
Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.
Ferrum metallicum (Eisen)
Nervenschmerzen.
Lithium benzoicum (Lithiumbenzoat)
Rheumatismus. Gicht.
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.
Spiraea ulmaria (Mädesüß)
Rheumatismus.
Gnaphalium polycephalum (Vielköpfiges Ruhrkraut)
Rheumatismus. Ischiasschmerz. Nervenschmerzen.

Neuro-Injeel® Ampullen

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum phosphoricum Dil. D10, Acidum phosphoricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D30, Platinum metallicum Dil. D10, Platinum metallicum Dil. D30, Sepia Dil. D10, Sepia Dil. D30, Valeriana Dil. D10, Valeriana Dil. D30 jeweils 1,1 µl; Avena sativa Dil. D10, Avena sativa Dil. D30, Ignatia Dil. D10, Ignatia Dil. D30 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Platinum metallicum (Platin)
Nerven-, Kopf- und Krampfschmerzen. Gesteigerte Erregbarkeit. Verstimmungszustände.
Sepia (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).
Valeriana (Baldrian)
Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände. Schlafstörungen bei Überforderungen nach Krankheiten.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

Nux vomica-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nux vomica Dil. D2, Nux vomica Dil. D10, Nux vomica Dil. D15, Nux vomica Dil. D30, Nux vomica Dil. D200, Nux vomica Dil. D1000, Bryonia Dil. D2, Bryonia Dil. D6, Bryonia Dil. D10, Bryonia Dil. D15, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 0,2 g; Lycopodium Dil. D3, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Colocynthis Dil. D3, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200 jeweils 0,3 g. Die Bestandteile 1 bis 19 werden mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 20 bis 21 werden mit Ethanol 86 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nux vomica Dil. D4, Nux vomica Dil. D10, Nux vomica Dil. D15, Nux vomica Dil. D30, Nux vomica Dil. D200, Nux vomica Dil. D1000, Bryonia Dil. D4, Bryonia Dil. D6, Bryonia Dil. D10, Bryonia Dil. D15, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 2,2 µl; Lycopodium Dil. D5, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Colocynthis Dil. D5, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus. Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Hämorrhoiden. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Kopfschmerzen. Nervenschmerzen. Krämpfe an Hohlorganen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündung des Bauchfells, der Leber (mit Meteorismus; Obstipation wechselnd mit Durchfall).
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals und des Gallensystems.

Oculoheel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Trit. D4, Natrium chloratum Trit. D6 jeweils 30 mg; Rhus toxicodendron Trit. D12, Hepar sulfuris Trit. D12, Spigelia Trit. D6 jeweils 60 mg; Staphisagria Trit. D4 45 mg; Aethiops mineralis Trit. D8 15 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Konjunktivitis, Blepharitis, Dakryozystitis (besonders chronische Formen).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben (Ödeme der Augenlider, Konjunktivitiden, Dakryozystitiden, Hordeola). Allergien.
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Entzündungen der Augen. Kopfschmerzen.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und der Schleimhäute. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung.
Spigelia (Wurmkraut)
Nervenschmerz. Kopfschmerz (u.a. Ziliarneuralgien, Infra- und Supraorbitalneuralgien).
Staphisagria (Stephanskörner)
Entzündungen der Augen (z.B. Blepharo-Konjunktivitis, Dakryozystitis, Hordeola).
Aethiops mineralis (Quecksilbermohr)
Krustige Entzündungen der Haut und Augenlider (Blepharitis squamosa bzw. crustosa).

Osteoheel® S

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hekla Lava Trit. D6, Kalium jodatum Trit. D4, Asa foetida Trit. D4, Stillingia silvatica Trit. D4, Aranea diadema Trit. D6, Natrium sulfuricum Trit. D4 jeweils 30 mg; Mercurius praecipitatus ruber Trit. D9, Calcium phosphoricum Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Periostitis; Exostosen, z.B. Fersenbeinsporn. Tinnitus aurium infolge Otosklerose.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Hekla Lava (Lava vom Heklavulkan)
Knochen- und Knochenhautentzündungen. Knochenauswüchse (Exostosen; osteosklerotische Herde mit Stapes-Ankylose bei Otosklerose!).
Kalium jodatum (Kaliumjodid)
Weichteilrheumatismus.
Asa foetida (Stinkasant)
Knochenerkrankungen.
Stillingia silvatica (Stillingie)
Knochen- und Knochenhautschmerzen.
Aranea diadema (Kreuzspinne)
Schmerzhafte Gelenkerkrankungen
(Verschlimmerung durch Nässe und Kälte).
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Rheumatismus.
Calcium phosphoricum (Kalziumphosphat)
Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Kalkmangelzustände. Wirbelsäulenerkrankungen (Osteochondrose mit Zacken- bzw. exostotischer Spangenbildung).

Ovarium compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarium suis D8, Placenta suis D10, Uterus suis D10, Salpinx suis D10, Hypophysis suis D13, Cypripedium D6, Lilium tigrinum D4, Pulsatilla D18, Aquilegia vulgaris D4, Sepia D10, Lachesis D10, Apisinum D8, Kreosotum D8, Bovista D6, Ipecacuanha D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D10, Hydrastis D4, Acidum cis-aconiticum D10, Magnesium phosphoricum D10 jeweils 22 µl.
Anwendungsgebiete: Anregung der Drüsen-, Bindegewebs- und Abwehrfunktionen bei Dysmenorrhoe, Endometritis, Metritis, Parametritis, Enuresis (Mädchen), im Klimakterium, bei Hyperemesis, HVL-Insuffizienz beim weiblichen Geschlecht, Craurosis vulvae, Mastodynie, Osteomalazie, Menorrhagien sowie bei verschiedenen Stoffwechselstörungen, auch in der Geriatrie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Hypophysis suis (Hypophyse)
Schwindel- und Verwirrtheitszustände.
Cypripedium pubescens (Frauenschuh)
Schlaflosigkeit.
Lilium tigrinum (Tigerlilie)
Beschwerden bei Gebärmuttersenkung in den Wechseljahren. Entzündungen und Schmerzen der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden. Reizbare Verstimmungszustände.

Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände (besonders auch in der Pubertät bzw. mit der Menarche).
Aquilegia vulgaris (Akelei)
Schlafstörungen bei Nervosität (besonders auch im Klimakterium).
Sepia (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).
Lachesis (Buschmeister)
Wechseljahrsbeschwerden. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Apisinum (Bienengift)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Schleimhäute, der Harn- und Geschlechtsorgane. Altersbedingte Erkrankungen.
Bovista (Bovist)
Gebärmutterblutung (auch intermenstruelle).
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Schleimhautblutungen.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemisch, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Entkräftende Krankheiten.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Polypen.
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Regelschmerzen.

Paeonia comp.-Heel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046692.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Paeonia officinalis Trit. D3 120 mg; Graphites Trit. D6 60 mg; Strychnos nux-vomica Trit. D4, Sulfur Trit. D4, Acidum nitricum Trit. D8, Hamamelis virginiana Trit. D3 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündliche Hautveränderungen und Einrisse im Analbereich; Hämorrhoiden.
Hinweis: Bei Blut im Stuhl sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen; bei akuten Beschwerden / bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Paeonia officinalis (Pfingstrose)
Hämorrhoiden und andere Aftererkrankungen.
Graphites (Reißblei)
Verdauungsschwäche (z.B. chronische – insbesondere atonische – Obstipation). Ekzeme und andere Erkrankungen der Haut. Entzündung der Schleimhäute.
Strychnos nux-vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Verstopfung. Hämorrhoiden. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Verdauungsschwäche. Hämorrhoiden und Blutungen. Nervöse Störungen. Schwächezustände.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündungen der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Verstimmungszustände.
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.

Pectus-Heel®

• **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium nitrosum D5, Spigelia D4 jeweils 30 mg; Phosphorus D12, Aconitum D8, Arnica D8, Argentum nitricum D10 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Pektanginöse Beschwerden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Spigelia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris.
Phosphorus (Phosphor)
Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Gefäßkrankheiten. Wirbelsäulenbeschwerden (vertebragene Angina pectoris!). Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Arnica (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Phosphor-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D10, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200 jeweils 0,4 g; Argentum nitricum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D200, Paris

quadrifolia Dil. D6, Paris quadrifolia Dil. D10, Paris quadrifolia Dil. D30, Paris quadrifolia Dil. D200 jeweils 0,3 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D10, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200 jeweils 4,4 µl; Argentum nitricum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D200, Paris quadrifolia Dil. D6, Paris quadrifolia Dil. D10, Paris quadrifolia Dil. D30, Paris quadrifolia Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Heiserkeit; Laryngitis; Pharyngitis. Petechiale Blutungen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane (z.B. Tracheitis und Laryngitis mit – schmerzhafter – Heiserkeit). Blutungen.
Paris quadrifolia (Einbeere)
Entzündungen der Atemwege (z.B. Laryngitis mit – schmerzloser – Heiserkeit).

Placenta compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Placenta suis D6, Embryo suis D8, Vena suis D8, Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hypophysis suis D10, Secale cornutum D4, Acidum sarcolacticum D4, Tabacum D10, Strophanthus D6, Aesculus D4, Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfuricum D6, Natriumpyruvat D8, Barium carbonicum D13, Plumbum jodatum D18, Vipera berus D10, Solanum nigrum D6 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung von Stoffwechselfunktionen der peripheren Durchblutung sowie der Abwehrorgane bei: Arteriosklerose, Raucherbeinen, Elephantiasis, Diabetes mellitus, gangränösen Ulcera, Dekubitus, Dysmenorrhoe, vegetativer Dystonie, Erythema nodosum et multiforme, Embolie, postenzephalitischen und postapoplektischen Residuen, Endarteriitis obliterans, bei chronisch kalten Füßen, Endometritis, Hornhauttrübungen, Innenohrschwerhörigkeit.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Hypophysis suis (Hypophyse)
Schwindel- und Verwirrtheitszustände.
Secale cornutum (Mutterkorn)
Muskelkrämpfe, Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Strophanthus (Strophanthus)
Herzschwäche.
Aesculus (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen. Krampfaderleiden.
Cuprum sulfuricum (Kupfersulfat)
Krämpfe der Muskulatur.
Barium carbonicum (Bariumkarbonat)
Bluthochdruck. Gefäßverkalkung.
Plumbum jodatum (Bleijodid)
Allgemeine Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Vipera berus (Kreuzotter)
Herz-Kreislauf-Schwäche. Angina pectoris.
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)
Hirn- und Hirnhautreizungen.

Plantago-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Plantago major Dil. D2, Plantago major Dil. D10, Plantago major Dil. D15, Plantago major Dil. D30, Plantago major Dil. D200 jeweils 0,6 g; Belladonna Dil. D3, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D15, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000, Ignatia Dil. D4, Ignatia Dil. D10, Ignatia Dil. D30, Ignatia Dil. D200 jeweils 0,2 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Enuresis nocturna; Incontinentia urinae; Reizblase.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Plantago major (Breitblättriger Wegerich)
Einnässen.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Krämpfe an Hohlorganen.

Podophyllum compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Zul.-Nr.: 6045824.00.01

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Podophyllum D2, Podophyllum D10, Acidum hydrochloricum D4, Acidum hydrochloricum D10, Ignatia D3, Hydrargyrum bichloratum D8 jeweils 1 g. Die Bestandteile 2 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 1 und 6 mit Ethanol 62 % (m/m) jeweils über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Podophyllum peltatum Dil. D2, Podophyllum peltatum Dil. D10, Acidum hydrochloricum Dil. D4, Acidum hydrochloricum Dil. D10, Strychnos ignatii Dil. D3, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung: Hämorrhoidalbeschwerden; Katarrhe des Dickdarms, z.B. Colitis mucosa et ulcerosa. Prä- und postoperativ bei Neoplasien.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Hämorrhoidalbeschwerden; zur unterstützenden Behandlung bei Erkrankungen des Dickdarms, wie z.B. Colitis mucosa (Reizdarm mit vermehrter Schleimbeimengung zum Stuhl) und Colitis ulcerosa (chronische Dickdarmentzündung mit Geschwürsbildung).
Hinweis: Vor der Behandlung mit diesem Arzneimittel ist eine ärztliche Abklärung der Erkrankung erforderlich. Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden, sowie Blut im Stuhl oder Fieber sollte ein Arzt aufgesucht werden. Dieses Arzneimittel ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.
Gegenanzeigen: Flüssige Verdünnung: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Flüssige Verdünnung: Es kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre: Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Zustand nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall. Mastdarmvorfall.
Acidum hydrochloricum (Acidum muriaticum)
Schwächezustände. Appetitlosigkeit. Hämorrhoiden. Schleimhautulzera. Hämorrhagische Diathese.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der Augen, der Mundhöhle, der Mandeln, des Dick- und Enddarmes, der Nieren, der ableitenden Harnwege, der Scheide.

Populus compositum SR

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 116 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Populus tremuloides Ø, Sabal serrulatum Ø jeweils 10 g; Capsicum D3, Bucco D3, Orthosiphon stamineus D3, Cubeba D3, Camphora D3, Apis mellifica D3, Solidago virgaurea D3, Scrophularia nodosa D3, Ononis spinosa D3, Petroselinum D3, Cucurbita pepo D3, Baptisia D3, Uva ursi D3, Scilla D3, Equisetum hiemale D3, Urtica D3, Kreosotum D5, Berberis D5, Cantharis D5, Hydrargyrum bichloratum D8, Terebinthina D6 jeweils 3 g. Gemeinsame Potenzierung über die vorletzte Stufe mit Ethanol 62 % (m/m) und über die letzte Stufe mit Ethanol 86 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Anregung der Abwehrsysteme bei Störungen der Nierenfunktion und -exkretion, bei Albuminurie sowie bei Reizzuständen im Harnwegesystem, auch bei Zystopyelitis, Zystitis, Hydronephrose, Nephrolithiasis (als Nebenmittel auch bei Bakteriurie), insbesondere auch bei Miktionsstörungen (1. Stadium des Prostata-Adenoms).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 80 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen, bei akuten Beschwerden anfangs stündlich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Populus tremuloides (Espe)
Entzündungen und Entleerungsstörungen der Harnblase.
Sabal serrulatum (Zwergpalme)
Entzündungen der ableitenden Harnwege. Blasenentleerungsstörungen.
Capsicum (Spanischer Pfeffer)
Schleimhautentzündungen der Harnblase und Harnröhre.

Bucco (Buccoblätter)
Erkrankungen der Harnwege.
Cubeba (Kubebenpfeffer)
Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane.
Camphora (Kampfer)
Erkältungskrankheiten. Kollapszustände.
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Solidago virgaurea (Goldrute)
Nierenschwäche.
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)
Schwächezustände. Drüsenverhärtungen.
Ononis spinosa (Hauhechel)
Wassersucht.
Petroselinum (Petersilie)
Harnwegsentzündungen, Reizblase.
Cucurbita pepo (Kürbis)
Erbrechen.
Baptisia (Wilder Indigo)
Schwere, fiebrige Infektionen.
Uva ursi (Bärentraube)
Entzündung der ableitenden Harnwege.
Scilla (Meerzwiebel)
Herzschwäche. Harnblasenentleerungsstörungen.
Equisetum hiemale (Winterschachtelhalm)
Nieren- und Harnwegserkrankungen.
Urtica urens (Kleine Brennnessel)
Nierenleiden. Gicht.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Blutungsneigung. Altersbedingte Erkrankungen.
Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen des Harn- und Geschlechtsapparates (Nephritis, Zystitis, Urethritis, Prostatitis; Harndrang mit brennenden Schmerzen!), Ergüsse in Körperhöhlen.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der Nieren, der ableitenden Harnwege.

Procainum compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viscum album Dil. D4, Ginseng Dil. D4, Abrotanum Dil. D4, China Dil. D6, Berberis Dil. D6 jeweils 22 µl; Procainhydrochlorid Dil. D2 aquos 1,1 ml.Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Stützung der Abwehrsysteme, insbesondere des Sympathikus und des Hypophysenvorderlappen-Nebennierenrinden-Systems. Revitalisierung bei zellulären Phasen jeder Art, Präkanzerose.
Gegenanzeigen: Bekannte Allergien gegen Procain, Benzoesäure und Sulfonamide. Eine Kreuzüberempfindlichkeit gegenüber Stoffen mit ähnlicher chemischer Struktur wie Procain, z.B. Ester-Lokalanästhetika und Parabenen, kann nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitige Behandlung mit Sulfonamiden sowie Cholinesterasehemmstoffen bzw. bei Mangel an Pseudocholinesterase. Myasthenia gravis. In der Schwangerschaft sollte Procainum compositum nur unter sorgfältiger Indikationsstellung zur Anwendung kommen.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Bei parenteraler Verabreichung: z.T. dosis- und injektionsgeschwindigkeitsabhängige zentralnervöse Störungen, Erregungszustände, Atemstörungen, Bronchospasmus, Muskelzittern bis zu generalisierten Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen, Urticaria, Schleimhautödeme, Exanthem, Blutdruckabfall, Tachy- oder Bradykardie, anaphylaktischer Schock sowie Nierenversagen. Todesfälle wurden beschrieben. Genitale Blutungen in der Postmenopause werden beobachtet. Die lokale Verträglichkeit bei intramuskulärer oder subkutaner Injektion von Procain ist im allgemeinen gut. Gelegentlich werden an den Injektionsstellen Schwellungen, Ödeme, Erythem, papulovesikuläres Ekzem, oberflächliche und tiefe Nekrosen und Hämatome beobachtet. Lokale Allergien und pseudoallergische Reaktionen auf Procain in Form einer Kontaktdermatitis mit Erythem, Pruritus bis hin zur Blasenbildung kommen vor. Bei kutaner Form der Procainallergie können allergische Reaktionen auch auf Verabreichung von Sulfonamiden oder oralen Antidiabetika auftreten. Bei Injektion von Procainum compositum im Hals-Kopf-Bereich besteht ein höherer Gefährdungsgrad im Hinblick auf das Auftreten zentralnervöser Intoxikationssymptome. Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion ist die Halbwertzeit und damit die Wirkungsdauer von Procain verlängert. Bei Patienten mit Anfallsleiden muss verstärkt auf die Manifestation zentralnervöser Symptome geachtet werden.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bei gleichzeitiger Behandlung mit Sulfonamiden setzt der Procain- Metabolit p-Aminobenzoesäure deren antibakterielle Wirksamkeit herab. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Cholinesterasehemmstoffen kann es zu Kumulationserscheinungen infolge Abbauhemmung des Procains kommen. Durch gleichzeitige Verabreichung nichtdepolarisierender Muskelrelaxantien wird die Wirkungsdauer des Procains verlängert.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. (in Störfelder, Akupunkturpunkte, segmental) injizieren. Das Arzneimittel sollte nicht i.v. injiziert werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.
Ginseng (Ginsengwurzel)
Schwächezustände.
Abrotanum (Eberraute)
Abmagerung durch chronische Entzündungen. Hauterkrankungen. Rheumatismus. Gicht.
China (Chinarinde)
Entzündungen der Atemwege. Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Schleimhautblutungen. Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Nervenschmerzen.
Berberis (Berberitze)
Trockene Hautausschläge. Leber- und Gallenleiden.

Psorinoheel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Psorinum D10, Medorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja D6, Bufo D10, Natrium chloratum D12, Vaccininum D8 jeweils 10 g; Kaliumtetraiodobismutat (III) D5, Oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12 jeweils 5 g. Die Bestandteile 1-10 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 34 % (m/m), die Bestandteile 1-11 über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Wasser, Gereinigtes
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Psorinum D10, Medorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja D6, Bufo D10, Natrium chloratum D12, Vaccininum D8 jeweils 1,1 µl; Oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12, Kaliumtetraiodobismutat (III) D5 jeweils 0,55 µl. Die Bestandteile 1 bis 10 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Umstimmungstherapeutikum bei Hauterkrankungen, Leberschäden, allgemein bei chronischen Erkrankungen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, anfangs täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tropfen: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Injektionslösung: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Psorinum (Psorinum-Nosode)
Verschiedene chronische Hauterkrankungen. Chronische Schleimhautentzündungen, besonders der Atemorgane. Schwächezustände, besonders nach schweren Krankheiten. Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.
Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)
Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane, der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Rheumatismus. Verhaltensauffälligkeiten. Voralterung.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.
Bufo (Kröte)
Gehirnstörungen mit Verhaltensänderung. Krämpfe und zerebrales Anfallsleiden. Haut- und Drüsenentzündung mit Eiterungsneigung. Nervöse Herzbeschwerden.
Natrium chloratum (Natrium muriaticum)
Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände. Hauterkrankungen. Erkrankungen des Stützgewebes.
Vaccininum (Vaccininum-Nosode)
Folgen von Pockenimpfungen. Entzündliche Hautkrankheiten. Kopfschmerzen.
Oleander (Oleander)
Organische Herzkrankheiten. Verdauungsstörungen. Nässendes Ekzem. Lähmigkeit. Rheumatismus.
Cicuta virosa (Wasserschierling)
Eiterflechten der Haut und Schleimhaut. Krampfleiden. Cerebrales Anfallsleiden.
Bacillinum (Bacillinum-Nosode)
Entzündungen der Atemwege. Hautkrankheiten. Kopfschmerzen. Schwächezustände.

Pulsatilla compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla Dil. D6, Sulfur Dil. D8, Cortisonacetat Dil. D18 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Aktivierung der mesenchymalen Abwehr. Stimulierung der Abwehrsysteme, speziell der Bindegewebsfunktion, zur Wirkungssteigerung biologischer Injektionspräparate sowie zur Therapie von zellulären Phasen, Reaktivierung geschädigter Abwehrsysteme, auch postoperativ.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, initial täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Ranunculus-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ranunculus bulbosus Dil. D2, Ranunculus bulbosus Dil. D10, Ranunculus bulbosus Dil. D15, Ranunculus bulbosus Dil. D30, Ranunculus bulbosus Dil. D200, Asclepias tuberosa Dil. D4, Asclepias tuberosa Dil. D10, Asclepias tuberosa Dil. D20, Asclepias tuberosa Dil. D30, Asclepias tuberosa Dil. D200 jeweils 0,5 g. Die Bestandteile 2 bis 10 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ranunculus bulbosus Dil. D4, Ranunculus bulbosus Dil. D10, Ranunculus bulbosus Dil. D15, Ranunculus bulbosus Dil. D30, Ranunculus bulbosus Dil. D200, Asclepias tuberosa Dil. D6, Asclepias tuberosa Dil. D10, Asclepias tuberosa Dil. D20, Asclepias tuberosa Dil. D30, Asclepias tuberosa Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Interkostalneuralgien; pleuritische Schmerzen; Herpes zoster.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.

Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ranunculus bulbosus (Knollenhahnenfuß)
Viruserkrankungen der Haut und Hornhaut des Auges. Erkrankung des Brustfelles. Rheumatismus im Brustkorbbereich. Nervenschmerzen.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze)
Trockene Rippenfellentzündung. Rheumatismus und Nervenschmerzen im Brustbereich (Interkostalneuralgien).

R

Rauwolfia compositum

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rauwolfia serpentina Dil. D3, Aurum jodatum Dil. D10, Kalmia Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D8, Sulfur Dil. D10, Belladonna Dil. D6, Arnica Dil. D4, Conium Dil. D3, Viscum album Dil. D3, Lycopodium Dil. D6, Cynara scolymus Dil. D8, Ren suis Dil. D10, Hepar suis Dil. D10 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Essentielle Hypertonie.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Bei intravenöser Verabreichung können Überempfindlichkeitsreaktionen und plötzlicher Blutdruckabfall auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Rauwolfia serpentina (Indische Schlangenwurzel)
Bluthochdruck. Verstimmungszustände.
Aurum jodatum (Goldjodid)
Bluthochdruck; Beschwerden bei Schlagaderverkalkung.
Kalmia (Berglorbeer)
Rheumatische und andere Herzerkrankungen.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (besonders kongestive bei „Rotem Hochdruck“).
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Arnica (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Lähmung und Lähmigkeit. Verstimmungszustände.
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung.
Lycopodium (Bärlapp)
Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Cynara scolymus (Artischocke)
Chronische Leber-Galle-Störungen.

Reneel® N

• **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis Trit. D2 15 mg; Acidum nitricum Trit. D4, Cantharis Trit. D5 jeweils 30 mg; Causticum Hahnemanni Trit. D4 60 mg; Plumbum aceticum Trit. D6 30 mg; Alumina Trit. D12 75 mg; Sabal serrulatum Trit. D2 30 mg. Die Bestandteile 2-6 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 2-7 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Schleimhäute. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.
Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen des Harn- und Geschlechtsapparates.
Sabal serrulatum (Zwergpalme)
Entzündungen der ableitenden Harnwege. Blasenentleerungsstörungen.
Causticum Hahnemanni
Erkrankungen der Harnwege (bes. schmerzhafte Blasenschwäche mit Brennschmerz). Verstimmungszustände.
Alumina (Tonerde)
Trockene Hautausschläge. Chronisch trockene Schleimhautentzündungen.

Rheuma-Heel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046924.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhus toxicodendron Trit. D6, Bryonia Trit. D4, Causticum Hahnemanni Trit. D4, Arnica montana Trit. D4, Ferrum phosphoricum Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Weichteilrheumatismus (Schmerzzustände und Bewegungseinschränkungen an Muskeln, Sehnen und Bändern).
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich.
Gegenanzeigen: Rheuma-Heel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse oder bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rheuma-Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen.
Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Bryonia (Zaunrübe)
Akuter und chronischer Rheumatismus.
Causticum Hahnemanni
Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.
Arnica (Bergwohlverleih)
Myalgie nach Überlastung.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke.
Dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Entzündungen der Gelenke, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Ledum (Sumpfporst)
Gicht und Gelenkrheumatismus.
Aconitum (Eisenhut)
Schmerzhafte Nervenerkrankungen.
Stellaria media (Vogelmiere)
Rheumatismus.
Lithium benzoicum (Lithiumbenzoat)
Rheumatismus. Gicht.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Rheumatische Erkrankungen.
Acidum benzoicum e resina (Benzoesäure)
Rheumatische, gichtige und degenerative Gelenkerkrankungen. Ganglien.

Rhododendroneel® S

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhododendron Dil. D3 10 g; Spiraea ulmaria Dil. D3, Asclepias tuberosa Dil. D6, Euphorbia cyparissias Dil. D3, Dil. Dulcamara Dil. D4, Ledum Dil. D4, Aconitum Dil. D4 jeweils 10 g; Stellaria media Dil. D2, Lithium benzoicum Dil. D3, Pulsatilla Dil. D3, Acidum benzoicum e resina Dil. D3 jeweils 5 g. Die Bestandteile 1-10 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-11 über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)-arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Rhododendron (Alpenrose)
Rheumatismus. Nervenschmerzen (Verschlimmerung besonders vor Regenwetter, Gewitter, Sturm!).
Spiraea ulmaria (Mädesüß)
Rheumatismus.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze)
Rheumatismus und Nervenschmerzen im Brustbereich.

Sabal-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sabal serrulatum Dil. Ø 0,9 g; Sabal serrulatum Dil. D10, Sabal serrulatum Dil. D30 jeweils 0,3 g; Hepar sulfuris Dil. D10, Hepar sulfuris Dil. D15, Hepar sulfuris Dil. D30, Hepar sulfuris Dil. D200 jeweils 0,7 g. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sabal serrulatum Dil. D2, Sabal serrulatum Dil. D10, Sabal serrulatum Dil. D30 jeweils 3,3 µl; Hepar sulfuris Dil. D12, Hepar sulfuris Dil. D15, Hepar sulfuris Dil. D30, Hepar sulfuris Dil. D200 jeweils 7,7 µl. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: 1. Stadium des Prostataadenoms (früher sog. Prostatahypertrophie); Reizblase.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 45 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Sabal serrulatum (Zwergpalme)
Entzündungen der ableitenden Harnwege. Blasenentleerungsstörungen (z.B. Harnträufeln bzw. Ischuria paradoxa beim Prostataadenom; „Homöopathischer Katheter“).
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen der Schleimhäute. Nervöse Überempfindlichkeit.

S

Schwef-Heel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 118 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D4, Sulfur Dil. D6, Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 20 g. Die Bestandteile 3-5 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 34 % (m/m), über die letzte Stufe mit Ethanol 86 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Anwendungsgebiete: Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien. Zur Anregung der Abwehrmechanismen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 85 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen.

Selenium-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium Dil. D10, Selenium Dil. D15, Selenium Dil. D30, Selenium Dil. D200, Kalium phosphoricum Dil. D2, Kalium phosphoricum Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D30, Kalium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,5 g. Die Bestandteile 1-7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium Dil. D10, Selenium Dil. D15, Selenium Dil. D30, Selenium Dil. D200, Kalium phosphoricum Dil. D6, Kalium phosphoricum Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D30, Kalium phosphoricum Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Selenium (Selen)
Schwächezustände (incl. Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Neurasthenie [= „reizbare Schwäche“]).
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände. Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.

Solidago compositum SN

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solidago Dil. D3, Berberis Dil. D4, Vesica urinaria suis Dil. D8, Pyelon suis Dil. D10, Ureter suis Dil. D10, Urethra suis Dil. D10, Terebinthina Dil. D6, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8, Acidum arsenicosum Dil. D28, Cuprum sulfuricum Dil. D6, Bucco Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D10, Capsicum Dil. D6, Orthosiphon stamineus Dil. D6, Equisetum hiemale Dil. D4, Pareira brava Dil. D6, Cantharis Dil. D6, Apisinum Dil. D8, Baptisia Dil. D4, Natriumpyruvat Dil. D10, Sarsaparilla Dil. D6, Colibacillinum Dil. D13, Coxsackie-Virus A_9 Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D6 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei: akuten und chronischen Erkrankungen der Nieren und Harnwege wie Zystitis, Zystopyelitis, Nephrolithiasis, Hydronephrose, Enuresis nocturna, 1. Stadium des Prostata-Adenoms, Harnröhrenstrikturen, Incontinentia urinae, Nephrose und Nephrosklerose, Hypertonie, jedoch auch bei akuter Glomerulonephritis sowie Anregung der Nierenausscheidung bei sonstigen Fehlfunktionen wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Solidago virgaurea (Goldrute)
Nierenschwäche (diuretische Wirkung).
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der Nieren und der ableitenden Harnwege.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen.
Cuprum sulfuricum (Kupfersulfat)
Krämpfe der (glatten und quergestreiften) Muskulatur. Nächtlicher Krampfhusten.
Bucco (Buccoblätter)
Erkrankungen der Harnwege.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen Schleimhäute. Nervöse Überempfindlichkeit.

Capsicum (Spanischer Pfeffer)
Schleimhautentzündungen der Harnblase und Harnröhre.
Orthosiphon stamineus (Orthosiphon)
Blasen- und Nierensteine. Harnsaure Diathese.
Equisetum hiemale (Winterschachtelhalm)
Nieren- und Harnwegserkrankungen.
Pareira brava (Grieswurz)
Harnblasenentleerungsstörungen, Harnwegsentzündungen. Vergrößerung der Prostata.
Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen der Schleimhäute sowie des Harn- und Geschlechtsapparates.
Apisinum (Bienengift)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Baptisia (Wilder Indigo)
Schwere, fiebrige Infektionen. Allgemeine Blutvergiftung. Verwirrtheitszustände.
Sarsaparilla (Sarsaparille)
Reizungen der Harnorgane.

Spascupreel®

- **TABLETTEN, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Spascupreel® S

- **SUPPOSITORIEN**

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis Trit. D4, Ammonium bromatum Trit. D4, Atropinum sulfuricum Trit. D6, Veratrum Trit. D6, Magnesium phosphoricum Trit. D6, Gelsemium Trit. D6 jeweils 30 mg; Passiflora incarnata Trit. D2, Agaricus Trit. D4, Chamomilla Trit. D3, Cuprum sulfuricum Trit. D6 jeweils 15 mg; Aconitum Trit. D6 60 mg. Die Bestandteile 1-10 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-11 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis Dil. D4, Ammonium bromatum Dil. D4, Atropinum sulfuricum Dil. D6, Veratrum Dil. D6, Magnesium phosphoricum Dil. D6 aquos, Gelsemium Dil. D6 jeweils 1,1 µl; Passiflora incarnata Dil. D2, Agaricus Dil. D4, Chamomilla Dil. D3, Cuprum sulfuricum Dil. D6 jeweils 0,55 µl; Aconitum Dil. D6 2,2 µl. Die Bestandteile 1-9 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Suppositorien: 1 Zäpfchen (= 2,0 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis Dil. D3, Ammonium bromatum Dil. D3, Atropinum sulfuricum Dil. D5, Veratrum Dil. D5, Magnesium phosphoricum Dil. D6, Gelsemium Dil. D5 jeweils 1,1 mg; Passiflora incarnata Dil. D1, Chamomilla Dil. D2, Cuprum sulfuricum Dil. D5, Agaricus Dil. D3 jeweils 0,55 mg; Aconitum Dil. D5 2,2 mg.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett
Anwendungsgebiete: Tabletten, Suppositorien: Bei krampfartigen Beschwerden von Magen, Darm, Gallenblase, der Gebärmutter, der ableitenden Harnwege und bei Muskelverhärtungen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege). Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden mehrmals alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden mehrmals täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Suppositorien: Soweit nicht anders verordnet, 2-3 mal täglich 1 Zäpfchen, bei akuten Schmerzzuständen stündlich 1 Zäpfchen in den After einführen. Bei Säuglingen bis 1/2 Jahr jeweils 1/2 Zäpfchen.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.
Suppositorien: Packungen 12 und 60 Zäpfchen zu 2,0 g.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane. Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.
Atropinum sulfuricum (Atropinsulfat)
Kongestive Entzündungen der oberen Atemwege. Entzündungen der Ausscheidungsorgane einschließlich der Haut.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Nervenschmerzen. schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals. Regelschmerzen.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Krampfleiden.
Passiflora incarnata (Passionsblume)
Schlafstörung. Krampfleiden. Unruhezustände.
Agaricus (Fliegenpilz)
Erregungszustände. Folgen von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Blasen- und Darmentleerungsstörungen.
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden. Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane, der weiblichen Geschlechtsorgane. Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Cuprum sulfuricum (Kupfersulfat)
Krämpfe der (glatten und quergestreiften) Muskulatur. Nächtlicher Krampfhusten.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.

Spigelon®

- **TABLETTEN, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia Trit. D3, Belladonna Trit. D3, Bryonia Trit. D3, Gelsemium Trit. D3, Melilotus officinalis Trit. D3, Natrium carbonicum Trit. D3 jeweils 30 mg; Acidum silicicum Trit. D12, Thuja Trit. D12 jeweils 60 mg. Die Bestandteile 1-7 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-8 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat
Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia Dil. D3, Belladonna Dil. D3, Bryonia Dil. D3, Gelsemium Dil. D3, Melilotus officinalis Dil. D3, Natrium carbonicum Dil. D3 jeweils 10 g; Acidum silicicum Dil. D12, Thuja Dil. D12 jeweils 20 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 % (m/m).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia Dil. D3, Belladonna Dil. D3, Bryonia Dil. D3, Gelsemium Dil. D3, Melilotus officinalis Dil. D3, Natrium carbonicum Dil. D3 jeweils 1,1 µl; Acidum silicicum Dil. D12, Thuja Dil. D12 jeweils 2,2 µl. Die Bestandteile 1-7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Tabletten, Flüssige Verdünnung: Bei Kopfschmerzen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Konstitutionelle Kopfschmerzen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Tabletten: Keine.
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden mehrmals alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden mehrmals alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Spigelia (Wurmkraut)
Nervenschmerz. Kopfschmerz.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (besonders kongestive bei „Rotem Hochdruck").
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Geistige Schwäche. Verstimmungszustände (Konstitutionsmittel; u.a. Verschlimmerung der Kopfschmerzen durch geistige Anstrengung).
Acidum silicicum (Silicea)
Geistige Erschöpfung (Konstitutionsmittel; u.a. körperliche [Bindegewebs- bzw. Mesenchymschwäche] sowie seelische Schwäche [Neurasthenie]).
Thuja (Lebensbaum)
Verstimmungszustände (Konstitutionsmittel; u.a. hydrogenoide Konstitution [Grauvogl]).

Strophanthus compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strophanthus Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D10, Aconitum Dil. D6, Latrodectus mactans Dil. D10, Acidum sarcolacticum Dil. D4, Spigelia Dil. D4, Cactus Dil. D3, Veratrum Dil. D4, Aethusa Dil. D8, Tabacum Dil. D10, Glonoinum Dil. D4, Carbo vegetabilis Dil. D10, Tormentilla Dil. D6 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens, zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, täglich bis 3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Strophanthus (Strophanthus)
Herzschwäche.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Verschleißkrankheiten (z.B. auch Myokardose, Myodegeneratio cordis). Gutartige, bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Latrodectus mactans (Schwarze Witwe)
Angina pectoris.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Spigelia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris.
Cactus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen.
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Bluthochdruck. Angina pectoris.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Herz- und Kreislaufschwäche.

Strumeel® T

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6047036.00.00

Strumeel forte® NF

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 60446108.00.00

Zusammensetzung: Strumeel T Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Trit. D3 150 mg; Calcium iodatum Trit. D4 90 mg; Fucus vesiculosus (HAB 34) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 4a) 30 mg. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1 bis 3 über die letzte Stufe mit Lactose gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Strumeel forte NF Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Dil. D2 5 g; Calcium iodatum Dil. D3 3 g; Fucus vesiculosus (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a) 1 g. Die Bestandteile 1 und 3 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kropfleiden.
Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels bei Schilddrüsenerkrankungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung muss der Arzt unbedingt auf die Arzneimitteleinnahme hingewiesen werden, da die Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden können.
Gegenanzeigen: Strumeel T Tabletten: Bei Jodüberempfindlichkeit, sowie bei einer Überfunktion der Schilddrüse oder bei Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, darf Strumeel T nicht eingenommen werden. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Strumeel forte NF Mischung: Bei Jodüberempfindlichkeit, sowie bei einer Überfunktion der Schilddrüse oder bei Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, darf Strumeel forte NF nicht eingenommen werden.
Strumeel forte NF ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wegen des Alkoholgehaltes soll Strumeel forte NF bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren auch aufgrund des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Gegenmaßnahmen: Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Strumeel forte NF: Enthält 40 Vol.-% Alkohol.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Strumeel T Tabletten: 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Strumeel forte NF Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung: Strumeel T Tabletten: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Strumeel forte NF Mischung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml/100 ml Flasche werden 9,5 g/31,6 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Strumeel T Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Strumeel forte NF Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Euspongia officinalis (gerösteter Meerschwamm)
Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie der Schilddrüse. Erkrankung der Herzkranzgefäße, der Hauptschlagader.
Calcium iodatum (Kalziumjodid)
Kropfleiden.
Fucus vesiculosus (Blasentang)
Übergewicht. Kropfleiden.

Sulfur comp.-Heel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046077.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Daphne mezereum Trit. D4, Acidum arsenicosum Trit. D6 jeweils 15 mg; Pix liquida (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 60 mg; Caladium seguinum (HAB 34) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 3a), Capsicum annuum Trit. D4 jeweils 90 mg; Sulfur Trit. D4 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Ekzemartige Hauterkrankungen; Juckreiz.
Hinweis: Bei starker Entzündung der Haut, bei Eiterungen sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen.
Daphne mezereum (Seidelbast)
Juckende Hautreizungen und Hauteiterungen. Nervenschmerzen und andere Schmerzzustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen (einschließlich der Haut: Ekzeme, Dermatitiden u.a.).
Pix liquida (Holzteer)
Rissekzem der Hände und Finger.
Caladium seguinum (Schweigrohr)
Juckreiz der Genitalorgane.

Syzygium compositum N

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Secale cornutum Dil. D6, Syzygium jambolanum Dil. D8, Lycopodium Dil. D4, Natrium sulfuricum Dil. D10, 2-Oxoglutarsäure Dil. D8, Phlorizin Dil. D10, Plumbum metallicum Dil. D18, Acidum arsenicosum Dil. D8, Ignatia Dil. D4, Acidum phosphoricum Dil. D4, Acidum sulfuricum Dil. D8, Acidum sarcolacticum Dil. D4, Kreosotum Dil. D6, Kalium picrinicum Dil. D4, Curare Dil. D8, Hepar suis Dil. D10, Pankreas suis Dil. D10 jeweils 1 g. Die Bestandteile 1-13 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) sowie die Bestandteile 16 und 17 über die letzte Stufe mit Ethanol 15 % (m/m) jeweils gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Anregung der Abwehrsysteme und der Drüsenfunktionen bei Altersdiabetes und damit verbundenen Gesundheitsstörungen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Secale cornutum (Mutterkorn)
Lähmungen (diabetische Polyneuropathie!). Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten (schwere und vorzeitige Arteriosklerose beim Diabetiker!).
Syzygium jambolanum (Jambulbaum)
Verwendung als Zusatzmittel bei Zuckerkrankheit.
Lycopodium (Bärlapp)
Stoffwechselkrankheiten. Alterskrankheiten.
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Leber-Galle-Störungen. Rheumatismus.
Plumbum metallicum (Blei)
Lähmungen und andere Erkrankungen des Nervensystems. Schlagaderverkalkungen. Verstimmungs- und Verwirrtheitszustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Verschleißkrankheiten.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
Acidum sulfuricum (Schwefelsäure)
Entkräftung. Hauterkrankungen.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Altersbedingte Erkrankungen (Voralterung bei Diabetes mellitus!).
Curare (Pfeilgift)
Lähmungen. Lähmigkeiten. Krämpfe.

Tanacet-Heel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 110 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tanacetum vulgare Dil. D1, Artemisia vulgaris Dil. D2 jeweils 30 g; Absinthium Dil. D4 20 g; Serpyllum Dil. D3, Chenopodium anthelminticum Dil. D6 jeweils 10 g. Die Bestandteile 3-5 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Anwendungsgebiete: Nervöse Reizzustände genuiner Art, besonders bei Verwurmung. Appetitlosigkeit (im Wechsel mit Heißhunger).
Gegenanzeigen: In der Schwangerschaft oder Stillzeit sowie bei Überempfindlichkeit gegen Rainfarn und andere Korbblütler sollte dieses Präparat nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 60 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Tanacetum vulgare (Rainfarn)
Nervöse Erschöpfung. Krämpfe der Muskulatur und Hohlorgane.
Artemisia vulgaris (Beifuß)
Krampfleiden. Wurmbeschwerden.
Absinthium (Wermut)
Erregungszustände (nervöse Reizbarkeit) und Krampfleiden. Magenschleimhautentzündung.
Chenopodium anthelminthicum (Wurmkraut)
Durchblutungsstörung des Gehirns, des Innenohrs. Lebererkrankungen.

Tartephedreel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tartarus stibiatus Dil. D4, Belladonna Dil. D4, Natrium sulfuricum Dil. D4, Arsenum jodatum Dil. D6 jeweils 10 g; Naphthalinum Dil. D6, Anisum stellatum Dil. D3, Lobelia inflata Dil. D4, Ipecacuanha Dil. D4, Blatta orientalis Dil. D6 jeweils 5 g. Gemeinsame Potenzierung über die vorletzte Stufe mit Ethanol 62 % (m/m), über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, Asthma bronchiale, Husten, der sich nur schwer löst. Langwieriger Husten skrofulöser Kinder, Bronchialkatarrhe, Kehlkopfkatarrhe verschiedener Art, gewisse Formen von Keuchhusten. Das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial mehrmals alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane.
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Bronchial-Asthma.
Arsenum jodatum (Arsentrijodid)
Schnupfen. Bronchitis.
Anisum stellatum (Sternanis)
Bronchitis.
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie)
Störungen des vegetativen Nervensystems. Heuschnupfen. Asthma bronchiale.
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten.
Blatta orientalis (Schabe)
Bronchitis; Asthma.

Testis compositum N Ampullen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Testis suis Dil. D4, Embryo suis Dil. D8, Glandula suprarenalis suis Dil. D13, Kalium picrinicum Dil. D6, Ginseng Dil. D4, Damiana Dil. D8, Caladium seguinum Dil. D6, Cor suis Dil. D8, Cortisonacetat Dil. D13, Agnus castus Dil. D6, Selenium Dil. D10, Cantharis Dil. D8, Conium Dil. D28, Lycopodium Dil. D28, Phosphorus Dil. D8, Diencephalon suis Dil. D10, Magnesium phosphoricum Dil. D10 aquos, Ferrum phosphoricum Dil. D10, Manganum phosphoricum Dil. D8 aquos, Zincum metallicum Dil. D10, Ascorbinsäure Dil. D6 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 20 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Organfunktionen bei: Dystrophia adiposogenitalis (Männer), Ejaculatio praecox, Impotentia virilis, Enuresis nocturna, Dystrophia musculorum progressiva, Erschöpfungs-

zuständen, Induratio penis plastica, Osteomalazie (Männer), Diabetes mellitus und bei verschiedenen sonstigen Stoffwechselstörungen, Leberschäden. Fördert regressive Vikariationen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Ginseng (Ginsengwurzel)
Schwächezustände.
Damiana (Damiana)
Sexuelle Schwäche.
Caladium seguinum (Schweigrohr)
Juckreiz der Genitalorgane.
Agnus castus (Keuschlamm)
Sexuelle Störungen bei Männern. Nervöse Verstimmungszustände.
Selenium (Selen)
Schwächezustände.
Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen des Harn- und Geschlechtsapparates (starker Harndrang mit brennenden Schmerzen).
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Verstimmungszustände.
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen der Harnorgane. Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Wirbelsäulenbeschwerden. Knochenentkalkungen (Osteoporose, Osteomalazie).
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Nervenschmerzen. Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule.
Zincum metallicum (Zink)
Krämpfe und Nervenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule, des Gehirns und des Rückenmarks. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände. Schlafstörungen.

Thalamus compositum N

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thalamus opticus suis Dil. D8, Corpus pineale suis Dil. D8, Glandula suprarenalis suis Dil. D10, Viscum album Dil. D10 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Stimulierung der zentralen Steuerungsfunktionen bei degenerativen Erkrankungen und Neoplasien.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.

Thyreoidea compositum

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thyreoidea suis D8, Thymus suis D10, Corpus pineale suis D8, Splen suis D10, Medulla ossis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hepar suis D10, Galium aparine D4, Sedum acre D6, Sempervivum tectorum D6, Conium D4, Spongia D8, Fucus vesiculosus D6, Calcium fluoratum D10, Colchicum D4, Viscum album D3, Cortisonacetat D28, Pulsatilla D8, Sulfur D10, Fumarsäure D8, DL-Äpfelsäure D8, 2-Oxoglutarsäure D8, Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz D8, Acidum sarcolacticum D3, Natrium oxalaceticum D8 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 23 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Schilddrüsendysfunktionen. Anregung der Drüsenfunktionen sowie der Abwehrsysteme und der Bindegewebsfunktionen, besonders auch bei Präkanzerosen, Karzinomen und Sarkomen, Hypernephrom, Dystrophia musculorum progressiva, Myxödem, Induratio penis plastica, Adipositas, Asthma bronchiale, Naevi, Sklerodermie, Elephantiasis, Osteochondrose, Arthrosen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Bei Schwangerschaft soll das Arzneimittel nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden. Bei intravenöser Verabreichung können Überempfindlichkeitsreaktionen und plötzlicher Blutdruckabfall auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., ggf. i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Sedum acre (Mauerpfeffer)
Afterschmerzen (z.B. bei Hämorrhoiden und Fissura ani).
Sempervivum tectorum (Hauswurz)
Knotige Verhärtungen in Haut, Zunge und Brust. Warzen.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Lähmung und Lähmigkeit. Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Spongia (Gerösteter Meerschwamm)
Entzündung und Krampfzustände der Atemorgane. Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie: Lymphdrüsen, Schilddrüse, Hoden, Nebenhoden. Entzündung des Herzens, Herzschwäche. Erkrankung der Herzkranzgefäße, der Hauptschlagader.
Fucus vesiculosus (Blasentang)
Übergewicht. Kropfleiden.
Calcium fluoratum (Kalziumfluorid)
Entzündungen der oberen Luftwege und des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.

Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Verdauungsschwäche. Rheumatische Erkrankungen. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

T

Tonico-Injeel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aurum metallicum Dil. D10, Aurum metallicum Dil. D30, Aurum metallicum Dil. D200 jeweils 1,65 µl; Chininum arsenicosum Dil. D10, Chininum arsenicosum Dil. D30, Helonias dioica Dil. D10, Helonias dioica Dil. D30, Hypericum Dil. D10, Hypericum Dil. D30, Selenium Dil. D10, Selenium Dil. D30 jeweils 1,1 µl; Kalium phosphoricum Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D30 jeweils 2,2 µl; Nux vomica Dil. D10, Nux vomica Dil. D30 jeweils 2,75 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Erschöpfungszustände physischer, aber auch psychischer Art. Geistige Entwicklungsstörungen der Kinder.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aurum metallicum (Gold)
Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Depressive Verstimmungszustände.
Chininum arsenicosum (Chininarsenit)
Schwächezustände. Blutarmut. Nervenschmerzen.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel)
Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Hypericum (Johanniskraut)
Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems. Verstimmungszustände. Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Selenium (Selen)
Verdauungsschwäche. Schwächezustände.
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Durchfälle. Verdauungsschwäche. Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände. Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Kreislaufbeschwerden. Schwindel. Kopfschmerzen. Muskelkrämpfe. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.

Tonsilla compositum N Ampullen

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsilla suis Dil. D28, Ascorbinsäure Dil. D6, Glandula lymphatica suis Dil. D8, Medulla ossis suis Dil. D10, Funiculus umbilicalis suis Dil. D10, Splen suis Dil. D10, Hypothalamus suis Dil. D10, Hepar suis Dil. D10, Embryo suis Dil. D13, Cortex glandulae suprarenalis suis Dil. D13, Cortisonacetat Dil. D13, Pulsatilla Dil. D6, Acidum sarcolacticum Dil. D6, Echinacea Dil. D4, Calcium phosphoricum Dil. D10, Aesculus Dil. D6, Tartarus stibiatus Dil. D6, Dil. Dulcamara Dil. D4, Levothyroxin Dil. D13, Coccus cacti Dil. D6, Ferrum phosphoricum Dil. D10, Gentiana lutea Dil. D6, Geranium robertianum Dil. D6, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D13, Barium carbonicum Dil. D28, Conium Dil. D4, Galium aparine Dil. D6, Sulfur Dil. D8 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Stimulation des Lymphapparates. Steigerung der körpereigenen Abwehr bei: exsudativer Diathese, Entwicklungsstörungen lymphatischer Kinder, Dystrophia adiposogenitalis, postencephalitischen Residuen, Erythema nodosum et multiforme, toxischen Exanthemen, Elephantiasis, Empyemen, Therapieschädigungen, wie Granulopenie, Agranulozytose und Leukämie, Induratio penis plastica, Sklerodermie, chronischer Gicht und primär chronischer Polyarthritis, Frühstadium von Neoplasmaphasen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Bei Rezeptur Zusatz „OP Heel“ verwenden.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Steigerung der körpereigenen Abwehr).
Calcium phosphoricum (Kalziumphosphat)
Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Appetitstörungen. Kalkmangelzustände.
Aesculus (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden. Lenden-Kreuzbeinschmerz.
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche. Brechdurchfälle. Entzündungen der Harnorgane. Eitrige Hauterkrankungen. Rheumatische Erkrankungen der unteren Wirbelsäule.

Dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Infekte. Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harnwege, der Gelenke, der Haut, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Coccus cacti (Cochenille)
Entzündungen des Nasen-Rachen-Raumes, der Atemwege. Gebärmutterblutungen. Nieren- und Nierensteinleiden.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Fieberhafte, entzündliche Erkrankungen der Atemorgane.
Gentiana lutea (Gelber Enzian)
Verdauungsstörungen (z.B. chronische Gastritis, Flatulenz, Diarrhoe).
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen der Atemwege. Hauterkrankungen. Mandel-, Lymphdrüsen- und Nierenentzündungen. Entzündungen anderer drüsiger Organe. Entkräftende Krankheiten.
Barium carbonicum (Bariumkarbonat)
Entwicklungsverzögerung bei Kindern. Chronische Entzündung der Mandeln und der oberen Atemwege.
Conium (Gefleckter Schierling)
Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Schwächezustände, besonders nach schweren Krankheiten. Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.

Traumeel® S

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, TABLETTEN, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION, SALBE**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica Dil. D2, Calendula Dil. D2, Hamamelis Dil. D2, Millefolium Dil. D3 jeweils 5 g; Belladonna Dil. D4 25 g; Aconitum Dil. D3, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D8 jeweils 10 g; Chamomilla Dil. D3, Symphytum Dil. D8 jeweils 8 g; Bellis perennis Dil. D2, Echinacea Dil. D2, Echinacea purpurea Dil. D2 jeweils 2 g; Hypericum Dil. D2 1 g.
Die Bestandteile 1-3 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-10 über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert. Die Bestandteile 11 und 12 werden über die vorletzte Stufe mit Gereinigtem Wasser, über die letzte Stufe mit Ethanol 15 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica Trit. D2, Calendula Trit. D2, Hamamelis Trit. D2, Millefolium Trit. D3 jeweils 15 mg; Belladonna Trit. D4 75 mg; Aconitum Trit. D3, Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D8, Hepar sulfuris Trit. D8 jeweils 30 mg; Chamomilla Trit. D3, Symphytum Trit. D8 jeweils 24 mg; Bellis perennis Trit. D2, Echinacea Trit. D2, Echinacea purpurea Trit. D2 jeweils 6 mg; Hypericum Trit. D2 3 mg.
Die Bestandteile 1-7 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-13 über die letzte Stufe gemeinsam als Verreibung potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica Dil. D2, Calendula Dil. D2, Chamomilla Dil. D3, Symphytum Dil. D6, Millefolium Dil. D3, Belladonna Dil. D2 jeweils 2,2 µl; Aconitum Dil. D2 1,32 µl; Bellis perennis Dil. D2 1,1 µl; Hypericum Dil. D2 0,66 µl; Echinacea Dil. D2, Echinacea purpurea Dil. D2 jeweils 0,55 µl; Hamamelis Dil. D1 0,22 µl; Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 1,1 mg; Hepar sulfuris Dil. D6 2,2 µl. Die Bestandteile 1-7 werden jeweils über die letzte Stufe, die Bestandteile 8-10 über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Salbe: 100 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica Dil. D3 1,5 g; Calendula Dil. Ø, Hamamelis Dil. Ø jeweils 0,45 g; Echinacea Dil. Ø, Echinacea purpurea Dil. Ø, Chamomilla Dil. Ø jeweils 0,15 g; Symphytum Dil. D4, Bellis perennis Dil. Ø jeweils 0,1 g; Hypericum Dil. D6, Millefolium Dil. Ø jeweils 0,09 g; Aconitum Dil. D1, Belladonna Dil. D1 jeweils 0,05 g; Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 0,04 g; Hepar sulfuris Dil. D6 0,025 g.
Sonstige Bestandteile: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB, enthält: Cetylstearylalkohol (Typ A), Emulgierender; Paraffin, Dickflüssiges; Vaselin, Weißes; Ethanol 96 %; Wasser, Gereinigtes.
Konserviert mit 12,5 Vol.-% Ethanol.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung, Tabletten, Salbe: Verletzungen wie Verstauchungen und Verrenkungen, Prellungen, Blut- und Gelenkergüsse, entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse am Stütz- und Bewegungsapparat (z.B. Sehnenscheiden-, Schleimbeutelentzündungen, Tennisarm), Arthrosen der Hüft-, Knie- und kleinen Gelenke.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Verletzungen wie Verstauchungen und Verrenkungen, Prellungen, Blut- und Gelenkergüsse, Knochenbrüche, postoperative und posttraumatische Ödeme und Weichteilschwellungen. Entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat (Tendovaginitis, Styloiditis, Epicondylitis, Bursitis, Periarthritis humeroscapularis u.a.), Arthrosen der Hüft-, Knie- und kleinen Gelenke, Commotio cerebri acuta.
Gegenanzeigen: Flüssige Verdünnung, Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Salbe: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler (Arnika).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion, Salbe: Keine.
Nebenwirkungen: Flüssige Verdünnung, Tabletten: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Nach intraartikulärer Applikation von Traumeel S (Injektionslösung) kann es in seltenen Fällen zu vorübergehenden schmerzhaften Reizzuständen des Gelenkes, eventuell mit steriler Ergussbildung kommen; eine entzündungshemmende Behandlung führt zum Abklingen der Beschwerden. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) und anderen Korbblütlern wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Salbe: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurden über lokale allergische Reaktionen (Entzündungen an der Haut) berichtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei Weichteilschwellungen 3 mal täglich 30 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1-2 Ampullen i.m., s.c., i.c. (evtl. Quaddelung), i.v., intraartikulär bzw. periartikulär injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Salbe: Soweit nicht anders verordnet, morgens und abends, bei Bedarf auch öfters, auf die betroffenen Stellen (auch auf Schürfwunden) auftragen, ggf. auch Salbenverband.
Hinweis: Eine großflächige Anwendung von Traumeel S Salbe ist zu vermeiden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Salbe: Tuben mit 50 und 100 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Calendula (Ringelblume)
Schlecht heilende Wunden. Quetsch-, Riss- und Defektwunden. Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.
Hamamelis (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.
Millefolium (Schafgarbe)
Hellrote Blutungen. Krampfschmerz.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen u.a. der Haut und der Gelenke.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemisch, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen. Lymphdrüsenentzündungen. Knochenschmerzen und Rheumatismus.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute.
Chamomilla (Kamille)
Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Symphytum (Beinwell)
Knochen- und Knochenhautverletzungen.
Bellis perennis (Gänseblümchen)
Blutungen, Blutergüsse. Muskelschmerzen, besonders nach Verletzungen und Überanstrengungen.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Echinacea purpurea (Purpurrote Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Hypericum (Johanniskraut)
Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems.

Ubichinon compositum Ampullen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coenzym Q10 Dil. D10, Ascorbinsäure Dil. D6, Thiaminchloridhydrochlorid Dil. D6, Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O Dil. D6, Pyridoxinhydrochlorid Dil. D6, Nicotinamid Dil. D6, Myrtillus Dil. D4, Colchicum Dil. D4, Podophyllum Dil. D4, Conium Dil. D4, Hydrastis Dil. D4, Galium aparine Dil. D6, Acidum sarcolacticum Dil. D6, Hydrochinon Dil. D8, (±)-æ-Liponsäure Dil. D8 aquos, Sulfur Dil. D8, Manganum phosphoricum Dil. D8 aquos, Natrium oxalaceticum Dil. D8 aquos, Trichinoyl Dil. D10, Anthrachinon Dil. D10, 1,4-Naphthochinon Dil. D10, para-Benzochinon Dil. D10, Adenosin-5'-triphosphat, Dinatriumsalz Dil. D10, Coenzym A Dil. D10, Acetylsalicylsäure Dil. D10, Histamin Dil. D10, Nadid Dil. D10, Magnesium-D-gluconat 2 H_2O Dil. D10 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 25 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen).
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen. Leber- und Verdauungsschwäche. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Histamin (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Niedriger Blutdruck. Herzbeschwerden.

Valerianaheel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 110 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Valeriana Dil. Ø 65 g; Lupulus Dil. Ø, Crataegus Dil. Ø, Hypericum Dil. D1 jeweils 5 g; Melissa Dil. Ø 3 g; Chamomilla Dil. Ø, Avena sativa Dil. Ø jeweils 2 g; Acidum picrinicum Dil. D5 10 g; Kalium bromatum Dil. D1, Ammonium bromatum Dil. D1, Natrium bromatum Dil. D1 jeweils 1 g.
Anwendungsgebiete: Sedativum bei Unruhezuständen. Neurasthenie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 66 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 15 Tropfen; abends 20 Tropfen. Einzelgabe bei Säuglingen und Kleinkindern 3 Tropfen, im Alter von 2-6 Jahren 5 Tropfen, von 6-12 Jahren 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Valeriana (Baldrian)
Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen.
Lupulus (Hopfen)
Nervosität. Schlafstörungen.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Hypericum (Johanniskraut)
Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems. Verstimmungszustände. Gehirngefäßverkalkung.
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen. Zahnungsbeschwerden. Krämpfe.
Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände. Schlafstörungen; bei Überforderungen nach Krankheiten.
Acidum picrinicum (Pikrinsäure)
Geistige und nervöse Erschöpfungszustände. Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Kalium bromatum (Kaliumbromid)
Erregungszustände des Zentralnervensystems. Zerebrales Anfallsleiden. Alpdruck. Schlafwandeln und Schlaflosigkeit. Folgen des Schlaganfalls. Gedächtnisschwäche.
Natrium bromatum (Natriumbromid)
Seelische Störungen mit Antriebssteigerung.

Veratrum-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum Dil. D2, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 0,6 g; Aloe Dil. D2, Aloe Dil. D10, Aloe Dil. D30 jeweils 0,2 g; Tormentilla Dil. Ø 0,3 g; Tormentilla Dil. D10, Tormentilla Dil. D30 jeweils 0,1 g; Rheum Dil. D1 1 g; Rheum Dil. D10, Rheum Dil. D30 jeweils 0,1 g. Die Bestandteile 1 bis 9 werden mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 10 bis 11 werden mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum Dil. D4, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 6,6 µl; Aloe Dil. D4, Aloe Dil. D10, Aloe Dil. D30 jeweils 2,2 µl; Tormentilla Dil. D2, Tormentilla Dil. D10, Tormentilla Dil. D30, Rheum Dil. D2, Rheum Dil. D10, Rheum Dil. D30 jeweils 1,1 µl. Die Bestandteile 1 bis 11 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Gastroenteritis. Kollapszustände.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankungen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.
Aloe (Aloe)
Magen-Darmstörungen. Stuhlinkontinenz. Hämorrhoiden.
Rheum (Rhabarber)
Durchfallerkrankungen.

Vertigoheel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 13442.00.00,
  MISCHUNG Zul.-Nr.: 6046396.00.00,
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION Zul.-Nr.: 6045511.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anamirta cocculus Trit. D4 210,0 mg; Conium maculatum Trit. D3, Ambra grisea Trit. D6, Petroleum rectificatum Trit. D8 jeweils 30,0 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anamirta cocculus Dil. D4 7,0 g; Conium maculatum Dil. D3, Ambra grisea Dil. D6, Petroleum rectificatum Dil. D8 jeweils 1,0 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Äthanol 30 % (G/G).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anamirta cocculus Dil. D3 7,7 mg; Conium maculatum Dil. D2, Ambra grisea Dil. D5, Petroleum rectificatum Dil. D7 jeweils 1,1 mg. Die Bestandteile 1 und 2 werden über die letzte Stufe mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Verschiedene Schwindelzustände.
Hinweis: Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Tabletten: Bei Überempfindlichkeit gegen Lactose (Milchzucker).
Wie alle Arzneimittel sollten auch Vertigoheel Tabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Mischung: Vertigoheel ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Vertigoheel sollte wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken erst nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Vertigoheel sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen – und wegen des Alkoholgehaltes – in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll daher – auch wegen des Alkoholgehaltes – bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Wie alle Arzneimittel sollte Vertigoheel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen; bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Nach Rücksprache mit einem Arzt kann die Dosis bei Bedarf auf 3 mal täglich 3 Tabletten erhöht werden.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
0 - 3 Jahre	2 mal tägl. ½ Tablette	4 mal tägl. ½ Tablette
4 - 6 Jahre	3 mal tägl. ½ Tablette	6 mal tägl. ½ Tablette
7 - 11 Jahre	2 mal tägl. 1 Tablette	8 mal tägl. ½ Tablette

im Mund zergehen lassen

Hinweis: Bei Kindern unter 1 Jahr sollte die Anwendung nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.
Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollen ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 10 Tropfen einnehmen.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei anfallsweisem Schwindel täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung und Anwendungsfehler:
Tabletten: Bei der Einnahme größerer Mengen (z.B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Mischung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml/100 ml Flasche werden 8,3 g/27,5 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 100 und 250 Tabletten.
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Anamirta cocculus (Kokkelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Reisekrankheit, -übelkeit. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Verstimmungszustände.
Ambra grisea (Grauer Amber)
Nervöse Übererregbarkeit und nervöse Erschöpfung. Fehlsteuerungen des vegetativen Nervensystems. Traurige Verstimmungszustände. Gefäßverkalkung. Voralterung.
Petroleum rectificatum (Steinöl)
Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Schwindel.

Viburcol® N

• **SUPPOSITORIEN**

Zusammensetzung: 1 Zäpfchen (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chamomilla Trit. D1, Belladonna Trit. D2, Plantago major Trit. D3 jeweils 1,1 mg; Pulsatilla Trit. D2 2,2 mg; Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D8 4,4 mg.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett
Anwendungsgebiete: Bei Unruhezuständen mit und ohne Fieber.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden mehrere Male jeweils 1 Zäpfchen; nach Besserung 3-2 mal täglich 1 Zäpfchen in den After einführen. Bei Säuglingen (vom 1. Lebenstag an) bis 6 Monate höchstens 2 mal täglich 1 Zäpfchen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 12 und 60 Zäpfchen zu 1,1 g.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden. Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane. Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.
Plantago major (Breitblättriger Wegerich)
Schmerzen im Kopfbereich. Einnässen. Durchfall. Hautausschläge.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Blasenentzündungen. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen.

Vomitusheel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Vomitusheel® S

• **SUPPOSITORIEN**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ipecacuanha Dil. D4, Aethusa Dil. D4, Nux vomica Dil. D4 jeweils 10 g; Apomorphinum hydrochloricum Dil. D6 15 g; Colchicum Dil. D6 25 g; Ignatia Dil. D6 30 g.Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 % (m/m).
Suppositorien: 1 Zäpfchen (= 2,0 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ipecacuanha Dil. D2, Aethusa Dil. D2, Nux vomica Dil. D2 jeweils 1,1 mg; Apomorphinum hydrochloricum Dil. D4 1,65 mg; Colchicum Dil. D4 2,75 mg; Ignatia Dil. D4 3,3 mg.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett
Anwendungsgebiete: Erbrechen und Brechreiz verschiedener Genese.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Suppositorien: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Zuständen initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Suppositorien: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden stündlich 1 Zäpfchen; nach Besserung der Beschwerden nur noch 3(-2) mal täglich 1 Zäpfchen. Bei Säuglingen bis ½ Jahr 2 mal täglich 1 Zäpfchen.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Suppositorien: Packungen mit 12 und 60 Zäpfchen zu 2,0 g.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung.
Aethusa (Hundspetersilie)
Akuter Brechdurchfall. Milchunverträglichkeit.
Nux vomica (Brechnuss)
Fieberhafte Erkrankungen. Entzündungen der Atemorgane. Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Schwindel. Krämpfe an Hohlorganen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Apomorphinum hydrochloricum (Apomorphinhydrochlorid)
Erbrechen bei verschiedenen Krankheiten.
Colchicum (Herbstzeitlose)
Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

Ypsiloheel® N

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Asa foetida Trit. D4, Ignatia Trit. D4, Paris quadrifolia Trit. D4, Thuja Trit. D6 jeweils 30 mg; Pulsatilla Trit. D4, Lachesis Trit. D8, Glonoinum Trit. D6 jeweils 45 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.
Anwendungsgebiete: Vegetative Dystonie; Globus hystericus.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Asa foetida (Stinkasant)
Verschiedene nervöse Störungen.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen.
Paris quadrifolia (Einbeere)
Kopfschmerz. Täuschungen des Geruchs- oder Tastsinns.
Thuja (Lebensbaum)
Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche.Verstimmungszustände.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Regelstörungen aller Art. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Lachesis (Buschmeister)
Wechseljahrsbeschwerden. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.

Zeel® comp. N

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 48834.00.00,
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 37188.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: In einer Tablette sind verarbeitet: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D2 1 mg; Solanum dulcamara Dil. D2 0,3 mg; Sulfur Dil. D6 0,75 mg; Arnica montana Dil. D2 0,5 mg; Sanguinaria canadensis Dil. D4 0,45 mg.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,0 ml (= 2 g) enth.: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D4 10 mg; Arnica montana Dil. D4 2 mg; Solanum dulcamara Dil. D4 1 mg; Sanguinaria canadensis Dil. D4 1 mg; Sulfur Dil. D10 3 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Rheumatische Gelenkbeschwerden.
Hinweis: Bei akuten Gelenkbeschwerden, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung einhergehen, sowie bei unklaren oder andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Tabletten: Zeel comp. N darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse oder bei Überempfindlichkeit gegen Arnica und andere Korbblütler.
Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Zeel comp. N nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Aufgrund des Bestandteils kanadische Blutwurz (Sanguinaria canadensis) soll Zeel comp. N in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse, gegen Arnica und andere Korbblütler.
Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte und /oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Zeel comp. N nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Aufgrund des Bestandteils kanadische Blutwurz (Sanguinaria canadensis) soll Zeel comp. N in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Tabletten: In Einzelfällen sind während der Behandlung mit sanguinarinhaltigen Arzneimitteln Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildet. In sehr seltenen Fällen können – auch einige Tage nach Einnahme des Arzneimittels – Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler (Arnika) sind in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen (bis zur anaphylaktischen Reaktion) möglich. Es kann vorübergehend zu einer Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle kommen. In Einzelfällen sind während der Behandlung mit sanguinarinhaltigen Arzneimitteln Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildet. In sehr seltenen Fällen können – auch einige Tage nach der Anwendung des Arzneimittels – Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten.
Hinweise: Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wechselwirkungen: Bei diesem Präparat sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: 3-5 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: 2 mal wöchentlich 1 Ampulle, s.c. (einschließlich periartikulär), i.m., i.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 100 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,0 ml.

Zeel® comp. N

- **SALBE** Reg.-Nr.: 19348.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D2 0,27 g; Arnica montana Dil. D2 0,3 g; Solanum dulcamara Dil. D2 0,075 g; Sanguinaria canadensis Dil. D2 0,225 g; Sulfur Dil. D6 0,27 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser.
Konservierungsstoff: Ethanol 13,2 Vol.-%.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Arnikaüberempfindlichkeit. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse und Bestandteile der Salbengrundlage.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Gegenmaßnahmen: Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, morgens und abends auf die betroffenen Stellen auftragen, z.B. im Bereich des Kniegelenkes einen 4-5 cm langen Salbenstrang einmassieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tuben mit 100 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Toxicodendron quercifolium/Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Solanum dulcamara (Bittersüß)
Entzündungen der Gelenke, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Sanguinaria canadensis (Kanadische Blutwurzel)
Rheumatismus (Muskeln, Weichteile, Gelenke).
Sulfur (Schwefel)
Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

2 Liste der Einzelbestandteile in den Kombinationspräparaten

Abrotanum (Eberraute) in Abropernol N, Procainum compositum.
Absinthium (Wermut) in Tanacet-Heel.
Acidum acetylosalicylicum (Acetylsalicylsäure) in Ubichinon compositum Ampullen.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Cantharis compositum S, Causticum compositum, Circulo-Injeel, Cor compositum N, Diarrheel S, Echinacea compositum (forte) SN, Gastricumeel, Leptandra compositum, Mezereum-Homaccord, Solidago compositum SN, Strophanthus compositum, Sulfur comp.-Heel, Syzygium compositum N.
Acidum ascorbicum siehe unter Ascorbinsäure.
Acidum benzoicum e resina (Benzoesäure) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Rhododendroneel S.
Acidum cis-aconiticum (Akonitsäure) in Coenzyme compositum Ampullen, Ovarium compositum.
Acidum citricum (Zitronensäure) in Coenzyme compositum Ampullen.
Acidum formicicum (Ameisensäure) in Angio-Injeel, Cutis compositum N.
Acidum fumaricum siehe unter Fumarsäure.
Acidum hydrochloricum (Acidum muriaticum) in Podophyllum compositum.
Acidum æ-ketoglutaricum siehe unter 2-Oxoglutarsäure.
Acidum L(+)-lacticum (Fleischmilchsäure) siehe unter Acidum sarcolacticum.
Acidum DL-malicum siehe unter DL-Äpfelsäure.
Acidum muriaticum (Salzsäure) siehe unter Acidum hydrochloricum.
Acidum nitricum (Salpetersäure) in Abropernol N, Galium-Heel N, Hormeel SN, Lamioflur, Paeonia comp.-Heel, Reneel N.
Acidum oroticum siehe unter Orotsäure.
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure) in Cerebrum compositum NM, Cutis compositum N, Nervoheel N, Neuro-Injeel Ampullen, Syzygium compositum N.
Acidum picrinicum (Pikrinsäure) in Aletris-Heel, Valerianaheel.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum) in Cor compositum N, Ginseng compositum N, Placenta compositum, Strophanthus compositum, Syzygium compositum N, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.
Acidum silicicum (Silicea) in Cruroheel S, Spigelon.
Acidum succinicum (Bernsteinsäure) in Coenzyme compositum Ampullen.
Acidum sulfuricum (Schwefelsäure) in Syzygium compositum N.
Aconitum (Eisenhut) in Aconitum-Homaccord, Barijodeel, Bryaconeel, Cerebrum compositum NM, Echinacea compositum (forte) SN, Gripp-Heel, Pectus-Heel, Rhododendroneel S, Spascupreel, Spascupreel S, Strophanthus compositum, Traumeel S.
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP) in Coenzyme compositum Ampullen, Ginseng compositum N, Thyreoidea compositum, Ubichinon compositum Ampullen.
DL-Äpfelsäure (Acidum DL-malicum) in Coenzyme compositum Ampullen, Cor compositum N, Hepar compositum N, Thyreoidea compositum.
Aesculus (Roßkastanie) in Aesculus-Heel, Cerebrum compositum NM, Cutis compositum N, Placenta compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.
Aethiops mineralis (Quecksilbermohr) in Oculoheel.
Aethusa (Hundspetersilie) in Strophanthus compositum, Vomitusheel, Vomitusheel S.
Agaricus (Fliegenpilz) in Abropernol N, Spascupreel, Spascupreel S.
Agnus castus (Keuschlamm) in Testis compositum N Ampullen.
Ailanthus altissima (Götterbaum) in Mercurius-Heel S.
Alchemilla vulgaris (Frauenmantel) in Lamioflur.
Aletris farinosa (Sternwurzel) in Aletris-Heel.
Aloe (Aloe) in Veratrum-Homaccord.
Alumina (Tonerde) in Lamioflur, Reneel N.
Ambra (Grauer Amber) in Cerebrum compositum NM, Vertigoheel.
Ammoniumbituminosulfat siehe unter Ichthyolum.
Ammonium bromatum (Ammoniumbromid) in Gynäcoheel N, Spascupreel, Spascupreel S, Valerianaheel.
Ammonium carbonicum (Ammoniumkarbonat) in Naso-Heel SN.
Anacardium (Malakkanuß) in Anacardium-Homaccord, Barijodeel, Cerebrum compositum NM, Duodenoheel, Mucosa compositum.
Anisum stellatum (Sternanis) in Tartephedreel N.
Anthrachinon (Anthrachinon) in Ubichinon compositum Ampullen.
Antimonium crudum (Schwarzer Spießglanz) in Gastricumeel.
Apis mellifica (Honigbiene) in Albumoheel S, Angin-Heel SD, Apis-Homaccord, Cruroheel S, Galium-Heel N, Gynäcoheel N, Metro-Adnex-Injeel, Oculoheel, Populus compositum SR.
Apisinum (Bienengift) in Apis-Homaccord, Ovarium compositum, Solidago compositum SN.
Apomorphinum hydrochloricum (Apomorphinhydrochlorid) in Vomitusheel, Vomitusheel S.
Aquilegia vulgaris (Akelei) in Hormeel SN, Ovarium compositum.
Aralia racemosa (Amerikanische Narde) in Luffeel comp..
Aranea diadema (Kreuzspinne) in Dulcamara-Homaccord, Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Osteoheel S.
Arctium lappa (Klette) in Cutis compositum N.
Argentum (Silber) in Circulo-Injeel, Galium-Heel N.
Argentum nitricum (Silbernitrat) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Diarrheel S, Duodenoheel, Echinacea compositum (forte) SN, Euphorbium comp. SN, Gastricumeel, Momordica compositum N, Mucosa compositum, Neuro-Injeel Ampullen, Phosphor-Homaccord, Pectus-Heel, Solidago compositum SN.
Arnica montana (Bergwohlverleih) in Angin-Heel SD, Arnica-Salbe-Heel S, Arteria-Heel N, Aurumheel N Tropfen, Barijodeel, Carbo compositum, Cardiacum-Heel, Causticum compositum, Cerebrum compositum NM, Cor compositum N, Echinacea compositum (forte) SN, Pectus-Heel, Rauwolfia compositum, Rheuma-Heel, Traumeel S, Zeel comp. N.
Arsenicum album (Weißes Arsenik) siehe unter Acidum arsenicosum.
Arsenum jodatum (Arsentrijodid) in Husteel, Luffeel comp., Tartephedreel N.
Artemisia vulgaris (Beifuß) in Tanacet-Heel.
Arteria suis (Arterie) in Placenta compositum.
Arum maculatum (Gefleckter Aronstab) in Naso-Heel SN.
Asa foetida (Stinkasant) in Discus compositum N, Osteoheel S, Ypsiloheel N.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze) in Angio-Injeel, Ranunculus-Homaccord, Rhododendroneel S.
Ascorbinsäure (Vitamin C) in Coenzyme compositum Ampullen, Testis compositum N Ampullen, Tonsilla compositum N Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.
Asterias rubens (Seestern) in Lamioflur.
ATP siehe unter Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz.
Atropa bella-donna siehe unter Belladonna.
Atropinum sulfuricum (Atropinsulfat) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Spascupreel, Spascupreel S.
Aurum jodatum (Goldjodid) in Gynäcoheel N, Rauwolfia compositum.
Aurum metallicum (Gold) in Galium-Heel N, Tonico-Injeel.
Aurum chloratum natronatum (Goldchlorid-Chlornatrium) in Aurumheel N Tropfen.
Avena sativa (Hafer) in Hepar compositum N, Neuro-Injeel Ampullen, Valerianaheel.
Azetylsalizylsäure siehe unter Acidum acetylosalicylicum.

Bacillinum (Bacillinum-Nosode) in Psorinoheel N.
Baptisia (Wilder Indigo) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Echinacea compositum (forte) SN, Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Barium carbonicum (Bariumkarbonat) in Barijodeel, Placenta compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.
Barium jodatum (Bariumjodid) in Arteria-Heel N, Circulo-Injeel.
Barium oxalsuccinicum (Bariumoxalsuccinat) in Coenzyme compositum Ampullen.
Belladonna (Tollkirsche) in Angin-Heel SD, Belladonna-Homaccord, Bronchalis-Heel, Carbo compositum, Chelidonium-Homaccord N, Husteel, Injeel-Chol, Mercurius-Heel S, Mucosa compositum, Plantago-Homaccord, Rauwolfia compositum, Spigelon, Tartephedreel N, Traumeel S, Viburcol N.
Bellis perennis (Gänseblümchen) in Traumeel S.
Berberis (Berberitze) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Berberis-Homaccord, Populus compositum SR, Procainum compositum, Reneel N, Solidago compositum SN.
Beta vulgaris rubra (Rote Rübe) in Coenzyme compositum Ampullen.
Betula alba (Birke) in Galium-Heel N.
Blatta orientalis (Schabe) in Tartephedreel N.
Bovista (Bovist) in Ovarium compositum.
Bryonia (Zaunrübe) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Bronchalis-Heel, Bryaconeel, Echinacea compositum (forte) SN, Gripp-Heel, Nux vomica-Homaccord, Rheuma-Heel, Spigelon.
Bucco (Buccoblätter) in Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Bufo (Kröte) in Psorinoheel N.

Cactus (Königin der Nacht) in Angio-Injeel, Cactus compositum/S, Cardiacum-Heel, Cor compositum N, Strophanthus compositum.
Caladium seguinum (Schweigrohr) in Sulfur comp.-Heel, Testis compositum N Ampullen.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale) in Calcoheel, Circulo-Injeel, Graphites-Homaccord, Hepar compositum N, Hormeel SN, Injeel-Chol, Viburcol N.
Calcium fluoratum (Kalziumfluorid) in Abropernol N, Cutis compositum N, Galium-Heel N, Thyreoidea compositum.
Calcium jodatum (Kalziumjodid) in Barijodeel, Strumeel T, Strumeel forte NF.
Calcium phosphoricum (Kalziumphosphat) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Osteoheel S, Tonsilla compositum N Ampullen.
Calendula (Ringelblume) in Calendula-Salbe-Heel S, Traumeel S.
Caltha palustris (Sumpfdotterblume) in Galium-Heel N.
Camphora (Kampfer) in Populus compositum SR.
Cantharis (Spanische Fliege) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Cantharis compositum S, Populus compositum SR, Reneel N, Solidago compositum SN, Testis compositum N Ampullen.
Capsicum (Spanischer Pfeffer) in Populus compositum SR, Solidago compositum SN, Sulfur comp.-Heel.
Carbo vegetabilis (Holzkohle) in Calcoheel, Carbo compositum, Cor compositum N, Cruroheel S, Droperteel, Gastricumeel, Leptandra compositum, Momordica compositum N, Strophanthus compositum.
Carduus marianus (Mariendistel) in Hamamelis-Homaccord, Hepar compositum N, Hepeel, Injeel-Chol.
Castoreum sibiricum (Sibirische Bibergeil) in Angio-Injeel, Cardiacum-Heel.
Causticum Hahnemanni (Ätzstoff) in Barijodeel, Causticum compositum, Husteel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Reneel N, Rheuma-Heel.
Ceanothus americanus (Säckelblume) in Ceanothus-Homaccord, Mucosa compositum.
Cedron (Cedronsamen) in Klimakt-Heel.
Cephaelis ipecacuanha siehe unter Ipecacuanha.
Cerebrum suis (Großhirn) in Cerebrum compositum NM.
Cerium oxalicum (Cerium(III)-oxalicum) in Coenzyme compositum Ampullen, Molybdän compositum.
Chamomilla (Kamille) in Calcoheel, Kamillen-Salbe-Heel S, Spascupreel, Spascupreel S, Traumeel S, Valerianaheel, Viburcol N.
Chelidonium (Schöllkraut) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Chelidonium-Homaccord N, Hepar compositum N, Hepeel, Injeel-Chol.
Chenopodium anthelminticum (Wurmkraut) in Tanacet-Heel.
China (Chinarinde) in Cerebrum compositum NM, China-Homaccord S, Ginseng compositum N, Hepar compositum N, Hepeel, Injeel-Chol, Procainum compositum.
Chininum arsenicosum (Chininarsenit) in Aletris-Heel, Tonico-Injeel.
Cicuta virosa (Wasserschierling) in Psorinoheel N.
Cimicifuga (Wanzenkraut) in Cimicifuga-Homaccord, Gelsemium-Homaccord, Metro-Adnex-Injeel.
Cinnabaris (Zinnober) in Naso-Heel SN.
Cinnamomum (Ceylon-Zimt) in Cinnamomum-Homaccord N.
Clematis (Aufrechte Waldrebe) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Galium-Heel N.
Cobaltum(II)-gluconicum siehe unter Kobalt(II)-gluconat 2 H_2O.
Cocculus (Kockelskörner) in Aletris-Heel, Cerebrum compositum NM, Cocculus-Homaccord, Vertigoheel.
Coccus cacti/Dactylopius coccus (Cochenille) in Droperteel, Tonsilla compositum N Ampullen.
Coenzym A in Coenzyme compositum Ampullen, Ginseng compositum N, Ubichinon compositum Ampullen.
Coenzym Q_{10} (Ubichinon) in Ubichinon compositum Ampullen.
Colchicum (Herbstzeitlose) in Colchicum compositum mite S, Diarrheel S, Ginseng compositum N, Lithiumeel comp., Neuralgo-Rheum-Injeel, Thyreoidea compositum, Ubichinon compositum Ampullen, Vomitusheel, Vomitusheel S.
Colibacillinum (Escherichia coli-Nosode) in Mucosa compositum, Solidago compositum SN.
Colocynthis (Koloquinte) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Berberis-Homaccord, Colocynthis-Homaccord, Diarrheel S, Hepeel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Nux vomica-Homaccord, Spascupreel, Spascupreel S.
Colon suis (Dickdarm) in Hepar compositum N.
Condurango (Kondurangorinde) in Mucosa compositum.
Conium (Gefleckter Schierling) in Cerebrum compositum NM, Colchicum compositum mite S, Ginseng compositum N, Rauwolfia compositum, Testis compositum N Ampullen, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen, Vertigoheel.
Convallaria majalis (Maiglöckchen) in Aurumheel N Tropfen.
Cor suis (Herz) in Cor compositum N, Testis compositum N Ampullen.
Corpus pineale suis (Epiphyse) in Thalamus compositum N, Thyreoidea compositum.
Cortex glandulae suprarenalis suis (Nebennierenrinde) in Tonsilla compositum N Ampullen.
Cortisonacetat (Cortisonacetat) in Cutis compositum N, Echinacea compositum (forte) SN, Pulsatilla compositum, Testis compositum N Ampullen, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.
Coxsackie-Virus A_9 (Coxsackie-Virus-A_9-Nosode) in Solidago compositum SN.
Crabro vespa (Hornisse) in Gynäcoheel N, Metro-Adnex-Injeel.
Crataegus (Weißdorn) in Angio-Injeel, Aurumheel N Tropfen, Cactus compositum/S, Cor compositum N, Cralonin, Crataegus-Heel S, Glonoin-Homaccord, Melilotus-Homaccord, Valerianaheel.
Cubeba (Kubebenpfeffer) in Populus compositum SR.
Cucurbita pepo (Kürbis) in Populus compositum SR.
Cuprum aceticum (Kupferazetat) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Drosera-Homaccord, Husteel.
Cuprum sulfuricum (Kupfersulfat) in Molybdän compositum, Placenta compositum, Solidago compositum SN, Spascupreel, Spascupreel S.
Curare (Pfeilgift) in Syzygium compositum N.
Cutis suis (Haut) in Cutis compositum N.
Cyanocobalaminum (Vitamin B_{12}) in Hepar compositum N.
Cyclamen (Alpenveilchen) in Hormeel SN.
Cynara scolymus (Artischocke) in Hepar compositum N, Rauwolfia compositum.
Cypripedium pubescens (Frauenschuh) in Ovarium compositum.
Cystein (Cystein) in Coenzyme compositum Ampullen.
Cytisus scoparius (Besenginster) in Aurumheel N Tropfen.

Damiana (Damiana) in Testis compositum N Ampullen.
Diencephalon suis (Zwischenhirn) in Testis compositum N Ampullen.
Dinatriummolybdat 2 H_2O (Natrium molybdaenicum) in Molybdän compositum.
Drosera (Sonnentau) in Droperteel, Drosera-Homaccord.
Dulcamara (Bittersüß) in Calcoheel, Dulcamara-Homaccord, Rhododendroneel S, Tonsilla compositum N Ampullen, Zeel comp. N.
Duodenum suis (Zwölffingerdarm) in Hepar compositum N.

Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume) in Belladonna-Homaccord, Echinacea compositum (forte) SN, Galium-Heel N, Mercurius-Heel S, Tonsilla compositum N Ampullen, Traumeel S.
Echinacea purpurea (Purpurrote Kegelblume) in Traumeel S.
Eisen(II)-fumarat (Ferrum(II)-fumaricum) in Molybdän compositum.
Embryo suis (Embryo) in Causticum compositum, Cerebrum compositum NM, Placenta compositum, Testis compositum N Ampullen, Tonsilla compositum N Ampullen.
Equisetum hiemale (Winterschachtelhalm) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Erigeron canadensis (Kanadisches Berufskraut) in Hormeel SN.
Erythraea centaurium (Tausendgüldenkraut) in Erigotheel.
Eucalyptus (Fieberbaum) in Aconitum-Homaccord.
Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf) in Echinacea compositum (forte) SN, Gripp-Heel.
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch) in Rhododendroneel S.
Euphorbium (Euphorbium) in Echinacea compositum (forte) SN, Euphorbium comp. SN.
Euspongia officinalis siehe unter Spongia.

Ferrum(II)-fumaricum siehe unter Eisen(II)-fumarat.
Ferrum jodatum (Eisenjodid) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N.
Ferrum metallicum (Eisen) in Ferrum-Homaccord, Neuralgo-Rheum-Injeel.
Ferrum muriaticum siehe unter Ferrum sesquichloratum.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat) in Ferrum-Homaccord, Lithiumeel comp., Rheuma-Heel, Testis compositum N Ampullen, Tonsilla compositum N Ampullen.
Ferrum sesquichloratum (Ferrum muriaticum) in Ferrum-Homaccord.
Ferrum sulfuricum (Eisensulfat) in Ferrum-Homaccord.
Fucus vesiculosus (Blasentang) in Strumeel T, Strumeel forte NF, Thyreoidea compositum.
Fumaria officinalis (Erdrauch) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N.
Fumarsäure (Acidum fumaricum) in Causticum compositum, Coenzyme compositum Ampullen, Cor compositum N, Cutis compositum N, Hepar compositum N, Thyreoidea compositum.

Funiculus umbilicalis suis (Wharton-Sulze der Nabelschnur) in Cutis compositum N, Placenta compositum, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.

Galium album (Labkraut) in Galium-Heel N.
Galium aparine (Klebkraut) in Colchicum compositum mite S, Cutis compositum N, Galium-Heel N, Ginseng compositum N, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.
Gelsemium (Wilder Jasmin) in Cardiacum-Heel, Cerebrum compositum NM, Echinacea compositum (forte) SN, Gelsemium-Homaccord, Spascupreel, Spascupreel S, Spigelon.
Gentiana lutea (Gelber Enzian) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Tonsilla compositum N Ampullen.
Geranium robertianum (Ruprechtskraut) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Tonsilla compositum N Ampullen.
Geum urbanum (Nelkenwurz) in Lamioflur.
Ginseng (Ginsengwurzel) in Ginseng compositum N, Procainum compositum, Testis compositum N Ampullen.
Glandula lymphatica suis (Lymphknoten) in Tonsilla compositum N Ampullen.
Glandula suprarenalis suis (Nebenniere) in Cutis compositum N, Testis compositum N Ampullen, Thalamus compositum N.
Glonoinum (Nitroglyzerin) in Angio-Injeel, Cactus compositum/S, Cardiacum-Heel, Cor compositum N, Glonoin-Homaccord, Strophanthus compositum, Ypsiloheel N.
Glyoxal (Oxalaldehyd) in Glyoxal compositum.
Gnaphalium polycephalum (Vielköpfiges Ruhrkraut) in Colocynthis-Homaccord, Neuralgo-Rheum-Injeel.
Graphites (Reißblei) in Graphites-Homaccord, Paeonia comp.-Heel.
Grippe-Nosode (Influenzinum-Nosode) in Echinacea compositum forte SN.

Hamamelis (Virginischer Zauberstrauch) in Abropernol N, Cinnamomum-Homaccord N, Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord, Hamamelis-Salbe-Heel S, Paeonia comp.-Heel, Traumeel S.
Hedera helix (Efeu) in Galium-Heel N.
Hekla lava (Lava vom Hekla-Vulkan) in Osteoheel S.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel) in Aletris-Heel, Gynäcoheel N, Tonico-Injeel.
Hepar suis (Leber) in Cerebrum compositum NM, Cor compositum N, Cutis compositum N, Hepar compositum N, Rauwolfia compositum, Syzygium compositum N, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber) in Angin-Heel SD, Cantharis compositum S, Coenzyme compositum Ampullen, Echinacea compositum (forte) SN, Euphorbium comp. SN, Mercurius-Heel S, Oculoheel, Sabal-Homaccord, Solidago compositum SN, Traumeel S.
Hepar sulfuris kalinum (Kalium sulfuratum) in Lamioflur.
Histamin (Histamin) in Causticum compositum, Hepar compositum N, Luffeel comp. Heuschnupfenspray, Ubichinon compositum Ampullen.
Humulus lupulus (Hopfen) in Valerianaheel.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus; Quecksilberchlorid) in Albumoheel S, Diarrheel S, Echinacea compositum (forte) SN, Metro-Adnex-Injeel, Podophyllum compositum, Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Hydrargyrum cyanatum (Mercurius cyanatus) in Angin-Heel SD.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz) in Colchicum compositum mite S, Ginseng compositum N, Lamioflur, Mucosa compositum, Naso-Heel SN, Ovarium compositum, Ubichinon compositum Ampullen.
Hydrochinon (1,4-Benzoldiol) in Ubichinon compositum Ampullen.
Hyoscyamus (Bilsenkraut) in Bronchalis-Heel, Cerebrum compositum NM.
Hypericum (Johanniskraut) in Tonico-Injeel, Traumeel S, Valerianaheel.
Hypophysis suis (Hypophyse) in Ovarium compositum, Placenta compositum.
Hypothalamus suis (Teil des Zwischenhirns) in Tonsilla compositum N Ampullen.

Ichthyolum (Ammoniumbituminosulfonat) in Cutis compositum N.
Ignatia (Ignatiusbohne) in Albumoheel S, Barijodeel, Cerebrum compositum NM, Cor compositum N, Cutis compositum N, Hormeel SN, Ignatia-Homaccord, Klimakt-Heel, Nervoheel N, Neuro-Injeel Ampullen, Plantago-Homaccord, Podophyllum compositum, Syzygium compositum N, Vomitusheel, Vomitusheel S, Ypsiloheel N.
Ipecacuanha (Brechwurzel) in Aconitum-Homaccord, Anacardium-Homaccord, Bronchalis-Heel, Duodenoheel, Mucosa compositum, Ovarium compositum, Tartephedreel N, Vomitusheel, Vomitusheel S.

Jodum (Jod) in Anacardium-Homaccord, Duodenoheel, Momordica compositum N.
Juglans regia (Walnuß) in Lymphomyosot (Tabl.).
Juniperus communis (Wacholder) in Galium-Heel N.

Kalium asparaginicum siehe unter Kalium-L-aspartat.
Kalium-L-aspartat (Kalium asparaginicum) in Molybdän compositum.
Kalium bichromicum (Kaliumdichromat) in Cerebrum compositum NM, Mucosa compositum, Naso-Heel SN.
Kalium bromatum (Kaliumbromid) in Nervoheel N, Valerianaheel.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat) in Aletris-Heel, Cactus compositum/S, Cardiacum-Heel, Cor compositum N, Cralonin, Droperteel.
Kalium jodatum (Kaliumjodid) in Osteoheel S.
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat) in Barijodeel, Cerebrum compositum NM, Selenium-Homaccord, Tonico-Injeel.
Kalium picrinicum (Kaliumpikrat) in Syzygium compositum N, Testis compositum N Ampullen.
Kalium sulfuratum siehe unter Hepar sulfuris kalinum.
Kaliumtetraiodobismutat (III) (Wismutkaliumjodid) in Psorinoheel N.
Kalmia (Berglorbeer) in Cor compositum N, Discus compositum N, Rauwolfia compositum.
Kobalt(II)-gluconat 2 H_2O (Cobaltum-II-gluconicum) in Molybdän compositum.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot) in Bronchalis-Heel, Ginseng compositum N, Lamioflur, Mucosa compositum, Ovarium compositum, Populus compositum SR, Syzygium compositum N.

Lachesis (Buschmeister) in Carbo compositum, Ceanothus-Homaccord, Droperteel, Duodenoheel, Echinacea compositum (forte) SN, Gripp-Heel, Klimakt-Heel, Mercurius-Heel S, Metro-Adnex-Injeel, Mucosa compositum, Ovarium compositum, Ypsiloheel N.
Lamium album (Taubnessel) in Lamioflur.
Lapathum acutum (Stumpfblättriger Ampfer) in Lamioflur.
Latrodectus mactans (Schwarze Witwe) in Strophanthus compositum.
Ledum (Sumpfporst) in Cutis compositum N, Rhododendroneel S.
Lemna minor (Wasserlinse) in Naso-Heel SN.
Leptandra (Virginischer Ehrenpreis) in Leptandra compositum.
Levothyroxin (Schilddrüsenhormon) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Tonsilla compositum N Ampullen.
Lilium tigrinum (Tigerlilie) in Gynäcoheel N, Metro-Adnex-Injeel, Ovarium compositum.
(±)-æ-Liponsäure (Thioktansäure) in Coenzyme compositum Ampullen, Hepar compositum N, Ubichinon compositum Ampullen.
Lithium benzoicum (Lithiumbenzoat) in Neuralgo-Rheum-Injeel, Rhododendroneel S.
Lithium carbonicum (Lithiumkarbonat) in Lithiumeel comp..
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie) in Bronchalis-Heel, Luffeel comp., Tartephedreel N.
Luffa operculata (Luffa) in Euphorbium comp. SN, Luffeel comp., Luffeel comp. Heuschnupfenspray.
Lupulus (Hopfen) in Valerianaheel.
Lycopodium (Bärlapp) in Cruroheel S, Hepar compositum N, Hepeel, Injeel-Chol, Metro-Adnex-Injeel, Momordica compositum N, Nux vomica-Homaccord, Rauwolfia compositum, Syzygium compositum N, Testis compositum N Ampullen.
Lycopus virginicus (Wolfsfuß) in Glonoin-Homaccord.

Magnesium-D-gluconat 2 H_2O (Magnesium gluconicum) in Ubichinon compositum Ampullen.
Magnesium-L-hydrogenaspartat (Magnesium asparaginicum) in Molybdän compositum.
Magnesiumorotat (Magnesium oroticum) in Coenzyme compositum Ampullen.
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat) in Cerebrum compositum NM, Ovarium compositum, Spascupreel, Spascupreel S, Testis compositum N Ampullen.
Majorana (Majoran) in Hormeel SN.
Mandragora (Alraune) in Momordica compositum N, Mucosa compositum.
Mangan(II)-D-gluconat (Manganum gluconicum) in Molybdän compositum.
Manganum phosphoricum (Manganphosphat) in Cerebrum compositum NM, Coenzyme compositum Ampullen, Testis compositum, Ubichinon compositum Ampullen.
Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Psorinoheel N.
Medulla ossis suis (Knochenmark) in Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.

Melilotus officinalis (Steinklee) in Carbo compositum, Gynäcoheel N, Melilotus-Homaccord, Naso-Heel SN, Placenta compositum, Rauwolfia compositum, Spigelon.
Melissa officinalis (Zitronenmelisse) in Valerianaheel.
Mercurius bijodatus (Quecksilberjodid) in Euphorbium comp. SN, Naso-Heel SN.
Mercurius cyanatus (Quecksilbercyanid) siehe unter Hydrargyrum cyanatum.
Mercurius praecipitatus ruber (Rotes Quecksilberoxid) in Cruroheel S, Discus compositum N, Osteoheel S.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält) in Cantharis compositum S, Cutis compositum N, Mercurius-Heel S, Momordica compositum N, Ovarium compositum, Tonsilla compositum N Ampullen, Traumeel S.
Mercurius sublimatus corrosivus (Quecksilberchlorid) siehe unter Hydrargyrum bichloratum.
Methylglyoxal (Aldehyd der Brenztraubensäure) in Glyoxal compositum.
Mezereum (Seidelbast) in Lamioflur, Mezereum-Homaccord, Sulfur comp.-Heel.
Millefolium (Schafgarbe) in Cinnamomum-Homaccord N, Traumeel S.
Momordica balsamina (Balsamapfel) in Momordica compositum N, Mucosa compositum.
Moschus (Bisam, Drüsensekret des männlichen Moschustieres) in Ignatia-Homaccord.
Mucosa suis (Schleimhaut) in Mucosa compositum.
Mucosa nasalis suis (Nasen- und Nebenhöhlenschleimhaut) in Mucosa compositum.
Myosotis arvensis (Vergißmeinnicht) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N.
Myrtillus (Heidelbeere) in Ubichinon compositum Ampullen.

Nadid (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) in Coenzyme compositum Ampullen, Ginseng compositum N, Ubichinon compositum Ampullen.
Naphthalinum (Naphthalin) in Tartephedreel N.
1,4-Naphthochinon (Naphthochinon) in Ubichinon compositum Ampullen.
Nasturtium aquaticum (Brunnenkresse) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N.
Natrium bromatum (Natriumbromid) in Valerianaheel.
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat) in Lamioflur, Lithiumeel comp., Natrium-Homaccord, Spigelon.
Natrium chloratum (Natrium muriaticum) in Aletris-Heel, Natrium-Homaccord, Oculoheel, Psorinoheel N.
Natrium molybdaenicum siehe unter Dinatriummolybdat 2 H_2O.
Natrium muriaticum siehe unter Natrium chloratum.
Natrium nitricum (Natriumnitrat) in Natrium-Homaccord.
Natrium nitrosum (Natriumnitrit) in Pectus-Heel.
Natriumoxalacetat (Natrium oxalaceticum) in Causticum compositum, Coenzyme compositum Ampullen, Cor compositum N, Cutis compositum N, Ginseng compositum N, Hepar compositum N, Mucosa compositum, Thyreoidea compositum, Ubichinon compositum Ampullen.
Natriumpyruvat (Natrium pyruvicum) in Coenzyme compositum Ampullen, Placenta compositum, Solidago compositum SN.
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Osteoheel S, Syzygium compositum N, Tartephedreel N.
Natrium tetrachloroauratum siehe unter Aurum chloratum natronatum.
Niccolum metallicum (Nickel) in Leptandra compositum.
Nickel(II)-acetat 4 H_2O (Niccolum aceticum) in Molybdän compositum.
Nicotinamid (Nicotinamid) in Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.
Nux moschata (Muskatnuß) in Albumoheel S, Hepeel, Hormeel SN.
Nux vomica (Brechnuß) in Gastricumeel, Lithiumeel comp., Mucosa compositum, Nux vomica-Homaccord, Paeonia comp.-Heel, Tonico-Injeel, Vomitusheel, Vomitusheel S.

Oleander (Oleander) in Psorinoheel N.
Ononis spinosa (Hauhechel) in Galium-Heel N, Populus compositum SR.
Origanum majorana (Majoran) siehe unter Majorana.
Origanum vulgare (Dost) in Erigotheel.
Orotsäure (Molkensäure) in Hepar compositum N.
Orthosiphon stamineus (Orthosiphon) in Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Ovarium suis (Eierstöcke) in Ovarium compositum.
Oxalis acetosella (Sauerklee) in Mucosa compositum.
2-Oxoglutarsäure (Acidum æ-ketoglutaricum) in Causticum compositum, Coenzyme compositum Ampullen, Cor compositum N, Cutis compositum N, Hepar compositum N, Syzygium compositum N, Thyreoidea compositum.

Paeonia officinalis (Pfingstrose) in Paeonia comp.-Heel.
Palladium (Palladium) in Gynäcoheel N.
Pankreas suis (Bauchspeicheldrüse) in Hepar compositum N, Mucosa compositum, Syzygium compositum N.
Para-Benzochinon (Para-Benzochinon) in Ubichinon compositum Ampullen.
Pareira brava (Grieswurz) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Solidago compositum SN.
Paris quadrifolia (Einbeere) in Phosphor-Homaccord, Ypsiloheel N.
Passiflora incarnata (Passionsblume) in Spascupreel, Spascu-preel S.
Petroleum (Steinöl) in Abropernol N, Cocculus-Homaccord, Duodenoheel, Vertigoheel.
Petroselinum (Petersilie) in Populus compositum SR.
Phlorizin (Phlorizinum) in Syzygium compositum N.
Phosphorus (Phosphor) in Albumoheel S, Arteria-Heel N, Bryaconeel, Echinacea compositum (forte) SN, Galium-Heel N, Gripp-Heel, Hepeel, Leptandra compositum, Molybdän compositum, Mucosa compositum, Naso-Heel SN, Pectus-Heel, Phosphor-Homaccord, Testis compositum N Ampullen.
Phytolacca (Kermesbeere) in Angin-Heel SD, Echinacea compositum (forte) SN, Mercurius-Heel S.
Pinus silvestris (Kiefer) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N.
Pix liquida (Holzteer) in Sulfur comp.-Heel.
Placenta suis (Mutterkuchen) in Cerebrum compositum NM, Cutis compositum N, Ovarium compositum, Placenta compositum.
Plantago major (Breitblättriger Wegerich) in Plantago-Homaccord, Viburcol N.
Platinum metallicum (Platin) in Gynäcoheel N, Lamioflur, Neuro-Injeel Ampullen.
Plumbum aceticum (Bleiazetat) in Reneel N.
Plumbum jodatum (Bleijodid) in Angio-Injeel, Placenta compositum.
Plumbum metallicum (Blei) in Syzygium compositum N.
Podophyllum (Maiapfel) in Colchicum compositum mite S, Diarrheel S, Leptandra compositum, Momordica compositum N, Podophyllum compositum, Ubichinon compositum Ampullen.
Populus tremuloides (Espe) in Populus compositum SR.
Procainhydrochlorid (Procainhydrochlorid) in Procainum compositum.
Psorinum (Psorinum-Nosode) in Psorinoheel N.
Pulsatilla (Kuhschelle) in Abropernol N, Causticum compositum, Coenzyme compositum Ampullen, Cruroheel S, Echinacea compositum (forte) SN, Euphorbium comp. SN, Gastricumeel, Ginseng compositum N, Hormeel SN, Metro-Adnex-Injeel, Mucosa compositum, Ovarium compositum, Pulsatilla compositum, Rhododendroneel S, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen, Viburcol N, Ypsiloheel N.
Pyelon suis (Nierenbecken) in Solidago compositum SN.
Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) in Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.

Quassia amara (Bitterholz) in Leptandra compositum.

Ranunculus bulbosus (Knollenhahnenfuß) in Cardiacum-Heel, Cor compositum N, Ranunculus-Homaccord.
Rauwolfia serpentina (Indische Schlangenwurzel) in Rauwolfia compositum.
Ren suis (Niere) in Rauwolfia compositum.
Rheum (Rhabarber) in Veratrum-Homaccord.
Rhododendron (Alpenrose) in Rhododendroneel S.
Rhus toxicodendron (Giftsumach) in Echinacea compositum (forte) SN, Gelsemium-Homaccord, Lithiumeel comp., Neuralgo-Rheum-Injeel, Oculoheel, Rheuma-Heel, Zeel comp. N.
Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O (Vitamin B_2) in Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.
Robinia pseudacacia (Scheinakazie) in Duodenoheel.
Rubidiumchlorid (Rubidium hydrochloricum) in Molybdän compositum.
Ruta (Weinraute) in Cerebrum compositum NM.

Sabal serrulatum (Zwergpalme) in Populus compositum SR, Reneel N, Sabal-Homaccord.
Salpinx suis (Eileiter) in Ovarium compositum.
Sanguinaria (Kanadische Blutwurzel) in Echinacea compositum (forte) SN, Klimakt-Heel, Zeel comp. N.

Sarsaparilla/Smilax (Sarsaparille) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Solidago compositum SN.
Scilla (Meerzwiebel) in Apis-Homaccord, Husteel, Populus compositum SR.
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Populus compositum SR.
Secale cornutum (Mutterkorn) in Arteria-Heel N, Circulo-Injeel N, Placenta compositum, Syzygium compositum N.
Sedum acre (Mauerpfeffer) in Galium-Heel N, Thyreoidea compositum.
Selenium (Selen) in Cerebrum compositum NM, Cutis compositum N, Selenium-Homaccord, Testis compositum N Ampullen, Tonico-Injeel.
Semecarpus anacardium siehe unter Anacardium.
Sempervivum tectorum (Hauswurz) in Galium-Heel N, Ginseng compositum N, Thyreoidea compositum.
Sepia (Tintenfisch) in Aletris-Heel, China-Homaccord S, Hormeel SN, Klimakt-Heel, Nervoheel N, Neuro-Injeel Ampullen, Ovarium compositum.
Serpyllum (Thymus serpyllum; Feldthymian) in Tanacet-Heel.
Silicea (Kieselsäure) siehe unter Acidum silicicum.
Solanum dulcamara siehe unter Dulcamara.
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten) in Circulo-Injeel N, Placenta compositum.
Solidago virgaurea (Goldrute) in Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Spigelia (Wurmkraut) in Angio-Injeel, Cactus compositum/S, Cardiacum-Heel, Cor compositum N, Cralonin, Oculoheel, Pectus-Heel, Spigelon, Strophanthus compositum.
Spiraea ulmaria (Mädesüß) in Ferrum Homaccord, Neuralgo-Rheum-Injeel, Rhododendroneel S.
Splen suis (Milz) in Cutis compositum N, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen.
Spongia (Gerösteter Meerschwamm) in Strumeel T, Strumeel forte NF, Thyreoidea compositum.
Stannum (Zinn) in Klimakt-Heel.
Staphisagria (Stephanskörner) in Oculoheel.
Staphylococcinum (Staphylokokken-Nosode) in Echinacea compositum (forte) SN.
Stellaria media (Vogelmiere) in Rhododendroneel S.
Sticta (Lungenflechte) in Bronchalis-Heel, Naso-Heel SN.
Stilingia silvatica (Stillingie) in Osteoheel S.
Stramonium (Stechapfel) in Barijodeel.
Streptococcinum (Streptokokken-Nosode) in Echinacea compositum (forte) SN.
Strontium carbonicum (Strontiumkarbonat) in Cimicifuga-Homaccord.
Strophanthus (Strophanthus) in Placenta compositum, Strophanthus compositum.
g-Strophanthin in Cor compositum N.
Strychnos ignatii siehe unter Ignatia.
Strychnos nux-vomica siehe unter Nux vomica.
Sulfur (Schwefel) in Cardiacum-Heel, Causticum compositum, Cerebrum compositum NM, Coenzyme compositum Ampullen, Cutis compositum N, Echinacea compositum (forte) SN, Engystol, Ginseng compositum N, Hepar compositum N, Klimakt-Heel, Luffeel comp. Heuschnupfenspray, Molybdän compositum, Mucosa compositum, Paeonia comp.-Heel, Psorinoheel N, Pulsatilla compositum, Rauwolfia compositum, Schwef-Heel, Sulfur comp.-Heel, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen, Zeel comp. N.
Symphytum (Beinwell) in Traumeel S.
Syzygium jambolanum (Jambulbaum) in Syzygium compositum N.

Tabacum (Tabak) in Arteria-Heel N, Circulo-Injeel N, Placenta compositum, Strophanthus compositum.
Tanacetum vulgare (Rainfarn) in Tanacet-Heel.
Taraxacum (Löwenzahn) in Hepar compositum N, Injeel-Chol.
Tartarus stibiatus (Brechweinstein) in Apis-Homaccord, Bronchalis-Heel, Tartephedreel N, Tonsilla compositum N Ampullen.
Terebinthina (Terpentinöl) in Albumoheel S, Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Testis suis (Hoden) in Testis compositum N Ampullen.
Teucrium scorodonia (Gamander) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N.
Thalamus opticus suis (Sehhügel) in Thalamus compositum N.
Thallium sulfuricum (Thalliumsulfat) in Cutis compositum N.
Thiaminchloridhydrochlorid (Vitamin B1) in Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen.
Thryallis glauca (Galphimia glauca) in Luffeel comp. Heuschnupfenspray.
Thuja (Lebensbaum) in Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Cerebrum compositum NM, Cutis compositum N, Echinacea compositum (forte) SN, Galium-Heel N, Psorinoheel N, Spigelon, Ypsiloheel N.
Thymus suis (Thymusdrüse) in Hepar compositum N, Thyreoidea compositum.
Thymus serpyllum siehe unter Serpyllum.
Thyreoidea suis (Schilddrüse) in Thyreoidea compositum.
Thyroxin (Schilddrüsenhormon) siehe unter Levothyroxin.
Tonsilla suis (Mandel) in Tonsilla compositum N Ampullen.
Tormentilla (Blutwurz) in Diarrheel S, Strophanthus compositum, Veratrum-Homaccord.
Toxicodendron quercifolium siehe unter Rhus toxicodendron.
Trichinoyl (Trichinoyloctahydrat) in Ubichinon compositum Ampullen.

Ubichinon siehe unter Coenzym Q10.
Ureter suis (Harnleiter) in Solidago compositum SN.
Urethra suis (Harnröhre) in Solidago compositum SN.
Urtica urens (Kleine Brennessel) in Cutis compositum N, Galium-Heel N, Populus compositum SR.
Uterus suis (Gebärmutter) in Ovarium compositum.
Uva ursi (Bärentraube) in Populus compositum SR.

Vaccininum (Vaccininum-Nosode) in Psorinoheel N.
Valeriana (Baldrian) in Aurumheel N Tropfen, Neuro-Injeel Ampullen, Valerianaheel.
Vena suis (Vene) in Placenta compositum.
Ventriculus suis (Magen) in Mucosa compositum.
Veratrum (Weiße Nieswurz) in Albumoheel S, Atropinum compositum, Atropinum compositum S, Berberis-Homaccord, Diarrheel S, Hepar compositum N, Hepeel, Injeel-Chol, Momordica compositum N, Mucosa compositum, Spascupreel, Spascupreel S, Strophanthus compositum, Veratrum-Homaccord.
Veronica (Ehrenpreis) in Lymphomyosot (Tabl.), Lymphomyosot N, Naso-Heel SN.
Vesica fellea suis (Gallenblase) in Hepar compositum N.
Vesica urinaria suis (Harnblase) in Solidago compositum SN.
Viburnum opulus (Schneeball) in Gynäcoheel N, Hormeel SN.
Vinca minor (Immergrün) in Naso-Heel SN.
Vincetoxicum (Schwalbenwurz) in Engystol.
Viola tricolor (Stiefmütterchen) in Lamioflur.
Vipera berus (Kreuzotter) in Placenta compositum.
Viscum album (Mistel) in Arteria-Heel N, Ginseng compositum N, Procainum compositum, Rauwolfia compositum, Thalamus compositum N, Thyreoidea compositum.
Vitamin B_1 siehe unter Thiaminchloridhydrochlorid.
Vitamin B_2 siehe unter Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz.
Vitamin B_6 siehe unter Pyridoxinhydrochlorid.
Vitamin B_{12} siehe unter Cyanocobalaminum.
Vitamin C siehe unter Ascorbinsäure.

Wismutkaliumjodid siehe unter Kaliumtetraiodobismutat (III).

Zincum metallicum (Zink) in Echinacea compositum (forte) SN, Testis compositum N Ampullen.
Zincum isovalerianicum (Zinkvalerianat) in Nervoheel N.
Zink-D-gluconat (Zincum gluconicum) in Molybdän compositum.

3 Homöopathische Einzelmittel in Potenzenaccorden und Einzelpotenzen

• **ABIES NIGRA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14584.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Resina piceae Dil. D10, Resina piceae Dil. D30, Resina piceae Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Abies nigra-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Resina piceae entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verdauungsschwäche des Magens.

• **ABROTANUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13655.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Artemisia abrotanum Dil. D6, Artemisia abrotanum Dil. D12, Artemisia abrotanum Dil. D30, Artemisia abrotanum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Artemisia abrotanum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Abmagerung und Entwicklungsstörungen bei Kindern sowie durch chronische Entzündungen. Hauterkrankungen. Rheumatismus. Gicht.

• **ACETYLCHOLINCHLORID-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acetylcholinchlorid D12, Acetylcholinchlorid D30, Acetylcholinchlorid D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Im homöopathischen Umkehreffekt ist dieses Präparat einzusetzen bei allgemeiner Vagotonie, z.B. bei (Neigung zu) Hypotonie, spastischer Bronchitis und Asthma bronchiale, Spasmen im Magen-Darm-Trakt mit und ohne Ulzerationen, vermehrter (Schweiß) Drüsensekretion, (Neigung zu) Bradykardie und reduzierter Schlagstärke bzw. Kontraktionskraft des Herzmuskels sowie auch bei Muskelspastizität.

• **ACETYLSALICYLSÄURE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119805.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum acetylsalicylicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum acetylsalicylicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum acetylsalicylicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum acetylosalicylicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Magen-Darmstörungen, Blutungen, Ohrensausen.

• **ACIDUM ACETYLOSALICYLICUM-INJEEL**
siehe Acetylsalicylsäure-Injeel

• **ACIDUM CIS-ACONITICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121154.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum cis-aconiticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g.

A

Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM CIS-ACONITICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121154.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum cis-aconiticum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Abwehrschwäche. Leichte Erkältlichkeit, Empfindlichkeit gegen Wind und Temperaturschwankungen, verbunden mit Kopfneuralgien, neuralgischen Zahnschmerzen, urtikariellen Ekzemen auf der Kopfhaut. Plötzliche Asthmaanfälle, Stenokardien (meist verbunden mit Tachykardien). Nächtliche Knochenschmerzen, auch in der Wirbelsäule, Scheuermann-Krankheit. Erschöpfungszustände nach Viruskrankheiten und chronischen Infektionen. Alle Beschwerden treten plötzlich auf, bevorzugt abends, und bessern sich durch trockene warme Anwendungen. Stimmung häufig wechselnd (auch depressiv), reizbar, jähzornig.

- **ACIDUM L(+)-ASPARAGICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum L-(+)-asparagicum D10, Acidum L-(+)-asparagicum D30, Acidum L-(+)-asparagicum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Imprägnationsphasen jeder Art, z.B. Asthma, Angina pectoris, Pruritus, Dermatosen, aber auch Psoriasis, Präkanzerosen, Neoplasmaphasen (besonders im Beginn); allgemein zur Verbesserung der Zellatmung.

- **ACIDUM BENZOICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13651.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum benzoicum e resina Dil. D12, Acidum benzoicum e resina Dil. D30, Acidum benzoicum e resina Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum benzoicum e resina entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische, gichtige und degenerative Gelenkerkrankungen. Ganglien. Harnwegserkrankungen.

- **ACIDUM CITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13653.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum citricum Dil. D10, Acidum citricum Dil. D30, Acidum citricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM CITRICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.:13653.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum citricum Dil. D6, Acidum citricum Dil. D10, Acidum citricum Dil. D30, Acidum citricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum citricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Zahnfleischbluten. Auszehrende Krankheiten.

- **ACIDUM FLUOR-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17404.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum hydrofluoricum Dil. D12, Acidum hydrofluoricum Dil. D30, Acidum hydrofluoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum hydrofluoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Eiterungen, Fisteln, Entzündungen und Entkalkungen der Knochen; Knochenhaut- und Gelenkentzündungen; Bindegewebsschwäche wie Krampfaderleiden, Krampfadergeschwüre; Magensenkung; Kropfleiden; verschiedene Erkrankungen der Haut und Hautanhangsgebilde; Überaktivität; Verstimmungszustände.

- **ACIDUM FORMICICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14580.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum formicicum Dil. D12, Acidum formicicum Dil. D30, Acidum formicicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Acidum formicicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM FORMICICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14580.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum formicicum Dil. D4, Acidum formicicum Dil. D12, Acidum formicicum Dil. D30, Acidum formicicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Acidum formicicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM FORMICICUM D30; D200**

als Einzelpotenzen.
Flüssige Verdünnung zur s.c. Injektion Reg.-Nr.: 3555.55.54
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,0 ml (= 1.0 g) enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Acidum formicicum Dil. D30 (D200) 1,0 ml.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich 1,0 ml s.c. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum formicicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus der Muskeln und Gelenke. Ekzem. Bronchialasthma. Allergien.

- **ACIDUM FUMARICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2120903.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum fumaricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum fumaricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum fumaricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM FUMARICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum fumaricum D6, Acidum fumaricum D10, Acidum fumaricum D30, Acidum fumaricum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Regenerierende Wirkung auf die Zellatmung, „Schwächemittel". Hyperhidrosis bei herabgesetzter Nierenfunktion. Pastöser aufgedunsener Habitus mit bläulicher Gesichtsfarbe und Kurzatmigkeit (Dyspnoe) sowie mit fettiger Haut und fettigem Haar und geschwollenen Augenlidern. Fermentstörungen der Verdauungsorgane (schlechte Fettverdauung). Entzündliche Erkrankungen der Schleimhäute (Sinusitis, Nasen-Rachen-Raum, Bronchitis) und der weiblichen Geschlechtsorgane (Ovariitis, Parametritis). Klimakterische Beschwerden (Schweißausbrüche, Wallungen).

- **ACIDUM GLUTAMINICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum glutaminicum D6, Acidum glutaminicum D12, Acidum glutaminicum D30, Acidum glutaminicum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Stimulativer Effekt bei Fermentstörungen bzw. Störungen im Eiweißstoffwechsel.

- **ACIDUM α-KETOGLUTARICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121158.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM α-KETOGLUTARICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121158.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Lufthunger (z.B. beim Asthma bronchiale und beim Lungenemphysem sowie beim Sportherz) sowie Zerschlagenheitsgefühl bzw. Zerschlagenheitsschmerz inklusive Weichteil- bzw. Muskelrheumatismus. Drüsenunterfunktionen (Schilddrüse, Ovarien, exkretorischer und inkretorischer Pankreas).

- **ACIDUM LACTICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum lacticum D6, Acidum lacticum D12, Acidum lacticum D30, Acidum lacticum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum lacticum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Abmagerung bei Diabetikern.

- **ACIDUM L(+)-LACTICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum L-(+)-lacticum D4, Acidum L-(+)-lacticum D12, Acidum L-(+)-lacticum D30, Acidum L-(+)-lacticum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum sarcolacticum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Muskelschmerzen.

- **ACIDUM DL-MALICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121156.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum DL-malicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM DL-MALICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121156.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum DL-malicum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hauptmittel für die Entgiftung und Sauerstoffzufuhr in drüsigen Geweben und Muskeln. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Degenerativ und toxisch bedingte Erkrankungen des Herzmuskels: Myokardschwäche, postinfektiöse Herzmuskelschwäche, Tachykardie, Sportherz. Chronische Bronchitis und Sinusitis mit trockenen Schleimhäuten von Kindheit an. Starke Seborrhö, trockene, schuppende Ekzeme und Psoriasis mit heftigem Juckreiz, Gehörgangsekzem. Pluriglanduläre Insuffizienz (Diabetes mellitus, Struma, Myxödem).Typisch sind kalte Hände und Füße mit bläulicher Verfärbung sowie große Empfindlichkeit gegenüber Wetterwechsel.

- **ACIDUM NITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13620.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum nitricum Dil. D12, Acidum nitricum Dil. D30, Acidum nitricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum nitricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.

- **ACIDUM OXALICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13618.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum oxalicum Dil. D12, Acidum oxalicum Dil. D30, Acidum oxalicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum oxalicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervenschmerzen und Rheumatismus. Nervöse Herzbeschwerden. Nierensteinleiden. Lähmungen. nervöse Störungen und Verstimmungszustände.

• **ACIDUM PHOSPHORICUM-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16255.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum phosphoricum Dil. D12, Acidum phosphoricum Dil. D30, Acidum phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Acidum phosphoricum-Injeel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Geistige und körperliche Erschöpfungszustände. Kalkstoffwechselstörungen. Durchfälle.

• **ACIDUM SARCOLACTICUM-INJEEL FORTE**
siehe Acidum L (+)-lacticum-Injeel forte.

• **ACIDUM SUCCINICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6018968.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum succinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ACIDUM SUCCINICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6018968.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum succinicum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum succinicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Heuschnupfen.

• **ACIDUM SULFURICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13707.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum sulfuricum Dil. D6, Acidum sulfuricum Dil. D12, Acidum sulfuricum Dil. D30, Acidum sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Magenbeschwerden. Hämorrhagische Diathese. Entkräftung. Haut- und Venenerkrankungen.

• **ACIDUM URICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum uricum D10, Acidum uricum D30, Acidum uricum D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum uricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Gicht.

- **ACONITUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16257.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum napellus Dil. D12, Aconitum napellus Dil. D30, Aconitum napellus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aconitum-Injeel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aconitum napellus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.

- **ACTAEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6053433.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Actaea spicata Dil. D10, Actaea spicata Dil. D30, Actaea spicata Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Zu diesem Präparat sind keine Nebenwirkungen bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Actaea spicata entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus der kleinen Gelenke.

- **ACTH-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: ACTH D12, ACTH D30, ACTH D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: HVL- und NNR-Dysfunktionen; Therapieschäden bei/nach langzeitiger Glukokortikoid-Medikation.

- **ADENOMA MAMMAE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adenoma mammae-Nosode D12, Adenoma mammae-Nosode D30, Adenoma mammae-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Mehr oder minder schmerzhafte kugelige, kleinknotige, derbe, benigne Mammaknoten, meist diffus/multipel im Sinne einer „Schrotkugelbrust“ mit typischer prämenstrueller Verschlimmerung der Beschwerden.

• ADENOMA PROSTATAE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adenoma prostata-Nosode D10, Adenoma prostata-Nosode D30, Adenoma prostata-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Prostatitis. Prostataadenom. Dysurie, Strangurie; im Rahmen der sonstigen antihomotoxischen Therapie auch bei Prostatakarzinom.

• ADENOSINTRIPHOSPHAT (ATP)-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adenosintriphosphat (ATP) D6, Adenosintriphosphat (ATP) D10, Adenosintriphosphat (ATP) D30, Adenosintriphosphat (ATP) D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Unterstützung der energieverbrauchendenSysteme; deshalb angezeigt bei Schädigung der energieverwertenden Systeme (Zitronensäurezyklus u.a.), besonders also bei Therapieschäden.

• ADEPS SUILLUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adeps suillus D12, Adeps suillus D30, Adeps suillus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• ADEPS SUILLUS-INJEEL FORTE S

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adeps suillus D8, Adeps suillus D12, Adeps suillus D30, Adeps suillus D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nach Genuss tierischer Fette (besonders Schweinesch malz) auftretende Beschwerden. Cholesterinämie. Bindegewebsverschlackung. Adipositas. Akne vulgaris; Seborrhö; akute und chronische Ekzeme. Gallenkoliken. Blepharitis, Hordeolum, Chalazion. Beschwerden durch Homotoxine, die durch Gewichtsverluste – z.B. auch bei überschnellen Abmagerungs-, Fasten-, Entwässerungskuren infolge massiver Einschwemmung von Fettgewebe (Depositionsphase) in die Lymph- und Blutbahn – freigemacht sind (intermediäre Abbau-Toxine).

• ADONIS VERNALIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13709.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adonis vernalis Dil. D12, Adonis vernalis Dil. D30, Adonis vernalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Adonis vernalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herzschwäche.

• **ADRENALIN-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adrenalin D8, Adrenalin D12, Adrenalin D30, Adrenalin D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Epinephrinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bluthochdruck. Angina pectoris.

• **AESCULUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13710.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aesculus hippocastanum Dil. D12, Aesculus hippocastanum Dil. D30, Aesculus hippocastanum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **AESCULUS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13710.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Aesculus hippocastanum Dil. D6, Aesculus hippocastanum Dil. D12, Aesculus hippocastanum Dil. D30, Aesculus hippocastanum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aesculus hippocastanum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden. Lenden-Kreuzbeinschmerz.

• **AGARICUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119518.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Amanita muscaria (HAB 34) Dil. D12 (HAB, Vorschrift 3a), Amanita muscaria (HAB 34) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 3a), Amanita muscaria (HAB 34) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Amanita muscaria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erregungszustände, auch Verminderung der Erregbarkeit des Nervensystems. Folgen von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Verwirrtheitszustände. zerebrales Anfallsleiden. Blasen- und Darmentleerungsstörungen.

• **AGNUS CASTUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14162.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitex agnus-castus Dil. D12, Vitex agnus-castus Dil. D30, Vitex agnus-castus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Agnus castus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vitex agnus-castus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Sexuelle Störungen bei Männern. Störungen des Milchflusses. Nervöse Verstimmungszustände.

- **ALLIUM SATIVUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14547.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Allium sativum Dil. D12, Allium sativum Dil. D30, Allium sativum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Allium sativum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Allium sativum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege. Verdauungsschwäche. Rheumatismus im Hüftbereich.

- **ALOE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14155.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aloe Dil. D12, Aloe Dil. D30, Aloe Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aloe-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aloe entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Magen-Darmstörungen. Stuhlinkontinenz. Hämorrhoiden.

- **AMBRA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15532.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ambra Dil. D12 (HAB, Vorschr. 4b), Ambra Dil. D30 (HAB, Vorschr. 4b), Ambra Dil. D200 (HAB, Vorschr. 4b) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ambra entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervöse Übererregbarkeit und nervöse Erschöpfung. Schlaf störungen. Fehlsteuerungen des vegetativen Nervensystems. Traurige Verstimmungszustände. Gefäßverkalkung. Voralterung.

- **AMMONIUM MURIATICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14160.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ammonium chloratum Dil. D8, Ammonium chloratum Dil. D12, Ammonium chloratum Dil. D30, Ammonium chloratum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ammonium muriaticum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ammonium chloratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Subakute und chronische Entzündungen der Atemwege. Ischiasschmerz. Neuralgien.

- **ANACARDIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14735.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Semecarpus anacardium Dil. D12, Semecarpus anacardium Dil. D30, Semecarpus anacardium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Anacardium-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Semecarpus anacardium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautausschläge. Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.

- **ANTHRACHINON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anthrachinon D8, Anthrachinon D12, Anthrachinon D30, Anthrachinon D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Gastrointestinale Störungen mit Durchfällen („Alles schlägt auf den Darm“). Hypotonie, die sich durch fast kein anderes Mittel besser beeinflussen läßt. Ferner: Lungenaffektionen (z.B. Pneumonie) und Erkältungskrankheiten, Pleuritis, zumeist mit Erguss. Niereninsuffizienz, besonders wenn gleichzeitig Durchfall (siehe oben) mit großem Elendsgefühl und starken Kopfschmerzen vorliegt. Trockene, schuppende Hautaffektionen, besonders in den Beugen.

- **ANTIMONIUM CRUDUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14414.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Stibium sulfuratum nigrum Dil. D12, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D30, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Antimonium crudum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Stibium sulfuratum nigrum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verdauungsstörungen. Hauterkrankungen. Rheumatismus.

- **AORTA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aorta suis D10, Aorta suis D30, Aorta suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **AORTA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aorta suis D8, Aorta suis D12, Aorta suis D30, Aorta suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hypotonie, Gefäßleiden wie Claudicatio intermittens und Gangrän. Besonderer Hinweis: Vorsicht bei pektanginösen Zuständen! Hier erst Vorbehandlung mit den entsprechenden Antihomotoxika.

- **APIS-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17298.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D12, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **APIS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17298.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D4, Apis mellifica Dil. D8, Apis mellifica Dil. D12, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bienengiftüberempfindlichkeit.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Bei s.c. Injektion kann es zu Rötungen an der Einstichstelle kommen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Apis mellifica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.

- **APOMORPHINUM HYDROCHLORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apomorphinum hydrochloricum D12, Apomorphinum hydrochloricum D30, Apomorphinum hydrochloricum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Apomorphinum hydrochloricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erbrechen bei verschiedenen Krankheiten.

- **APPENDICITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Appendicitis-Nosode D10, Appendicitis-Nosode D30, Appendicitis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;

b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische Lymphdrüsenschwellungen. Appendizitische Reizzustände. Versuchsweise bei chronischer Obstipation.

- **ARGENTUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14665.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum metallicum Dil. D12, Argentum metallicum Dil. D30, Argentum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Argentum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Argentum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Rachen- u. Kehlkopfentzündung. Geistige Erschöpfung und Störungen des Nervensystems mit Lähmigkeit und Krämpfen der Gliedmaßen. Entzündliche Schwellung der Eierstöcke.

- **ARGENTUM NITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14318.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitricum Dil. D12, Argentum nitricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Argentum nitricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Argentum nitricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.

- **ARISTOLOCHIA CLEMATITIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 3487.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aristolochia clematitis Dil. D12, Aristolochia clematitis Dil. D30, Aristolochia clematitis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aristolochia clematitis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Menstruationsstörung. Krankheiten des venösen Systems.

- **ARNICA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17306.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica montana Dil. D12, Arnica montana Dil. D30, Arnica montana Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ARNICA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17306.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica montana Dil. D4, Arnica montana Dil. D12, Arnica montana Dil. D30, Arnica montana Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten drei Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen:
Bekannte Überempfindlichkeit gegen Korbblütler.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Arnica montana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

• **ARSENICUM ALBUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17304.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum arsenicosum Dil. D12, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ARSENICUM ALBUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17305.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum arsenicosum Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D12, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum arsenicosum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände.

• **ARSENUM JODATUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14660.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arsenum jodatum Dil. D12, Arsenum jodatum Dil. D30, Arsenum jodatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Arsenum jodatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Arsenum jodatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schnupfen. Bronchitis. Drüsenschwellung. Altersherz.

• **ARTEMISIA VULGARIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119542.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Artemisia vulgaris Dil. D12, Artemisia vulgaris Dil. D30, Artemisia vulgaris Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Artemisia vulgaris entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfleiden. Wurmbeschwerden.

- **ARTERIA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arteria suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ARTERIA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arteria suis D8, Arteria suis D12, Arteria suis D30, Arteria suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Durchblutungsstörungen, Claudicatio intermittens. Wadenkrämpfe. Diabetes mellitus. Gangrän. Periarteriitis. Morbus Buerger-Winiwarter (Thrombangiitis obliterans).

- **ASA FOETIDA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14317.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Asa foetida Dil. D12, Asa foetida Dil. D30, Asa foetida Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Asa foetida-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Asa foetida entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Atemwege; nervöse Störungen der Verdauungswege; Knochenerkrankungen; Krampfaderleiden; Hautgeschwüre und Fistelbildungen; Störungen der Milchabsonderung; Kopfschmerzen; verschiedene nervöse Störungen.

- **ASTHMA-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Asthma-Nosode D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Asthma bronchiale. Emphysem. Chronische Bronchitis. Stauungslunge. Silikosis. Zyanose. Empirisch bewährt auch bei Keuchhustenanfällen, Harnträufeln, spastischer Obstipation, chronischen Ekzemen und Angstzuständen jeder Art, Platzangst (auch bei Kindern). Zur Anregung der Histaminentgiftung bei sonstigen Imprägnationsphasen.

• **ATP-INJEEL UND FORTE**
siehe Adenosintriphosphat(ATP)-Injeel und forte.

• **AURUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14703.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aurum metallicum Dil. D12, Aurum metallicum Dil. D30, Aurum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchloid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aurum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aurum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhauteiterungen. Knochen- und Knochenhautentzündungen. Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Angina pectoris. Verhärtung drüsiger Organe. Depressive Verstimmungszustände.

• **AURUM COLLOIDALE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aurum colloidale D6, Aurum colloidale D12, Aurum colloidale D30, Aurum colloidale D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aurum colloidale entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhauteiterungen. Knochen- und Knochenhautentzündungen. Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Angina pectoris. Verhärtung drüsiger Organe. Depressive Verstimmungszustände.

• **AURUM JODATUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14410.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aurum iodatum Dil. D12, Aurum iodatum Dil. D30, Aurum iodatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aurum jodatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aurum jodatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bluthochdruck; Beschwerden bei Schlagaderverkalkung; Verhärtung drüsiger Organe.

• **AVENA SATIVA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14327.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Avena sativa Dil. D3, Avena sativa Dil. D8, Avena sativa Dil. D12, Avena sativa Dil. D30, Avena sativa Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Avena sativa-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Avena sativa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erschöpfungszustände; Schlafstörungen; bei Überforderung nach Krankheiten.

- **BACILLINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacillinum-Nosode D20, Bacillinum-Nosode D30, Bacillinum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BACILLINUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacillinum-Nosode D15, Bacillinum-Nosode D20, Bacillinum-Nosode D30, Bacillinum-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Tuberculinum BURNETT Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege. Hautkrankheiten. Kopfschmerzen. Schwächezustände.

- **BACTERIUM COLI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacterium coli-Nosode D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BACTERIUM COLI-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacterium coli-Nosode D6, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Müdigkeit. Körperliche und geistige Erschöpfbarkeit. Anwendung falscher Worte. Gedächtnisverlust für letzte Ereignisse. Furchtsamkeit und Unentschlossenheit, häufig verbunden mit Meteorismus. Frösteln nach dem Essen. Zunge weiß-gelblich belegt mit rotem Strich in der Mitte. Auch bei Urintenesmen und trübem, übelriechendem Urin. Verschlimmerung durch feuchte Kälte. O. Julian weist auf gute Wirkungen bei Salpingitis (zu interponieren bei chronischer

Adnexitis), Zystitis, Nierensteinen, Cholangitis und depressiven Psychosen hin. Besonders indiziert nach Therapie mit Antibiotika, die ja bekanntlich die physiologische Coli-Flora im Darm mehr oder minder schädigen (Darm-Dysbiose) und bei sonstigen Antibiotikaschäden.

• BACTERIUM LACTIS AEROGENES-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacterium lactis aerogenes-Nosode D12, Bacterium lactis aerogenes-Nosode D30, Bacterium lactis aerogenes-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nach Schädigungen der Darmflora durch Antibiotika. Ferner als Nebenmittel bei Avitaminosen und bei Pankreatitis, Ernährungsstörungen der Säuglinge, Ulcus duodeni, Anazidität, Diabetes mellitus sowie bei Lymphatismus. Das Präparat wirkt besonders gut bei hageren Patienten und beim K-Typ (starke Kälteempfindlichkeit!) nach Curry.

• BACTERIUM PROTEUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacterium proteus-Nosode D12, Bacterium proteus-Nosode D30, Bacterium proteus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Gastroenteritiden, insbesondere Säuglingsdiarrhöen. Peritonitis; Zystopyelitis; (Puerperal)Sepsis; Otitis; gangränöse Lungenprozesse. Osteomyelitis. Nach Schädigung der Darmflora durch Antibiotika-Chemotherapeutika. Allgemeine Abwehrschwäche. Periphere Zirkulationsstörungen, z.B. Claudicatio intermittens. Ulcus ventriculi et duodeni. Hämatemesis. Angioneurotische Ödeme. Charakterstörungen bei Kindern. Empirisch bewährt bei nervöser Reizbarkeit (heftige Zornanfälle, wirft mit Gegenständen, cholerische Kinder stoßen mit den Füßen). Schwindel. Herpes (O. Julian).

• BACTERIUM PYOCYANEUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacterium pyocyaneus-Nosode D12, Bacterium pyocyaneus-Nosode D30, Bacterium pyocyaneus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Symptome bzw. (Spät-)Folgen nach folgenden Krankheiten: Entzündungen der Gallen- und Harnwege, Otitis media und externa, Hautgangrän (Ecthyma gangraenosum),Puerperalsepsis. Hyperhidrosis. Imprägnationsphasen nach retoxisch gehemmten Schweißabsonderungen. Nach Missbrauch von Abführmitteln und bei Angina tonsillaris.

• BAPTISIA-INJEEL S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17406.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Baptisia tinctoria Dil. D12 (HAB, Vorschr. 3a), Baptisia tinctoria Dil. D30 (HAB, Vorschr. 3a), Baptisia tinctoria Dil. D200 (HAB, Vorschr. 3a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a)
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Baptisia tinctoria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwere, fiebrige Infektionen. Allgemeine Blutvergiftung. Verwirrtheitszustände.

• **BARYUM CARBONICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14693.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium carbonicum Dil. D6, Barium carbonicum Dil. D12, Barium carbonicum Dil. D30, Barium carbonicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Baryum carbonicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Barium carbonicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entwicklungsverzögerung bei Kindern. Chronische Entzündung der Mandeln und der oberen Atemwege. Bluthochdruck. Gefäßverkalkung.

• **BARYUM OXALSUCCINICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium oxalsuccinicum D10, Barium oxalsuccinicum D30, Barium oxalsuccinicum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **BARYUM OXALSUCCINICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium oxalsuccinicum D6, Barium oxalsuccinicum D10, Barium oxalsuccinicum D30, Barium oxalsuccinicum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Indiziert bei regulativen Störungen des endokrinen Systems, besonders auch in der Pubertät und im Klimakterium. Ferner: Chronische Katarrhe und Asthma mit großer Dyspnoe. Bei allen Ohrenerkrankungen im Kindesalter sowie bei herabgesetztem Geruchsvermögen (Hyposmie, Anosmie). Blutandrang zum Kopf. Status nach Apoplexie. Sehschwäche, Kurzsichtigkeit schon im Kindesalter, Schielen. Augenmuskellähmungen nach Infektionskrankheiten. Entzündliche Erkrankungen der Augenlider. Durchblutungsstörungen der Extremitäten.

• **BELLADONNA-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17314.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Atropa bella-donna Dil. D12, Atropa bella-donna Dil. D30, Atropa bella-donna Dil. D200, Atropa bella-donna Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **BELLADONNA-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17314.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Atropa bella-donna Dil. D4, Atropa bella-donna Dil. D12, Atropa bella-donna Dil. D30, Atropa bella-donna Dil. D200, Atropa bella-donna Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Atropa belladonna entsprechen dem homöopathischen Arzneimittel-

B

bild. Dazu gehören: Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.

• **BELLIS PERENNIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14687.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bellis perennis Dil. D12, Bellis perennis Dil. D30, Bellis perennis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Bellis perennis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Bellis perennis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Blutungen, Blutergüsse. Muskelschmerzen, besonders nach Verletzungen und Überanstrengungen. Rheumatismus. Hauterkrankungen, auch mit Eiterungen.

• **PARA-BENZOCHINON-INJEEL UND FORTE**

siehe Para-Benzochinon-Injeel und forte

• **BERBERIS AQUIFOLIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119504.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mahonia aquifolium Dil. D10, Mahonia aquifolium Dil. D30, Mahonia aquifolium Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Mahonia aquifolium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Trockene Hautausschläge. Leber- und Gallenleiden.

• **BERBERIS VULGARIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19315.00.00

Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis vulgaris Dil. D12, Berberis vulgaris Dil. D30, Berberis vulgaris Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **BERBERIS VULGARIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19315.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis vulgaris Dil. D4, Berberis vulgaris Dil. D6, Berberis vulgaris Dil. D12, Berberis vulgaris Dil. D30, Berberis vulgaris Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Berberis vulgaris entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nierenerkrankungen und Harnwegserkrankungen, insbesondere Nierensteinleiden. Gicht. Rheumatismus. Erkrankungen der Leber und Gallenblase. Trockene Hauterkrankungen. Fisteln.

• **BISMUTUM SUBNITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bismutum subnitricum D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Bismutum subnitricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Geschwürige Entzündungen der Mundhöhle und des Zahnfleisches. Organische und nervöse Magenerkrankungen. Akute Durchfälle.

- **BORAX-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14357.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium tetraboracicum Dil. D8, Natrium tetraboracicum Dil. D12, Natrium tetraboracicum Dil. D30, Natrium tetraboracicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Borax-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Natrium tetraboracicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erkrankungen der Mundschleimhaut. Hauterkrankungen. Akne vulgaris. Ekzeme und Schuppenflechte. Nierensteinleiden. Ausfluss. Milchfluss. Schmerzen der Brustdrüse. Nervöse Überempfindlichkeit bei Kindern. Schwindel bei Abwärtsbewegungen.

- **BRONCHUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bronchus suis D10, Bronchus suis D30, Bronchus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BRONCHUS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bronchus suis D8, Bronchus suis D12, Bronchus suis D30, Bronchus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Emphysem, Asthma bronchiale. Chronische Bronchitis. Stauungen im kleinen Kreislauf.

- **BRYONIA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17312.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia cretica Dil. D12, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BRYONIA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17312.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Dil. D4, Bryonia Dil. D12, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Bryonia cretica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells, des Bauchfells, der Leber; akuter und chronischer Rheumatismus.

• **BUFO-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bufo D15, Bufo D30, Bufo D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Bufo bufo, Bufo, Bufo rana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gehirnstörungen mit Verhaltensänderung. Krämpfe und zerebrales Anfallsleiden. Haut- und Drüsenentzündung mit Eiterungsneigung. Nervöse Herzbeschwerden.

• **CACTUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15231.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenicereus grandiflorus Dil. D12, Selenicereus grandiflorus Dil. D30, Selenicereus grandiflorus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cactus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Selenicereus grandiflorus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krämpfe der Muskulatur, der Gefäße, der Hohlorgane. Schleimhautblutungen. Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.

• **CADMIUM SULFURICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cadmium sulfuricum D12, Cadmium sulfuricum D30, Cadmium sulfuricum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Bei eingeschränkter Nierenfunktion Cadmium sulfuricum nur auf ärztliche Empfehlung verabreichen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cadmium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gesichtslähmung. Hornhauttrübung. Nasenpolypen. Akute und chronische Entzündung des Magen-Darm-Kanals. Schwächezustände.

• **CALCIUM BROMATUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6056584.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium bromatum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), Calcium bromatum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Calcium bromatum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium bromatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervosität bei Kindern.

• **CALCIUM CARBONICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14412.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium carbonicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CALCIUM CARBONICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14412.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D6, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium carbonicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium carbonicum Hahnemanni entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.

• CALCIUM FLUORATUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14416.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium fluoratum Dil. D12, Calcium fluoratum Dil. D30, Calcium fluoratum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium fluoratum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CALCIUM FLUORATUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14416.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium fluoratum Dil. D6, Calcium fluoratum Dil. D12, Calcium fluoratum Dil. D30, Calcium fluoratum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium fluoratum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindernist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan,intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium fluoratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der oberen Luftwege und des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.

- **CALCIUM PHOSPHORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14361.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium phosphoricum Dil. D12, Calcium phosphoricum Dil. D30, Calcium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium phosphoricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CALCIUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14361.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium phosphoricum Dil. D6, Calcium phosphoricum Dil. D12, Calcium phosphoricum Dil. D30, Calcium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium phosphoricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Appetitstörungen. Kalkmangelzustände. Wirbelsäulenerkrankungen.

- **CALCIUM SULFURICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14363.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium sulfuricum Dil. D6, Calcium sulfuricum Dil. D12, Calcium sulfuricum Dil. D30, Calcium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium sulfuricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Eiterung der Haut und Unterhaut mit Fistelneigung. Chronische Schleimhauteiterung.

• **CALCULI BILI-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calculi bili-Nosode D10, Calculi bili-Nosode D30, Calculi bili-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calculi biliarii-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gallensteinleiden.

• **CALCULI RENALES-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calculi renales-Nosode D10, Calculi renales-Nosode D30, Calculi renales-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nephrolithiasis. Zystopyelitis. Pyelonephritis. Prostataleiden.

• **CALENDULA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14549.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calendula officinalis Dil. D4, Calendula officinalis Dil. D12, Calendula officinalis Dil. D30, Calendula officinalis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calendula-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calendula officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden. Quetsch-, Riss- und Defektwunden. Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.

• **CAMP D8; D12; D30** als Einzelpotenzen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adenosin-3‘,5‘-cyclophosphorsäure Dil. D8 1,1 ml (HAB, Vorschrift 5a) / Dil. D12 / Dil. D30 1,1 ml (HAB, Vorschrift 5a, 11)
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur stimulativen Reaktivierung bei Fermentblockaden (Zellmembranfermente wie Adenylat-Zyklase) bei zellulären Phasen sowie zur stimulativen Aktivierung von Enzymsystemen.

• **CANTHARIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14593.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lytta vesicatoria Dil. D12, Lytta vesicatoria Dil. D30, Lytta vesicatoria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cantharis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lytta vesicatoria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündungen der Schleimhäute, des Harn- und Geschlechtsapparates, des Magen-Darm-Kanals, der Haut mit Blasenbildung. Ergüsse in Körperhöhlen.

• CARBO VEGETABILIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14551.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo vegetabilis Dil. D12, Carbo vegetabilis Dil. D30, Carbo vegetabilis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Carbo vegetabilis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CARBO VEGETABILIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14551.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo vegetabilis Dil. D6, Carbo vegetabilis Dil. D12, Carbo vegetabilis Dil. D30, Carbo vegetabilis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Carbo vegetabilis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Carbo vegetabilis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfaderleiden. Entzündung der Atemwege. Heiserkeit. Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht. Schleimhautblutung. Herz- und Kreislaufschwäche.

• CARCINOMA BRONCHIUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma bronchium-Nosode D10, Carcinoma bronchium-Nosode D30, Carcinoma bronchium-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden/zusätzlichen Therapie bei Bronchialkarzinom (besonders postoperativ). Chronische Bronchitis und Raucherkatarrhe.

- **CARCINOMA COLI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma coli-Nosode D10, Carcinoma coli-Nosode D30, Carcinoma coli-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden/zusätzlichen Therapie bei Dickdarmkarzinom (auch und besonders postoperativ, z.B. bei Anus-praeter-Trägern). Sigmoiditis, Colitis mucosa et ulcerosa.

- **CARCINOMA HEPATIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma hepatis-Nosode D10, Carcinoma hepatis-Nosode D30, Carcinoma hepatis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden/zusätzlichen Therapie bei primären Lebertumoren (besonders auch postoperativ) sowie auch bei Lebermetastasen.

- **CARCINOMA HEPATIS METASTATIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma hepatis metastatis-Nosode D10, Carcinoma hepatis metastatis-Nosode D30, DCarcinoma hepatis metastatis-Nosode 200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden/zusätzlichen Therapie bei meist nicht mehr operativ angehbaren Lebermetastasen. Ferner bei Leberschäden und Präkanzerose der Leber sowie als Zwischeninjektion bei Imprägnations- und Degenerationsphasen verschiedener Art, auch bei Frühfällen von Karzinomen mit Tendenz zur metastatischen Ausbreitung.

- **CARCINOMA LARYNGIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma laryngis-Nosode D10, Carcinoma laryngis-Nosode D30, Carcinoma laryngis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden/zusätzlichen Therapie bei Kehlkopfkarzinom (auch und besonders postoperativ sowie nach Bestrahlung). Langwierige Heiserkeit ohne organischen Befund. Laryngitis der Redner und Sänger.

• **CARCINOMA MAMMAE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma mammae-Nosode D10, Carcinoma mammae-Nosode D30, Carcinoma mammae-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden bzw. zusätzlichen Therapie bei Mammakarzinom (auch und besonders postoperativ sowie nach Bestrahlung). Ferner bei Mastopathia chronica cystica, Mastitis cystica, Zystenmamma, (zystischer) diffuser Mamma-Fibromatose, „Schrotkugelbrust“.

• **CARCINOMA UTERI-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma uteri-Nosode D10, Carcinoma uteri-Nosode D30, Carcinoma uteri-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden bzw. zusätzlichen Therapie bei Uteruskarzinom (auch und besonders postoperativ sowie nach Bestrahlung, Radiumeinlagen usw.). Auch bei Uterusmyomen/ Uterus myomatosus angezeigt.

• **CARDIA VENTRICULI SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cardia ventriculi suis D10, Cardia ventriculi suis D30, Cardia ventriculi suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Kardiospasmus. Sodbrennen. Singultus. Chronische Gastritis. Ulkusdiathese.

• **CARDUUS MARIANUS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14583.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Silybum marianum Dil. D4, Silybum marianum Dil. D12, Silybum marianum Dil. D30, Silybum marianum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Carduus marianus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Silybum marianum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Leber-Galle-Erkrankungen. Hämorrhoiden und Krampfleiden. Rheumatismus der Schulter, der Hüfte.

• **CARTILAGO SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cartilago suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal pro Woche den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CARTILAGO SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cartilago suis D8, Cartilago suis D12, Cartilago suis D30, Cartilago suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cartilago entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Begleittherapie bei Gelenkerkrankungen.

- **CAULOPHYLLUM THALICTROIDES-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119538.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Caulophyllum thalictroides (HAB 34) Dil. D12 (HAB, Vorschrift 3a), Caulophyllum thalictroides (HAB 34) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 3a), Caulophyllum thalictroides (HAB 34) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Caulophyllum thalictroides entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Menstruations-, Gebärmutter- und Geburtsstörungen. Rheumatismus der Finger- und Zehengelenke.

- **CAUSTICUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17412.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D12 (HAB, Vorschr. 5a), Causticum Hahnemanni Dil. D30 (HAB, Vorschr. 5a) Causticum Hahnemanni Dil. D200 (HAB, Vorschr. 5a) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CAUSTICUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17412.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D4 (HAB, Vorschr. 5a), Causticum Hahnemanni Dil. D12 (HAB, Vorschr. 5a), Causticum Hahnemanni Dil. D30 (HAB, Vorschr. 5a), Causticum Hahnemanni Dil. D200 (HAB, Vorschr. 5a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Causticum hahnemanni entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erkrankungen der Atemwege, der Harnwege. Chronische Ekzeme. Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Krampfleiden. Lähmungen. Verstimmungszustände.

- **CEANOTHUS AMERICANUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ceanothus americanus D8, Ceanothus americanus D12, Ceanothus americanus D30, Ceanothus americanus D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ceanothus americanus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Milzvergrößerung.

• **CEPA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cepa D4, Cepa D12, Cepa D30, Cepa D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Allium cepa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fließschnupfen. Entzündungen der Atemwege. Blähungskoliken. Nervenschmerzen.

• **CEREBELLUM SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebellum suis D10, Cerebellum suis D30, Cerebellum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CEREBELLUM SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebellum suis D8, Cerebellum suis D12, Cerebellum suis D30, Cerebellum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Kinetosen. Menièresches Syndrom. Schwindel. Hyperemesis gravidarum. Schlaflosigkeit.

• **CEREBRUM FRONTALIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum frontalis suis D10, Cerebrum frontalis suis D30, Cerebrum frontalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CEREBRUM FRONTALIS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum frontalis suis D8, Cerebrum frontalis suis D12, Cerebrum frontalis suis D30, Cerebrum frontalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Intelligenz und des Denkvermögens. Entwicklungsstörungen der Kinder.

• **CEREBRUM OCCIPITALIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum occipitalis suis D10, Cerebrum occipitalis suis D30, Cerebrum occipitalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CEREBRUM OCCIPITALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum occipitalis suis D8, Cerebrum occipitalis suis D12, Cerebrum occipitalis suis D30, Cerebrum occipitalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schwindel. Zentral bedingte Sehstörungen.

- **CEREBRUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CEREBRUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum suis D8, Cerebrum suis D12, Cerebrum suis D30, Cerebrum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Geistige Erschöpfungszustände und Entwicklungsstörungen. Funktionsschwäche und Durchblutungsstörungen des Gehirns. Progressive Paralyse (Nachbehandlung). Paraplegie. Arteriosklerotische Demenz. Enzephalo malazie.

- **CEREBRUM TOTALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum totalis suis D10, Cerebrum totalis suis D30, Cerebrum totalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CEREBRUM TOTALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum totalis suis D8, Cerebrum totalis suis D12, Cerebrum totalis suis D30, Cerebrum totalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Indikationen wie Cerebrum suis (Großhirn) und Cerebrum frontalis suis (vordere Hirnabschnitte; Stirnhirn).

• **CHAMOMILLA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14573.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chamomilla recutita Dil. D12, Chamomilla recutita Dil. D30, Chamomilla recutita Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Chamomilla-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Chamomilla recutita entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemorgane.

Zahnungsbeschwerden. Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane, der weiblichen Geschlechtsorgane. Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.

• **CHELIDONIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14587.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium majus Dil. D12, Chelidonium majus Dil. D30, Chelidonium majus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Chelidonium-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CHELIDONIUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14587.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium majus Dil. D4, Chelidonium majus Dil. D12, Chelidonium majus Dil. D30, Chelidonium majus Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Bei bestehenden Lebererkrankungen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Chelidonium-Injeel forte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Das Arzneimittel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrung vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungüstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen sind während der Behandlung mit Schöllkrautpräparaten Anstiege der Leber-Transaminasen und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentöse-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildete.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Falle sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihren Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Bei der Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte kontrolliert werden Chelidonium-Injeel forte sollte ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Chelidonium majus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems. Entzündung der Atemorgane und des Rippenfelles. Rheumatismus.

• **CHINA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17310.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinchona pubescens Dil. D12, Cinchona pubescens Dil. D30, Cinchona pubescens Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a)

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CHINA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17310.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinchona pubescens Dil. D4, Cinchona pubescens Dil. D6, Cinchona pubescens Dil. D12, Cinchona pubescens Dil. D30, Cin-chona pubescens Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Chininüberempfindlichkeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cinchona succirubra entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberanfälle. Allgemeine Blutvergiftung. Entzündungen der Atemwege. Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Schleimhautblutungen. Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag. Nervenschmerzen.

• **CHINHYDRON-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chinhydron D12, Chinhydron D30, Chinhydron D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CHINHYDRON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chinhydron D8, Chinhydron D12, Chinhydron D30, Chinhydron D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

(intermediärer Katalysator, Gruppe B)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Alle zellulären Phasen, auch Neoplasmaphasen und Viruskrankheiten.

• **CHLORAMPHENICOL-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chloramphenicol D12, Chloramphenicol D30, Chloramphenicol D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

(homöopathisiertes Allopathikum)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schädigung der Darmflora (Avitaminosen) durch Antibiotika und Chemotherapeutika. Sonstige Therapieschäden. Agranulozytose u.a.

• **CHLORUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chlorum D10, Chlorum D30, Chlorum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Chlorum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Kehlkopfentzündung.

• **CHOLESTERINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14575.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cholesterolum Dil. D12, Cholesterolum Dil. D30, Cholesterolum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cholesterinum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CHOLESTERINUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14575.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cholesterolum Dil. D6, Cholesterolum Dil. D12, Cholesterolum Dil. D30, Cholesterolum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cholesterinum-Injeel fortein der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cholesterinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Lebererkrankungen und Vermehrung von Cholesterin im Blut.

- **CIMICIFUGA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17300.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga racemosa Dil. D12, Cimicifuga racemosa Dil. D30, Cimicifuga racemosa Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

- **CIMICIFUGA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17300.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga racemosa Dil. D4, Cimicifuga racemosa Dil. D12, Cimicifuga racemosa Dil. D30, Cimicifuga racemosa Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cimicifuga racemosa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatischer und wirbelsäulenbedingter Muskelschmerz. Krampfschmerz des Herzens, des Magen-Darm-Kanals, der Gallenblase und im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Regel-, Schwangerschaft- und Wechseljahrbeschwerden. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.

- **CINA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cina D12, Cina D30, Cina D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Artemisia cina entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberanfälle. Wurmbeschwerden. Krampfneigung. Stimmungsänderung bei Kindern.

- **CINNABARIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14508.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D12, Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D30, Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cinnabaris-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hydrargyrum sulfuratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Eitrige Bindehaut- und Nasennebenhöhlenentzündung. Harnröhren- und Vorhautentzündung. Warzen.

• CINNAMOMUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14739.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinnamomum verum Dil. D12, Cinnamomum verum Dil. D30, Cinnamomum verum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cinnamomum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cinnamomum zeylanicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervöse Störungen. Gebärmutterblutung.

• CIRRHOSIS HEPATIS-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cirrhosis hepatis-Nosode D12, Cirrhosis hepatis-Nosode D30, Cirrhosis hepatis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schwere Funktionsstörungen der Leber, insbesondere (Tendenz/Neigung zu) Leberzirrhose mit den entsprechenden Symptomen wie Müdigkeit, Übelkeit, Fettunverträglichkeit, Flatulenz, Meteorismus, Aszites, Ösophagusvarizen, Hämorrhoiden.

• CISTUS CANADENSIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cistus canadensis D12, Cistus canadensis D30, Cistus canadensis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Helianthemum canadense entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Juckende Hautflechte. Entzündung der Lymphdrüsen. Entzündung der Brustdrüse. Erkrankung der Atemwege.

• **COCCULUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14504.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anamirta cocculus Dil. D6, Anamirta cocculus Dil. D12, Anamirta cocculus Dil. D30, Anamirta cocculus Dil. D200, Anamirta cocculus Dil.D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cocculus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Anamirta cocculus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Reise-Krankheit, -Übelkeit. Verkalkung der Hirngefäße. Hinterhauptkopfschmerz. Krämpfe und Lähmungen. Regelstörungen. Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.

• **COCCUS CACTI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119589.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Dactylopius coccus Dil. D12, Dactylopius coccus Dil. D30, Dactylopius coccus Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Dactylopius coccus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen des Nasen-Rachen-Raumes, der Atemwege. Gebärmutterblutungen. Nieren- und Nierensteinleiden.

• **COECUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coecum suis D10, Coecum suis D30, Coecum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

(Suis-Organpräparat)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Darmexkretion. Chronische Obstipation. Allgemeine Giftüberlastung. Wirkt anregend auf Entgiftungs- und Ausscheidungsvorgänge.

• **COFFEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14555.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coffea arabica Dil. D12, Coffea arabica Dil. D30, Coffea arabica Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Coffea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Coffea arabica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schlafstörungen. Neuralgien.

• **COLCHICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14510.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum autumnale Dil. D12, Colchicum autumnale Dil. D30, Colchicum autumnale Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Colchicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **COLCHICUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14510.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum autumnale Dil. D6, Colchicum autumnale Dil. D12, Colchicum autumnale Dil. D30, Colchicum autumnale Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Colchicum-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Colchicum autumnale entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.

• **COLIBACILLINUM-INJEEL UND FORTE**

siehe Bacterium coli-Injeel und forte

• **COLOCYNTHIS-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17410.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Citrullus colocynthis Dil. D12 (HAB, Vorschr. 4a), Citrullus colocynthis Dil. D30 (HAB, Vorschr. 4a), Citrullus colocynthis Dil. D200 (HAB, Vorschr. 4a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **COLOCYNTHIS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17410.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Citrullus colocynthis Dil. D4 (HAB, Vorschr. 4a), Citrullus colocynthis Dil. D12 (HAB, Vorschr. 4a), Citrullus colocynthis Dil. D30 (HAB,Vorschr. 4a), Citrullus colocynthis Dil. D200 (HAB, Vorschr. 4a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Citrullus colocynthis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane. Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.

• **COLON SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colon suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COLON SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colon suis D8, Colon suis D12, Colon suis D30, Colon suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnliche Wirkungen wie Coecum suis, jedoch kräftiger. Auch bei Enterospasmen (Flexura lienalis, Sigmoid). Nabelkoliken, Darmtenesmen, Darmatonie (spastisch-atonische Obstipation!) sowie bei Colitis mucosa et ulcerosa. Insomnie. Ist als Zwischenmittel oder zu Beginn der Kur bei allen schweren Giftlagen indiziert.

- **CONIUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17408.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium maculatum Dil. D12 (HAB, Vorschr. 2a), Conium maculatum Dil. D30 (HAB, Vorschr. 2a), Conium maculatum Dil. D200 (HAB, Vorschr. 2a) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CONIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17408.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium maculatum Dil. D4, Conium maculatum Dil. D12, Conium maculatum Dil. D30, Conium maculatum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Conium maculatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verkalkungen der Hirngefäße. Lähmung und Lähmigkeit. Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.

- **COR SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cor suis D10, Cor suis D30, Cor suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COR SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cor suis D8, Cor suis D12, Cor suis D30, Cor suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hypotonie. Angina pectoris. Koronardurchblutungsstörungen. Herzinsuffizienz. Sportherz. Paroxys male Tachykardie. Nachbehandlung post infarctum.

- **CORNEA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cornea suis D10, Cornea suis D30, Cornea suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CORNEA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cornea suis D8, Cornea suis D12, Cornea suis D30, Cornea suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hornhauttrübungen. Astigmatismus. Chronische Hornhautulzera und chronische Konjunktivitiden.

- **CORPUS LUTEUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus luteum suis D10, Corpus luteum suis D30, Corpus luteum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CORPUS LUTEUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus luteum suis D8, Corpus luteum suis D12, Corpus luteum suis D30, Corpus luteum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen des weiblichen Hormonhaushaltes. Frühzeitiges Altern. Klimakterium. Störungen im Ablauf der Schwangerschaft.

- **CORPUS PINEALE SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus pineale suis D10, Corpus pineale suis D30, Corpus pineale suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CORPUS PINEALE SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus pineale suis D8, Corpus pineale suis D12, Corpus pineale suis D30, Corpus pineale suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Wirkt bremsend auf Neoplasmaphasen. Papillome der Blase. Asthma bronchiale. Versuchsweise auch bei epileptiformen Zuständen und Degenerationsphasen allgemeiner Art als Neben- und Zwischenmittel sowie bei Chorea minor.

• **CORPUS VITREUM SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus vitreum suis D10, Corpus vitreum suis D30, Corpus vitreum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden

• **CORPUS VITREUM SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus vitreum suis D8, Corpus vitreum suis D12, Corpus vitreum suis D30, Corpus vitreum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Glaskörpertrübungen. Glaukom. Katarakta.

• **CORTISON-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13856.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cortisonacetat Dil. D12 HAB, Vorschr. 8a, Cortisonacetat Dil. D30 HAB, Vorschr. 8a, Cortisonacetat Dil. D200 HAB, Vorschr. 8a jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CORTISON-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13856.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cortisonacetat Dil. D6 HAB, Vorschr. 6 u. 11, Cortisonacetat Dil. D12 HAB, Vorschr. 8a, Cortisonacetat Dil. D30 HAB, Vorschr. 8a, Cortisonacetat Dil. D200 HAB, Vorschr. 8a jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Folgen von Cortisonmissbrauch und anderen Cortison-Therapieschäden. Schädigungen der NNR, der Hypophyse, besonders des Hyophysenvorderlappens (Simmonds-Kachexie bzw. Simmonds-Sheehan-Syndrom, Dystrophia adiposogenitalis). Bindegewebsschwäche bzw. Bindegewebsschäden, z.B. Osteoporose, Osteo malazie, Osteochondrose, Bänderschwäche mit Umknicken der Gelenke, Sudecksche Atrophie und andere am Bindegwebe manifest werdende Erkrankungen.

• **COXSACKIE-VIRUS-A_9-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie-Virus A_9-Nosode D15, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **COXSACKIE-VIRUS-A_9-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie-Virus A_9-Nosode D10, D15, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COXSACKIE-VIRUS-A_9 D8** als Einzelpotenz

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie-Virus A_9-Nosode Dil. D8 1,1 ml (HAB, Vorschrift 44, 11)
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Magen-Darm-Affektionen wie Gastritis, Duodenitis, besonders aber Colitis mucosa et ulcerosa (opti mal ist die Lokalinjektion in den zwanzigsten Dickdarmpunkt, der in der Nasolabialfalte liegt), Colon irritabile, chronisch-rezidivierende Darminfekte. Ferner Affektionen der ableitenden Harnwege wie Zystopyelitis, Urethritis, Reizblase, Prostatitis sowie Epididymitis, Konjunktivitis, (Poly)Sinusitiden, Rhinitis, Laryngitis, Sinubronchiales Syndrom, Asthma bronchiale. Herzaffektionen (Tachykardie, Tachyarrhythmie, Extrasystolie, Angina pectoris); ggf. mit konsekutiver Atemnot und Zyanose.

- **COXSACKIE-VIRUS-B_4-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie Virus B_4-Nosode D15, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COXSACKIE-VIRUS-B_4-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie Virus B_4-Nosode D10, D15, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bei den Folgezuständen von „zentralen" Affektionen, z.B. bei Zuständen nach Meningitis bzw. Meningismus, nach Enzephalitis und den entsprechenden psychischen Symptomen u.a. auch Depressionen, Erschöpfungszustände, Konzentrationsschwäche, pathologische Ermüdbarkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen u.a.

- **CRATAEGUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14737.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D12, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Crataegus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CRATAEGUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14737.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D4, Crataegus Dil. D12, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Crataegus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Crataegus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

- **CRINIS HUMANUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crinis humanus-Nosode D10, Crinis humanus-Nosode D30, Crinis humanus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Alopezie. Vorzeitiges Ergrauen der Haare (Canities praematura).

- **CROTALUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crotalus D12, Crotalus D30, Crotalus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Crotalus horridus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwere Infektionen der Haut, der Schleimhäute. Neigung zu allgemeiner Blutvergiftung. Blutungen aller Art. Lähmungen.

- **CUPRUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14695.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cuprum metallicum Dil. D12, Cuprum metallicum Dil. D30, Cuprum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cuprum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CUPRUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14695.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cuprum metallicum Dil. D6, Cuprum metallicum Dil. D12, Cuprum metallicum Dil. D30, Cuprum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cuprum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cuprum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Cerebrales Anfallsleiden. Muskelkrämpfe. Krämpfe der glatten Muskulatur, des Magen-Darm-Kanals, der Atemorgane, der Gefäße, der Herzkranzgefäße. Kreislaufversagen.

- **CUPRUM ACETICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14760.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cuprum aceticum Dil. D6, Cuprum aceticum Dil. D12, Cuprum aceticum Dil. D30, Cuprum aceticum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cuprum aceticum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cuprum aceticum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erkrankungen mit Krampfneigung wie cerebrales Anfallsleiden, Wadenkrämpfe, Asthma, Keuchhusten, Angina pectoris.

- **CURARE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Curare D12, Curare D30, Curare D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Curare entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Lähmungen. Lähmigkeiten. Krämpfe.

- **CUTIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cutis suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CUTIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cutis suis D8, Cutis suis D12, Cutis suis D30, Cutis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Allergische Reaktionen. Dermatosen. Ekzem. Seborrhö. Pemphigus. Rhagaden. Psoriasis. Dekubitus. Dermatomykosen. Elephantiasis. Sklerodermie. Nach Verbrennungen (auch Röntgenstrahlen). Neurodermitis. Störungen der Nierenexkretion (Ableitung auf der Haut!), Hyperhidrosis u.a.

- **CYNARA SCOLYMUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cynara scolymus D10, Cynara scolymus D30, Cynara scolymus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cynara scolymus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Leber-Galle-Störungen.

- **CYSTEIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121052.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cysteinum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), Cysteinum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Cysteinum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Retoxische Störungen und Therapieschäden jeder Art und Lokalisation. Zu interponieren bei allen zellulären Phasen, speziell bei Leberschäden verschiedener Art, Asthma bronchiale, Leukämie, Präkanzerosen und Neoplasmaphasen.

- **CYSTOPYELONEPHRITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cystopyelonephritis-Nosode D12, Cystopyelonephritis-Nosode D30, Cystopyelonephritis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CYSTOPYELONEPHRITIS-NOSODE-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cystopyelonephritis-Nosode D8, Cystopyelonephritis-Nosode D12, Cystopyelonephritis-Nosode D30, Cystopyelonephritis-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronisch-rezidivierende Entzündungen und Folgezustände im Bereich der ableitenden Harnwege einschließlich des Nierenparenchyms („interstitielle“ Nephritis, „Phenacetin-Niere“, Papillennekrosen).

- **DAMIANA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14986.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Turnera diffusa Dil. D4, Turnera diffusa Dil. D12, Turnera diffusa Dil. D30, Turnera diffusa Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Damiana-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Turnera diffusa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Sexuelle Schwäche. Regelstörungen.

- **DENS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Dens suis D10, Dens suis D30, Dens suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Parodontose. Parodontitis. Karies. Zahnentwicklungsstörungen. Apikale Foki. Fokalerkrankungen.

- **DIGITALIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14988.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Digitalis purpurea Dil. D6, Digitalis purpurea Dil. D12, Digitalis purpurea Dil. D30, Digitalis purpurea Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Digitalis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Digitalis purpurea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herzschwäche. Migräne.

- **DISCUS INTERVERTEB5RALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Discus intervertebralis suis D10, Discus intervertebralis suis D30, Discus intervertebralis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel

absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **DISCUS INTERVERTEBRALIS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Discus intervertebralis suis D8, Discus intervertebralis suis D12, Discus intervertebralis suis D30, Discus intervertebralis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Discus intervertebralis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Begleittherapie bei Bandscheibenschäden.

• **DIVERTICULOSE-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Diverticulose-Nosode D12, Diverticulose-Nosode D30, Diverticulose-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Symptome bei Divertikulose im Bereich des Verdauungstraktes wie beispielsweise Schluckbeschwerden (Dysphgie), Regurgitieren, „Vogelkropf-Symptomatik“ (Oesophagusdivertikel), Stuhlunregelmäßigkeiten (Wechsel von Obstipation und Diarrhö), Kolikschmerzen; ferner peritonitische Symptome. Symptome bei Blasendivertikel wie Strangurie, „unerklärbare“ bakteriurische Schübe, ggf. mit Fieber und Schüttelfrost.

• **DOLICHOS PRURIENS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6057431.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucuna pruriens Dil. D10, Mucuna pruriens Dil. D30, Mucuna pruriens Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Mucuna pruriens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Juckreiz bei Leberstörungen.

• **DOXYCYCLIN-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Doxycyclin D10, Doxycyclin D30, Doxycyclin D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Therapieschäden (Fermentschäden) nach Anwendung von Doxycyclin, z.B. gastrointestinale Störungen, Haut- und Schleimhautveränderungen, schwere Leberfunktionsstörungen, schwere Nierenfunktionsstörungen, Hörschäden und zerebrale Reizerscheinungen (Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen), Lupus erythematodes.

• **DROSERA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14712.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Dil. D12, Drosera Dil. D30, Drosera Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Drosera-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **DROSERA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14712.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Dil. D4, Drosera Dil. D12, Drosera Dil. D30, Drosera Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Drosera-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Drosera entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege und besonders Keuchhusten.

- **DUCTUS AURICULARIS EXTERNUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ductus auricularis externus suis D10, Ductus auricularis externus suis D30, Ductus auricularis externus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische Ekzeme des äußeren Gehörganges. Störungen der Ohrsch malzabsonderung. Gehörgangsfurunkel. Chronische Otitis externa.

- **DUCTUS DEFERENS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ductus deferens suis D10, Ductus deferens suis D30, Ductus deferens suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Impotentia virilis. Störungen der Fertilität.

- **DULCAMARA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15528.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solanum dulcamara Dil. D12, Solanum dulcamara Dil. D30, Solanum dulcamara Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

D

• **DULCAMARA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15528.01.00

Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solanum dulcamara Dil. D4, Solanum dulcamara Dil. D12, Solanum dulcamara Dil. D30, Solanum dulcamara Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Solanum dulcamara entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberhafte Infekte. Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harnwege, der Gelenke, der Haut, ausgelöst durch Kälte und Nässe.

• **DUODENITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Duodenitis-Nosode D10, Duodenitis-Nosode D30, Duodenitis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet

a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;

b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;

c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nosodenpräparat)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ulcus duodeni und Duodenitis chronica mit Heißhunger und Nüchternschmerz; ggf. auch als Zwischenmittel bei Pankreatitis.

• **DUODENUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Duodenum suis D10, Duodenum suis D30, Duodenum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **DUODENUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Duodenum suis D8, Duodenum suis D12, Duodenum suis D30, Duodenum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

(Suis-Organpräparat)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ulcus duodeni. Ulkusdiathese. Duodenitis. Pankreatitis. Gastrokardialer Symptomenkomplex (Roemheld). Pylorospasmus.

• **ECHINACEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14710.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D12, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Echinacea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ECHINACEA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14710.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D4, Echinacea Dil. D12, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Echinacea-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Echinacea angustifolia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen.

• **EMBRYO TOTALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Embryo totalis suis D10, Embryo totalis suis D30,Embryo totalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **EMBRYO TOTALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Embryo totalis suis D8, Embryo totalis suis D12, Embryo totalis suis D30, Embryo totalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur Revitalisierung (durchblutungsfördernd und allgemein stimulativ). Generell bei zellulären Phasen, Arteriosklerose, Muskeldystrophie.

• **EPIDIDYMIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Epididymis suis D10, Epididymis suis D30, Epididymis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Fertilität und Potenz; als Nebenmittel bei Carcinoma recti.

• **EQUISETUM ARVENSE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Equisetum arvense D6, Equisetum arvense D12, Equisetum arvense D30, Equisetum arvense D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Equisetum arvense entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nieren- und Harnwegserkrankungen.

- **ERYTHROMYCIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Erythromycin D12, Erythromycin D30, Erythromycin D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Symptome und Krankheitsbilder bei Therapieschäden/Nebenwirkungen nach Erythromycin (Makrolid-Antibiotikum), wie z.B. gastrointestinale Störungen (ggf. verbunden mit Durchfällen, mit Übelkeit und Erbrechen), Leberfunktionsstörungen bzw. Leberschäden (Cholestase) nach Erythromycin, Erythromycin-Allergie (z.B. Pruritus, Urtikaria, Exantheme und andere allergische Hautreaktionen).

- **EUPATORIUM PERFOLIATUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14993.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Eupatorium perfoliatum Dil. D12, Eupatorium perfoliatum Dil. D30, Eupatorium perfoliatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Eupatorium perfoliatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Eupatorium perfoliatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Grippe, grippeähnliche fieberhafte Erkrankungen. Fieberhafte Erkrankungen des Leber-Galle-Systems. Rheumatismus.

- **EUPHORBIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14882.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphorbium Dil. D12, Euphorbium Dil. D30, Euphorbium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphorbium-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **EUPHORBIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14882.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphorbium Dil. D6, Euphorbium Dil. D12, Euphorbium Dil. D30, Euphorbium Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphorbium-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Euphorbium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündung der Haut. Entzündung der Atemwege.

- **EUPHRASIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14907.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphrasia officinalis Dil. 12, Euphrasia officinalis Dil. D30, Euphrasia officinalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphrasia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Euphrasia officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Augen. Entzündung der oberen Luftwege.

- **FAGOPYRUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14905.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fagopyrum esculentum Dil. D12, Fagopyrum esculentum Dil. D30, Fagopyrum esculentum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Fagopyrum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Fagopyrum esculentum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerzen. Haut- und Lebererkrankungen mit Juckreiz.

- **FEL SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fel suis D10, Fel suis D30, Fel suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Funktion der Leber und Galle – insbesondere betr. deren Exkretion – sowie zur allgemeinen Leberentgiftung. Dysbakterie des Darmes. Tachykardie und Arrhythmia cordis.

- **FERRUM FUMARICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum fumaricum D10, Ferrum fumaricum D30, Ferrum fumaricum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Versuchsweise bei Degenerationsphasen bzw. bei Störungen der Sauerstoffutilisation (Blockierung des Zitronensäurezyklus), z.B. bei Psoriasis, Anaemia perniciosa u. a.

- **FERRUM METALLICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14903.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D12, Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicumDil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ferrum metallicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **FERRUM METALLICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14903.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D6, Ferrum metallicum Dil. D12, Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ferrum metallicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ferrum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Blutungen. Blutarmut. Kreislaufstörungen. Verdauungsschwäche. Nervenschmerzen. Entzündung der Atemwege.

- **FERRUM PHOSPHORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121054.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Ferrum phosphoricum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 8a), Ferrum phosphoricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 8a), Ferrum phosphoricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 8a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollte Ferrum phosphoricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzten und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **FERRUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum phosphoricum D6, Ferrum phosphoricum D12, Ferrum phosphoricum D30, Ferrum phosphoricum D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ferrum phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberhafte, entzündliche Erkrankungen der Atemorgane. Blutungen und deren Folgen. Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke.

- **FERRUM SULFURICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum sulfuricum D10, Ferrum sulfuricum D30, Ferrum sulfuricum D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ferrum sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schilddrüsenüberfunktion.

- **FIBROMA PENDULUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fibroma pendulum-Nosode D10, Fibroma pendulum-Nosode D30, Fibroma pendulum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bei/nach operativ entferntem Fibroma pendulum. Allgemein zur Bindegewebsentschlackung und zur Anregung des körpereigenen Abwehr (durch Stimulierung/Aktivierung des Bindegewebes).

- **FLUOR ALBUS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fluor albus-Nosode D12, Fluor albus-Nosode D30, Fluor albus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fluor albus (besonders dysfunktioneller). Zusatzbehandlung bei Trichomonaden-Fluor, Soor-Fluor, Chlamydien-Fluor und bei entzündlichen Prozessen im weiblichen Genitale wie Vaginitis, Zervizitis, Endometritis.

- **FORMICA RUFA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14935.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Formica rufa Dil. D12, Formica rufa Dil. D30, Formica rufa Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Formica rufa-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Formica rufa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gichtige Erkrankungen. Rheumatismus. Entzündungen der Luftwege. Allergische Erkrankungen.

- **FUCUS VESICULOSUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fucus vesiculosus D12, Fucus vesiculosus D30, Fucus vesiculosus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **FUCUS VESICULOSUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fucus vesiculosus D4, Fucus vesiculosus D12, Fucus vesiculosus D30, Fucus vesiculosus D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Fucus vesiculosus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Übergewicht. Kropfleiden.

- **FUMARIA OFFICINALIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14886.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fumaria officinalis Dil. D10, Fumaria officinalis Dil. D30, Fumaria officinalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Fumaria officinalis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das - Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Fumaria officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronisches, juckendes Ekzem bei Leberstörungen.

- **FUNICULUS UMBILICALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Funiculus umbilicalis suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **FUNICULUS UMBILICALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Funiculus umbilicalis suis D8, Funiculus umbilicalis suis D12, Funiculus umbilicalis suis D30, Funiculus umbilicalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fast bei allen chronischen Erkrankungen indiziertes Bindegewebsmittel. Bindegewebsschäden. Osteochondrose. Osteo malazie, ggf. mit Zervikalsyndrom und vertebragenen Neuralgien. Vorzeitiges Altern sowie geriatrische Indikationen jeder Art incl. Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose und sonstige Gefäßleiden sowie Runzelbildung, Fibrome. Ferner Autoaggressionskrankheiten, Schäden durch Antibiotika und sonstige Chemotherapeutika, allgemeine Therapieschäden. Strahlenschäden. Pruritus (incl. vulvae), Psoriasis, Akne rosacea, Elephantiasis, Erythema exsudativum multiforme et nodosum, Skrofulose, Neurodermitis, ödematöse Hautveränderungen, Dermatitiden. Myopie (insbes. bei der häufigsten Form der Myopie, der Achsenmyopie infolge zu großer a-p-Länge des Augapfels mit erhöhter Dehnbarkeit des Augapfels und der Folge einer Myopia maligna).Uterusprolaps bzw. Descensus uteri (bindegewebige Beckenbodeninsuffizienz mit Erschlaffung des Band-und Halteapparates). Muskelatrophie. Ödematöse Weichteilschwellungen sowie Myxödem. Dystrophia adiposogenitalis. Adynamie, Marasmus, Kachexie. Vegetative Dystonie. Ggf. wichtiges Nebenmittel bei Arthrosen (incl. Koxarthrosen), bei Exostosen sowie bei Tendovaginitis. Ferner Nebenmittel bei Divertikulitis, chronischer Colitis, Ulcus duodeni et ventriculi, Fissura ani, Harnröhrenstrikturen, Hydrozele sowie bei Morbus Bechterew und Myositis ossificans. Wichtiges Nebenmittel ferner beim Lungenemphysem, beim Glaukom sowie bei Lymphogranulomatose, Sarkomen und Karzinomen sowie bei Multipler Sklerose und Otosklerose.

- **GALIUM APARINE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Galium aparine D10, Galium aparine D30, Galium aparine D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Galium aparine entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nierensteinleiden. Geschwüre besonders der Zunge.

- **GALPHIMIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14912.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thryallis glauca Dil. D10, Thryallis glauca Dil. D30, Thryallis glauca Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Galphimia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Thryallis glauca entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Haut- und Schleimhautallergien.

- **GAMMA-GLOBULIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gamma-Globulin D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Reduzierung der Infektanfälligkeit, insbesondere bei Viruskrankheiten.

- **GASTRITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gastritis-Nosode D10, Gastritis-Nosode D30, Gastritis-Nosode 200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische bzw. chronisch-rezidivierende Magenschleimhautkatarrhe, insbesondere Gastritis sub- bzw. anacida, ohne und mit Erosionen bzw. Ulzerationen (Gastritis erosiva bzw. Ulcus ventriculi). Präkanzerose des Magens.

- **GELSEMIUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17296.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium sempervirens Dil. D6, Gelsemium sempervirens Dil. D10, Gelsemium sempervirens Dil. D30, Gelsemium sempervirens Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GELSEMIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17296.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium sempervirens Dil. D4, Gelsemium sempervirens Dil. D6, Gelsemium sempervirens Dil. D10, Gelsemium sempervirens Dil. D30, Gelsemium sempervirens Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Gelsemium sempervirens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Infektionskrankheiten. Lähmungen und Krampfleiden.

- **GINGIVA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gingiva suis D10, Gingiva suis D30, Gingiva suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GINGIVA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gingiva suis D8, Gingiva suis D12, Gingiva suis D30, Gingiva suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Parodontose. Parodontitis. Apikale Foki. Gingivitis. Chronische Aphthenbildung.

- **GINSENG-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ginseng D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **GINSENG-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ginseng D4, Ginseng D12, Ginseng D30, Ginseng D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Panax pseudoginseng entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Schwächezustände.

• **GLANDULA LYMPHATICA SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula lymphatica suis D10, Glandula lymphatica suis D30, Glandula lymphatica suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **GLANDULA LYMPHATICA SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula lymphatica suis D8, Glandula lymphatica suis D12, Glandula lymphatica suis D30, Glandula lymphatica suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Lymphatismus. Exsudative Diathese. Unklare Lymphdrüsenschwellungen sonstiger Genese. Nabelkoliken. Chronische Tonsillitis. Tonsillarhypertrophie. Agranulozytose. Als Nebenmittel bei Morbus Hodgkin (Lymphogranulomatose), Lymphsarkom und Retikulosen.

• **GLANDULA PARATHYREOIDEA SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula parathyreoidea suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **GLANDULA PARATHYREOIDEA SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula parathyreoidea suis D8, Glandula parathyreoidea suis D12, Glandula parathyreoidea suis D30, Glandula parathyreoidea suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Glandula parathyreoidea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kalziumstoffwechselstörungen.

• **GLANDULA PINEALIS SUIS-INJEEL UND FORTE**
siehe Corpus pineale suis-Injeel und forte.

• **GLANDULA SUBMANDIBULARIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula submandibularis suis D10, Glandula submandibularis suis D30, Glandula submandibularis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Speichelsekretion. Morbus Parkinson (versuchsweise).

- **GLANDULA SUPRARENALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula suprarenalis suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GLANDULA SUPRARENALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula suprarenalis suis D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Adynamie. Erschöpfungszustände. Morbus Addison und andere Erscheinungen der Nebennierenerschöpfung. Primär chronische Polyarthritis. Hypotonie. Vagotonie. Asthma bronchiale. Neurodermitis. Rhagaden. Colitis mucosa. Spasmophilie. Nach Verbrennungen. Geriatrikum.

- **GLANDULA THYMI SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula thymi suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GLANDULA THYMI SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula thymi suis D8, Glandula thymi suis D12, Glandula thymi suis D30, Glandula thymi suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Wachstums- und Entwicklungsstörungen. Mongolismus. Neoplasmaphasen.

- **GLANDULA THYREOIDEA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula thyreoidea suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **GLANDULA THYREOIDEA SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula thyreoidea suis D8, Glandula thyreoidea suis D12, Glandula thyreoidea suis D30, Glandula thyreoidea suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Mongolismus. Myxödem. Adipositas. Struma parenchymatosa et colloides. Leber- und Nierenerkrankungen. Neoplasmaphasen.

• **GLIOMA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glioma-Nosode D12, Glioma-Nosode D30, Glioma-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Erkrankungen im Bereich der Neuroglia des Gehirns und Rückenmarks (bzw. nach operativer Behandlung derselben), z.B. Glioblastom, Glioblastose bzw. Gliomatose, Gliose, Gliofibrom bzw. Gliofibromatose. Ferner bei Fibroneurinomen, Neurofibromen und Neurofibromatosis generalisata (v. Recklinghausen).

• **GLONOINUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14962.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nitroglycerinum Dil. D12, Nitroglycerinum Dil. D30, Nitroglycerinum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Glonoinum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Nitroglycerinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.

• **GLYOXAL-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glyoxal D12, Glyoxal D30, Glyoxal D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Alle zellulären Phasen, besonders auch Neoplasmaphasen und Viruskrankheiten.

• **GNAPHALIUM POLYCEPHALUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gnaphalium polycephalum D12, Gnaphalium polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Pseudognaphalium obtusifolium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Ischiasschmerz. Nervenschmerzen. Durchfallerkrankungen.

• GONOCOCCINUM-INJEEL UND FORTE

siehe Medorrhinum-Injeel und forte

• GRANULOMA DENTIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Granuloma dentis-Nosode D10, Granuloma dentis-Nosode D30, Granuloma dentis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden Therapie bei Fokalerkrankungen und Fokaltoxikosen nach entsprechender Herdausschaltung; ggf. auch zur „Fokussuche“ („diagnostische Suchspritze“). Erkrankungen mit fokaler Genese bzw. Anamnese wie z.B. Krankheitsbilder aus dem rheumatischen Formenkreis, chronische Neuralgien und Neuritiden, Kopfschmerzen, Endo-, Myo-, Perikarditiden mit und ohne Herzrhythmusstörungen, Herzklappenfehler, Herzinsuffizienzerscheinungen. Ferner auch bei Parulis und Parodontopathien.

• GRAPHITES-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14910.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D12, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Graphites-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• GRAPHITES-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14910.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D6, Graphites Dil. D12, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Graphites-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Graphites entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Regelstörung. Verdauungsschwäche. Altersbedingte Erkrankungen. Ekzeme und andere Erkrankungen der Haut. Entzündung der Schleimhäute.

• GRIPPE-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Grippe-Nosode D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GRIPPE-NOSODE-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Grippe-Nosode D6, D10, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Eine der am meisten indizierten Nosoden überhaupt, weil Grippe(spät)folgen jeder Art sehr häufig sind, z.B. chronische Polysinusitis, asthmatoide Beschwerden, anhaltende Heiserkeit, rheumatische Beschwerden mit mehr oder minder heftigen Schmerzen (Grippe-Rheumatoid), Erschöpfung und Müdigkeit, Herzbeschwerden, Durchblutungsstörungen, Zerschlagenheitsgefühl der Glieder – ggf. verbunden mit Muskelschmerzen –, Kopfschmerzen. Frösteln sowie anhaltende Nachtschweiße u.a.
Ferner allgemeine Neigung zu Korpulenz und Adipositas – auch bei Kindern – aufgrund einer Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose). Neigung zu chronisch-rezidivierenden Erkältungen.
Generell gilt: Nach überstandener Infektion bzw. nach soeben durchgemachter Infektionskrankheit stellen die entsprechenden Nosoden ein ausgezeichnetes Mittel dar, die im Mesenchym abgelagerten Toxine zur (schnelleren) Ausscheidung zu bringen.

- **GUAJACUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14943.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Guajacum Dil. D12, Guajacum Dil. D30, Guajacum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Guajacum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Guajacum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Mandel- und Rachenentzündung. Entzündung der Bronchien und der Lunge. Rheumatismus. Gicht.

- **GUANIDIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Guanidin D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schwerwiegende Schädigungen intrazellulärer Faktoren. Versuchsweise z.B. bei Mutationen, Tetanie, Störungen der Parathyreoideafunktion und des Kalkstoffwechsels, wie Osteo malazie, Osteoporose, Rachitis. Im Sinne eines homöopathisierten Allopathikums versuchsweise auch einzusetzen bei Schäden durch/nach Anwendung von älteren oral wirksamen Antidiabetika (Biguanide).

- **HAMAMELIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14941.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis virginiana Dil. D12, Hamamelis virginiana Dil. D30, Hamamelis virginiana Dil. D200, Hamamelis virginiana Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hamamelis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HAMAMELIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14941.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis virginiana Dil. D4, Hamamelis virginiana Dil. D6, Hamamelis virginiana Dil. D12, Hamamelis virginiana Dil. D30, Hamamelis virginiana Dil. D200, Hamamelis virginiana Dil. D1000 jeweils 0,183 ml. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hamamelis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hamamelis virginiana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.

- **HEKLA LAVA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hekla lava D12, Hekla lava D30, Hekla lava D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hekla Lava entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Knochen- und Knochenhautentzündungen. Knochenauswüchse.

- **HELLEBORUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Helleborus D12, Helleborus D30, Helleborus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Helleborus niger entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hirn- und Hirnhautentzündung. Akute Durchfallerkrankung. Nierenentzündung. Verwirrtheitszustände und Gemütsleiden.

- **HEPAR SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HEPAR SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar suis D8, Hepar suis D12, Hepar suis D30, Hepar suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Leberschäden und mangelnde Leberentgiftung. Chronische Ekzeme. Neurodermitis. Psoriasis. Erythematodes. Porphyrie. Auch bei Dermatomykosen, Pemphigus und Kraurosis vulvae. Männliche Sterilität. Röntgenkater. Hypoglykämie. Anorexia nervosa. Als Zwischenmittel bei zellulären Phasen häufig indiziert. Zur Anregung der entgiftenden Leberfunktion auch bei Arthrosis deformans und Periarthritis humeroscapularis indiziert.

- **HEPAR SULFURIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar sulfuris D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HEPAR SULFURIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar sulfuris D6, Hepar sulfuris D12, Hepar sulfuris D30, Hepar sulfuris D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hepar sulfuris calcarea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute wie Furunkel, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.

- **HERPES SIMPLEX-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Herpes simplex-Nosode D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HERPES SIMPLEX-NOSODE-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Herpes simplex-Nosode D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;

b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronisch rezidivierende Herpesinfektionen gleich welcher Ursache (Herpes febrilis, menstrualis, solaris, „Schreckbläschen“) und Lokalisation (Herpes labialis, [pro]genitalis, gingivalis).
Auch bei herpetiformen Hautkrankheiten und arzneibedingten (As, J, Hg) Herpesarten sowie Infektionskrankheiten, die mit einem Herpes labialis (febrilis) ggf. einhergehen können.

• **HERPES ZOSTER-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Herpes zoster-Nosode D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **HERPES ZOSTER-NOSODE-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Herpes zoster-Nosode D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bei frischem Herpes zoster zweckmäßigerweise das einfache Injeel verwenden, während bei voller Ausbildung der Herpes zoster-Bläschen, also ca. 10-14 Tage nach Krankheitsbeginn, Herpes zoster-Nosode-Injeel forte zunächst einzusetzen ist und dann im weiteren Verlauf der Behandlung auf Herpes zoster-Nosode-Injeel übergegangen wird. Ferner bei den oft sehr therapierefraktären postherpetischen Neuralgien, ebenso aber auch bei anderen Herpes- bzw. Zoster-ähnlichen Erkrankungen (symptomatische Ähnlichkeit!).

• **HISTAMIN-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Histaminum D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **HISTAMIN-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Histaminum D6, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **HISTAMIN D200** als Einzelpotenz.
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Histamin Dil. D200 1,1 ml (HAB, Vorschrift 5a, 11)
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Histaminum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Niedriger Blutdruck. Herzbeschwerden.

- **HYDRASTIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14884.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrastis canadensis Dil. D12, Hydrastis canadensis Dil. D30, Hydrastis canadensis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hydrastis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HYDRASTIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14884.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrastis canadensis Dil. D4, Hydrastis canadensis Dil. D12, Hydrastis canadensis Dil. D30, Hydrastis canadensis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hydrastis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hydrastis canadensis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.

- **HYDROCHINON-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrochinon D12, Hydrochinon D30, Hydrochinon D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HYDROCHINON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrochinon D8, Hydrochinon D12, Hydrochinon D30, Hydrochinon D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bei toxischen Belastungen des Leberparenchyms sowie bei Störungen in der Sauerstoffutilistion, z.B. bei Imprägnationsphasen – wie Asthma bronchiale (Dyspnoe) und Dermatosen – sowie bei Präkanzerosen. Ferner chronische trockene Ekzeme, besonders wenn diese bei dem geringsten Diätfehler exazerbieren.

- **HYDROCOTYLE ASIATICA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14945.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Centella asiatica Dil. D8, Centella asiatica Dil. D12, Centella asiatica Dil. D30, Centella asiatica Dil. D200 jeweils 0,275 ml.

Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hydrocotyle asiatica-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Centella asiatica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gebärmutterentzündung. Hauterkrankungen mit Verdickungen und Juckreiz.

- **HYOSCYAMUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14938.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hyoscyamus niger Dil. D12, Hyoscyamus niger Dil. D30, Hyoscyamus niger Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hyoscyamus-Injee in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HYOSCYAMUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14938.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hyoscyamus niger Dil. D4, Hyoscyamus niger Dil. D12, Hyoscyamus niger Dil. D30, Hyoscyamus niger Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hyoscyamus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hyoscyamus niger entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Unruhe und Erregungszustände. Schlafstörungen. Spastische Zustände der Atemwege und der Verdauungswege.

- **HYPERICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14956.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypericum perforatum Dil. D12, Hypericum perforatum Dil. D30, Hypericum perforatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hypericum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• HYPERICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14956.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypericum perforatum Dil. D3, Hypericum perforatum Dil. D6, Hypericum perforatum Dil. D12, Hypericum perforatum Dil. D30, Hypericum perforatum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hypericum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hypericum perforatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems. Verstimmungszustände. Gehirngefäßverkalkung. Asthma.

• HYPOPHYSIS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypophysis suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• HYPOPHYSIS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypophysis suis D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hypophysis cerebri entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwindel- und Verwirrtheitszustände.

• HYPOTHALAMUS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypothalamus suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• HYPOTHALAMUS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypothalamus suis D8, Hypothalamus suis D12, Hypothalamus suis D30, Hypothalamus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schlafstörungen. Morbus Parkinson. Epileptiforme Zustände. Reifungs- und Entwicklungsstörungen, auch solche geistiger Art bei Kindern. Chorea minor. Nymphomanie. Erregungszustände. Simmonds-Kachexie.

- **IGNATIA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17414.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos ignatii Dil. D12, Strychnos ignatii Dil. D30, Strychnos ignatii Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **IGNATIA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17414.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos ignatii Dil. D4, Strychnos ignatii Dil. D12, Strychnos ignatii Dil. D30, Strychnos ignatii Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strychnos ignatii entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

- **INDOL-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Indol D12, Indol D30, Indol D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Indolum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fäulnisdyspepsie.

- **INFLUENZINUM-INJEEL UND FORTE**

siehe Grippe-Nosode-Injeel und forte.

- **INSEKTIZID-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Insektizid D12, Insektizid D30, Insektizid D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem
Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Dermatitis. Leberschäden nach Intoxikationen mit Spritzmitteln.

- **INSULIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Insulin D12, Insulin D30, Insulin D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Insulinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwächezustände und Schweißausbrüche einige Stunden nach Nahrungsaufnahme.

- **IPECACUANHA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14954.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cephaelis ipecacuanha Dil. D12, Cephaelis ipecacuanha Dil. D30, Cephaelis ipecacuanha Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ipecacuanha-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cephaelis ipecacuanha entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung. Kreislaufstörungen.

- **IRIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119660.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Iris versicolor Dil. D12, Iris versicolor Dil. D30, Iris versicolor Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Iris versicolor entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Migräne. Nervenschmerzen des Gesichts, des Ischias, nach Gürtelrosenerkrankung. Entzündung der Magenschleimhaut und der Bauchspeicheldrüse.

- **JABORANDI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14947.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pilocarpus Dil. D12, Pilocarpus Dil. D30, Pilocarpus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Jaborandi-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Pilocarpus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Augenbeschwerden. Vermehrte Schweißbildung.

- **JEJUNUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Jejunum suis D10, Jejunum suis D30, Jejunum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **JEJUNUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Jejunum suis D8, Jejunum suis D12, Jejunum suis D30, Jejunum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

(Suis-Organpräparat)

Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ulcus duodeni. Pankreatitis. Dumping-Syndrom. Hypoglykämie.

• **JODUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14948.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Iodum Dil. D12, Iodum Dil. D30, Iodum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Jodum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Jodum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schilddrüsenüberfunktion. Furunkulose. Akne vulgaris.

• **KALIUM BICHROMICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14953.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium bichromicum Dil. D12, Kalium bichromicum Dil. D30, Kalium bichromicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium bichromicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium bichromicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, des Harnsystems. Chronische Geschwüre der Haut. Nervenschmerz und Rheumatismus.

• **KALIUM BROMATUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14951.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium bromatum Dil. D12, Kalium bromatum Dil. D30, Kalium bromatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium bromatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium bromatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erregungszustände des Zentralnervensystems. Zerebrales Anfallsleiden. Alpdruck. Schlafwandeln und Schlaflosigkeit. Minderung der Erregbarkeit des Gehirns wie Lähmung. Folgen des Schlaganfalls. Gedächtnisschwäche. Akne vulgaris.

- **KALIUM CARBONICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15126.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium carbonicum Dil. D12, Kalium carbonicum Dil. D30, Kalium carbonicum Dil. D200, Kalium carbonicum Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium carbonicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **KALIUM CARBONICUM-INJEEL FORTE N**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 3812.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium carbonicum Dil. D6, Kalium carbonicum Dil. D12, Kalium carbonicum Dil. D30, Kalium carbonicum Dil. D200, Kalium carbonicum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium carbonicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündung der Atemwege, des Rippenfells. Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben. Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems. Allgemeine Schwäche. Menstruationsstörungen. Erkrankungen in der Schwangerschaft.

- **KALIUM CHLORATUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15142.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium chloratum Dil. D4, Kalium chloratum Dil. D12, Kalium chloratum Dil. D30, Kalium chloratum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium chloratum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium chloratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum mit fibrinösen Belägen. Schleimbeutelentzündungen.

- **KALIUM JODATUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15029.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium iodatum Dil. D8, Kalium iodatum Dil. D12, Kalium iodatum Dil. D30, Kalium iodatum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium jodatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arz-

neimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium jodatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungserscheinungen der oberen Luftwege. Weichteilrheumatismus.

- **KALIUM PHOSPHORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15033.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium phosphoricum Dil. D12, Kalium phosphoricum Dil. D30, Kalium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium phosphoricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **KALIUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15033.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium phosphoricum Dil. D4, Kalium phosphoricum Dil. D12, Kalium phosphoricum Dil. D30, Kalium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium phosphoricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündung der Mundhöhle, des Zahnfleisches, der Atemwege. Durchfälle. Verdauungsschwä-che. Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände. Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.

- **KALIUM SULFURICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15060.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium sulfuricum Dil. D6, Kalium sulfuricum Dil. D10, Kalium sulfuricum Dil. D30, Kalium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium sulfuricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündung. Hautausschläge. Rheumatismus.

• **KALMIA-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17285.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalmia latifolia Dil. D12, Kalmia latifolia Dil. D30, Kalmia latifolia Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalmia latifolia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische und andere Herzerkrankungen. Rheumatismus. Gürtelrose. Nervenschmerzen.

• **KIEFEROSTITIS-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kieferostitis-Nosode D12, Kieferostitis-Nosode D30, Kieferostitis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **KIEFEROSTITIS-NOSODE-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kieferostitis-Nosode D8, Kieferostitis-Nosode D12, Kieferostitis-Nosode D30, Kieferostitis-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fokalerkrankungen und Fokaltoxikosen, z.B. chronische Neuralgien (besonders des 2. und 3. Trigeminus-Astes) sowie Sinusitiden, die trotz Entfernung sämtlicher Zähne weiterbestehen! Ferner: Knochen- und Periostaffektionen.

• **KLEBSIELLA PNEUMONIAE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Klebsiella pneumoniae-Nosode D12, Klebsiella pneumoniae-Nosode D30, Klebsiella pneumoniae-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **KLEBSIELLA PNEUMONIAE-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Klebsiella pneumoniae-Nosode D6, Klebsiella pneumoniae-Nosode D12, Klebsiella pneumoniae-Nosode D30, Klebsiella pneumoniae-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;

c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden Therapie bei/nach Friedländer-Pneumonie; ferner bei Silikosis und anderen Pneumokoniosen, bei Bronchiektasen, Asthma bronchiale sowie als Adjuvans auch bei akuter Grippe, Pleuritis und Pneumonie (besonders bei adipösen Patienten). Therapieschäden nach antibiotischer Therapie.

• **KREOSOTUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15138.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kreosotum Dil. D12, Kreosotum Dil. D30, Kreosotum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kreosotum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kreosotum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Blutungsneigung. Verhaltensstörungen bei Kindern. Altersbedingte Erkrankungen.

• **LACHESIS-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15530.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lachesis Dil. D12, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200, Lachesis Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **LACHESIS-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15531.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lachesis Dil. D8, Lachesis Dil. D12, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200, Lachesis Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lachesis muta entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Wechseljahrsbeschwerden. Drüsenerkrankungen. Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung. Venenentzündungen. Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Rheumatismus. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

• **LARYNX SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Larynx suis D10, Larynx suis D30, Larynx suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **LARYNX SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Larynx suis D8, Larynx suis D12, Larynx suis D30, Larynx suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Heiserkeit. Aphonie. Störungen der Stimmbildung. Stimmbandpolypen. Versuchsweise bei Ca. laryngis.

- **LATHYRUS SATIVUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lathyrus sativus D12, Lathyrus sativus D30, Lathyrus sativus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lathyrus sativus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Spastische Lähmungen.

- **LEDUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15057.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ledum palustre Dil. D12, Ledum palustre Dil. D30, Ledum palustre Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ledum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ledum palustre entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gicht und Gelenkrheumatismus. Verrenkungen. Verstauchungen. Lähmigkeit. Stich- und Bissverletzungen. Keuchhusten und andere Entzündungen der Atemwege. Haut- und Schleimhautblutungen.

- **LENS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lens suis D10, Lens suis D30, Lens suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **LENS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lens suis D8, Lens suis D12, Lens suis D30, Lens suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Cataracta senilis und traumatischer grauer Star.

- **LEPTANDRA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119668.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veronica virginica Dil. D10, Veronica virginica Dil. D30, Veronica virginica Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Veronica virginica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Leber, des Gallensystems. Diarrhoe.

• LILIUM TIGRINUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15122.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lilium lancifolium Dil. D12, Lilium lancifolium Dil. D30, Lilium lancifolium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Lilium tigrinum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lilium lancifolium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Beschwerden bei Gebärmuttersenkung in den Wechseljahren. Entzündungen und Schmerzen der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden. Reizbare Verstimmungszustände.

• LINGUA SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lingua suis D10, Lingua suis D30, Lingua suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zungenbrennen. Stomatitis aphthosa. Störungen der Geschmacksempfindung.

• LISTERIOSE-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Listeriose-Nosode D12, Listeriose-Nosode D30, Listeriose-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Die Listeriose-Nosode ist einzusetzen bei Zoonosen, die als solche erkannt wurden, oder wenn in der Anamnese eine Infektion durch ein Tier nicht ausgeschlossen werden kann. Zustand nach überstandener Listeriose-Fetopathie (Listeriose synonym: Granulomatosis infantiseptica!), insbesondere geistige Entwicklungsstörungen.

• LITHIUM CARBONICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15175.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lithium carbonicum Dil. D12, Lithium carbonicum Dil. D30, Lithium carbonicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Lithium carbonicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lithium carbonicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gicht. Nierenleiden bei vermehrter Harnsäure im Blut. Rheumatische Erkrankungen.

- **LUFFA OPERCULATA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15120.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Luffa operculata Dil. D10, Luffa operculata Dil. D30, Luffa operculata Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Luffa operculata-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Luffa operculata entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schnupfen. Heuschnupfen. Verdauungsschwäche.

- **LYCOPODIUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17394.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopodium clavatum Dil. D8, Lycopodium clavatum Dil. D12, Lycopodium clavatum Dil. D30, Lycopodium clavatum Dil. D200, Lycopodium clavatum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **LYCOPODIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17394.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopodium clavatum Dil. D4, Lycopodium clavatum Dil. D8, Lycopodium clavatum Dil. D12, Lycopodium clavatum Dil. D30, Lycopodium clavatum Dil. D200, Lycopodium clavatum Dil. D1000 jeweils 0,183 ml. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lycopodium clavatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemorgane. Allgemeine Blutvergiftung. Folgen von Infektionskrankheiten. Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen, Stoffwechselkrankheiten. Entzündungen der Harnorgane, Nierensteinleiden. Krampfaderleiden. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen. Regelstörungen und Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Andere Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

- **LYCOPUS VIRGINICUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15164.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopus virginicus Dil. D6, Lycopus virginicus Dil. D12, Lycopus virginicus Dil. D30, Lycopus virginicus Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Lycopus virginicus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor.

Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lycopus virginicus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herzklopfen, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion.

- **MAGNESIUM CARBONICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15118.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium carbonicum Dil. D12, Magnesium carbonicum Dil. D30, Magnesium carbonicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Magnesium carbonicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Magnesium carbonicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Konstitutionsmittel beim neuropathischen Typ. Verdauungsstörungen. Menstruationsstörung. Vergrößerung, Verhärtung drüsiger Organe.

- **MAGNESIUM-MANGANUM-PHOSPHORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium phosphoricum D12, Magnesium phosphoricum D30, Magnesium phosphoricum D200, Manganum phosphoricum D12, Manganum phosphoricum D30, Manganum phosphoricum D200 jeweils 0,183 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Katalysatorische Wirkung der Spurenelemente Magnesium und Manganum. Aktivator für intermediäre Katalysatoren des Zitronensäurezyklus.

- **MAGNESIUM PHOSPHORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15234.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium phosphoricum Dil. D12, Magnesium phosphoricum Dil. D30, Magnesium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Magnesium phosphoricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MAGNESIUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15234.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium phosphoricum Dil. D6, Magnesium phosphoricum Dil. D12, Magnesium phosphoricum Dil. D30, Magnesium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Magnesium phosphoricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Magnesium phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervenschmerzen. Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals. Regelschmerzen.

- **MAMMA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mamma suis D10, Mamma suis D30, Mamma suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MAMMA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mamma suis D8, Mamma suis D12, Mamma suis D30, Mamma suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Laktorrhoe. Mastodynie. Präkanzerose. Fibrombildung. Schlaffe und unterentwickelte Brüste. Zwischenschmerz. Post amputationem mammae.

- **MANDRAGORA E RADICE SICCATO-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 29891.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mandragora e radice siccato Dil. D8, Mandragora e radice siccato Dil. D12, Mandragora e radice siccato Dil. D30, Mandragora e radice siccato Dil. D200 jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Mandragora e radice siccato entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerz; Herz-Kreislauf-Beschwerden; Verdauungsschwäche bei Leber-Galle-Störungen; Ischiasschmerz.

- **MANGANUM ACETICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Manganum aceticum D12, Manganum aceticum D30, Manganum aceticum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Manganum aceticum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der oberen Luftwege. Chronische Hauterkrankungen. Knochen- und Gelenkschmerzen. Blutarmut und Schwäche. Lähmungen.

- **MASTOIDITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mastoiditis Nosode D10, Mastoiditis Nosode D30, Mastoiditis Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische Otitis media (laufendes Ohr), Neigung zu rezidivierenden Mittelohrentzündungen, Mittelohrschwerhörigkeit, retoxische Schädigungen am Gehörapparat. Chronische Fieberzustände jeder Art. Chronische Neuralgien. Versuchsweise bei chronischer Osteomyelitis, bei Osteoporose und bei Sudeckscher Atrophie sowie bei Fokalherden.

- **MASTOPATHIA CYSTICA-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mastopathia cystica-Nosode D12, Mastopathia cystica-Nosode D30, Mastopathia cystica-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Benigne Knoten in der weiblichen Brustdrüse, insbesondere zystischer Art. Mastodynie. Beim männlichen Geschlecht Pubertätsmakromastie bzw. Gynäkomastie.

- **MEDORRHINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medorrhinum-Nosode D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDORRHINUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medorrhinum-Nosode D10, Medorrhinum-Nosode D12, Medorrhinum-Nosode D30, Medorrhinum-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Medorrhinum-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane, der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Rheumatismus. Verhaltensauffälligkeiten. Voralterung.

- **MEDULLA OBLONGATA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla oblongata suis D10, Medulla oblongata suis D30, Medulla oblongata suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDULLA OBLONGATA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla oblongata suis D8, Medulla oblongata suis D12, Medulla oblongata suis D30, Medulla oblongata suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Paralysis agitans. Progressive Bulbärparalyse. Polyneuritis. Multiple Sklerose. Amyotrophische Lateralsklerose. Tabes dorsalis. Spinalparalyse. Chorea minor. Hypotonie. Störungen in den vegetativen Zentren, z.B. auch bei Asthma bronchiale.

- **MEDULLA OSSIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla ossis suis D10, Medulla ossis suis D30, Medulla ossis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDULLA OSSIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla ossis suis D8, Medulla ossis suis D12, Medulla ossis suis D30, Medulla ossis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Anämie. Leukämie. Agranulozytose und sonstige Therapieschäden. Strahlenschäden. Koxitis. Osteo malazie. Osteomyelitis chronica. Exostosen. Arthritis deformans. Morbus Sudeck.

- **MEDULLA SPINALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla spinalis suis D10, Medulla spinalis suis D30, Medulla spinalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDULLA SPINALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla spinalis suis D8, Medulla spinalis suis D12, Medulla spinalis suis D30, Medulla spinalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Multiple Sklerose. Amyotrophische Lateralsklerose. Tabes dorsalis. Paresen. Myelitis. Paraplegie. Chorea minor.

- **MENINGEOMA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Meningeoma-Nosode D12, Meningeoma-Nosode D30, Meningeoma-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Folgezustände nach operativer Entfernung eines Meningeoms; symptomatisch versuchsweise bei Rückenmarkskompression, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Hemikranie, Riechstörungen, Stauungspapille, Exophthalmus und anderen Hirndruck-Symptomen; ferner bei Meningismus bzw. meningealen Reaktionen.

- **MERCURIUS AURATUS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius auratus D10, Mercurius auratus D12, Mercurius auratus D30, Mercurius auratus D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aurum a malgamum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gesichtsknochen- und Nasenschleimhauteiterungen.

- **MERCURIUS SALICYLICUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius salicylicus D10, Mercurius salicylicus D30, Mercurius salicylicus D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Polyarthritis. Chronische Dermatosen.

- **MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15600.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D12, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D30, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D200, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Es kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15607.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D10, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D12, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D30, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D200, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Es kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Mercurius solubilis Hahnemanni entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Hauterkrankungen. Mandel-, Lymphdrüsen-, Leber- und Nierenentzündungen. Entzündungen andererdrüsiger Organe. Knochenschmerzen und Rheumatismus. Entkräftende Krankheiten. Gehirngefäßverkalkung.

- **MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15601.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum bichloratum Dil. D12, Hydrargyrum bichloratum Dil. D30, Hydrargyrum bichloratum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mercurius sublimatus corrosivus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Es kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hydrargyrum bichloratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochakute Schleimhautentzündung der Augen, der Mundhöhle, der Mandeln, des Dick- und Enddarmes, der Nieren, der ableitenden Harnwege, der Scheide.

- **METHYLENBLAU-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Methylenblau D12, Methylenblau D30, Methylenblau D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Methylenum caeruleum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Harnwegsentzündungen.

- **MEZEREUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum D12, Mezereum D30, Mezereum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEZEREUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum D6, Mezereum D12, Mezereum D30, Mezereum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Daphne mezereum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Atemwegsentzündungen. Verdauungsstörungen. Juckende Hautreizungen und Hauteiterungen. Nervenschmerzen. Knochenschmerzen und andere Schmerzzustände.

• MOMORDICA BALSAMINA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Momordica balsamina D8, Momordica balsamina D12, Momordica balsamina D30, Momordica balsamina D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Momordica balsamina entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Durchfallerkrankungen. Blähungskoliken.

• MUCOSA NASALIS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13860.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucosa nasalis suis Dil. D10, (HAB, Vorschr. 42), Mucosa nasalis suis Dil. D30, (HAB, Vorschr. 42), Mucosa nasalis suis Dil. D200, (HAB, Vorschr. 42) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mucosa nasalis suis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• MUCOSA NASALIS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13860.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucosa nasalis suis Dil. D8, (HAB, Vorschr. 42), Mucosa nasalis suis Dil. D12, (HAB, Vorschr. 42), Mucosa nasalis suis Dil. D30, (HAB, Vorschr. 42), Mucosa nasalis suis Dil. D200, (HAB, Vorschr. 42) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mucosa nasalis suis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: (Poly)Sinusitis chronica. Rhinitis. Ozaena. Nasenpolypen. Nasen- und Nebenhöhlenaffektionen sonstiger Art, evtl. mit Reflexzuständen an inneren Organen (z.B. Ulcus duodeni, Asthma bronchiale).

• MUIRA PUAMA-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Muira puama D4, Muira puama D8, Muira puama D12, Muira puama D30, Muira puama D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Aphrodisiakum. Tonisierung des zentralen Nervensystems.

• **MUMPS-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mumps-Nosode D12, Mumps-Nosode D30, Mumps-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **MUMPS-NOSODE-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mumps-Nosode D8, Mumps-Nosode D12, Mumps-Nosode D30, Mumps-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur Nachbehandlung bei Parotitis epidemica. Sonstige Schwellungen im Gebiet der Mundspeicheldrüsen und der Tränendrüsen. Mumps-Orchitis. Ferner Pankreopathie, Pankreatitis, Myokarditiden, rheumatoide und polyneuritische Symptome, und zwar immer dann, wenn diese Krankheitsbilder im Verlauf eines früher durchgemachten Ziegenpeters aufgetreten sind (= „anamnestische ätiologische Ähnlichkeit“) oder aber Anwendung unter dem Gesichtspunkt der symptomatischen Ähnlichkeit.

• **MUSCULI OCULI SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Musculi oculi suis D10, Musculi oculi suis D30, Musculi oculi suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Strabismus. Zustand nach Apoplexie mit Augenmuskellähmung.

• **MUSCULUS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Musculus suis D10, Musculus suis D30, Musculus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **MUSCULUS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Musculus suis D8, Musculus suis D12, Musculus suis D30, Musculus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Myotonie. Muskuläre Insuffizienz. Muskeldystrophie. Muskelatrophie. Schwäche- und Erschöpfungszustände. Insomnie.

• **MYOMA UTERI-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myoma uteri-Nosode D10, Myoma uteri-Nosode D30, Myoma uteri-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **MYOMA UTERI-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myoma uteri-Nosode D6, Myoma uteri-Nosode D10, Myoma uteri-Nosode D30, Myoma uteri-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Myome des Uterus, Uterus myomatosus. Menorrhagien, Metrorrhagien. Frigidität. Sterilität junger Frauen.

• **MYRISTICA SEBIFERA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myristica sebifera D12, Myristica sebifera D30, Myristica sebifera D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **MYRISTICA SEBIFERA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myristica sebifera D6, Myristica sebifera D12, Myristica sebifera D30, Myristica sebifera D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Virola sebifera entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Eiterungen.

• **NAGELMYKOSE-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nagelmykose-Nosode D10, Nagelmykose-Nosode D30, Nagelmykose-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NAGELMYKOSE-NOSODE-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nagelmykose-Nosode D8, Nagelmykose-Nosode D12, Nagelmykose-Nosode D30, Nagelmykose-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Erkrankungen der Hautanhangsgebilde sowie der Haut. Nagelmykosen und Dermatomykosen. Haarausfall. Auch bei Erkrankungen einzusetzen, die als retoxische Schädigungen nach extern bzw. intern behandelten Mykosen auftreten, z.B. chronische Neuralgien. Hier ist die Anamnese der ausschlaggebende Faktor.

• **NAPHTHOCHINON-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Naphthochinon D12, Naphthochinon D30, Naphthochinon D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NAPHTHOCHINON-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Naphthochinon D8, Naphthochinon D12, Naphthochinon D30, Naphthochinon D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Alle zellulären Phasen, speziell Neoplasmaphasen und Viruskrankheiten, jedoch auch toxische Infektionen (Reaktionsphasen). Hauptindikationen sind vor allem Karzinome im Bereich des Darmes und der Geschlechtsorgane (Carcinoma uteri und Carcinoma prostatae) sowie generell alle Tumoren, nach deren operativer Entfernung eine Strahlenbehandlung (ggf. mit Strahlenschäden) durchgeführt wurde.

• **NATRIUM CARBONICUM-INJEEL FORTE N**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 3908.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium carbonicum Dil. D6, Natrium carbonicum Dil. D8, Natrium carbonicum Dil. D12, Natrium carbonicum Dil. D30, Natrium carbonicum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die 2 letzten Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Natrium carbonicum H_2O entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Atemwege. Ausfluss. Verdauungsschwäche. Körperliche und geistige Schwäche. Verstimmungszustände.

• **NATRIUM MURIATICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16009.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium chloratum Dil. D8, Natrium chloratum Dil. D12, Natrium chloratum Dil. D30, Natrium chloratum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium muriaticum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NATRIUM MURIATICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16009.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium chloratum Dil. D6, Natrium chloratum Dil. D8, Natrium chloratum Dil. D12, Natrium chloratum Dil. D30, Natrium chloratum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium muriaticum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Natrium chloratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände. Hauterkrankungen. Erkrankungen des Stützgewebes.

• **NATRIUM OXALACETICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13858.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium oxalaceticum Dil. D10, HAB, Vorschr. 8a u. 11, Natrium oxalaceticum Dil. D30, HAB, Vorschr. 8a, Natrium oxalaceticum Dil. D200, HAB, Vorschr. 8a jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal pro Wochen jeweils den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan, oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NATRIUM OXALACETICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13858.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium oxalaceticum Dil. D6, HAB, Vorschr. 6 u. 11, Natrium oxalaceticum Dil. D10, HAB, Vorschr. 8a u. 11, Natrium oxalaceticum Dil. D30, HAB, Vorschr. 8a, Natrium oxalaceticum Dil. D200, HAB, Vorschr. 8a jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 3 und 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal pro Woche jeweils den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten (Abwehrschwäche). Empfindlich gegen Wind und Feuchtigkeit sowie gegen Licht- und Sonneneinstrahlung. Überempfindlichkeit gegen Eiweiß und Fette (nicht gegenüber Zucker). Ferner: Therapieresistenter Schwindel, Status vor und nach Apoplexie, Hypertonie, akute und chronische Gastritis. Entzündliche Erkrankungen der Nieren und des Nierenbeckens sowie starkes Schwitzen bei Tag und Nacht mit Gelbfärbung der Wäsche. Schweiß riecht nach Ammoniak, Harn riecht nach Spargel.

• **NATRIUM PYRUVICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium pyruvicum D10, Natrium pyruvicum D30, Natrium pyruvicum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NATRIUM PYRUVICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium pyruvicum D6, Natrium pyruvicum D10, Natrium pyruvicum D30, Natrium pyruvicum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnlichkeit mit Sulfur-Symptomen (da bei einem Pyruvatstau Sulfur-ähnliche Symptome auftreten!). Angezeigt bei allen zellulären Phasen, so z.B. bei Asthma bronchiale, juckenden Ekzemen, Psoriasis, rheumatischen und gichtischen Manifestationen, organischen Nervenkrankheiten, Psychosen, Präkanzerosen. Migräne, morgens auftretend und bis Sonnenuntergang anhaltend mit Brechreiz und Elendsgefühl. Durchblutungsstörungen (auch bei Diabetes mellitus). Generell vor allem auch bei allen Therapieschäden.

• NATRIUM SULFURICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15596.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium sulfuricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D30, Natrium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium sulfuricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• NATRIUM SULFURICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15596.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium sulfuricum Dil. D4, Natrium sulfuricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D30, Natrium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium sulfuricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Natrium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Leber-Galle-Störungen. Morgendiarrhoe. Bronchial-Asthma. Folgen eines Traumas des Nervensystems. Rheumatismus.

• NERVUS OLFACTORIUS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nervus olfactorius suis D10, Nervus olfactorius suis D30, Nervus olfactorius suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Anosmie. Rhinitis vasomotorica. Heuschnupfen (Prophylaxe). Reflektorisch von der Nasenschleimhaut ausgelöste Erkrankungen, versuchsweise auch bei Asthma bronchiale.

• NERVUS OPTICUS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nervus opticus suis D10, Nervus opticus suis D30, Nervus opticus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NERVUS OPTICUS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nervus opticus suis D8, Nervus opticus suis D12, Nervus opticus suis D30, Nervus opticus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Atrophia nervi optici (z.B postluetisch [Tabes dorsalis] oder toxisch bzw. postneuritisch sowie bei MS). Sehstörungen. Flimmerskotom. Migräne.

• **NEUROFIBROMA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Neurofibroma-Nosode D12, Neurofibroma-Nosode D30, Neurofibroma-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bindegewebliche, weiche, gutartige Geschwülste, meist im Bereich peripherer Nerven (Unterhaut- und Hauttumoren), gelegentlich aber auch in den Lungen, im Mediastinum, im Bereich des Rückenmarks und der Knochen mit den entsprechenden Symptomen, wie sensiblen Reizerscheinungen, Parästhesien, Schmerzen.

• **NUX VOMICA-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17396.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos nux-vomica Dil. D12, Strychnos nux-vomica Dil. D30, Strychnos nux-vomica Dil. D200, Strychnos nux-vomica Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NUX VOMICA-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17396.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos nux-vomica Dil. D4, Strychnos nux-vomica Dil. D12, Strychnos nux-vomica Dil. D30, Strychnos nux-vomica Dil. D200, Strychnos nux-vomica Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strychnos nux-vomica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberhafte Erkrankungen. Entzündungen der Atemorgane. Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Hämorrhoiden. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Harnwegserkrankungen. Kreislaufbeschwerden. Schwindel. Angina pectoris-Beschwerden. Blutungen. Kopfschmerzen. Nervenschmerzen und rheumatische Schmerzen. Krämpfe an Hohlorganen, Muskelkrämpfe. Lähmungen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.

• **OCULUS TOTALIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Oculus totalis suis D10, Oculus totalis suis D30, Oculus totalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **OCULUS TOTALIS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Oculus totalis suis D8, Oculus totalis suis D12, Oculus totalis suis D30, Oculus totalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Augenerkrankungen imprägnativer und degenerativer Art. Glaukom. Katarakta. Chronische Konjunktivitis. Skleritis. Bei chronischen Granulationen (Tbc) Vorsicht!

• **OESOPHAGUS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Oesophagus suis D10, Oesophagus suis D30, Oesophagus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Sodbrennen. Globus hystericus. Kardiospasmus. Singultus.

• **OLEANDER-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15236.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nerium oleander Dil. D12, Nerium oleander Dil. D30, Nerium oleander Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Oleander-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Nerium oleander entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Organische Herzkrankheiten. Verdauungsstörungen. Nässendes Ekzem. Lähmigkeit. Rheumatismus.

• **ONYX SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Onyx suis D10, Onyx suis D30, Onyx suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Onychomykosen. Nagelatrophie. Veränderungen der Nägel bei sonstigen Erkrankungen.

• **OS PETROSUM SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os petrosum suis D10, Os petrosum suis D30, Os petrosum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **OS PETROSUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os petrosum suis D8, Os petrosum suis D12, Os petrosum suis D30, Os petrosum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Otosklerose. Ohrgeräusche, Schwerhörigkeit. Sonstige Imprägnations- und Degenerationsphasen des Innenohres.

- **OS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os suis D10, Os suis D30, Os suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **OS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os suis D8, Os suis D12, Os suis D30, Os suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Osteoporose. Osteo malazie. Morbus Sudeck. Exostosen. Periostitis. Rachitis.

- **OSTEOMYELITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Osteomyelitis-Nosode D10, Osteomyelitis-Nosode D30, Osteomyelitis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden Behandlung bei mehr oder minder chronischen Eiterungen im Bereich des Knochenmarks – mit und ohne Knochenfisteln –, und zwar gleichgültig welcher Lokalisation (Metaphysen der langen Röhrenknochen, Becken, Brustbein, Rippen, Wirbel, Schädelknochen), welcher Genese (offene Frakturen, hämatogen – z.B. bei Furunkeln, Panaritien, Erysipelen, Anginen – bzw. lymphogen) und welcher Erregerart (Staphylokokken, Streptokokken – beim Streptococcus haemolyticus meist perakut! –, Proteus, Pyocyaneus, Tbc, Lues, Typhus und Paratyphus, Bang und andere Brucellosen, Klebsiellen). Nach allen Frakturen. Chronische Knochenerkrankungen wie Osteo malazie, Rachitis, Sudecksche Knochenatrophie. Otitis media chronica.

- **OTITIS MEDIA-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Otitis media-Nosode D10, Otitis media-Nosode D30, Otitis media-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **OTITIS MEDIA-NOSODE-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Otitis media-Nosode D6, Otitis media-Nosode D10, Otitis media-Nosode D30, Otitis media-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische und chronisch-rezidivierende Otitis media, chronisch laufende/nässende Ohren, Cholesteatom. Otitis externa. Sinusitis. Ohrtubenkatarrh. Eventuell auch wirksam bei chronischer Zystitis bzw. Neigung dazu, da Ohr und Harnblase gewisse Korrelationen aufweisen. Als Wechselmittel bei Osteomyelitis und entzündlichen Prozessen/Eiterungen sonstiger Art und Lokalisation.

- **OVARIALCYSTE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarialcyste-Nosode D10, Ovarialcyste-Nosode D30, Ovarialcyste-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zystische Veränderungen jeder Art und Lokalisation, insbesondere versuchsweise bei Ovarialzysten, besonders nach durchgeführter Zystenoperation zur Vermeidung von Rezidiven. Beschwerden während der Menarche, Klimakterium praecox, „gynäkologische Migräne“, z.B. vor oder während der Menses.

- **OVARIUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarium suis D10, Ovarium suis D30, Ovarium suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **OVARIUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarium suis D8, Ovarium suis D12, Ovarium suis D30, Ovarium suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Ovarialfunktion. Dysmenorrhoe. Amenorrhoe. Klimakterium mit ovariellen Ausfallerscheinungen. Hypermenorrhoe. Metrorrhagien. Weibliche Sterilität. Klimakterische Neurosen mit Depressionen. Nymphomanie. Eifersuchtswahn. Kraurosis vulvae. Mastodynie. Osteo malazie.

• **PANKREAS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreas suis D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **PANKREAS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreas suis D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Diabetes mellitus (pankreogener). Marasmus. Kachxie. Chronische Enteritis. Duodenitis. Störungen der Darmfermentation. Dysbakterie. Adynamie. Gastrokardialer Symptomenkomplex (Roemheld).

• **PARA-BENZOCHINON-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119356.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: para-Benzochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **PARA-BENZOCHINON-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119357.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: para-Benzochinonum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Durch das gesamte Arzneimittelbild von Para-Benzochinon zieht sich Entartung der verschiedensten Gewebe bis zum Tumor mit fast hoffnungsloser Kachexie und totaler Entgleisung des Stoffwechsels bei vollkommener Reaktionslosigkeit auf sonst gut gewählte Medikamente. Anwendungsgebiete: Alle zellulären Phasen, z.B. auch Leukämie, Asthma bronchiale, organische Nervenerkrankungen, Hepatitis u.a. sowie Präkanzerosen und Neoplasmaphasen.

• **PARATHYREOIDEA SUIS-INJEEL UND FORTE**
siehe Glandula Parathyreoidea suis-Injeel und forte

• **PARATYPHOIDINUM B-INJEEL UND FORTE**
siehe Salmonella Paratyphi B-Injeel und forte

• **PARODONTOSE-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Parodontose-Nosode D12, Parodontose-Nosode D30, Parodontose-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Als Adjuvans bei allen Parodontopathien sowie bei Zahnfleischbluten und Zahnfleischatrophie. Fokalherde, die von Parodontopathien ausgehen.

• **PAROTIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Parotis suis D10, Parotis suis D30, Parotis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Mumps-Nachbehandlung. Zysten und Sekretionsstörungen der Parotis.

- **PASSIFLORA INCARNATA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15226.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Passiflora incarnata Dil. D4, Passiflora incarnata Dil. D12, Passiflora incarnata Dil. D30, Passiflora incarnata Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Passiflora incarnata-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Passiflora incarnata entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schlafstörung. Krampfleiden. Unruhezustände.

- **PENICILLIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Penicillin D12, Penicillin D30, Penicillin D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PENICILLIN-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Penicillin D6, Penicillin D12, Penicillin D30, Penicillin D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Bei Penicillinüberempfindlichkeit sollte das Präparat Penicillin-Injeel forte nicht angewendet werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Benzylpenicillinum-Kalium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Haut- und Schleimhautentzündungen.

- **PERTUSSIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pertussis-Nosode D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Keuchhusten – und zwar nach überstandener Krankheit, um die im Mesenchym abgelagerten Toxine zur (rascheren) Ausscheidung zu bringen. Ferner auch bei einigen weiteren Krankheiten, die mit Husten einhergehen, z.B. beim Lungenemphysem und Asthma bronchiale mit Hustenattacken – insbesondere bei zähem, klebrigem Schleim, ggf. verbunden mit Erbrechen und Laryngospasmus – sowie bei Bronchiektasen. Nach O. Julian auch bei neurologischen (Kinder)Krankheiten mit Konvulsionen sowie ferner bei Tetanie, epileptiformen Zuständen, Enzephalopathie mit mehr oder minder großem Schwachsinn, und zwar besonders dann, wenn ein Keuchhusten (toxische Enzephalitis im akuten Pertussis-Stadium; „Pertussis-Gehirn“!) in der Anamnese vorliegt („anamnestische ätiologische Ähnlichkeit“).

• **PETROLEUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Petroleum D12, Petroleum D30, Petroleum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Petroleum rectificatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene Hautkrankheiten. Entzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, der Harnorgane. Rheumatismus. Schwindel.

• **PHOSPHORUS-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17294.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D12, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200, Phosphorus Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **PHOSPHORUS-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17295.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D6, Phosphorus Dil. D12, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200, Phosphorus Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Phosphorus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten. Rheumatismus, Wirbelsäulenbeschwerden. Knochenentzündungen und -entkalkungen. Nerven- und Kopfschmerzen, Lähmungen. Entwicklungsstörungen bei Kindern. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane, Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

• **PHYTOLACCA-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17287.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phytolacca americana Dil. D12, Phytolacca americana Dil. D30, Phytolacca americana Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **PHYTOLACCA-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17287.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phytolacca americana Dil. D4, Phytolacca americana Dil. D12, Phytolacca americana Dil. D30, Phytolacca americana Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Phytolacca americana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochfieberhafte Infekte. Schleimhaut-entzündungen, besonders der Atemorgane. Entzündung und Erkrankung der Brustdrüse. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

• **PLACENTA FETALIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Placenta fetalis suis D10, Placenta fetalis suis D30, Placenta fetalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: siehe unter Placenta suis-Injeel und forte (gesamte Placenta).

- **PLACENTA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Placenta suis D10, Placenta suis D30, Placenta suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PLACENTA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Placenta suis D8, Placenta suis D12, Placenta suis D30, Placenta suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Periphere Durchblutungsstörungen. Cutis marmorata. Dysbasia Intermittens. Morbus Buerger. Wadenkrämpfe. Dekubitus. Perniones. Ulcus cruris. Rhagaden. Ekzeme. Faltenbildung der Haut. Sklerodermie. Dysmenorrhoe. Muskelrheumatismus.

- **PLATINUM METALLICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Platinum metallicum D12, Platinum metallicum D30, Platinum metallicum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Platinum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nerven-, Kopf- und Krampfschmerzen. Erkrankungen und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Gesteigerte Erregbarkeit. Verstimmungszustände.

- **PLUMBUM METALLICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15178.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Plumbum metallicum Dil. D12, Plumbum metallicum Dil. D30, Plumbum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Plumbum metallicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Plumbum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervenschmerzen und -entzündungen. Krampfzustände. Lähmungen und andere Erkrankungen des Nervensystems. Leberstörungen. Koliken. Verstopfung. Nierenentzündungen. Mumps. Schlagaderverkalkungen. Verstimmungs- und Verwirrtheitszustände.

- **PNEUMOCOCCINUM-INJEEL UND FORTE**

siehe Klebsiella Pneumoniae-Injeel und forte

- **PODOPHYLLUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15176.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Podophyllum peltatum Dil. D12, Podophyllum peltatum Dil. D30, Podophyllum peltatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Podophyllum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Podophyllum peltatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall. Mastdarmvorfall. Gebärmuttersenkung. Zahnungsbeschwerden.

- **POLIOMYELITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Poliomyelitis-Nosode D20, Poliomyelitis-Nosode D30, Poliomyelitis-Nosode D200, Poliomyelitis-Nosode D400 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Paresen jeder Art, besonders schlaffe. Fieber mit Gliederschmerzen und Kopfschmerzen. Versuchsweise zu interponieren auch bei spinalen Muskelatrophien, amyotrophischer Lateralsklerose, MS, atrophischen Lähmungen, trophischen und vasomotorischen Störungen, Schlottergelenken, sonstigen Skelett- und Gelenkveränderungen.

- **POLLIS GRAMINIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pollis graminis D10, Pollis graminis D30, Pollis graminis D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Versuchsweise zur Desensibilisierung bei Heuschnupfen, Asthma bronchiale, Neurodermitis, Ekzemen.

- **POLYPUS LARYNGIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Polypus laryngis-Nosode D10, Polypus laryngis-Nosode D30, Polypus laryngis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Polypen im Gebiet des Kehlkopfs. Akute und chronische Laryngitis, akute und chronische Heiserkeit (auch bei Rednern und Sängern). Sonstige Schleimhautpolypen anderer Lokalisation, z.B. Nasenpolypen, Rektumpolypen, Blasenpolypen.

- **POLYPUS NASALIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Polypus nasalis-Nosode D10, Polypus nasalis-Nosode D30, Polypus nasalis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nasenpolypen und Polypen der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen, Lymphatismus, adenoide Vegetationen, Tonsillarhypertrophie (besonders auch der Rachenmandel). Durch eine chronische Tonsillarhypertrophie (insbesondere der unpaarigen Rachenmandel = Tonsilla pharyngica) kann es wie auch durch polypös stark behinderte Nasenatmung (offener Mund) im Kindesalter zu geistigen Entwicklungsstörungen kommen!

- **PONS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pons suis D10, Pons suis D30, Pons suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Postenzephalitische Erkrankungen. Morbus Parkinson. Störungen der Muskelinnervation.

- **PROSTATA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Prostata suis D10, Prostata suis D30, Prostata suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PROSTATA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Prostata suis D8, Prostata suis D12, Prostata suis D30, Prostata suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Prostataadenom. Störungen der Miktion und Potenz. Frühzeitiges Altern. Marasmus und Kachexie.

- **PSORINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Psorinum-Nosode D12, Psorinum-Nosode D30, Psorinum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PSORINUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Psorinum-Nosode D9, Psorinum-Nosode D12, Psorinum-Nosode D30, Psorinum-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Psorinum-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene chronische Hauterkrankungen. Chronische Schleimhautentzündungen, besonders der Atemorgane. Schwächezustände, besonders nach schweren Krankheiten. Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.

- **PULMO SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulmo suis D10, Pulmo suis D30, Pulmo suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PULMO SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulmo suis D8, Pulmo suis D12, Pulmo suis D30, Pulmo suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Asthma bronchiale. Raucherbronchitis. Emphysem. Bronchiektasen. Bei Tbc: Vorsicht, nicht im fieberhaften Stadium injizieren. Nachwirken lassen, d.h. nur in größeren Zeitabständen applizieren!

- **PULPA DENTIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulpa dentis suis D10, Pulpa dentis suis D30, Pulpa dentis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PULPA DENTIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulpa dentis suis D8, Pulpa dentis suis D12, Pulpa dentis suis D30, Pulpa dentis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Apikales Fokusgeschehen. Schlechte Zahnentwicklung. Parodontose. Parodontitis. Karies.

- **PULSATILLA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17398.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla pratensis Dil. D12 (HAB, Vorschr. 3a), Pulsatilla pratensis Dil. D30, Pulsatilla pratensis Dil. D200 , Pulsatilla pratensis Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **PULSATILLA-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17398.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla pratensis Dil. D4, Pulsatilla pratensis Dil. D12, Pulsatilla pratensis Dil. D30, Pulsatilla pratensis Dil. D200, Pulsatilla pratensis Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Pulsatilla pratensis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

• **PYELON SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pyelon suis D10, Pyelon suis D30, Pyelon suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hydronephrose. Chronische Pyelitis. Zystopyelitis. Nephrolithiasis. Prostataadenom. Nephrose. Urämie. Eklampsie.

• **PYODERMIE-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pyodermie-Nosode D10, Pyodermie-Nosode D30, Pyodermie-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Subakute und chronische Hauterkrankungen, nässende Ekzeme, Furunkel, Furunkulose, Karbunkel (besonders dann, wenn – wie meist! – eine ausgesprochene Neigung zu Rezidiven besteht). Erkrankungen, die nach retoxisch behandelten Hautausschlägen auftreten, z.B. Asthma bronchiale, Neuralgien, Leberschäden u.a.

• **QUASSIA AMARA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15594.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D10, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D30, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Quassia amara in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Picrasma excelsa, Quassia amara entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Lebererkrankungen. Verdauungsschwäche.

• **RANUNCULUS BULBOSUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15294.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ranunculus bulbosus Dil. D12, Ranunculus bulbosus Dil. D30, Ranunculus bulbosus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ranunculus bulbosus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ranunculus bulbosus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Viruserkrankungen der Haut und Hornhaut des Auges. Erkrankung des Brustfelles. Rheumatismus im Brustkorbbereich. Nervenschmerzen.

- **RAUWOLFIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15290.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rauwolfia serpentina Dil. D8, Rauwolfia serpentina Dil. D12, Rauwolfia serpentina Dil. D30, Rauwolfia serpentina Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rauwolfia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Rauwolfia serpentina entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bluthochdruck. Verstimmungszustände.

- **RECTUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rectum suis D10, Rectum suis D30, Rectum suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **RECTUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rectum suis D8, Rectum suis D12, Rectum suis D30, Rectum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Darmtenesmen. Obstipation. Mangelnde Ausscheidung über den Darm. Präkanzerose des Mastdarms. Divertikulitis. Colitis mucosa. Fissura ani.

- **REN SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ren suis D10, Ren suis D30, Ren suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **REN SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ren suis D8, Ren suis D12, Ren suis D30, Ren suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nephrolithiasis. Hydronephrose. Zystopyelitis. Albuminurie. Nephrosen. Ödeme. Oxalurie. Prostataadenom. Darniederliegende Nierenfunktion mit unzureichender Ausscheidung. Hyperhidrosis. Hinweis: Bei Glomerulonephritis nicht im akuten Stadium.

• **RETINA SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Retina suis D10, Retina suis D30, Retina suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **RETINA SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Retina suis D8, Retina suis D12, Retina suis D30, Retina suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chorioditis. Störungen des Gesichtssinnes. Degenerative Erkrankungen der Netzhaut und des Auges. Myopie (bes. Achsenmyopie mit verlängertem Augapfel und Neigung zu Netzhautschädigung!). Versuchsweise bei Glaukom.

• **RHODODENDRON-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15296.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhododendron Dil. D12, Rhododendron Dil. D30, Rhododendron Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rhododendron-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **RHODODENDRON-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15296.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhododendron Dil. D6, Rhododendron Dil. D12, Rhododendron Dil. D30, Rhododendron Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rhododendron-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Rhododendron entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Nervenschmerzen. Hodenentzündungen.

- **RHUS TOX-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17400.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Toxicodendron quercifolium Dil. D30, Toxicodendron quercifolium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **RHUS TOX-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17400.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D4, Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Toxicodendron quercifolium Dil. D30, Toxicodendron quercifolium Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Toxicodendron quercifolium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Juckende Hautkrankheiten. Fieberhafte Infektionskrankheiten mit Benommenheit. Entzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Entzündungen der Augen. Regelstörungen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Lähmigkeiten, Lähmungen. Schwindel. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.

- **RUBEOLAE-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rubeolae-Nosode D12, Rubeolae-Nosode D30, Rubeolae-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Schwangerschaft.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nachbehandlung nach Röteln – also am Ende des akuten Stadiums der Röteln! Enzephalomyelitische bzw. rheumatoide Symptome im Zusammenhang mit früher durchgemachten Röteln (anamnestische ätiologische Ähnlichkeit!).Lymphdrüsenschwellungen, besonders zervikal, axillar, in den Kniekehlen (ggf. verbunden mit einer Milzvergrößerung) sowie bei Röteln-ähnlichen Exanthemen (symptomatische Ähnlichkeit). Anmerkung: Rubeolae-Nosode kann keinesfalls den Röteln-Impfstoff ersetzen, wobei Schwangere überhaupt nicht gegen Röteln geimpft werden dürfen und bei geschlechtsreifen Mädchen und Frauen 2 Monate vor und 3 Monate nach der Impfung der Eintritt einer Schwangerschaft hundertprozentig sicher verhütet werden muß (Embryopathia rubeolosa, Gregg 1941, sowie Fetopathia rubeolosa: Im Kleinkindesalter geistige und körperliche Retardierung!).

- **RUTA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15298.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ruta graveolens Dil. D12, Ruta graveolens Dil. D30, Ruta graveolens Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ruta-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ruta graveolens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Quetschungen, Prellungen, Verrenkungen, körperliche Überanstrengung. Krampfaderleiden. Rheumatismus besonders der Wirbelsäule.

• SABAL SERRULATUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sabal serrulatum D8, Sabal serrulatum D12, Sabal serrulatum D30, Sabal serrulatum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Serenoa repens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der ableitenden Harnwege. Blasenentleerungsstörungen.

• SABINA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15329.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Juniperus sabina Dil. D8, Juniperus sabina Dil. D12, Juniperus sabina Dil. D30, Juniperus sabina Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sabina-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Juniperus sabina entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gebärmutterblutung. Entzündung der Harn-Geschlechts-Organe. Rheumatismus. Gicht. Warzen.

• SALMONELLA PARATYPHI B-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salmonella paratyphi B-Nosode D10, Salmonella paratyphi B-Nosode D30, Salmonella paratyphi B-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• SALMONELLA PARATYPHI B-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salmonella paratyphi B-Nosode D6, Salmonella paratyphi B-Nosode D10, Salmonella paratyphi B-Nosode D30, Salmonella paratyphi B-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Gastroenteritische Krankheitsbilder, z.B. nach Eisgenuss und bei Muschel- und Fleischvergiftungen. Hochfieberhafte Erkrankungen mit Exsikkose. Verschleppte Anginen und grippale Pharyngitiden, Cholezystitis und andere Infektionen mit Schweiß, Blässe. Herzmuskelschwäche mit Arrhythmie. Als Nebenmittel bei Neoplasmaphasen. Nach O. Julian auch bei adenoiden Vegetationen im Kindesalter.

• SALMONELLA TYPHI-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salmonella typhi-Nosode D12, Salmonella typhi-Nosode D30, Salmonella typhi-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• SALMONELLA TYPHI-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salmonella typhi-Nosode D6, Salmonella typhi-Nosode D12, Salmonella typhi-Nosode D30, Salmonella typhi-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hochfieberhafte Erkrankungen, hämorrhagische Enterokolitis, bradykarde Herzstörungen sowie auch bei „typhoiden Folgezuständen“ bzw. „post-typhösen“ Zuständen/Symptomen wie Meteorismus, Cholangitis, Cholezystitis, Bronchitis, Bronchopneumonie. Ferner seltenere Komplikationen im Verlauf eines Typhus abdominalis wie z.B. Otitis, Konjunktivitis, Netzhautblutungen, Muskeldegeneration, Polyneuritis, Parotitis, Osteomyelitis, Pankreopathie, Endo- und Myokarditis (hier oft Übergang von Bradykardie in Tachykardie!) sowie Perikarditis, Hepatitis, Spondylitis. Verwirrtheits- und Benommenheitszustände z.B. bei Zerebralsklerose.

• SALPINX UTERI SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salpinx uteri suis D10, Salpinx uteri suis D30, Salpinx uteri suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Weibliche Sterilität durch entzündliche Erkrankungen der Salpinx uteri (Folgen von Gonorrhoe, Mischinfektionen mit aeroben und anaeroben Bakterien, Mykoplasmen, Chlamydien u.a.). Störungen der Ovulation. Dysmenorrhoe. Klimakterium.

• SANGUINARIA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15323.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sanguinaria canadensis Dil. D12, Sanguinaria canadensis Dil. D30, Sanguinaria canadensis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sanguinaria-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sanguinaria canadensis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Migränöse Kopfschmerzen. Entzündungen der Atmungsorgane. Beschwerden der Wechseljahre. Rheumatismus.

• **SANGUIS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sanguis suis D10, Sanguis suis D30, Sanguis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Allgemein bei Dyskrasien, schweren Homotoxinlagen und zu Beginn von Entgiftungskuren. Dieses Präparat ist bei allen Degenerationsphasen in gewissen Intervallen (etwa alle 1-2-3 Wochen) zu der sonstigen Therapie mit Biotherapeutika-Heel zu interponieren, da das Blut als das große Transportband auch zahlreiche Homotoxine befördert, die dann im Umkehreffekt antihomotoxische Therapiewirkungen entfalten. Indikationen sind daher auch: Leukämie. Agranulozytose. Anämien. Allergische Zustände. Dermatosen. Stoffwechselkrankheiten (speziell Diabetes mellitus) Art und Dauererioskleroose sowie Cholesterinämie, Polyzythämie u.a., auch Simmonds-Kachexie.

• **SCATOL-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Scatol D12, Scatol D30, Scatol D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Scatol entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fäulnisdyspepsie.

• **SCROPHULARIA NODOSA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15318.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Scrophularia nodosa Dil. D12, Scrophularia nodosa Dil. D30, Scrophularia nodosa Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Scrophularia nodosa-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Scrophularia nodosa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwächezustände. Drüsenverhärtungen. Enddarmentzündung. Milchschorf.

• **SECALE CORNUTUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6372351.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Secale cornutum Dil. D12, Secale cornutum Dil. D30, Secale cornutum Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Secale cornutum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gebärmutterkrämpfe, Muskelkrämpfe, Krampfleiden, Lähmungen, Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten, Blutungsneigung.

• **SELENIUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium D12, Selenium D30, Selenium D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SELENIUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium D6, Selenium D12, Selenium D30, Selenium D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Selenium amorphum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautausschläge, fettige Haut. Entzündungen der oberen Luftwege. Verdauungsschwäche. Schwächezustände.

• **SEPIA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sepia D12, Sepia D30, Sepia D200, Sepia D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SEPIA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sepia D6, Sepia D12, Sepia D30, Sepia D200, Sepia D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sepia officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene, besonders chronische Hauterkrankungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Entzündungen der Harnorgane und Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Krampfaderleiden. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände.

• **SEROTONIN-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Serotonin D10, Serotonin D30, Serotonin D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SEROTONIN-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Serotonin D6, Serotonin D10, Serotonin D30, Serotonin D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Versuchsweise einzusetzen bei „Karzinoid-Syndromen" (u.a. Flushs, Tachykardie, Tachypnoe, Endokardfibrose; Trikuspidalinsuffizienz, Pulmonalstenose (Veränderungen besonders am rechten Herzen!)) sowie bei zerebralen Erregungszuständen und bei Migräneanfällen im Sinne des Serotonin- (bzw. Histamin)-Kopfschmerzes (Bing-Horton-Syndrom). Ferner: Allergische bzw. toxische Hautaffektionen, z.B. nach Kontakt mit Kraken, Salamandern, Tintenfischen, Moluscae (Murex), Brennesseln.

- **SILICEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15394.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum silicicum Dil. D12, Acidum silicicum Dil. D30, Acidum silicicum Dil. D200, Acidum silicicum Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Silicea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **SILICEA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15394.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum silicicum Dil. D6, Acidum silicicum Dil. D12, Acidum silicicum Dil. D30, Acidum silicicum Dil. D200, Acidum silicicum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Silicea-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum silicicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen, Eiterungen und Fistelbildung der Haut, der Lymphdrüsen, der Schleimhäute, der Knochen und Gelenke. Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke. Gewebewucherungen. Geistige Erschöpfung.

- **SINUSITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13862.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sinusitis-Nosode Dil. D10, HAB, Vorschr. 44, Sinusitis-Nosode Dil. D30, HAB, Vorschr. 44, Sinusitis-Nosode Dil. D200, HAB, Vorschr. 44 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sinusitis-Nosode-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sinusitis-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Wiederkehrende Nasennebenhöhlenentzündung.

• **SOLIDAGO VIRGAUREA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15425.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solidago virgaurea Dil. D12, Solidago virgaurea Dil. D30, Solidago virgaurea Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Solidago virgaurea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SOLIDAGO VIRGAUREA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15425.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solidago virgaurea Dil. D4, Solidago virgaurea Dil. D12, Solidago virgaurea Dil. D30, Solidago virgaurea Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Solidago virgaurea-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Solidago virgaurea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nierenschwäche. Leberstörungen.

• **SPIGELIA-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17289.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia anthelmia Dil. D8, Spigelia anthelmia Dil. D12, Spigelia anthelmia Dil. D30, Spigelia anthelmia Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Spigelia anthelmia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Herzentzündung. Angina pectoris. Nervenschmerz. Kopfschmerz. Wurmbeschwerden.

• **SPIRAEA ULMARIA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15428.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Filipendula ulmaria Dil. D12, Filipendula ulmaria Dil. D30, Filipendula ulmaria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spiraea ulmaria-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Filipendula ulmaria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Schleimhautentzündungen.

• **SPLEN SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Splen suis D10, Splen suis D30, Splen suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SPLEN SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Splen suis D8, Splen suis D12, Splen suis D30, Splen suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Leukämie. Anämie. Agranulozytose. Bei Karzinom zur Revitalisierung allgemein zu verwenden sowie generell zur Steigerung der Infektabwehr besonders auch im Senium.

• **SPONGIA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15315.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Dil. D12, Euspongia officinalis Dil. D30, Euspongia officinalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spongia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SPONGIA-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15315.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Dil. D4, Euspongia officinalis Dil. D12, Euspongia officinalis Dil. D30, Euspongia officinalis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Spongia-Injeel forte ist bei Jodüberempfindlichkeit nicht anzuwenden. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spongia-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Euspongia officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündung und Krampfzustände der Atemorgane. Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie: Lymphdrüsen, Schilddrüse, Hoden, Nebenhoden. Entzündung des Herzens, Herzschwäche. Erkrankung der Herzkranzgefäße, der Hauptschlagader.

• **STANNUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15392.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Stannum metallicum Dil. D12, Stannum metallicum Dil. D30, Stannum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Stannum-Injee in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• STANNUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15392.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Stannum metallicum Dil. D6, Stannum metallicum Dil. D12, Stannum metallicum Dil. D30, Stannum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Stannum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Stannum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Bronchitis. Leberschwäche. Nerven- und Kolikschmerzen. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.

• STAPHISAGRIA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Staphisagria D12, Staphisagria D30, Staphisagria D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Delphinium staphisagria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautausschläge. Entzündungen der Augen. Erkrankungen der Zähne. Verdauungsschwäche. Reizzustände an den ableitenden Harnwegen und den Geschlechtsorganen. Nervenschmerzen. Koliken. Schmerzen und Folgezustände nach Verletzungen und Operationen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

• STAPHYLOCOCCUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Staphylococcus-Nosode D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• STAPHYLOCOCCUS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Staphylococcus-Nosode D6, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische und chronisch rezidivierende Erkrankungen, bei denen Staphylokokken ggf. in Form einer Mischinfektion bzw. einer Sekundärinfektion ursächlich in Frage kommen, z.B. Furunkel, Karbunkel, Panaritien, Impetigo contagiosa staphylogenes (Bockhart), Blepharitis, Hordeolum, Akne vulgaris et conglobata, Unterschenkelgeschwüre, Pyodermia chronica papillaris et exulcerans, Osteomyelitis, phlegmonöse Veränderungen, Otitis media, Zystopyelitiden, Pneumonie, Enterokolitiden, Myelitiden u. a. Allgemein bei retoxischen Phasen, die auf Schädigungen durch Staphylokokkengifte beruhen (z.B. Autoaggressionskrankheiten) sowie Krankheitsbilder, bei welchen sich in der Anamnese die oben aufgezeigten Erkrankungen finden. Staphylococcus kann auch mit guter Wirkung eingesetzt werden bei Myokardschädigungen, Leberschädigungen, Nierenschädigungen und Bindegewebsschädigungen sowie bei Schilddrüsenerkrankungen.

- **STICTA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15313.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lobaria pulmonaria Dil. D12, Lobaria pulmonaria Dil. D30, Lobaria pulmonaria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sticta-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lobaria pulmonaria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündungen der Atemwege.

- **STRAMONIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15327.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Datura stramonium Dil. D12, Datura stramonium Dil. D30, Datura stramonium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Stramonium-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Datura stramonium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochfieberhafte Infektionen. Krampfzustände. Krankheiten mit Beeinträchtigung seelischer Funktionen. Entzündung der Augen.

- **STREPTOCOCCUS HAEMOLYTICUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptococcus haemolyticus-Nosode D12, Streptococcus haemolyticus-Nosode D30, Streptococcus haemolyticus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **STREPTOCOCCUS HAEMOLYTICUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptococcus haemolyticus-Nosode D6, Streptococcus haemolyticus-Nosode D12, Streptococcus haemolyticus-

Nosode D30, Streptococcus haemolyticus-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Angina (häufig mit Neigung zu Tonsillarabszessen), Otitis media, Phlegmonen, Impetigo contagiosa streptogenes (Tilburg-Fox), Empyeme, Mastitis puerperalis, Endo-, Myo-, Perikarditis, Pneumonie, Meningitis, Osteomyelitis. Primär chronische Polyarthritis. Choreatische Zuckungen, Grimassieren, Tics, Muskelhypotonie. Psychische Veränderungen wie Antriebsschwäche, Unterwürfigkeit, Unaufmerksamkeit, Sprunghaftigkeit, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen, psychotische Bilder, halluzinatorische Psychosen, Alpdrücken, Aufstampfen mit den Füßen. Symptomatisch besteht Intoleranz gegen Lärm, Licht, Luftzug sowie unmotiviertes Weinen, Gefühl von Vibrieren der Wirbelsäule bei ausgestrecktem Liegen sowie Ohrenrauschen, Sehstörungen und das Gefühl salziger Lippen. Streptococcus haemolyticus ist auch bei Fokalherden bzw. Fokaltoxikosen und bei Autoaggressionskrankheiten stets mit einzusetzen, speziell wenn der Verdacht auf Beteiligung von Streptokokken in der Pathogenese besteht.

- **STREPTOCOCCUS VIRIDANS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptococcus viridans-Nosode D10, Streptococcus viridans-Nosode D30, Streptococcus viridans-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **STREPTOCOCCUS VIRIDANS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptococcus viridans-Nosode D6, Streptococcus viridans-Nosode D10, Streptococcus viridans-Nosode D30, Streptococcus viridans-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnliche Indikationen wie bei Streptococcus haemolyticus; jedoch – sowohl unter symptomatischen als auch unter anamnestisch-ätiologischen Gesichtspunkten! – speziell bei Endocarditis lenta und bei Lenta-Sepsis-Symptomen einzusetzen sowie bei schleichenden bzw. bei „typhösen“ Fieberzuständen sowie ferner bei Autoaggressionskrankheiten, ggf. als Zwischenmittel bei Neoplasmaphasen.

- **STREPTOMYCIN-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptomycin D6, Streptomycin D12, Streptomycin D30, Streptomycin D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schwindelerscheinungen, Gleichgewichts- und Gangstörungen (Vestibularis-Affektionen), aber auch Hörstörungen wie Tinnitus aurium, Schwerhörigkeit und Taubheit, da auch Streptomycin – und nicht nur Dihydrostreptomycin! – Akustikus- bzw. Cochlearisstörungen auslösen kann. Ferner weitere Nebenwirkungen/Therapieschäden nach Anwendung dieses Aminoglykosid-Antibiotikums, wie Nierenschäden, neuromuskuläre Blockaden, Parästhesien, Muskelschmerzen. Allergische Reaktionen wie urtikarielle Ekzeme, generalisierte Dermatitiden, Granulozytopenien, Leberschäden.

• **STROPHANTHUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15331.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strophanthus gratus Dil. D12, Strophanthus gratus Dil. D30, Strophanthus gratus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Strophanthus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strophanthus gratus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herzschwäche, Erwartungsangst.

• **STRUMA CYSTICA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Struma cystica-Nosode D10, Struma cystica-Nosode D30, Struma cystica-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zystische Struma. Versuchsweise auch bei sonstigen Schilddrüsenvergrößerungen, z.B. Struma nodosa bzw. colloides (bei der kolloiden Entartung einer Struma kommt es zur Bildung von Zysten!). Postoperativ zur Vermeidung eventueller Struma-Rezidive.

• **STRUMA NODOSA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Struma nodosa-Nosode D10, Struma nodosa-Nosode D30, Struma nodosa-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Knotige Struma (Adenom), die oft mit Zysten durchsetzt ist; dabei häufig Verkalkungen und gelegentlich Blutungen (Struma nodosa calcificata bzw. haemorrhagica). Versuchsweise auch bei anderen Struma-Formen. Postoperativ zur Vermeidung eventueller Struma-Rezidive.

• **STRUMA PARENCHYMATOSA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Struma parenchymatosa-Nosode D10, Struma parenchymatosa-Nosode D30, Struma parenchymatosa-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Parenchymatöse, d.h. diffuse und gleichmäßige Vergrößerung der Schilddrüse (meist mit reichlicher Gefäßentwicklung und Epithelwucherungen). Versuchsweise auch bei sonstigen Struma-Formen. Postoperativ zur Vermeidung eventueller Struma-Rezidive.

• **STRYCHNINUM NITRICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychninum nitricum D12, Strychninum nitricum D30, Strychninum nitricum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strychninum nitricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervenschmerzen. Nervöse Übererregbarkeit.

• **SULFONAMID-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfonamid D6, Sulfonamid D12, Sulfonamid D30, Sulfonamid D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Therapieschäden nach Sulfonamiden (die generell als Fermentgifte zu klassifizieren sind), wie gastro-intestinale Störungen, Cholestase, Leukopenie, Agranulozytose, Thrombopenie, hämolytische Anämie sowie besonders bei Säuglingen und Kleinstkindern Sulfhämoglobinbildung und Methämoglobinbildung mit den entsprechenden Symptomen (u.a. Zyanose, Atemnot, Tachykardie, Übelkeit). Ferner allergische Schäden nach Sulfonamiden, wie allergische Hautreaktionen, allergische Nieren- und Leberschäden, „Sulfonamid-Fieber“.

• **SULFUR-INJEEL S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17291.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SULFUR-INJEEL FORTE S**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15838.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D6, Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sulfur-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SULFUR D200** als Einzelpotenz.
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6033608.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Sulfur Dil. D200 1,1 g.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sulfur entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

• **SULFUR JODATUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15241.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur jodatum Dil. D12, Sulfur jodatum Dil. D30, Sulfur jodatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sulfur jodatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sulfur jodatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege, des Brustfelles, des Darms, besonders des Dickdarms. Stuhlentleerungsstörungen. Eitrige Entzündungen und Geschwüre der Haut. Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie der Lymphdrüsen, der Brustdrüse.

• **SUTOXOL-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sutoxol-Nosode D12, Sutoxol-Nosode D30, Sutoxol-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **SUTOXOL-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sutoxol-Nosode D6, Sutoxol-Nosode D12, Sutoxol-Nosode D30, Sutoxol-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schwere homotoxische Belastung bei Phasen jeder Art. Allgemein zur Bereinigung des homotoxischen Terrains vorab einzusetzen bzw. zwischenzuschalten. Neigung zu Suppurationen, Furunkeln, Karbunkeln. Lymphatismus, Fluor albus. Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis. Versuchsweise bei chronischer Appendizitis. Bei Neoplasmaphasen als Zwischenmittel. Sutoxol ist eine der wichtigsten Nosoden überhaupt beim Abbau schwerer Homotoxinlagen.

• **SYMPATHICUS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sympathicus suis D10, Sympathicus suis D30, Sympathicus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Vegetative Dystonie. Morbus Sudeck. Hypotonie. Raynaudsche Gangrän. Morbus Buerger. Hypernephrom (versuchsweise). Migräne. Asthma bronchiale. Ulcus duodeni. Angina pectoris. Diabetes mellitus.

• **SYMPHYTUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Symphytum officinalie e radice D12, Symphytum officinalie e radice D30, Symphytum officinalie e radice D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **SYMPHYTUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Symphytum officinalie e radice D4, Symphytum officinalie e radice D12, Symphytum officinalie e radice D30, Symphytum officinalie e radice D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Symphytum officinale e radice entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Knochen- und Knochenhautverletzungen.

- **SYZYGIUM JAMBOLANUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15426.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Syzygium cumini Dil. D4, Syzygium cumini Dil. D12, Syzygium cumini Dil. D30, Syzygium cumini Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Syzygium jambolanum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Syzygium cumini entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verwendung als Zusatzmittel bei Zuckerkrankheit.

- **TABACUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15309.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nicotina tabacum Dil. D12, Nicotina tabacum Dil. D30, Nicotina tabacum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Tabacum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Nicotina tabacum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Beschwerden bei Blutdruckabfall. Brechdurchfall. Angina pectoris.

- **TARANTULA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tarantula D12, Tarantula D30, Tarantula D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Tarantula hispanica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Hautentzündungen. Allgemeine Blutvergiftung. Kopfschmerzen. Angina pectoris. Übererregbarkeit und Überempfindlichkeiten.

- **TARAXACUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Taraxacum D12, Taraxacum D30, Taraxacum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Taraxacum officinale entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.

- **TARTARUS STIBIATUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15237.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium stibyltartaricum Dil. D6, Kalium stibyltartaricum Dil. D12, Kalium stibyltartaricum Dil. D30, Kalium stibyltartaricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Tartarus stibiatus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium stibyltartaricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche. Brechdurchfälle. Entzündungen der Harnorgane. Eitrige Hauterkrankungen. Rheumatische Erkrankungen der unteren Wirbelsäule.

- **TESTIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Testis suis D10, Testis suis D30, Testis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **TESTIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Testis suis D8, Testis suis D12, Testis suis D30, Testis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Impotentia virilis. Sterilität. Frühzeitiges Altern. Erschöpfungszustände. Revitalisierungsfaktor. Hydrozele. Samenstrangneuralgien. Versuchsweise bei Osteo malazie und Osteoporose beim männlichen Geschlecht.

- **TETANUS-ANTITOXIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tetanus-Antitoxin-Nosode D12, Tetanus-Antitoxin-Nosode D30, Tetanus-Antitoxin-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Serum-Reaktionen, -Überempfindlichkeit, -Krankheit und andere anaphylaktoide Zustände. Spastische Erkrankungen jeder Art sowie bei spastischen Paresen, eventuell auch bei Multipler Sklerose und Parkinsonismus. Nach O. Julian auch bei Trismus, Tetanie und parathyreogenen Symptomen. Störungen der Glandula parathyreoidea und des Kalkstoffwechsels. Ferner auch bei Arthrosen sowie bei Neuralgien und Neuritiden, und zwar besonders dann, wenn eine serogenetische (Poly)neuritis bzw. ein Guillain-Barré-Syndrom (Polyradikuloneuritis mit typischem Liquorbefund einer „Dissociation albumino-cytologique“, d.h. massive Eiweißvermehrung bei geringgradiger/fehlender Zellvermehrung!) vorliegt (Anamnese!).

- **TETRACYCLIN-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tetracyclin D6, Tetracyclin D12, Tetracyclin D30, Tetracyclin D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(homöopathisiertes Allopathikum)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: siehe unter Doxycyclin!

- **TEUCRIUM SCORODONIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16093.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Teucrium scorodonia Dil. D8, Teucrium scorodonia Dil. D12, Teucrium scorodonia Dil. D30, Teucrium scorodonia Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Teucrium scorodonia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **TEUCRIUM SCORODONIA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16093.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält:Arzneilich wirksame Bestandteile: Teucrium scorodonia Dil. D3, Teucrium scorodonia Dil. D8, Teucrium scorodonia Dil. D12, Teucrium scorodonia Dil. D30, Teucrium scorodonia Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Teucrium scorodonia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Atemwege.

- **THALLIUM SULFURICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thallium sulfuricum D12, Thallium sulfuricum D30, Thallium sulfuricum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Thallium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Haarausfall. Nervenschmerzen.

- **THUJA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17302.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thuja occidentalis Dil. D12, Thuja occidentalis Dil. D30, Thuja occidentalis Dil. D200, Thuja occidentalis Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **THUJA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17302.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thuja occidentalis Dil. D4, Thuja occidentalis Dil. D12, Thuja occidentalis Dil. D30, Thuja occidentalis Dil. D200, Thuja occidentalis Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Thuja occidentalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Haut- und Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.

- **THYMUS SUIS-INJEEL UND FORTE**

siehe Glandula Thymi suis-Injeel und forte

- **THYREOIDEA SUIS-INJEEL UND FORTE**

siehe Glandula Thyreoidea suis-Injeel und forte

- **TONSILLA PHARYNGICA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsilla pharyngica suis D10, Tonsilla pharyngica suis D30, Tonsilla pharyngica suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Lymphatismus. Rachenmandelhypertrophie. Geistige und körperliche Entwicklungsstörungen als Folge einer Hyperplasie der Rachenmandel („Adenoide Facies"; offener Mund; z.B. auch beim Sinubronchialen Syndrom).

- **TONSILLA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsilla suis D10, Tonsilla suis D30, Tonsilla suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Tonsillarhypertrophie. Chronische Tonsillitis. Lymphatismus. Exsudative Diathese. Skrofulose. Auch bei Lymphogranulomatose und Retikulosen versuchsweise einzusetzen.

- **TONSILLARPFRÖPFE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsillarpfröpfe-Nosode D10, Tonsillarpfröpfe-Nosode D30, Tonsillarpfröpfe-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hydrogenoide Konstitution. Überlastung mit Giftstoffen. Neigung zu chronischen bzw. chronisch rezidivierenden Anginen, aber auch chronische und chronisch rezidivierende Sinusitiden. Fokalerkrankungen, z.B. Neuralgien, Krankheitsbilder aus dem rheumatischen Formenkreis, Nephropathien, Nephrosen. Versuchsweise auch bei Störungen der Koronardurchblutung (Tonsillen als neurales Störungsfeld!).

- **TONSILLITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsillitis-Nosode D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnliche Indikationen wie Tonsillarpfröpfe-Nosode und forte, jedoch mit spezieller Ausrichtung auf retoxische Imprägnierungen nach unbiologisch behandelter Tonsillitis, wie z.B. Polyarthritis rheumatica, Glomerulonephritis, Nephrosen, Endo-, Myokarditiden, Myokard- und Leberschädigungen.

- **TRICHINOYL-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Trichinoyl D12, Trichinoyl D30, Trichinoyl D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **TRICHINOYL-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Trichinoyl D8, Trichinoyl D12, Trichinoyl D30, Trichinoyl D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Regeneration blockierter Atmungsfermente, entgiftungsfördernd. Alle zellulären Phasen, einschließlich Viruskrankheiten und Neoplasmaphasen.

- **TRICHOMONADEN-FLUOR-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Trichomonaden-Fluor-Nosode D10, Trichomonaden-Fluor-Nosode D30, Trichomonaden-Fluor-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Vaginitis, Erosio portionis, Pruritus vulvae (et ani), brennende Schmerzen in der Scheide und beim Wasserlassen; beim Mann brennende schleimige Urethritis. Endometritiden, Parametritiden, Salpingitiden, Ovariitiden bzw. Prostatitiden, und zwar besonders dann, wenn vorher ein Fluor bzw. eine Urethritis (beim Mann) retoxisch behandelt wurde. Auch bei trockener Nasenschleimhaut und Neigung zu Ozaena sowie bei Herzattacken, die nach retoxisch behandeltem Fluor aufgetreten sind.

- **TUBA EUSTACHII SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tuba Eustachii suis D10, Tuba Eustachii suis D30, Tuba Eustachii suis D200 jeweils0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **TUBA EUSTACHII SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tuba Eustachii suis D8, Tuba Eustachii suis D12, Tuba Eustachii suis D30, Tuba Eustachii suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische Katarrhe der Ohrtrompete mit Ohrensausen und Schwerhörigkeit. Mittelohraffektionen, z.B. Hydrops des Mittelohrs = Serotympanon (= akuter Ohrtubenkatarrh) bzw. Seromukotympanon (= chronischer Ohrtubenkatarrh).

- **TUBERCULINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tuberculinum Koch-Nosode D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **TUBERCULINUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tuberculinum Koch-Nosode D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Tuberculinum residuum KOCH Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Gelenkbeschwerden.

- **TYPHOIDINUM-INJEEL UND FORTE**

siehe Salmonella Typhi-Injeel und forte

- **UBICHINON-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ubichinon D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **UBICHINON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ubichinon D8, Ubichinon D12, Ubichinon D30, Ubichinon D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe B)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Impfschäden nach der Pockenschutzimpfung. Entzündliche Hauterkrankungen. Schleimhautentzündungen und -eiterungen mit wundmachenden Sekreten. Adjuvans bei multpler Sklerose. Allgemein angezeigt bei allen zellulären Phasen (Imprägnations-, Degenerations-, Neoplasmaphasen – inklusive Viruskrankheiten), bei denen die eigenen Abwehrleistungen nicht mehr ausreichen.

• **ULCUS VENTRICULI-NOSODE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ulcus ventriculi-Nosode D10, Ulcus ventriculi-Nosode D30, Ulcus ventriculi-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische und chronisch rezidivierende Magengeschwüre (gleichgültig, ob Super-, Sub- oder Anazidität besteht). Auch bei Präkanzerose.

• **URETER SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ureter suis D10, Ureter suis D30, Ureter suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nephrolithiasis. Störungen der Nierenexkretion. Hydronephrose. Nephrose. Zystopyelitis. Glomerulonephritis. Prostataleiden. Gewisse Fälle renaler Hypertonie.

• **URETHRA SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Urethra suis D10, Urethra suis D30, Urethra suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Harnröhrenstrikturen. Chronische Reizzustände in der Urethra und im Urogenitalsystem. Pruritus vulvae.

• **URTICA-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Urtica urens D12, Urtica urens D30, Urtica urens D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Urtica urens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nesselsuchtartige Hauterkrankungen. Nierenleiden. Gicht.

• **UTERUS SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Uterus suis D10, Uterus suis D30, Uterus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **UTERUS SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Uterus suis D8, Uterus suis D12, Uterus suis D30, Uterus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Prolapsus uteri. Myomatosis uteri. Dysmenorrhoe. Präkanzerose des Uterus. Erosio portionis uteri. Weibliche Sterilität. Sonstige degenerative Erkrankungen des Uterus.

- **VACCININUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vaccininum-Nosode D20, Vaccininum-Nosode D30, Vaccininum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehr mals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vaccininum-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Folgen von Pockenimpfungen. Entzündliche Hautkrankheiten. Kopfschmerzen.

- **VALERIANA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15310.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Valeriana officinalis Dil. D12, Valeriana officinalis Dil. D30, Valeriana officinalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Valeriana-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **VALERIANA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15310.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Valeriana officinalis Dil. D4, Valeriana officinalis Dil. D12, Valeriana officinalis Dil. D30, Valeriana officinalis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Valeriana-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Valeriana officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen. Ischiasschmerz.

- **VENA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vena suis D10, Vena suis D30, Vena suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **VENA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vena suis D8, Vena suis D12, Vena suis D30, Vena suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Venöse Stase, Varikosis, Thrombose(neigung), Ulcus cruris. Durchblutungsstörungen. Claudicatio intermittens. Thromb(end)-angiitis obliterans (Morbus Buerger) – hierbei meist gleichzeitig bzw. vorher auch Thrombophlebitis. Periarteriitis nodosa (Kussmaul-Maier-Syndrom). Wadenkrämpfe, Mitralvitium.

- **VENTRICULUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ventriculus suis D10, Ventriculus suis D30, Ventriculus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **VENTRICULUS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ventriculus suis D8, Ventriculus suis D12, Ventriculus suis D30, Ventriculus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Achylia gastrica. Anaemia perniciosa. Postinfektiöse Anämie. Präkanzerose des Magens. Chronische Magengeschwürsleiden. Sodbrennen.

- **VERATRUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17402.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum album Dil. D12 (HAB, Vorschr. 4a), Veratrum album Dil. D30 (HAB, Vorschr. 4a), Veratrum album Dil. D200 (HAB, Vorschr. 4a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.)
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **VERATRUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17402.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum album Dil. D4 (HAB, Vorschr. 4a), Veratrum album Dil. D12 (HAB, Vorschr. 4a), Veratrum album Dil. D30 (HAB, Vorschr. 4a), Veratrum album Dil. D200 (HAB, Vorschr. 4a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Veratrum album entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

• **VESICA FELLEA SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica fellea suis D10, Vesica fellea suis D30, Vesica fellea suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **VESICA FELLEA SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica fellea suis D8, Vesica fellea suis D12, Vesica fellea suis D30, Vesica fellea suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Leberfunktion. Chronische Cholangitis und Cholezystitis. Bei zahlreichen Giftüberlastungen zu interponieren, auch bei Leberzirrhose, Urämie, Erythematodes u.a.

• **VESICA URINARIA SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica urinaria suis D10, Vesica urinaria suis D30, Vesica urinaria suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **VESICA URINARIA SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica urinaria suis D8, Vesica urinaria suis D12, Vesica urinaria suis D30, Vesica urinaria suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Nierenexkretion. Urämie, Nephrolithiasis. Oxalurie. Zystopyelitis. Hydronephrose. Glomerulonephritis und Nephrose. Papillome der Blase. Blasentenesmen. Prostataadenom. Wirkt kanalisierend und anregend auf die Nierenexkretion und die gesamte Giftentlastung; daher bei zahlreichen chronischen Krankheiten zu interponieren.

• **VINCETOXICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15312.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Dil. D10, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D30, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsampotenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Vincetoxicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **VINCETOXICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15364.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Dil. D4, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D10, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D30, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vincetoxicum hirundinaria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Virusinfektionen.

• **VIOLA TRICOLOR-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15367.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viola tricolor Dil. D12, Viola tricolor Dil. D30, Viola tricolor Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Viola tricolor-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Viola tricolor entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Ekzeme. Entzündung der Harnwege.

• **VIPERA BERUS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vipera berus D15, Vipera berus D30, Vipera berus D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vipera berus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündungen der Haut und der Venen. Blutungsneigung. Herz-Kreislauf-Schwäche. Angina pectoris.

• **VISCUM ALBUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119419.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viscum album Dil. D12, Viscum album Dil. D30, Viscum album Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren.
Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **VISCUM ALBUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viscum album D3, Viscum album D12, Viscum album D30, Viscum album D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Bei intravenöser Verabreichung können Überempfindlichkeitsreaktionen und plötzlicher Blutdruckabfall auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Viscum album entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.

- **VITAMIN A-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitamin A D10, Vitamin A D30, Vitamin A D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Coferment-Faktor im Stoffwechsel; versuchsweise – im Sinne eines homöopathisierten Allopathikums – bei Vitamin-A-Hypervitaminosen.

- **VITAMIN B_1-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitamin B_1 D10, Vitamin B_1 D30, Vitamin B_1 D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Co-Faktor für Fermentfunktionen (oxydative Dekarboxylierung).

- **VITAMIN B_2-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O D10, Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O D30, Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Co-Faktor für Fermentfunktionen (Flavoproteide und Redoxsysteme).

- **VITAMIN B_6-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119502.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Co-Faktor für Fermentfunktionen (Transaminasen, Dehydratasen, Desulfhydrasen, Dekarboxylasen).

- **VITAMIN B_{12}-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitamin B_{12} D10, Vitamin B_{12} D30, Vitamin B_{12} D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fett- und Kohlenhydratstoffwechselstörungen; Anregung der entgiftenden Leberfunktion.

• **VITAMIN C-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitamin C D10, Vitamin C D30, Vitamin C D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **VITAMIN C-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitamin C D6, Vitamin C D10, Vitamin C D30, Vitamin C D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Coferment-Faktor im Stoffwechsel (u.a. in Redoxsystemen; Mitwirkung beim Aufbau der Grundsubstanz des Bindegewebes).

• **YOHIMBINUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Yohimbinum D10, Yohimbinum D30, Yohimbinum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Yohimbinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Sexuelle Übererregbarkeit.

• **ZINCUM CYANATUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum cyanatum D10, Zincum cyanatum D30, Zincum cyanatum D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ZINCUM CYANATUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum cyanatum D6, Zincum cyanatum D10, Zincum cyanatum D30, Zincum cyanatum D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 3 und 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Zincum cyanatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfleiden.

• **ZINCUM METALLICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15227.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum metallicum Dil. D12, Zincum metallicum Dil. D30, Zincum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Zincum metallicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ZINCUM METALLICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15227.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum metallicum Dil. D6, Zincum metallicum Dil. D12, Zincum metallicum Dil. D30, Zincum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Zincum metallicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Zincum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krämpfe und Nervenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule, des Gehirns und des Rückenmarks. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände. Schlafstörungen.

- **ZINCUM VALERIANICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum valerianicum D12, Zincum valerianicum D30, Zincum valerianicum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ZINCUM VALERIANICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum valerianicum D6, Zincum valerianicum D12, Zincum valerianicum D30, Zincum valerianicum D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Zincum valerianicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervöse Schlafstörungen mit „unruhigen Beinen“. Nervenschmerzen.

4 Liste der neuen Bezeichnungen für homöopathische Wirkstoffe in registrierten Einzelmitteln

Bei zahlreichen Einzelmittel-Injeelen, die zwischenzeitlich nach neuem Arzneimittelrecht beim Bundesgesundheitsamt registriert wurden, musste aufgrund der neuen Rechtslage die Deklaration der Wirkstoffe auf Etiketten und Beipackzetteln umgestellt werden. Die Inhaltsstoffe selbst sind die gleichen geblieben. Die Präparatenamen wurden ebenfalls unverändert beibehalten, soweit nicht Änderungen der enthaltenen Potenzstufen einen unterscheidenden Zusatz zum Namen (z.B. „S“) erforderlich gemacht haben.
Die neuen Bezeichnungen der homöopathischen Wirkstoffe, wie sie auf den Etiketten und in den Packungsbeilagen unter „Zusammensetzung“ angegeben werden, sind, soweit sie sich von den bisher üblichen Bezeichnungen unterscheiden, in der nachfolgenden Tabelle fett gedruckt.

Abies nigra	**Resina piceae**
Abrotanum	**Artemisia abrotanum**
Acidum arsenicosum	Arsenicum album
Acidum fluor	**Acidum hydrofluoricum**
Acidum hydrofluoricum	Acidum fluor
Acidum silicicum	Silicea
Aconitum	**Aconitum napellus**
Aconitum napellus	Aconitum
Actaea	**Actaea spicata**
Actaea spicata	Actaea
Aesculus	**Aesculus hippocastanum**
Aesculus hippocastanum	Aesculus
Agaricus	**Amanita muscaria**
Agnus castus	**Vitex agnus-castus**
Amanita muscaria	Agaricus
Ammonium chloratum	Ammonium muriaticum
Ammonium muriaticum	**Ammonium chloratum**
Anacardium	**Semecarpus anacardium**
Anamirta cocculus	Cocculus
Antimonium crudum	**Stibium sulfuratum nigrum**
Argentum	**Argentum metallicum**
Argentum metallicum	Argentum
Arsenicum album	**Acidum arsenicosum**
Artemisia abrotanum	Abrotanum
Atropa belladonna	Belladonna
Aurum	**Aurum metallicum**
Aurum metallicum	Aurum
Baptisia	**Baptisia tinctoria**
Baptisia tinctoria	Baptisia
Belladonna	**Atropa belladonna**
Benzylpenicillinum-Kalium	Penicillin
Berberis	**Berberis vulgaris**
Berberis aquifolium	**Mahonia aquifolium**
Berberis vulgaris	Berberis
Borax	**Natrium tetraboracicum**
Bryonia	**Bryonia cretica**
Bryonia cretica	Bryonia
Cactus	**Selenicereus grandiflorus**
Calendula	**Calendula officinalis**
Calendula officinalis	Calendula
Cantharis	**Lytta vesicatoria**
Carduus marianus	**Silybum marianum**
Centella asiatica	Hydrocotyle asiatica
Cephaelis ipecacuanha	Ipecacuanha
Chamomilla	**Chamomilla recutita**
Chamomilla recutita	Chamomilla
Chelidonium	**Chelidonium majus**
Chelidonium majus	Chelidonium
China	**Cinchona succirubra**
Cimicifuga	**Cimicifuga racemosa**
Cimicifuga racemosa	Cimicifuga
Cinchona succirubra	China
Cinnabaris	**Hydrargyrum sulfuratum rubrum**
Cinnamomum	**Cinnamomum zeylanicum**
Cinnamomum zeylanicum	Cinnamomum
Citrullus colocynthis	Colocynthis
Cocculus	**Anamirta cocculus**
Coccus cacti	**Dactylopius coccus**
Coffea	**Coffea arabica**
Coffea arabica	Coffea
Colchicum	**Colchicum autumnale**
Colchicum autumnale	Colchicum
Colocynthis	**Citrullus colocynthis**
Conium	**Conium maculatum**
Conium maculatum	Conium
Cortison	**Cortisonacetat**
Cortisonacetat	Cortison
Cuprum	**Cuprum metallicum**
Cuprum metallicum	Cuprum
Dactylopius coccus	Coccus cacti
Damiana	**Turnera diffusa**
Datura stramonium	Stramonium
Digitalis	**Digitalis purpurea**
Digitalis purpurea	Digitalis
Dolichos pruriens	**Mucuna pruriens**
Dulcamara	**Solanum dulcamara**
Euphrasia	**Euphrasia officinalis**
Euphrasia officinalis	Euphrasia
Euspongia officinalis	Spongia
Fagopyrum	**Fagopyrum esculentum**
Fagopyrum esculentum	Fagopyrum
Filipendula ulmaria	Spiraea ulmaria
Galphimia	**Thryallis glauca**
Gelsemium	**Gelsemium sempervirens**
Gelsemium sempervirens	Gelsemium
Glonoinum	**Nitroglycerinum**
Hamamelis	**Hamamelis virginiana**
Hamamelis virginiana	Hamamelis
Hydrargyrum bichloratum	Mercurius sublimatus corrosivus
Hydrargyrum sulfuratum rubrum	
Hydrastis	Cinnabaris
Hydrastis canadensis	**Hydrastis canadensis**
Hydrocotyle asiatica	Hydrastis
Hyoscyamus	**Centella asiatica**
Hyoscyamus niger	**Hyoscyamus niger**
Hypericum	Hyoscyamus
Hypericum perforatum	**Hypericum perforatum**
	Hypericum
Ignatia	**Strychnos ignatii**
Ipecacuanha	**Cephaelis ipecacuanha**
Iris	**Iris versicolor**
Iris versicolor	Iris
Jaborandi	**Pilocarpus**
Juniperus sabina	Sabina
Kalium stibyltartaricum	Tartarus stibiatus
Kalmia	**Kalmia latifolia**
Kalmia latifolia	Kalmia
Ledum	**Ledum palustre**
Ledum palustre	Ledum
Leptandra	**Veronica virginica**
Lilium lancifolium	Lilium tigrinum
Lilium tigrinum	**Lilium lancifolium**
Lobaria pulmonaria	Sticta
Lycopodium	**Lycopodium clavatum**
Lycopodium clavatum	Lycopodium
Lytta vesicatoria	Cantharis
Mahonia aquifolium	Berberis aquifolium
Mercurius sublimatus corrosivus	**Hydrargyrum bichloratum**

Mucuna pruriens	Dolichos pruriens
Natrium chloratum	Natrium muriaticum
Natrium muriaticum	**Natrium chloratum**
Natrium tetraboracicum	Borax
Nerium oleander	Oleander
Nicotiana tabacum	Tabacum
Nitroglycerinum	Glonoinum
Nux vomica	**Strychnos nux-vomica**
Oleander	**Nerium oleander**
Papaver	**Papaver rhoeas**
Papaver rhoeas	Papaver
Penicillin	**Benzylpenicillinum-Kalium**
Picrasma excelsa	Quassia amara
Quassia amara	
Pilocarpus	Jaborandi
Podophyllum	**Podophyllum peltatum**
Podophyllum peltatum	Podophyllum
Prunus laurocerasus	Laurocerasus
Pulsatilla	**Pulsatilla pratensis**
Pulsatilla pratensis	Pulsatilla
Quassia amara	**Picrasma excelsa**
	Quassia amara
Rauwolfia	**Rauwolfia serpentina**
Rauwolfia serpentina	Rauwolfia
Resina piceae	Abies nigra
Rhus Tox	**Toxicodendron quercifolium**
Ruta	**Ruta graveolens**
Ruta graveolens	Ruta
Sabina	**Juniperus sabina**
Sanguinaria	**Sanguinaria canadensis**
Sanguinaria canadensis	Sanguinaria
Selenicereus grandiflorus	Cactus
Semecarpus anacardium	Anacardium
Silicea	**Acidum silicicum**
Silybum marianum	Carduus marianus
Solanum dulcamara	Dulcamara
Spiraea ulmaria	**Filipendula ulmaria**
Spongia	**Euspongia officinalis**
Stannum metallicum	Stannum
Stannum	**Stannum metallicum**
Stibium sulfuratumnigrum	Antimonium crudum
Sticta	**Lobaria pulmonaria**
Stramonium	**Datura stramonium**
Strophanthus	**Strophanthus gratus**
Strophanthus gratus	Strophanthus
Strychnos ignatii	Ignatia
Strychnos nux-vomica	Nux vomica
Syzygium cumini	Syzygium jambolanum
Syzygium jambolanum	**Syzygium cumini**
Tabacum	**Nicotiana tabacum**
Tartarus stibiatus	**Kalium stibyltartaricum**
Thryallis glauca	Galphimia
Toxicodendron quercifolium	Rhus Tox
Turnera diffusa	Damiana
Valeriana	**Valeriana officinalis**
Valeriana officinalis	Valeriana
Veronica virginica	Leptandra
Vincetoxicum	**Vincetoxicum hirundinaria**
Vincetoxicum hirundinaria	Vincetoxicum
Vitex agnus-castus	Agnus castus

5 Bestellung von Arzneimitteln

Bei dem Heel-Vollsortiment mit mehr als 1.000 verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln und homöopathischen Kombinationspräparaten ist es seitens der Apotheken aber auch des pharmazeutischen Großhandels nicht möglich, sämtliche Präparate in allen Darreichungsformen und Packungsgrößen vorrätig zu halten. Dies trifft besonders für die Einzelmittel in Form der Injeele und Injeel forte zu. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß Apotheken, die im Einzugsbereich von antihomotoxisch arbeitenden Therapeuten liegen, sich rasch auf deren Verordnungsgewohnheiten in ihrer Lagerhaltung einstellen. Es wird sich im Einzelfall dennoch bei seltener verordneten Präparaten der vorher erwähnten Präparategruppe nicht vermeiden lassen, daß die Präparate erst beschafft werden müssen.

In besonders dringenden Fällen bietet es sich deshalb an, die benötigten Präparate bei der Firma direkt zu bestellen. Sie kommen bei Auftragseingang vor 10.00 Uhr an die gewünschte Apotheke noch am gleichen Tag zum Versand.

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Postfach 10 03 49, 76484 Baden-Baden

Telefonische Auftragsannahme

Telefon	**(07221) 5 01-123**
Telefon Zentrale	**(07221) 5 01-00**
Telefax	**(07221) 5 01-210 und 5 01-284**
e-mail	**bestellungen@heel.de**

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.45 Uhr
Freitag 8.00 - 16.00 Uhr

Automatische Auftragsannahme nach Geschäftsschluß

Sollte es dennoch im Einzelfall zu Beschaffungsschwierigkeiten kommen, bitten wir um Mitteilung, damit diese ausgeräumt werden können und die Behandlung der Patienten mit antihomotoxischen Präparaten sichergestellt werden kann.

5.1 Ampullenregal als Organisationshilfe

Maße 90 cm hoch, 55 cm breit, 20 cm tief. Das zum Selbstkostenpreis erhältliche Ampullenregal bietet die Möglichkeit die in der Praxis laufend benötigten Heel Ampullen-Präparate in einer übersichtlichen Form entweder Indikations- oder Präparate-bezogen vorrätig zu halten. In diesem Regal lassen sich 156 Kunststoff-Schiebefächer für jeweils ca. 45 Ampullen unterbringen. Das Regal ist weiß lackiert und kann entweder auf einem Tisch abgestellt oder mit den jeweils beigefügten Metallaufhängern an der Wand angebracht werden.

5.2 Zuzahlungsregelung nach Packungsgrößen

	Packungsgröße (N1)	Packungsgröße (N2)	Packungsgröße (N3)
Tabletten (Stück)	bis 150	151 - 250	251 - 500
Tropfen (ml)	bis 50	51 - 100	101 - 200
Ampullen (Stück)	bis 10	11 - 50	51 - 100
Salbe (g)	bis 50	51 - 100	101 - 200
Suppositorien (Stück)	bis 20	21 - 60	61 - 120
Nasentropfen (ml)	bis 20	–	–

Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen (Phytotherapie, Homöopathie, Anthroposophie) gehören zu den Leistungen, die gesetzlichen Krankenkassen den Versicherten unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes grundsätzlich zur Verfügung stellen (vgl.: §2, Abs. 1, Satz 2, SGB V). Gemäß §2 Abs. 2 der Verordnung über unwirtschaftliche Arzneimittel dürfen homöopathische Präparate – sofern sie nicht von der Negativliste betroffen sind – zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden.
Gemäß §92a, Abs. 6, SGB V sind Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen zukünftig in die Positivliste* aufzunehmen und bleiben somit verordnungsfähig zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach den neuen Arzneimittel-Richtlinien vom 31.08.1993, Ziffer 13, sind die Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen von der Verordnung nicht ausgeschlossen.

* Wirkstoffbezogene Vorschlagsliste verordnungsfähiger Fertigarzneimittel für die Anwendung in der vertragsärztlichen Versorgung

6 Haltbarkeit der Heel-Präparate

Die Heel-Präparate sind bei sachgerechter Lagerung 5 Jahre haltbar. Soweit ein Verfalldatum angegeben ist, soll das Arzneimittel nach Ablauf dieses Datums nicht mehr angewendet werden.

Tropflösungen sollten nach längerem Stehen zweckmäßigerweise mehrmals geschüttelt werden. Alle Darreichungsformen der Präparate sollten vor übermäßiger Erwärmung und direkter Sonnenbestrahlung geschützt werden. Die Tablettenpräparate sind auch vor Feuchtigkeit zu schützen.

Die Zäpfchenpräparate dürfen niemals (auch nicht kurzfristig) oberhalb 30 °C aufbewahrt werden, da sonst die Zäpfchenmasse erweicht oder schmilzt.