Ordinatio

Antihomotoxica et Materia Medica

Praktisches Lehrbuch der
Antihomotoxischen Therapie
2007

AURELIA

Ordinatio Praktisches Lehrbuch der Antihomotoxischen Therapie 2007

21 407

AURELIA

ISBN 978-3-936676-43-3

Ordinatio

Antihomotoxica et Materia Medica

Praktisches Lehrbuch der Antihomotoxischen Therapie

Herausgegeben vom Aurelia-Verlag in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.

Wir danken der Firma Heel für die freundliche Überlassung der Fachinformationen zu den Arzneimitteln.

AURELIA

13. aktualisierte Auflage
Stand April 2007
ISBN 978-3-936676-43-3

© Copyright 2005 by Aurelia-Verlag GmbH
Bahnackerstr. 16, 76532 Baden-Baden
E-Mail: info@aurelia-verlag.de
Internet: www.aurelia-verlag.de

Druck: Konkordia GmbH, Bühl
Printed in Germany

Inhalt

Ordinatio Antihomotoxica et Materia Medica

1 Vorwort 11

2 Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie 12

Grundlagen

3 Grundbegriffe der Homotoxikologie 13

4 Therapie mit Biotherapeutika-Antihomotoxika-Heel 21

5 Biotherapeutika-Antihomotoxika, ihr stofflicher Aufbau und ihre medizinisch-therapeutische Wirkweise 31

6 Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg 34

7 Dedifferenzierungsphasen 38

8 Schmerzbehandlungen 41

9 Schadstoffbelastung 42

10 Amalgam-Ausleitung 44

11 Mikrobiologische Therapie: Ein Therapiekonzept zur Immunmodulation 45

12 Allgemeine Regeln zum praktischen Vorgehen beim therapeutischen Einsatz der Heel-Präparate 47

13 Erstattungsmöglichkeiten von Heel-Präparaten 50

Therapeutischer Index

14 Einleitung zum Therapeutischen Index 54

15 Therapeutischer Index 55

Heel-Kombinationspräparate

1 Kombinationspräparate 177

Heel-Einzelmittel

2 Heel-homöopathische Einzelmittel (in Potenzenaccorden und Einzelpotenzen) 237

Cosmochema-Präparate

3 Präparateübersicht 321

Fides-Präparate

4 Präparateübersicht 333

Einzelbestandteile

5 Von Heel, Cosmochema, Fides in Kombinationspräparaten 341

Haltbarkeit der Präparate und PZN

6 Haltbarkeit der Präparate 348

7 Pharma-Zentral-Nummern von Heel, Cosmochema, Fides 349

Ordinatio

Antihomotoxica et Materia Medica

Praktisches Lehrbuch der Antihomotoxischen Therapie

Herausgegeben vom Aurelia-Verlag in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.

Wir danken der Firma Heel für die freundliche Überlassung der Fachinformationen zu den Arzneimitteln.

Inhalt

Ordinatio Antihomotoxica et Materia Medica

1 Vorwort 11

2 Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie 12

Grundlagen

3 Grundbegriffe der Homotoxikologie 13

4 Therapie mit Biotherapeutika-Antihomotoxika-Heel 21

5 Biotherapeutika-Antihomotoxika, ihr stofflicher Aufbau und ihre medizinisch-therapeutische Wirkweise 31

6 Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg 34

7 Dedifferenzierungsphasen 38

8 Schmerzbehandlungen 41

9 Schadstoffbelastung 42

10 Amalgam-Ausleitung 44

11 Mikrobiologische Therapie: Ein Therapiekonzept zur Immunmodulation 45

12 Allgemeine Regeln zum praktischen Vorgehen beim therapeutischen Einsatz der Heel-Präparate 47

13 Erstattungsmöglichkeiten von Heel-Präparaten 50

Therapeutischer Index

14 Einleitung zum Therapeutischen Index 54

15 Therapeutischer Index 55

1 Vorwort

Die Verschmelzung der Schulmedizin mit der Homöopathie war die Vision von Dr. Hans-Heinrich Reckeweg. Dass damit zugleich das Fundament für eine neue Qualität der Medizin gelegt wurde, war vor 50 Jahren sicher den wenigsten Therapeuten bewußt. Zielsicher, mit einer unverwechselbaren Mischung aus therapeutischem Geschick, Imaginationskraft und wissenschaftlichem Anspruch, hat Reckeweg mit der Homotoxikologie eine zukunftsweisende Methode geschaffen, von der Millionen Patienten heute weltweit profitieren.

Längst ist die moderne Homöopathie keine Therapierichtung mehr, die nur wenigen "Außenseitern" vorbehalten bleibt. Zahlreiche wissenschaftlich erarbeitete Studienergebnisse belegen die breite Wirkung der Komplexmittelhomöopathika aus dem Hause HEEL.
Angesichts der zahlreichen Nebenwirkungen und iatrogenen Schäden durch allopathische Medizin, wird der Ruf nach einer nebenwirkungsarmen Therapie immer größer. Gerade chronische Erkrankungen, die oft multikausale Ursachen haben, scheinen hierfür besonders geeignet zu sein.
Es liegt in der Hand der Therapeuten – in Ihren Händen – dieses Potential zu nutzen.

Immer wieder wurden in der Vergangenheit Studien zur Grundlagenforschung des Therapiekonzeptes der Homotoxikologie gefordert und zwischenzeitlich ist es auch gelungen, die direkten Einflüsse des homotoxikologischen Prinzips auf biochemische Reaktionen zu zeigen. Damit bestätigt sich Reckewegs Vorstellung, alle Lebensäußerungen seien "chemisch" fassbare Vorgänge.
Antivirale Effekte, Wirkungen auf Enzymsysteme und auf Rezeptoren der glatten Muskulatur waren Ergebnisse jüngster Forschung, um nur einige zu nennen.

Einen weiteren großen Vorteil hat die Homotoxikologie für alle Anwender. Sie ist systematisch - logisch und damit lehr- und lernbar.
Weltweit werden Fortbildungen nach höchsten Qualitätsstandards durchgeführt und werden von immer mehr Kolleginnen und Kollegen belegt. In verschiedenen Ländern werden die Fortbildungen in Kooperation mit Universitäten zur Erlangung von Diplomen und Zertifikaten für Homotoxikologie durchgeführt, neuerdings auch mit Zertifizierung durch die WHO.
In seinen Grundzügen ist der Einsatz der Heel-Arzneimittel nach dem homotoxikologischen Prinzip aber schon mit wenig Aufwand durchführbar. Die vorliegende Neuauflage der "Ordinatio – Antihomotoxica et Materia Medica" leitet dazu an. Sie bietet homotoxikologische Therapieanleitungen zu alphabetisch geordneten Indikationen und zwar beginnend von der empfohlenen Basistherapie bis hin zu begleitenden Maßnahmen. Eine ebenfalls alphabetisch sortierte Arzneimittelübersicht komplettiert die leichte Handhabbarkeit der Ordinatio, ergänzt um eine Darstellung der wesentlichen aktuellen Erkenntnisse über die Homotoxikologie.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit den Arzneimitteln und dem Konzept der Homotoxikologie erfolgreich therapieren. Und, dass Ihnen dazu die "neue" Ordinatio eine gleichermaßen schnelle wie kompetente Hilfe ist! Dem Wunsch des Autorenteams der 1959 erschienenen Erstauflage, wonach die Ordinatio klare Richtlinien und Sicherheit bieten möge für die Anwendung einer kausalen, modernen und wissenschaftlich fundierten Behandlungsmethodik, schließe ich mich uneingeschränkt an!

Dr. med. Franz-Anselm Graf von Ingelheim
Präsident der
Internationalen Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.

2 Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.

Die „Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.“ ist eine Gesellschaft, der approbierte Ärzte aller Fachrichtungen der Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Apotheker angehören.

Die Gründung der „Internationalen Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.“ fand am 24. Juni 1961 in Baden-Baden statt, wo sich seither auch ihr Sitz befindet. Sie wurde von dem deutschen Arzt Dr. H.-H. Reckeweg ins Leben gerufen, der auch die Grundlagen der „Homotoxikologie – Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin“ im Jahre 1955 schuf. Das therapeutische Konzept hat sich in Klinik und Praxis bewährt.

Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Pflege und Förderung der Homotoxinlehre und der Homotoxinforschung sowie der auf der Homotoxikologie basierenden antihomotoxischen Therapie im In- und Ausland zu vertreten. Zu diesem Zweck wurde 1992 die „Akademie für Homotoxikologie“ gegründet. Ihre wesentliche Aufgabe ist die Durchführung von Seminaren mit dem Ziel der ärztlichen Fortbildung und Weiterbildung. Auf diesen Veranstaltungen werden Forschungsergebnisse aus Klinik und Praxis diskutiert und ihre Anwendung in der Praxis verdeutlicht.

In folgenden Ländern wurden bereits weitere Gesellschaften gegründet:

Belgien
Belgische Vereniging voor Homotoxicologie en antihomotoxische Therapie v.z.w. bzw. Association Belge d'Homotoxicologie et de Thérapie Antihomotoxique a.s.b.l.
Booiebos 25, B-9031 Drongen

Brasilien
Sociedade Brasileira de Homotoxicologia e Terapieas Antihomótoxicas,
Rua do Acre 616, CEP 03181-100 São Paulo S.P.

Chile
Fundación de Homotoxicología Heel Chile,
Guardia Vieja 255, Oficina 411, Providencia/Santiago

Ecuador
Sociedad Médica de Terapia Antihomotóxica y Homotóxica del Ecuador “SOMTHAE”,
Av. Peública E215 y Atahualpa

El Salvador
Asociación de Homotoxicologia y Terapia Antihomotóxica de El Salvador,
Apartado Postal No. 3 San Salvador C.A.

Georgien
Society of Biological Medicine and Homotoxicology,
A. Kazbegi Ave. 33, Tbilisi 38007

Griechenland
Elliniki Eteria Omotoxikologias
Merkouriou 8, 54655 Thessaloniki

Großbritannien
The Society for Homotoxicology & Anti-Homotoxic Therapy – GB,
c/o P.O. Box 217, Ashford, Kent TN23 6ZU

Guatemala
Asociacion Médica de Homotoxicologia de Guatemala (AMHOGUA),
10 calle 1-74 Z.I. Guatemala, Ciudad

Italien
Associazione Italiana di Omotossicologia,
Via Durini, 9, I-20121 Milano

Kanada
The Society of Homotoxicology of North America,
P O Box 11280 Albuquerque, NM 87123-3376, USA

Kolumbien
Centro de Medicina Biológica,
Carrera 26 # 2-38, Cali, Colombia

Lettland
Latvijas Homotoksikoloģijas un antihomotoksiskās terapijas biedrība
Šmerļa 2, Rīga, LV-1006

Litauen
Homotoksikologijos ir Antihomotoksinės Terapijos Asociacija,
Partizanų g. 198-5, 3041 Kaunas, Lietuva

Mexiko
Sociedad Médica Mexicana de Homotoxicología S.A.,
Calle Aurora #609; Col. Jacarandas, C.P. 62420; Cuernavaca, Morelos

Österreich
Österreichische Ärztegesellschaft für Homotoxikologie und Antihomotoxische Therapie,
Postfach 64, A-1232 Wien

Polen
Sekcja Homotoksykologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Platan Park I, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

Portugal
Sociedade Médica Portuguesa de Homotoxicologia,
Rua de Correeiros 41 - 3Ro, 1100 Lisboa

Schweiz
Schweizerische Gesellschaft für Homotoxikologie und regulative Therapieverfahren,
Paracelsus Klinik, CH-9062 Lustmühle b. St. Gallen

Slowakei
Slovenská spoločnosť pre homotoxikológiu a antihomotoxickú terapiu,
Grösslingová 58, 811 09 Bratislava

Spanien
Sociedad Española de Homotoxicología y Terapia Antihomotóxica,
Apartado de correos 161, E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Südafrika
Biological Medicines Association,
P.O. Box 2839, Paarl 7620

Tschechien
Česká lékařská společnost pro homotoxikologii a antihomotoxickou terapii,
Čestmírova 1, 140 00 Praha 4

USA
Society of Homotoxicology of North America,
P O Box 11280 Albuquerque, NM 87123-3376, USA

Venezuela
Asociaciõn Médica Venezolana de Homotoxicolocía,
Calle 10 y 5, Edificio Walpirema, Zdo. Piso, La Urbina, Caracas

Aus der angesehenen Zeitschrift „Biologische Medizin“ wurden weitere Fachzeitschriften ins Leben gerufen, z.B.

Journal of Biomedical Therapy – Integrating Homotoxicology and Mainstream Medicine (USA)
Medicina Biológica (Spanien)
La Medicina Biologica Rivista Italiana Di Omotossicologia (Italien)
Biologinė Medicina (Littauen)
Medycyna Biologiczna (Polen)
Биологическая Медицина (Biologische Medizin - Russland)
Биологическая Терапиа (Biologische Therapie - Ukraine)
Dansk Journal for Biomedicinsk Forskning og Terapi, BM (Dänemark)

Ferner gehört die Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V. als Mitgliedsverband folgenden Organisationen an:

Der Hufelandgesellschaft für Gesamtmedizin e.V.
ECPM = European Council Of Doctors For Plurality In Medicine, Bruxelles (= Europäische Vereinigung der Ärzteverbände der besonderen Therapierichtungen Brüssel).

Bei der Entwicklung und Pflege der Homotoxinlehre haben sich folgende Präsidenten und Ehrenpräsidenten verdient gemacht:

Ehrenpräsidenten
Dr. med. Hans-Heinrich Reckeweg, Baden-Baden
Dr. med. Manfred Vosgerau, Hamburg
Dr. med. Johannes John, Baden-Baden

Präsidenten

1961 - 1975	Dr. med. Manfred Vosgerau, Hamburg
1975 - 1983	Dr. med. Helmut Winterberg, Mannheim
1984 - 1989	Dr. med. Johannes John, Baden-Baden
seit 1989	Dr. med. Franz-Anselm Graf von Ingelheim, Geisenheim

Personen, die sich für die Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V. interessieren, Literatur, Forschungsschriften oder Information zu Seminaren der Homotoxinlehre wünschen, wenden sich bitte an folgende Adresse:

IGHH
Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V.
Waldseestraße 2c, 76530 Baden-Baden
Telefon +49 (0) 7221 18301-10
Telefax +49 (0) 7221 18301-89
info@homotox.de

3 Grundbegriffe der Homotoxikologie

Die klassische Homöopathie nach Hahnemann (1811) orientiert sich zur Therapiefindung am so genannten Arzneimittelbild. Es besagt, dass sich Krankheitssymptome spiegelbildlich zu solchen Arzneisymptomen verhalten, die gesunde Probanden nach Einnahme einer Urtinktur oder Potenz entwickeln. Das daraus ableitbare Wirkprinzip ist die *Simile-Regel* (Similia similibus curentur = Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden): Das bei einem Kranken auftretende Krankheitsbild kann durch eine künstlich erzeugte, ähnliche Krankheit ausgelöscht werden. Es kann auch nach einem Aequale-Prinzip (*Isopathie* = Gleiches soll durch Gleiches geheilt werden) vorgegangen werden, wie dies mit potenzierten allopathischen Substanzen oder zum Teil Nosoden in der Antihomotoxischen Medizin erfolgt bzw. mit Vakzinen oder Impfstoffen in der konventionellen Medizin durchgeführt wird.

Die klassische Homöopathie arbeitet mit Einzelmitteln, die jedoch nur zum Teil echte Einzelmittel sind (z.B. Schwefel, Quecksilber, Arsen usw.), sonst jedoch als Auszüge einzelner Pflanzen ein hochkomplexes Gemisch zahlreicher Inhaltsstoffe darstellen. Repertorien (Auflistung von Arzneimittelbildern) erleichtern dem Homöopathen die Zuordnung zu dem jeweils individuellen Krankheitsbild.

In der Antihomotoxischen Medizin wird meist indikationsbezogen (Orientierung an objektiven Symptomen) vorgegangen. Die Antihomotoxischen Arzneimittel stellen überwiegend Substanzgemische niedriger bis mittlerer Potenzen dar.

Bei der praktischen Anwendung des homöopathischen Heilprinzips ergab sich von selbst, dass die Anwendung von sehr kräftigen oder giftigen Urtinkturen dem Kranken schaden kann und daher nur in homöopathischen Verdünnungen, d.h. Potenzierungen, verwendet werden darf. Diese Praxis wurde wissenschaftlich von Rudolf Arndt (Psychiater, 1835–1900) und Hugo Schulz (Pharmakologe, 1853-1932) durch eine quantitative Differenzierung der Arzneimittelwirkung auf Biosysteme untermauert und hat als *Arndt-Schulz-Regel* (biologisches Grundgesetz) nach wie vor Gültigkeit. Sie besagt:

Schwache Reize regen die Lebensfunktionen an (Umkehreffekt homöopathischer Präparate),
mittelstarke Reize verhalten sich neutral, starke wirken hemmend,
stärkste heben die Lebensfunktionen auf.

Da bei Entwicklung einer Krankheit zumeist mehrere gewebeunverträgliche Substanzen beteiligt sind, ist die gleichzeitige Anwendung mehrerer potenzierter „Gegengifte“, wie sie in den Antihomotoxischen Präparaten vorliegen, gerechtfertigt.

Die Homotoxikologie wurde von Hans-Heinrich Reckeweg begründet (Reckeweg, 1976):
„Nach der Homotoxinlehre sind alle jene Vorgänge, Zustandsbilder und Erscheinungen, die wir als Krankheiten bezeichnen, der Ausdruck dessen, dass der Körper mit Giften kämpft und dass er diese Gifte unschädlich machen und ausscheiden will. Entweder gewinnt dabei der Körper oder er verliert den Kampf. Stets aber handelt es sich bei jenen Vorgängen, die wir als Krankheiten bezeichnen, um biologische, d.h. naturgerechte Zweckmäßigkeitsvorgänge, die der Giftabwehr und Entgiftung dienen.“

Die körpereigene zelluläre Abwehr enthält eine unspezifische Komponente (zusammengefasst als das retikuloendotheliale System [RES]; Makrophagen, neutrophile Granulozyten, kapilläre Endothelzellen mit der Eigenschaft von Makrophagen, z.B. in Leber, Knochenmark, Milz) und eine spezifische (T- und B-Lymphozyten) Komponente. Eine allgemeine Barrierefunktion gegenüber einer Vielzahl antigener Substanzen üben Epithelien und Gefäßendothelien aus. Das gleiche gilt für die Molekularsiebfunktion der extrazellulären Matrix.

3.1 Homotoxine

Unter dem Begriff Homotoxine wurden von Reckeweg alle für den Menschen schädliche Stoffe zusammengefasst (Reckeweg, 1957). Denn nicht alle Schadstoffe und Gifte wirken bei allen Lebewesen gleich oder sind überhaupt giftig. Homotoxine können von außen zugeführt werden (exogene Homotoxine) oder im Körper selbst durch physiologische oder pathologische Reaktionen entstehen (endogene Homotoxine). Entsprechend der zunehmenden Zahl künstlicher organischer Verbindungen in allen Lebensbereichen steigt auch die Bedeutung der Homotoxine.

3.2 Phasenlehre, biologischer Schnitt, Vikariationsprinzip

Es ist der Verdienst Reckewegs, die Reaktionen des Körpers gegen ihn bedrohende Schadstoffe (Homotoxine) in ein morphologisch-zeitliches Gefüge von sechs abgestuften Phasen gegliedert zu haben:

1. Exkretionsphase
2. Inflammationsphase
3. Depositionsphase
4. Imprägnationsphase
5. Degenerationsphase
6. Dedifferenzierungsphase

3.3 Antihomotoxische Arzneimittel

Es lassen sich vier Gruppen Antihomotoxischer Arzneimittel unterscheiden:

Kombinationspräparate, bestehend aus mehreren potenzierten Einzelmitteln und Einzelsubstanzen (Niedrig- bis Hochpotenzen).

Potenzenaccorde verschiedener homöopathischer Einzelmittel (Potenzenaccorde tragen den Zusatz „Injeel“ und „forte“). Sie enthalten höhere und Hochpotenzen, um mögliche Erstreaktionen abzudämpfen.

Homaccorde. Sie werden durch Kombination von Potenzenaccorden verschiedener homöopathischer Einzelmittel hergestellt, die zu einem fixen Kombinationspräparat vereint sind.

Einzelpotenzen von verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln.

Die Darreichungsformen sind Injektionslösungen, Tabletten, Tropfen, Zäpfchen und Salben.

3.4 Wirkprinzipien der Antihomotoxischen Medizin

Jeder Organismus benötigt zur Aufrechterhaltung seiner vitalen Funktionen Energie, die durch den Stoffwechsel fortlaufend bereitgestellt werden muss. Störungen des Energiestoffwechsels beeinträchtigen deshalb stets auch die Energieversorgung, die von der endogenen Regulation gesteuert wird.

Abb. 1 Phasentabelle



Als übergeordnetes Prinzip lässt sich eine funktionelle Dreiteilung in *humorale Phasen* (1 und 2), *Matrixphasen* (3 und 4) und *zelluläre Phasen* (5 und 6) erkennen (Abb. 1).

Der biologische Schnitt liegt zwischen den Matrixphasen 3 und 4. Dies hebt die Bedeutung der Matrix als Mittlerin zwischen humoralen und zellulären Phasen besonders hervor.

Der biologische Schnitt markiert letztlich die Grenze ganzheitlicher Regulation eines Organismus mit der Gefahr des Übergangs in eine zunehmende regulatorische Entkopplung seiner Subsysteme, z.B. Verlust der regulatorischen Kopplung zwischen Hormon- und Immunsystem (chronische Krankheiten) bis hin zur Entkopplung von Zellfunktionen (z.B. Aufheben des genetisch programmierten Zelltods [Apoptose] bei Tumoren).

Der biologische Schnitt ist auch für das Verständnis des *Vikariationsprinzips* der Antihomotoxischen Medizin unerlässlich. Das Prinzip besagt, dass ein Krankheitsbild sich unter einer Therapie dann bessert oder als geheilt gelten kann, wenn die einzelnen Phasen rückläufig bis einschließlich der Exkretionsphase durchschritten worden sind (*regressive Vikariation*), ein Verharren in einzelnen Phasen ist dabei möglich. Eine *progressive Vikariation* bedeutet dagegen Verschlechterung des Zustandes.

Der Organismus ist ein energetisch offenes System – geeignete Energie muss (in Form von Nahrungsmitteln) zugeführt, ungeeignete abgeführt werden. Auf diese Weise lässt sich ein labiler Ordnungszustand, fernab von einem thermodynamischen Gleichgewicht, über längere Zeit („Lebensspanne“) erhalten.

Alle Reaktionen von Organismen laufen im wässrigen Milieu bei relativ niedriger Temperatur ab, deshalb müssen sie beschleunigt, d.h. katalysiert werden.

• SYSTEM DER GRUNDREGULATION

Voraussetzung für eine effektive Katalyse sind geeignete Substrate zwischen und in den Zellen. Da der Extrazellulärraum den Zellen vorgeschaltet ist, können die Zellen nur so reagieren, wie sie über den Extrazellulärraum informiert werden. Die dynamische Struktur des Extrazellulärraumes und dessen Regelung („Grundregulation“) entscheidet daher über die Effektivität extra- und intrazellulärer Katalysen. Dies hängt von der Struktur der Grundsubstanz (extrazelluläre Matrix bzw. Matrix) ab. Sie stellt in allen Zellen und Zellverbänden ein Molekularsieb aus Matrixkomponenten dar, wie hochpolymere Zuckerprotein- und Zuckerkomplexe (Proteglykane-Glykosaminoglykane, PG/GAGs), Strukturproteine (Kollagen, Elastin) und Vernetzungsglykoproteine (z.B. Fibronektin) (Abb. 2). Die PG/GAGs sind elektro-

negativ geladen und daher zur Wasserbindung, aber auch Ionenaustausch befähigt. Sie sind daher die Garanten für Isoionie, Isoosmie und Isotonie in der Matrix.
Über die blind in der Matrix endenden vegetativen Nervenfasern erfolgt der Anschluss an das Zentralnervensystem, über die die Matrix durchsetzende Endstrombahn an das System der innersekretorischen Drüsen (Hypophyse, Schilddrüse, Nebennieren u.a.m.). Beide Systeme sind im Gehirnstamm miteinander verbunden und an übergeordnete Zentren des Gehirns angeschlossen (Abb. 2). Auf diese Weise wird in der Matrix nicht nur vor Ort, sondern auch stets unter dem Einfluss übergeordneter Steuergebiete geregelt. Regelzentrum in der Matrix ist der Fibroblast (im Zentralnervensystem entspricht ihm die Gliazelle). Auf alle eingehenden Informationen (Hormone, Neurosubstanzen, Metaboliten, Kataboliten, pH-Wert-Änderungen u.a.m.) reagiert er sofort mit einer situationsgerechten Synthese von Matrixkomponenten. Dabei unterscheidet er nicht zwischen „guter“ oder „böser“ Information. Auf diese Weise kann jedes Zuviel oder Zuwenig in individueller Abhängigkeit in einen *Circulus vitiosus* mit u.U. deletären Folgen für das Gesamtsystem führen.

Wichtig dabei ist, dass aufgrund der Sieb- wie auch Bindungseigenschaften der PG/GAGs immer auch die Gefahr der Verschlackung der Matrix besteht, mit Entwicklung einer latenten Gewebsazidose, Anstieg freier Radikale und Aktivierung des proteolytischen Systems mit Übergang in eine proinflammatorische Situation. Letztlich können Schädigungen aller humoralen und zellulären Elemente auftreten, mit Fortschreiten von zunächst anhaltenden Befindensstörungen zu chronischen Krankheiten und malignem Geschehen.



Abb. 2 Schema der Grundregulation

Wechselseitige Beziehungen (Pfeile) zwischen Endstrombahn (Kapillaren, Lymphgefäße), Grundsubstanz, terminalen vegetativen Axonen, Bindegewebszellen (Mastzellen, Abwehrzellen, Fibroblasen usw.) und Organparenchymzellen. Epitheliale und endotheliale Zellverbände sind von einer zur Grundsubstanz vermittelnden Basalmembran unterlagert. Jede Zelloberfläche trägt einen mit der Grundsubstanz verbundenen Glykoprotein- und lipidfilm (gepunktete Linie), wozu auch die Histokompatibilitätskomplexe (MHC) gehören. Die Grundsubstanz ist über die Endstrombahn an das Endokrinium, über die Axone an das ZNS angeschlossen. Der Fibroblast ist das stoffwechselaktive Zentrum (aus 3).

3.5 Literatur

(1) Hahnemann S, Reine Arzneimittellehre. Dresden, 1811; ders.: Kleine med. Schriften, ges. und herausgegeben von D. Ernst Stapf, Dresden und Leipzig, 1829; ders.: Unterricht für Wundärzte. Leipzig, 1789; ders.: Die chronischen Krankheiten. Dresden und Leipzig, 1835; ders.: Organon der Heilkunst. Dresden und Leipzig, 1829.

(2) Harisch H, Dittmann J. Untersuchungen zur Wirkung von Ubichinon Injeel und Injeel forte mit zellfreien Systemen. Biol Med 1997; 26(3):99-104

(3) Heine H. Lehrbuch der biologischen Medizin. 2. Auflage Stuttgart: Hippokrates 1997a

(4) Reckeweg HH. Homotoxikologie. Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin. Baden-Baden: Aurelia, 1976

(5) Reckeweg HH. Materia medica: homeopathia antihomotoxica. 3rd rev. English ed. Baden-Baden: Aurelia-Verlag, 1996.

3.6 Forschung in der Homotoxikologie

Entscheidende Beiträge zur wissenschaftlichen Fundamentierung der Homöopathie leistet die Firma Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden. Im Fokus einer starken Forschungsabteilung und internationalen Kooperationen mit Instituten und Experten stehen bei Heel vorrangig zwei Ziele:

1. Nachweis der Präparate-Wirksamkeit
2. Entschlüsselung der Wirkmechanismen durch Grundlagenforschung

Aus beiden Feldern gibt es laufend neue Ergebnisse, die regelmäßig publiziert werden. Sie liefern gesicherte Argumente in der Diskussion um die Belegbarkeit der Homöopathie – systematisch und aktuell.

Von Hahnemann zu moderner Forschung

Die Simile-Regel von Hahnemann besagt, dass eine Substanz bestimmte Symptome beim Gesunden hervorrufen kann, die in „Verdünnung" (Potenzierung) gegeben, bei Kranken „ähnliche" Symptome kurieren kann.

Grundlage jeder homöopathischen Therapie sind deshalb Arzneimittelbilder der Einzelmittel, die ausführliche Sammlungen von Symptomen darstellen. In dieser klar definierten Form war die Arzneimittelprüfung am Gesunden zu Hahnemanns Zeit revolutionär und hatte als wissenschaftliches Experiment bereits Grundzüge der heutigen Arzneimittelforschung.

Auch heute, nach über 200 Jahren Therapiegeschichte in der Homöopathie, fühlt sich die Homotoxikologie dieser Grundlage verpflichtet. Allerdings ebenso unter Einbeziehung der modernen Pharmazie und Medizin.

Homöopathische Arzneimittelprüfungen sind keine undefinierten Versuche, sondern klinische Prüfungen an gesunden Probanden. Sie entsprechen internationalen Vorschriften wie EU-Directives und CPMP/ICH-Guidelines, der Deklaration von Helsinki, der Berufsordnung der Ärzte sowie dem arzneimittelrechtlichen Vorgehen.

Die klinischen Studien entsprechen den Good Clinical Practice Guidelines. Sie regeln für klinische Prüfungen Planung, Durchführung und Dokumentation und stellen die Glaubwürdigkeit der Daten sowie die Rechte der Probanden und Patienten sicher.

Ziel der Forschung ist, neue Perspektiven in die Medizin zu bringen. So werden Wirksamkeitsstudien durchgeführt, in denen die Homöopathika mit allopathischen Arzneimitteln verglichen werden. Der wissenschaftliche Nachweis der Ersetzbarkeit chemischer Substanzen durch Homöopathika ist in der Homotoxikologie ein großes Anliegen (und schon mehrfach gelungen). Zweiter Ansatz der Generierung neuer Sichtbilder in der Medizin ist die Grundlagenforschung. Auch hier ist Heel seit Jahren aktiv und liefert wegweisende Ergebnisse – für die erfolgreiche und sichere Therapie.

Wirksamkeitsnachweise

Die Antihomotoxischen Kombinationsarzneimittel sind auf die Gesetzmäßigkeiten der Homotoxikologie zugeschnitten. Charakteristisch für diese Arzneimittel ist ein Effekt in drei Bereichen, der in der Summe die therapeutische Wirksamkeit ausmacht. Das sind:

1. Matrixentgiftendes Potential („Homotoxin-Ausleitung")
2. Organstärkendes Potential
3. Immunmodulierendes Potential

Das Matrixentgiftende Potential bedingte historisch die Sammelbezeichnung „Antihomotoxika". Die wissenschaftliche Verifizierung aller drei bislang empirisch ermittelten Effekte ist Gegenstand der Grundlagenforschung.

Für den Nachweis der klinischen Wirksamkeit werden neben den homöopathischen Arzneimittelprüfungen eine Vielzahl von Studien durchgeführt. Fragestellungen der Studien sind die bewährten Indikationen. Zwei Arten von Untersuchungen sind von besonderer Bedeutung:

Anwendungsbeobachtung (AWB): Bei diesem Studientyp werden große Fallzahlen (hundert bis zigtausend Patienten) erfasst und mit Hilfe statistischer Methoden deskriptiv ausgewertet. Ziel ist, statistisch valide Aussagen zu bestimmten Merkmalen wie Verträglichkeit oder Sicherheit zu bekommen. Auch Ereignisse, die erst eine Langzeituntersuchung an den Tag bringt, sind die Spezialität der AWB.

Klinische Studie: Sie ist eine von der Schulmedizin anerkannte wissenschaftliche Methode, die unter kontrollierten Bedingungen die Wirksamkeit eines Präparates nachweisen kann. In der Antihomotoxischen Medizin wurden in den letzten 10 Jahren eine Reihe von klinischen Studien zu verschiedenen Präparaten durchgeführt und publiziert.

ERGEBNISSE AKTUELLER KLINISCHER STUDIEN:

Im Folgenden werden aktuelle Studien, die Ergebnisse und vor allem deren große Bedeutung für die Therapie beschrieben:

Euphorbium compositum-Nasentropfen S erfolgreich gegen chronische Sinusitis

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S bei chronischer Sinusitis.

Studiendesign: Randomisierte, placebokontrollierte Doppelblind-Studie über fünf Monate.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 173 Patienten mit gesicherter chronisch-rezidivierender Sinusitis. 155 konnten in die Auswertung einbezogen werden. Die Patienten erhielten 4 mal 2 Sprühstöße Verum bzw. Placebo in jedes Nasenloch täglich. Ausgeschlossen waren Raucher, Patienten mit Polyposis, nicht-sanierten Wurzelgranulomen, infektiöser Rhinitis, odontogener Genese der Sinusitis und chirurgische Sanierung im letzten halben Jahr.

Ergebnisse: Verglichen wurde ein Summenscore zu den drei Bereichen „Subjektive Beschwerden (Tag/Nacht)", „Vordere Rhinoskopie" und „Ultraschalluntersuchung der Nasennebenhöhle". Der statistische Vergleich der Behandlungsgruppen zeigte eine signifikante Überlegenheit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S.

Die deutlichsten Verbesserungen traten bei Atembehinderung, Druckgefühl und Kopfschmerz auf. Die Verträglichkeit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S war gut.

Schlussfolgerung: Die Studie belegt die Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von Euphorbium compositum-Nasentropfen S bei chronischer Sinusitis – und zwar auf höchstem Methodenstandard (doppelblind, placebokontrolliert)!

* Weiser M, Clasen BPE: Randomisierte plazebokontrollierte Doppelblindstudie zur Untersuchung der klinischen Wirksamkeit der homöopathischen „Euphorbium compositum-Nasentropfen S" bei chronischer Sinusitis. Forsch Komplementärmed 1994; 1: 251-259

Gripp-Heel - Die Studie

Fragestellung: Wie stellt sich die klinische Wirksamkeit und Verträglichkeit von Gripp-Heel im Vergleich zu konventionellen Therapieansätzen (Analgetika, Antibiotika, Rhinologika oder Grippemittel) bei einem grippalen Infekt dar?

Studiendesign: Multizentrische, prospektive, nicht intervenierende Kohortenstudie mit Parallelgruppen.

Patienten/ Methode: Insgesamt wurden 263 Patienten im Alter zwischen 0 und 82 Jahren in die Studie eingeschlossen: 82 Patienten erhielten Gripp-Heel Tabletten (Regeldosis: 3-5 x 1 Tablette/Tag), 181 Patienten wurden konventionell (schulmedizinisch) behandelt. Die Wirksamkeit wurde anhand der Rate und der Zeit bis zur Symptomheilung/-besserung ermittelt (stratifiziert in primäres und sekundäres klinisches Leitsymptom). Die vorherrschenden klinischen Symptome waren Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Kopf-, Glieder-, Muskelschmerz sowie Fieber/erhöhte Temperatur.

Ergebnisse: Die Chancen unter Gripp-Heel geheilt zu werden, waren um 38%-34% höher als unter konventioneller Therapie. Beim primären Leitsymptom lag die Chance, durch Gripp-Heel schneller geheilt zu werden bzw. eine Symptomlinderung zu erreichen um 57% signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Durch Gripp-Heel wurden signifikant mehr Patienten beschwerdefrei (77%) als unter konventioneller Therapie (49 %). Gripp-Heel wurde zudem signifikant besser verträglich als die Kontrolltherapie beurteilt.

Schlussfolgerung: Bei der symptomatischen Therapie eines grippalen Infektes ist Gripp-Heel (mindestens) vergleichbar gut wirksam wie konventionelle (schulmedizinische) Therapieansätze. Eine Symptomverbesserung ist innerhalb der ersten vier Tage unter Gripp-Heel signifikant häufiger als unter konventioneller Medikation.

* Rabe A: Symptomatische Behandlung akuter grippaler Infekte – Homöopathikum und konventionelle Therapie im Vergleich. Der Allgemeinarzt 2003 (20): 1522-1523.

Spascupreel® S

Fragestellung: Ist die Wirksamkeit von Spascupreel® S bei kindlichen Spasmen vergleichbar der von Butylscopolaminiumbromid?

Studiendesign: Multizentrische, prospektive, Referenz-kontrollierte Kohortenstudie mit 320 Kindern im Alter unter 12 Jahren (1-11 Jahre).

Patienten/Methode: Insgesamt wurden 320 Kinder in die Studie aufgenommen. 161 erhielten Butylscoplolaminiumbromid und 159 Kinder erhielten Spascupreel® S, Behandlungsdauer eine Woche.

Ergebnisse: In beiden Gruppen zeigte sich eine klinisch relevante Verbesserung der Gesamtsymptomatik und der einzelnen Symptome wie Schmerzen, Krämpfe, Schlafprobleme, Ess-/ Trinkprobleme, Weinen/Schreien, Unruhe, Zeitspanne bis zum Einsetzen der Besserung der Symptome.

Schlußfolgerung: Die statistische Auswertung beider Gruppen ergab ein gleichwertiges therapeutisches Potential. Spascupreel® S ist zuverlässig wirksam, sicher bei der Behandlung kindlicher Spasmen verschiedenen Ursprungs und gleichwirksam im Vergleich zu Butylscopolaminiumbromid.

* Müller-Krampe B, Klein P, Weiser M, Behandlung von Spasmen bei Kindern. Jatros Päd. Nr. 4/2004

Husteel® als Alternative zu Dihydrocodein bei Kindern

Fragestellung: Wie stellt sich die gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von Husteel® im Vergleich zu Dihydrocodeintropfen bei Kindern unter 12 Jahren dar?

Studiendesign: Multizentrische, prospektive, Referenz-kontrollierte Kohortenstudie mit Kindern im Alter unter 12 Jahren (1-11 Jahre), die unter Husten/Reizhusten litten.

Patienten/Methode: Insgesamt wurden 170 Kinder in die Studie aufgenommen. Davon erhielten 98 Kinder Dihydrocodeintropfen (Paracodin®) und 72 Kinder Husteel®. Die Behandlungsdauer betrug zwei Wochen mit einer Zwischenuntersuchung.

Ergebnisse: Die beiden Gruppen waren bezüglich der demographischen Daten vergleichbar (Ausnahme Altersverteilung). Nach 2 - 3 Tagen wurde in beiden Gruppen eine Besserung beobachtet. Vollständige Beschwerdefreiheit wurde bei 92% der mit Husteel® und bei 82% der Kontrollgruppe erreicht. Die Compliance war in beiden Gruppen in 90% mit gut oder sehr gut beurteilt worden. Die Bewertung des globalen Therapieergebnisses fiel signifikant besser aus für Husteel®.

Schlussfolgerung: Damit zeigte sich, dass Husteel® als gleichwertiger Ersatz codeinhaltiger Präparate bei Kindern eingesetzt werden kann. Zumindest tendenziell zeigte sich Husteel® den Dihydrocodeintropfen (Paracodin®) überlegen.

* Hellriegel H.-J, Klein P, Weiser M, Symptomatische Hustentherapie bei Kindern < 12 Jahre. Jatros Päd. Nr. 10/2004

Vertigoheel® überzeugend im Vergleich mit Betahistin bei Schwindel

Fragestellung: Wie stellt sich die klinische Wirksamkeit und Verträglichkeit von Vertigoheel® im Vergleich zu Betahistin bei Schwindel verschiedener Genese dar?

Studiendesign: Doppelblind, randomisiert, multizentrisch (15 Prüfzentren), aktiv-kontrolliert, Double-dummy-Technik, klinische Studie über 6 Wochen.

Patienten/ Methode: Insgesamt 119 Patienten (Vertigoheel®: 59, Betahistin: 60) mit Schwindel verschiedener Genese (vestibulär, nicht-vestibulär) wurden entweder mit Vertigoheel® (Dosierung: 3-mal 15 Tropfen/Tag) oder mit Betahistin (Dosierung: 18 mg/Tag in 3 geteilten Dosen) behandelt. Parameter zur Erfassung der Wirksamkeit waren die Änderung der Anzahl, der Dauer und der Intensität der Schwindelattacken pro Tag im Verlauf einer maximal 6-wöchigen Behandlung sowie die fragebogengestützte Bewertung von Lebensqualität, Wirksamkeit und schwindelspezifischer Symptome. Die Verträglichkeit beider Präparate wurde anhand von unerwünschter Arzneimittelwirkung, Vital- und Laborparametern erfasst.

Ergebnisse: Beide Therapieformen werden von den Prüfärzten als gleichwertig eingestuft. Leichte bis mittelschwere Schwindelstörungen konnten mit dem Homöopathikum Vertigoheel® in äquivalenter Weise zum Antivertiginosum Betahistin behandelt werden.

Schlussfolgerung: Die Studie bestätigt, dass Vertigoheel® eine wirksame und sichere Therapiemöglichkeit bei Schwindel verschiedener Genese ist. Eine therapeutische Gleichwertigkeit zum Wirkstoff Betahistin konnte belegt werden.

* Weiser M, Strösser W, Klein P: Homeopathic vs Conventional Treatment of Vertigo – A Randomized Double-blind Controlled Clinical Study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg/Vol 124, Aug 1998: 879-885

Vertigoheel® überzeugt im Vergleich mit Dimenhydrinat bei Schwindel

Fragestellung: Wie stellt sich die klinische Wirksamkeit und Verträglichkeit von Vertigoheel® im Vergleich zu Dimenhydrinat bei Schwindel verschiedener Genese dar?

Studiendesign: Prospektive, multizentrische, Referenz-kontrollierte Kohortenstudie.

Patienten/ Methode: Untersucht wurden 747 Patienten mit Schwindel verschiedener Genese (vestibulär-, nicht-vestibulär). Vertigoheel erhielten 352 Patienten (Regeldosierung: 3 mal 2-3 Tabletten/Tag), Dimenhydrinat 422 Patienten (Regeldosierung: 2-3mal 50 mg/Tag). Zur Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit wurde die Änderung der Anzahl, Dauer und Intensität der Schwindelattacken pro Tag sowie die globale Beurteilung des erzielten Therapieergebnisses durch den Arzt herangezogen. Die Behandlungsdauer pro Patient betrug 8 Wochen.

Ergebnisse: Bezüglich der Parameter Anzahl, Dauer und Intensität der Schwindelattacken lag bei Studienende eine statistisch signifikante und klinisch relevante Reduktion gegenüber der Ausgangssymptomatik in beiden Gruppen vor. Die Verträglichkeit der Prüfpräparate war sehr gut.

Schlussfolgerung: Die Studie bestätigt, dass Vertigoheel® eine wirksame und sichere Therapiemöglichkeit bei Schwindel verschiedener Genese ist, wobei eine therapeutische Gleichwertigkeit zum Wirkstoff Dimenhydrinat vorliegt.

* Wolschner U, Strösser W, Weiser M, Klein P: Behandlung des Schwindels mit einem modernen Homöopathikum. Biol Med 2001; 30 (4): 184-190

Vertigoheel®

Fragestellung: Es sollte im Rahmen einer Metaanalyse überprüft werden, ob sich die Ergebnisse der Einzelstudien in der Metaanalyse bestätigen.

Studiendesign: Metaanalyse von vier klinischen Studien mit insgesamt 1388 Patienten. Zwei Studien waren randomisierte, doppelblinde, kontrollierte Studien, die beiden anderen offene Beobachtungsstudien.

Patienten/Methode: Um in die Metaanalyse aufgenommen werden zu können, mussten innerhalb der Studien Vertigoheel® (VH) mit einer aktiven Behandlung verglichen werden. Die Behandlung musste mindestens über sechs Wochen erfolgen, bei vergleichbarer Dosierung von Vertigoheel®. Zum Ausgleich von Unterschieden bei der Altersverteilung und der Anzahl der Vertigoattacken wurde eine Adjustierung vorgenommen. Die Studien mussten vor Januar 2004 beendet sein.

Ergebnisse: Es ergab sich für die drei Zielvariablen eine adäquate Verbesserung unter Vertigoheel® und der jeweiligen Kontrollbehandlung: Reduktion der mittleren Zahl der Episoden um 4 bzw. 3,9; Reduktion der mittleren Dauer (Scorewert auf einer Skala von 0 – 4) bei VH 1,1 und bei Kontrolle 1,0; Reduktion der mittleren Intensität (Scorewert auf einer Skala von 0 – 4) bei VH 1,8 und bei der Kontrolle 1,8. Die Nichtunterlegenheit konnte bei allen Studien und in der Metaanalyse mit einer 97,5 % Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

Schlussfolgerung: Die Analyse bestätigt die einzelnen Studien, die eine klinisch relevante Wirksamkeit und Verträglichkeit von Vertigoheel® bei Patienten mit Schwindel gezeigt hatten.

* Schneider B, Klein P, Weiser M: Treatment of Vertigo with a homeopathic Complex remedy Compared with usual Treatment. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 55, No. 1, 23-29 (2005).

Luffeel® comp. Heuschnupfenspray ebenso wirksam wie Cromoglicinsäure bei allergischer Rhinitis

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Luffeel ® comp. Heuschnupfenspray bei Heuschnupfen im Vergleich zur intranasalen Therapie mit Cromoglicinsäure.

Studiendesign: Randomisierte, doppelblinde Äquivalenzstudie über 6 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 146 Patienten mit Heuschnupfen. Luffeel® comp. Heuschnupfenspray bzw. Cromoglicinsäure wurden 4 mal täglich eingesetzt. Zielkriterium der Wirksamkeit war die Lebensqualität, erfasst mittels des Rhinokonjunktivitis-Lebensqualitäts-Fragebogens (RQLQ). Die Verträglichkeit der Prüfmedikation wurde mittels Globalbeurteilung, Rhinoskopie, Erfassung unerwünschter Ereignisse und mit Hilfe von Vital- und Laborparameter erfasst.

Ergebnisse: Erzielt wurde ein rascher und nachhaltiger Effekt, der unabhängig vom applizierten Präparat zur fast vollständigen Remission der Heuschnupfensymptome führte. Der RQLQ-Gesamtscore verbesserte sich signifikant, wobei therapeutische Äquivalenz zwischen beiden Arzneimitteln vorlag. Unerwünschte systemische Wirkungen traten nicht auf.

Schlussfolgerung: Für den Heuschnupfen gibt es ein nachgewiesen verlässliches Nasenspray auf homöopathischer Basis. Ebenso wirksam wie die herkömmliche Therapie mit Cromoglicinsäure und sehr gut verträglich.

* Weiser M, Gegenheimer LH, Klein P: A Randomized Equivalence Trial Comparing the Efficacy and Safety of Luffa comp.-Heel Nasal Spray with Cromolyn Sodium Spray in the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis. Forsch Komplementärmed 1999; 6:142-148.

Zeel® comp. N als Dual-Inhibitoren von Cyclooxygenase und Lipoxygenase

Fragestellung: Wie wirkt Zeel® comp. N in vitro auf Leukotriene und Cyclooxygenasen?

Studiendesign: In vitro-Untersuchungen zur enzymatischen (antientzündlichen) Aktivität von Zeel® comp. N und der Einzelbestandteile (5-LOX: Einfluss auf die Syntheserate von Leukotrien B4; COX 1 und 2: Einfluss auf die Prostaglandin E2-Synthese).

Methode: Die 5-LOX Hemmung wurde an differenzierten humanen Leukämiezellen, die COX 1-Hemmung an isolierten Enzymen aus Zellen der Samenblase (Schaf) und die COX 2-Hemmung an isolierten Enzymen aus der Placenta (Schaf) untersucht (ermittelt wurden jeweils die dosisabhängigen IC50-Werte).

Ergebnisse: Zeel® comp. N und die Mehrzahl seiner Einzelbestandteile hatten einen ausgeprägten hemmenden Einfluss auf die Produktion von Leukotrien B4 und eine ausgeprägte hemmende Wirkung auf die Prostaglandin E2-Synthese.

Schlussfolgerung: Zeel® comp. N wirkt in vitro als dualer 5-LOX/COX 1 und 2-Hemmer. Diese in vitro-Aktivitäten könnten sowohl die klinische Wirksamkeit als auch die magenschonenden Eigenschaften des Homöopathikums erklären. Damit ist Zeel® comp. N die optimale Basistherapie für eine Langzeitbehandlung leichter bis mittelschwerer rheumatischer Gelenkbeschwerden (z.B. Kniearthrose).

* Jäggi, U. Würgler, F. Grandjean, M. Weiser: Dual inhibition of 5-lipoygenase/-cyclooxygenase by a reconstituted homeopathic remedy; possible explanation for clinical efficacy and favourable gastrointestinal tolerability. Inflammation Research 53 (2004): 150-7

Zeel® comp N so wirksam wie COX 2-Hemmer bei Arthrose

Fragestellung: Wie stellen sich Wirksamkeit und Verträglichkeit von Zeel® comp. N im Vergleich zu COX 2-Hemmern dar?

Studiendesign: Prospektive, offene, multizentrische, Referenz-kontrollierte Kohortenstudie über 10 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 592 Patienten mit leichter bis mittelschwerer Kniearthrose. 323 Patienten erhielten Zeel® comp. N und 269 Patienten Celecoxib (1-2 x 100 mg tgl.) Hartkapseln bzw. Rofecoxib Tabletten (1-2 x 12,5 mg tgl.).

Ergebnisse: Erfasst wurde die klinische Symptomausprägung (Anlaufschmerz, Bewegungs-/Belastungsschmerz, Ermüdungsschmerz, Spannungsgefühl/Steifigkeit) und der WOMAC-Index (Patienten-Bewertungsskala). Es zeigte sich nach 4 Wochen bei den COX 2-Hemmern eine stärkere Reduktion der Symptome bzw. des WOMAC-Index. Nach 6 Wochen waren die Prüfpräparate in ihrer Wirksamkeit äquivalent. Die Verträglichkeit wurde bei Zeel® comp. N als signifikant besser beurteilt.

Schlussfolgerung: Zeel® comp. N ist bei leichter bis mittlerer Kniearthrose den COX 2-Hemmern in der Wirksamkeit äquivalent. Die bessere Verträglichkeit ist unter den Gesichtspunkten Vermeidung von Nebenwirkungen, Verbesserung der Compliance und Ausschluss von Folgekosten sicher ein Argument für Zeel® comp. N.

*Birnesser H, Weiser M, Klein P: Modernes Homöopathikum ist COX 2-Hemmern ebenbürtig. Der Allgemeinarzt 2003 (4): 261-2

Zeel® comp. so effektiv wie Hyaluronsäure bei Kniearthrose

Fragestellung: Untersuchung der Wirksamkeit von Zeel® comp. im Vergleich zu Hyaloronsäure bei mittelschwerer Kniearthrose.

Studiendesign: Randomisierte, einfachblinde klinische Äquivalenzstudie über 5 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 121 Patienten mit mittelschwerer Kniearthrose. 114 Patienten kamen in die statistische Auswertung. Sie erhielten entweder Zeel® comp. (2 ml 2 mal wöchentlich) oder Hyaluronsäure (2 ml 1 mal wöchentlich) als intraartikuläre Injektion.

Ergebnisse: Gemessen wurde das subjektive Schmerzempfinden mittels standardisierter visueller Analogskala (VAS) als primäres Zielkriterium. Die arthrotischen Beschwerden nahmen in beiden Gruppen deutlich ab. Die therapeutische Wirksamkeit von Zeel® comp. und Hyalart erwies sich als äquivalent. Nebenwirkungen (lokale Reizerscheinungen) traten in 6 (Zeel® bzw. 13 (Hyaluronsäure) Fällen auf.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse belegen die Gleichwertigkeit von Zeel comp. mit Hyaluronsäure. Besonders interessant war, dass die Wirksamkeit von Zeel® comp. auch bei starken Schmerzen mit jener von Hyaluronsäure gleichzusetzen ist.

* Nahler G, Metelmann H, Sperber H: Behandlung der Gonarthrose mit Zeel comp. – Ergebnisse einer randomisierten, kontrollierten klinischen Prüfung im Vergleich zu Hyaluronsäure. Orthopäd Prax 1996; 5: 354-359

Zeel® comp. sensationell gut im Vergleich mit Diclofenac bei Kniearthrose

Fragestellung: Untersuchung der Wirksamkeit von Zeel® comp. im Vergleich zu Diclofenac bei leichter bis mittelschwerer Kniearthrose.

Studiendesign: Randomisierte, doppelblinde Äquivalenzstudie über 10 Wochen.

Patienten/Methode: Untersucht wurden 121 Patienten mit leichter bis mittelschwerer Kniearthrose. Sie erhielten entweder Zeel® comp. oder Diclofenac 25 (je 3 mal 1 Tablette/Tag).

Ergebnisse: Die Reduktion des als Hauptzielgröße definierten WOMAC-Arthroseindex nach 6 Wochen Therapie betrug im Mittel 26% unter Zeel® comp. und 35% unter Diclofenac (auf Analogskala). Der konfirmatorische Test auf Gleichheit ergab äquivalente Wirksamkeit beider Präparate. Für die globale Beurteilung der Wirksamkeit durch Arzt und Patient am Ende der Studie bestand ebenfalls Gleichheit. Die Verträglichkeit der Prüfpräparate war gut.

Schlussfolgerung: Ein herausragendes Ergebnis: Zeel® comp. hat die gleiche Wirksamkeit wie Diclofenac in der beschriebenen Indikation. Damit ist die Behandlung der Gonarthrose auf einer neuen Basis möglich.

* Maronna U, Weiser M, Klein P: Orale Behandlung der Gonarthrose mit Zeel comp. – Ergebnisse einer doppelblinden Äquivalenzstudie versus Diclofenac. Orthopäd Prax 2000; 36 (5): 285-291

Traumeel® S senkt deutlich Begleitfolgen von Chemotherapie

Fragestellung: Untersuchung der klinischen Wirksamkeit von Traumeel® S bei Chemotherapie-induzierter Stomatitis bei Kindern.

Studiendesign: Randomisierte, placebokontrollierte Studie über 4 Wochen.

Patienten/Methode: 32 Patienten (3-25 Jahre) erhielten nach der Stammzelltransplantation entweder Traumeel® S oder Placebo (5 mal tgl. für mindestens 14 Tage bei oraler Anwendung). Der Stomatitis-Score wurde gemäß der WHO-Einteilung für Mukositis vorgenommen.

Ergebnisse: Bei 33% der Traumeel®-Patienten konnte eine Stomatitis verhindert werden, im Gegensatz zu 7% in der Placebo-Gruppe. Eine schwere Stomatitis trat bei 93% der Mitglieder in der Placebo-Gruppe auf, während es bei Traumeel®-Gabe nur 47% waren. Der Stomatitis-Score war mit 10.4 bei Traumeel® S gegenüber 24.3 bei Placebo signifikant besser.

Schlussfolgerung: Mit Traumeel® S können Häufigkeit und Schwere der bei Chemotherapie auftretenden Stomatiden deutlich vermindert werden. Ein Riesenplus für die Lebensqualität – vor allem auch bei Kindern.

* Oberbaum M et al. A randomized, controlled clinical trial of the homeopathic medication Traumeel S in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing stem cell transplantation. Cancer 2001; 92: 684-690

Traumeel® S bessert Symptome einer Epicondylitis vergleichbar gut wie NSAIDs.

Fragestellung: Vergleich von Traumeel® S mit einer Standard NSAID Therapie auf die Besserung der Symptome einer Epicondylitis.

Studiendesign: Multizentrische, nicht-randomisierte, vergleichende Kohortenstudie.

Patienten/Methode: Vergleichende Beobachtungsstudie. 106 Patienten erhielten Traumeel® S und 78 Patienten NSAIDs (überwiegend Diclofenac), zunächst als Injektion. Die Behandlung wurde mittels der klinisch relevanten Variablen Schmerz (lokaler Druckschmerz, Bewegungsschmerz und Ruheschmerz) und zweier Mobilitätsvariablen (Änderung der Gelenkstreckung und -drehbarkeit) evaluiert.

Ergebnisse: In beiden Behandlungsarmen wurden die Scores der fünf Variablen signifikant verbessert, es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen bei der Zeitspanne bis zum Wirkungseintritt. Traumeel® S war signifikant besser bei der Verbesserung der Symptome Ruheschmerz ($p < 0{,}01$), Gelenkdrehung ($p<0{,}01$) und Gelenkstreckung ($p<0{,}05$). 71% der Patienten mit Traumeel® S beurteilten das Ergebnis als gut bis sehr gut, im Vergleich zu 44,2% der mit NSAIDs behandelten Patienten. Die Verträglichkeit war in beiden Gruppen gut.

Zusammenfassung: Traumeel® S ist eine gut wirksame und gut verträgliche Alternative zu NSAIDs bei der Behandlung von Epicondylitis.

* Birnesser H, Oberbaum M, Klein P, Weiser M: The Homeopathic Preparation Traumeel S compared with NSAIDs for symptomatic treatment of Epicondylitis. Journal of Musculoskeletal research, Vol. 8, Nos. 2 & 3 (2004) 119-128

Grundlagenforschung:

Im Folgenden werden Studien und Erkenntnisse auf dem Gebiet der homöopathischen Grundlagenforschung vorgestellt:

Regulationsstörungen auf der Spur

Ein Thema – auch für die Homöopathie – ist die Frage nach den Wirkmechanismen. Heel bearbeitet dieses Thema vor allem für Tief- und Mittelpotenzen, d.h. der in den Antihomotoxika vorkommende Bereich. Vom Ansatz her bieten sich dazu die klassischen Methoden der pharmakologischen Grundlagenforschung an. Sie sind zudem wissenschaftlich etabliert, und die Ergebnisse werden allgemein anerkannt.

Ein Großteil der Erkrankungen „zivilisatorischen" Ursprungs sind chronisch-entzündliche Prozesse. Ursache ist meist eine Störung der Regulation des Immunsystems. Die Regulation erfolgt hauptsächlich durch die Zellen des Immunsystems selbst, und zwar durch Freisetzung einer Vielzahl von Mediatoren bzw. Cytokinen. Insgesamt steht für die Regulation ein komplexes durch Cytokin-Signale auf verschiedenen Zellebenen rückgekoppeltes Netzwerk zur Verfügung.

Antihomotoxika zeigen bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen oft besonders günstige Therapierfolge. Es lag daher nahe zu vermuten, dass ein Wirkmechanismus der Präparate auf der Korrektur von Dysbalancen im Cytokin-Netzwerk beruht.

Zur wissenschaftlichen Klärung der Hypothese wurde das Immunsystem genutzt. Es bietet zur Erforschung derartiger Mechanismen gute Bedingungen. So ist seine hohe Sensitivität Voraussetzung für die Reaktion auf sehr gering konzentrierte Stoffe, wie sie z.B. in den Antihomotoxika vorkommen (niedrige bis mittlere Potenzen).

Der zweite Vorteil ist, dass sich durch einfache Blutentnahme ein repräsentativer Teil des Immunsystems gewinnen und unter weitgehend physiologischen Kulturbedingungen züchten lässt. In Zellkulturen lassen sich Bedingungen schaffen, wie sie während Immunabwehr-Reaktionen auch zu finden sind. Gibt man hierzu die zu prüfenden Arzneimittel, so können damit Hinweise für den Wirkmechanismus im Bereich des Immunsystems gewonnen werden.

Wirkung auf das Immunsystem

Ergebnisse aus Labor-Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass in vielen Fällen das Immunsystem Ziel der therapeutischen Wirkung Antihomotoxischer Medikamente bzw. deren Inhaltsstoffe ist. Antihomotoxika führen offenbar zu einer Modulation unterschiedlicher Regulationsschleifen zwischen verschiedenen Arten von Leukozyten. Ob die über Cytokine übermittelten Signale bereits auf der Ebene ihrer Entstehung abgeschwächt oder verstärkt werden, ist abhängig davon, um welche Inhaltsstoffe es sich handelt.

Die beobachteten Wirkungen weisen je nach Spender (individuelle Wirkungsentfaltung, wie von der klassischen Homöopathie postuliert) und Ausgangszustand des Immunsystems deutliche Unterschiede auf. Aufgrund der Vielzahl von Untersuchungen können zwei Eigenschaften der Inhaltsstoffe Antihomotoxischer Arzneimittel als grundlegend für ihre Wirkung angesehen werden:

1. Antihomotoxika besitzen verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur von Regulationsvorgängen
2. und können auf die Gegebenheiten des zu beeinflussenden Systems individuell reagieren.

Damit unterscheiden sich Antihomotoxische Präparate gravierend von chemisch definierten Präparaten, die gegen entzündliche Prozesse eingesetzt werden. Eine in-vivo-Untersuchung konnte die im Labor ermittelten Ergebnisse bestätigten. So wurde gezeigt, dass Traumeel® S die Freisetzung von immunregulativen Botenstoffen im Gesamtorganismus* beeinflusst. Ein Resultat, das glänzend die therapeutischen Leistungen von Traumeel® S z.B. im Bereich Sportverletzungen oder Arthritis (mit)erklärt.

* Conforti A et al: Experimentelle Untersuchungen zur entzündungshemmenden Wirkung eines homöopathischen Kombinationspräparates. Deut. Zeitschrft f. Sportmed. 1997; 10:400-401

In einer im Juni 2004 veröffentlichten Studie* konnte gezeigt werden, dass mit Traumeel® S in verschiedenen Konzentrationen die Sekretion von IL-1β und TNF-α in nicht aktivierten und aktivierten humanen T-Zellen, Monocyten und Epithelzellen inhibiert werden kann. Die IL-1β Sekretion wurde in ruhenden und aktivierten Zellen bis zu 70% und die TNF-α Sekretion bis zu 65 bzw. 54% vermindert. Die IL-8 Sekretion wurde in beiden aktivierten und nicht aktivierten Zellen um 50% reduziert ($P<0{,}01$). Interessanterweise erscheinen die Effekte invers dosisabhängig; d. h., die maximale Inhibition wurde mit Verdünnungen von 10^{-3}-10^{-6} des Traumeel® Ausgangsmaterials gemessen. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass Traumeel® die Immunzellen nicht durch toxische Effekte inhibiert. Tatsächlich war die Proliferation der T-Zellen und Monozyten nicht beeinträchtigt. Diese Ergebnisse zeigen die kausale Beziehung zwischen der Inhibition der Zytokin/Chemokin Sekretion in Zellkultur und den klinischen Effekten von Traumeel®. Die in vitro Ergebnisse zeigen den möglichen Wirkmechanismus der klinisch beobachteten entzündungshemmenden Effekte von Traumeel®.

* Porozov S, Cahalon L, et.al. Inhibition of IL-1β and TNF-α Secretion from resting and activated Human Immunocytes by the Homeopathic Medication Traumeel® S. Clinical Developmental Immunology, June 2004, Vo. 11 (2), pp. 143 – 149.

Immunmodulation

1998 wurde von Heine die Theorie entwickelt, dass Antihomotoxika über die beschriebene Immunmodulation hinaus einen von Weiner beschriebenen Regulationsmechanismus, die sog. Bystander-Reaction, anstoßen. Der Mechanismus soll auf Th3-Lymphozyten zurückgehen, die gewebespezifisch den hemmenden Botenstoff TGF-ß freisetzen und damit Entzündungsabläufe herunter regulieren. Der Gewebespezifität käme bei gezielter therapeutischer Nutzung dieses Prinzips der Entzündungshemmung große Bedeutung zu.

Bis heute konnten viele Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass die Freisetzung von TGF-ß durch Inhaltsstoffe von Antihomotoxika gesteigert werden kann*. Weitere Untersuchungen werden derzeit durchgeführt, um zu prüfen, ob dies einer Induktion der Bystander-Reaction entspricht und wie diese sinnvoll in therapeutische Konzepte eingepasst werden kann.

Alle bisherigen Befunde sprechen dafür, dass die Immunmodulation eines der wesentlichen therapeutischen Prinzipien in der Antihomotoxischen Therapie** ist. Erste Bestätigung für das Funktionieren in vivo konnte 1999 in einer Pilot-Studie gewonnen werden (perorale Verabreichung eines Antihomotoxikums an gesunde Probanden). Eine klinische Studie konnte die Hypothesen aus den Pilotstudien bestätigen und statistisch absichern***.

* Heine H, Schmolz M: Immunologische Beistandsreaktion durch pflanzliche Extrakte. Biol Med 1998; 27 (4):12-27

** Heine H, Schmolz M: Immunoregulation via „bystander suppression" needs minute amounts of substances – a basic for homeopathic therapy? Med Hypoth 2000; 54 (3):392-393

*** Heine H, Schmolz M: Influence of herbal homeopathic extracts on the synthesis of TGF-ß1 in human whole blood cultures. Zur Publikation eingereicht

Virushemmende Eigenschaft

Untersuchungen über grundlegende Wirkeffekte können auch von vornherein eine sehr therapeutische Orientierung haben. So z.B. eine Studie mit Euphorbium compositum Nasentropfen S. Das Nasenspray wird erfolgreich bei viralen Infekten der Atemwege eingesetzt.

Neben nachgewiesenen immunmodulatorischen* Eigenschaften wurde deshalb geprüft, ob das Präparat zusätzlich die Vermehrung von Viren des Respirationstrakts hemmen kann. Das konnte in Untersuchungen mit Infektionsmodellen an Zellkulturen bestätigt werden**.

Damit wird klar, dass sich im Präparat unterschiedliche Wirkungen auf der Nasenschleimhaut zu einem sinnvollen Gesamtkonzept ergänzen. Angesichts der Vielfalt an positiven Effekten kann angenommen werden, dass Tests in anderen Systemen, beispielsweise an Kulturen von Schleimhautzellen, weitere therapierelevante Effekte zeigen.

Vorstellbar ist, dass sich das entgiftende Potential der Antihomotoxika auf zelluläre Schutzmechanismen erkrankter Gewebe zurückführen lässt. Für die Schleimhaut könnte dies eine gesteigerte Produktion von Sekreten oder Schutzfaktoren (z.B. IgA) sein.

* Schmolz M, Metelmann H: Einzelkomponenten eines homöopathischen Komplexmittels zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen der Nase modulieren die Zytokinsyntheses menschlicher Leukozyten. Biol Med 1998; 27 (4):155-158

** Metelmann H, Glatthaar-Saalmüller B: Die antivirale Wirkung von Euphorbium compositum S. Biol Med 1999; 28 (3):142-146

Wirkung auf molekularer Ebene

Eine grundlegende Ebene zur Untersuchung der Wirkmechanismen homöopathisch zubereiteter Arzneimittel ist der Molekülbereich. Zwei grundlegende Fragen standen hier im Mittelpunkt von Untersuchungen:

1. Lassen sich Unterschiede zwischen Potenzierungen und nur einfach verdünnten Wirksubstanzen nachweisen?
2. Lassen sich Wirkunterschiede zwischen verschiedenen Potenzen nachweisen?

Antworten dazu gab es aus der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover von Harisch und Dittmann, die für die Homöopathie von ausschlaggebendem Interesse sind.

So war eindeutig belegbar, dass Potenz und konzentrationsgleiche Verdünnung auf Enzym- und molekularer Strukturebene unterschiedliche Wirkung besitzen.

Zum Zweiten wurde der Nachweis erbracht, dass Homöopathika die katalytische Aktivität bestimmter Enzyme beeinflussen. Besonders interessant war, dass sich keine lineare Abhängigkeit zwischen verschiedenen Potenzen und ihrem Wirkeffekt ergab. Was bedeutet, dass jede Potenz einen individuellen Einfluss hat.

Fast als revolutionäre Neusicht der Homöopathie sind diese Ergebnisse bewertet worden – vor allem im Bereich der Schulmedizin.

Heel ist seit 1997 Kooperationspartner und Auftraggeber von Grundlagenforschung in Hannover – unter speziellen Fragestellungen. So wurde für Antihomotoxische Arzneimittel der Wirkunterschied zwischen Urtinktur und homöopathischer Dilution (Potenz) untersucht. Wieder wurden einzelne Enzyme mit Inhaltssubstanzen von Antihomotoxika inkubiert und das Ausmaß der enzymatischen Aktivität als Maß für den Wirkungsgrad der Probe herangezogen.

Es zeigten sich in diesen Experimenten unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem ob die Urtinktur des Einzelmittels lediglich verdünnt wurde oder als homöopathische Dilution vorlag*.

Eine besondere Sorte Antihomotoxischer Arzneimittel sind die Potenzenaccorde. Sie enthalten mehrere unterschiedlich hohe homöopathische Potenzen desselben Grundmittels in gleichen Teilen. Der Vorteil der Potenzenaccorde gegenüber ihren Einzelpotenzen wurde schon vor einiger Zeit durch in-vivo-Studien nachgewiesen**. Hervorzuheben ist die Wirksamkeit, die zu einem länger anhaltenden Therapieerfolg führt. Zudem sind Potenzenaccorde noch verträglicher als homöopathische Einzelmittel, da sie Erstverschlimmerungen verhindern können.

Zur Klärung der Frage, ob diese Überlegenheit der Potenzenaccorde gegenüber ihren Einzelpotenzen auch durch experimentelle Daten belegt werden kann, wurden Untersuchungen durchgeführt, die als in-vitro-Studien konzipiert waren***. Als Wirksubstanzen wurden c-AMP und Ubichinon verwendet.

Die besondere Wirkungsqualität der Potenzenaccorde wurde mit folgenden Einzelergebnissen bestätigt:

1. Potenzenaccorde besitzen ein eingeständiges Wirkungsprofil, das sie von ihren Einzelpotenzen unterscheidet.
2. Potenzenaccorde sind in ihrer inhibitorischen Wirkung ihren Einzelpotenzen überlegen.
3. Die Wirkung von Potenzenaccorden ist nicht mit der Summe der Wirkungen ihrer Einzelpotenzen identisch.

Besonders der zweite und dritte Punkt sind ein starkes Argument für den bevorzugten Einsatz von homöopathischen Kombinationen vor allem in der Praxis des niedergelassen Arztes.

* Harisch G, Dittmann J: In Vivo and in Vitro Studies on the Efficiency of Potenzied and Non Potentized Substances BT 1997; 15 (2):40-46

** Harisch G, Dittmann J: Untersuchungen zur Wirkung von Ubichinon Injeel und Injeel forte mit zellfreien Systemen. Biol. Med 1997 27 (3):99-104

*** Harisch G, Dittmann J: Wirkungsunterschiede zwischen Potenzenaccorden und ihren Einzelpotenzen. Biol Med 2000; 27 (1):18-23

Weitere Aussichten

Die Kernhypothesen der Homotoxikologie sind Gegenstand der Grundlagenforschung. Derzeit werden Modelle erarbeitet, die die wissenschaftliche Beweisführung für die postulierten Pathomechanismen ermöglichen können. Insbesondere sollen untersucht werden:

1. Mechanismus der negativen Matrixbeeinflussung durch Homotoxine („Verschlackung")
2. Mechanismus der positiven Matrixbeeinflussung durch Antihomotoxika (Homotoxin-Ausleitung)
3. Quantifizierung der Homotoxin-Ausleitung
4. Pathogenetische Phasenfolgen an Organsystemen
5. Pathohistologische Grundlagen der Phasenwechsel

Die Homotoxikologie ist eine regulativ auf den Organismus einwirkende Therapieform. Die konsequente Aufdeckung der dabei greifenden Mechanismen ist das Ziel der Grundlagenforschung. Endgültig soll erarbeitet werden, wie die verschiedenen Mechanismen im System Homotoxikologie ineinander greifen und welchen Stellenwert die Homotoxikologie damit für die Regulationsmedizin hat.

4 Therapie mit Biotherapeutika-Antihomotoxika-Heel

4.1 Differenzierung der antihomotoxischen Arzneimittel



Abb. 3 Das System der großen Abwehr (Reckeweg)

Im Mittelpunkt steht der unspezifisch reagierende Makrophage (Monozyt). Über Zellbotenstoffe, vor allem Zytokine und Wachstumsfaktoren erfolgt eine gegenseitige informative Rückkopplung zwischen der unspezifischen und spezifischen Komponente des Immunsystems (mit seinen zellulären T-Zell- und humoralen B-Zellsystem).
Eine vermittelnde Position nehmen die vor allem auf Antihomotoxika ansprechenden TH3-Lymphozyten ein („immunologische Beistandsreaktion“).
CSF koloniestimulierender Faktor, IFN-γ Interferon-gamma, IL Interleukine, TGF-β Transforming Growth Factor-beta, TH T-Helferzelle.

Die Firma Heel stellt für die antihomotoxische Therapie nach Dr. H.-H. Reckeweg folgende Arzneimittel zur Verfügung:

Kombinationspräparate
Spezialpräparate (z.B. Cralonin, Vertigoheel, Traumeel S)
Homaccorde (z.B. Aconitum-Homaccord)
Composita-Präparate (z.B. Echinacea compositum SN)

Homöopathische Einzelmittel
Homöopathisierte Allopathika (z.B. Penicillin-Injeel)
Katalysatoren (z.B. Histamin-Injeel) inkl. der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus
Nosoden (z.B. Sinusitis-Nosode-Injeel)
Suis-Organpräparate (z.B. Cerebrum suis-Injeel)

4.2 Kombinationspräparate

• 4.2.1 SPEZIALPRÄPARATE

Die Spezialpräparate werden heute in jeder Praxis eingesetzt, unabhängig davon, ob sie naturheilkundlich ausgerichtet ist oder nicht. Auch Universitätskliniken greifen auf diesen Arzneimittelschatz zurück (z.B. Vertigoheel, Traumeel S).

Die nachfolgende Tabelle kann nur eine subjektive Auswahl aus dem reichhaltigen Sortiment der verfügbaren Spezialpräparate darstellen.

Tab. 1 Auswahl von Spezialpräparaten

Präparat	Hauptindikationen
Cralonin®	Altersherz, Cor nervosum
Engystol®	Grippe, fieberhafte Virusinfekte
Gripp-Heel®	grippale Infekte
Lymphomyosot® N	Lymphödem, Tonsilitis, Infektanfälligkeit
Rheuma-Heel®	Weichteilrheumatismus
Spascupreel® (S)	Koliken, Myogelosen
Spigelon®	Kopfschmerzen
Traumeel® S	Arthritis, Arthrosis, Sportverletzungen
Vertigoheel®	Schwindel verschiedener Genese
Viburcol® N	Fieber, banale Infekte, Unruhezustände
Ypsiloheel® N	vegetative Dystonie, Globus hystericus
Zeel® comp. N	Arthrose, Polyarthrose

• 4.2.2 HOMACCORDE

Homaccorde stehen sowohl als Dilution zur oralen Applikation als auch in Ampullenform zur Injektion zur Verfügung. Da die Homaccorde neben den Tiefpotenzen auch die Hochpotenzen der verwendeten Mittel als Potenzenaccord enthalten, werden sie insbesondere auch in der Therapie chronischer Erkrankungen eingesetzt.

Die Potenzen der einzelnen Bestandteile liegen bei den Ampullen im Allgemeinen zwei bis drei Potenzen höher als bei den Liquidum-Formen der Homaccorde. Durch die hohen Potenzen im Homaccord werden mögliche Erstreaktionen abgedämpft, d.h. Erstverschlimmerungen sind eine Seltenheit.

• 4.2.3 COMPOSITA-PRÄPARATE

Um einerseits ein hochwirksames Präparat zur Verfügung zu haben, das andererseits risiko- und nebenwirkungsarm ist, war es erforderlich, zahlreiche homöopathische Einzelmittel, homöopathisierte Allopathika (siehe unten), intermediäre Katalysatoren (siehe unten) und eventuell Suis-Organpräparate (siehe unten) in einem Kombinationspräparat zu vereinigen.

Die Vielzahl der in den Composita-Präparaten enthaltenen Inhaltsstoffe bewirkt eine tiefe Breitenwirkung, da diese Therapeutika an verschiedenen Angriffspunkten ihre Wirkung entfalten.

4.3 Homöopathische Einzelmittel

Die homöopathischen Einzelmittel als Injeel (**Inj**ectiones H**eel**) und auch als Einzelpotenzen können i.v., i.m., s.c. oder i.c. (Segmenttherapie) injiziert werden. Alle Einzelmittel und Injeele können auch als Trinkampullen (siehe S. 48) verwendet werden, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern in Wasser oder Tee gegeben werden.

Bei den Injeelen sind in einer Ampulle mehrere Potenzen desselben Grundmittels nebeneinander als Potenzenaccord enthalten. Injeele enthalten meist als Basispotenz D10 oder D12, dazu gemischt zu gleichen Teilen D30 und D200. Injeele forte enthalten im Allgemeinen (D4), D6, D12, D30 und D200, eventuell auch D1000 zu gleichen Teilen. Die bei Injeelen verwendeten Potenzen (D4 bzw. D6 in der forte-Form und D10 bzw. D12 und höhere Potenzen im Potenzenaccord bei der normalen Injeel-Form) entsprechen gerade jenen Wirkungsbereichen, mit denen eine Steigerung der Giftabwehr erreicht werden kann. Bei diesen Potenzenaccorden wird der therapeutische Effekt der Basispotenz ausgenutzt, gleichzeitig wird durch die höheren Potenzen eine überschießende Wirkung verhindert und eine größere Breiten- und Tiefenwirkung erreicht.

Das Prinzip des Potenzenaccordes ist, dass eventuell durch tiefere Potenzen ausgelöste Arzneireaktionen durch die gleichzeitige Verabreichung höherer Potenzen gemildert und abgebaut werden können (Umkehrwirkung der Hochpotenzen).

Prinzipiell gilt, eine Behandlung mit einer gleichzeitigen Verabreichung von Einzelmittel-Injeelen, Katalysatoren und Spezialpräparaten zu beginnen. Die forte-Formen finden ihre Anwendung bei akuten und bereits organisch fassbaren Erkrankungen.

• 4.3.1 HOMÖOPATHISIERTE ALLOPATHIKA

Diese Präparate (siehe nachfolgende Tabelle) werden zur Behebung von Therapieschäden eingesetzt (isopathisches Prinzip). Ein Therapeutikum, das zum Therapieschaden geführt hat, wird in höherer Verdünnung als Gegenmittel zur Behebung des Therapieschadens appliziert (isotherapeutisches Prinzip). Die homöopathisierten Allopathika werden mit ihrem „generic name“ bezeichnet.

Die homöopathisierten Allopathika können auch nach dem „Ähnlichkeits-Prinzip“ angewendet werden: Die Rezeptoren des Systems der Großen Abwehr sind durch das bereits Schäden hervorrufende Präparat schon besetzt und sprechen auf Präparate nach dem „Gleichheits-Prinzip“ nicht mehr an. Nach dem Simile-Gesetz (Ähnlichkeitsregel) werden mit dem Antihomotoxikum (= Simillimum) ähnliche, in Reserve liegende, zusätzliche Abwehrmechanismen angeregt.

Neben dem zum Therapieschaden führenden Präparat in homöopathisierter Form sollten auch noch andere ähnliche Wirkfaktoren eingesetzt werden: Kann man Schäden, die z.B. durch Penicillin gesetzt wurden, nicht durch Penicillin-Injeel ausgleichen, wird man Streptomycin-Injeel forte versuchen.

Tab. 2 Liste der homöopathisierten Allopathika

Acetylsalicylsäure-Injeel
Penicillin-Injeel

• 4.3.2 KATALYSATOREN

Der Einsatz von Katalysatoren des intermediären Stoffwechsels ist eine Besonderheit der antihomotoxischen Therapie. Die als intermediäre Katalysatoren bezeichneten Substanzen sind physiologische Bestandteile im Rahmen der Zellatmung und Energiegewinnung (Zitronensäurezyklus, Redoxsysteme). Zum Teil handelt es sich dabei auch um Substanzen, die bei sonstigen enzymatischen Umsetzungen gebildet werden bzw. bei solchen Vorgängen katalytisch wirksam werden.

Schädigungen von Enzymsystemen sind häufig iatrogener Natur, da vielen konventionellen Pharmaka die Beeinflussung von Enzymen als Wirkprinzip zugrunde liegt. Daneben werden gerade Enzyme in ihrer Wirkung durch die zunehmende Belastung aus der Umwelt (z.B. durch Schwermetalle oder Pestizide) beeinträchtigt. Durch den Ausfall einer Enzymfunktion kommt es sowohl zu einem Stau der vor der betreffenden enzymatischen Reaktion bereits vorhandenen Metaboliten als auch zu einem Mangel der nach dieser Reaktion zu verstoffwechselnden Substrate.

Die Verabreichung der entsprechenden Katalysatoren in homöopathischer Aufbereitung geschieht aus der Vorstellung heraus, dass dadurch das Stoffwechselgeschehen aktiviert wird sowie blockierte Zell- oder Enzymfunktionen wieder in Gang gesetzt werden. Da sich Enzymschäden vor allem als chronische bzw. degenerative Erkrankungen äußern, kommt der Einsatz dieser Präparategruppen deshalb in erster Linie auch bei solchen Erkrankungen in Betracht.

Katalysatoren sind Stoffe, die die Gleichgewichtseinstellung chemischer Reaktionen beschleunigen, ohne jedoch selbst in die Bilanz des Vorgangs einzugehen. Der Umfang, in welchem ein Katalysator eine Reaktion zu beschleunigen vermag, ist oftmals sehr eindrucksvoll. Nicht ungewöhnlich ist eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit um sechs Zehnerpotenzen, da ein einziges Enzymmolekül häufig mehr als 10 000 Substratmoleküle pro Sekunde umzusetzen vermag. Am Ende einer Reaktion stehen die Katalysatoren unverändert wieder zur Verfügung, um die gleiche Reaktion sofort am nächsten Molekül zu katalysieren. Der genannte Vorgang selbst wird als Katalyse bezeichnet. Sofern die Reaktionen in Biosystemen stattfinden, spricht man deshalb auch von „Biokatalysatoren“.

Die Katalyse kann durch Aktivatoren noch zusätzlich gesteigert, durch „Gifte“ (Homotoxine) aber auch herabgesetzt oder blockiert werden. Als intermediäre Katalysatoren werden häufig auch die Induktoren und Aktivatoren im Bereich des Intermediärstoffwechsels bezeichnet.

Die Drehscheibe des Stoffwechsels ist der Zitronensäurezyklus. Er stellt den Hauptweg des katabolen Stoffwechsels des Pyruvats bzw. Acetyl-Coenzyms A dar. Er ist ein grundlegender, bei Menschen, Tieren und Pflanzen in allen Zellen vorkommender, in sich geschlossener Reaktionsweg; in ihn münden die Spaltprodukte des Kohlenhydratstoffwechsels, des oxidativen Fettsäureabbaues und – nach Transaminierung – die des Eiweißstoffwechsels. Weiterhin liefert er wichtige Bausteine für Synthesen des Organismus. In Verbindung mit der Atmungskette ist der Zitronensäurezyklus gleichzeitig auch die bedeutendste Energiequelle des Stoffwechsels. Er liefert den Wasserstoff für die biologische Oxidation und ist dadurch eng mit dem Energiestoffwechsel der Zelle verknüpft.

Die Bausteine des Zitronensäurezyklus sind Acidum citricum (Zitronensäure), Acidum cis-aconiticum (cis-Aconitsäure), Axidum oxalsuccinicum (Oxalbernsteinsäure), Acidum α-ketoglutaricum (α-Ketoglutarsäure), Acidum succinicum (Bernsteinsäure), Acidum fumaricum (Fumarsäure), Acidum DL-malicum (Apfelsäure) und als Salz Natrium oxalaceticum (oxalessigsaures Natrium).

Einige Karbonsäuren kommen im Tier- und Pflanzenreich auch außerhalb des Zitratzyklus vor, z.B. als Fruchtsäuren, die Apfelsäure oder Zitronensäure. Die Umwandlung der Karbonsäuren in die jeweils im Zitratzyklus folgende Karbonsäure wird durch Enzyme vermittelt. Die beteiligten Enzyme können nun aber durch Noxen bedingt gehemmt werden (z.B. kompetitive Hemmung, Endprodukthemmung, Substrathemmung), wobei solche Blockaden in Folge zu Konzentrationsänderungen einzelner Säuren des Zitratzyklus führen können. Dies kann in verschiedenen Geweben dann wiederum Reaktionen oder Blockaden mit konsekutiven Symptomen oder Krankheitserscheinungen auslösen.

Bei therapeutischen Fragen ist zu berücksichtigen, dass Katalysatoren nur wirken können, wenn das Milieu stimmt. In Regelkreisen und Stoffwechselketten gehört dazu nicht nur die Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), sondern es müssen auch die entsprechenden Substrate und „Cofaktoren“ zur Verfügung stehen. Zu diesen Cofaktoren gehören Vitamine und die Spurenelemente, d.h. bestimmte Metallionen. Erst durch diese Cofaktoren werden die Katalysatoren aktiviert, d.h. spezifisch funktionsfähig. Bei Metall-Enzym-Komplexen spricht man häufig auch von Metallo-Enzymen.

Für den therapeutischen Einsatz ist aus den physiologischen Zusammenhängen heraus der Begriff „intermediäre Katalysatoren“ weiter gefasst; er umfasst Katalysatoren im strengen Sinn (Enzyme), zugehörige Substrate, Zwischenprodukte und Cofaktoren.

Daraus ergeben sich folgende Präparategruppen:

Einzel-Katalysatoren (Enzyme)
Einzel-Coenzyme (Cofaktoren, Vitamin-Cofaktoren)
Einzel-Intermediärprodukte
Enzymgemische
Katalysator-Kombinationen

Für die Aktivierung und Funktionen von Katalysatoren sind Spurenelemente bzw. Metallionen bei Hunderten von Prozessen erforderlich. Manche dieser Ionen zeigen dabei ein Janusgesicht. Während sie in kleinen Dosen die Katalyse ermöglichen, können sie in größeren Dosen Funktionen hemmen oder blockieren. Dies trifft vor allem für Metallionen zu, die einerseits Cofaktoren für Metallo-Enzyme sind, andererseits aber auch als „toxische Metalle“ bestimmte Enzymreaktionen blockieren.

4.3.2.1 Intermediärprodukte

Regelkreise und Stoffwechselketten können ihre Funktion nur erfüllen, wenn alle Kettenglieder intakt sind; bei physiologischen Abläufen bedeutet dies, dass Ausgangssubstrat, Katalysatoren und Intermediärprodukte für die einzelnen Stoffwechselschritte aufeinander abgestimmt sein müssen (z.B. Zitronensäurezyklus). Funktionsstörungen können im materiellen oder dynamischen Bereich entstehen; die Folgen sind immer wechselseitig. Daraus resultieren folgende Konstellationen:

Das Ausgangssubstrat ist quantitativ unzureichend oder qualitativ verändert. Aus der Michaelis-Menten-Beziehung der Abhängigkeit der katalytischen Reaktion vom verfügbaren Substrat ergibt sich, dass eine Fehlsteuerung schon beim Initialschritt vorgegeben ist.

Der Katalysator steht nur unzureichend zur Verfügung oder fehlt vollständig. Der Stoffwechselprozess wird an dieser Stelle gebremst oder blockiert. Das zu katalysierende Produkt wird unzureichend oder überhaupt nicht mehr gebildet – die Stoffwechselkette wird abgeschwächt oder unterbrochen.

Diese Grundvorgänge spielen sich in Stoffwechselketten an vielen Stellen ab. Die genannte Leistung der Kette wird dabei stets vom schwächsten Glied – Substrat, Katalysator oder Intermediärprodukt – bestimmt. Da hinter jeder enzymatischen Fehlfunktion auch das nachfolgend zu katalysierende Produkt nur noch unzureichend gebildet wird, kommt den Intermediärprodukten für den weiteren Ablauf der Kettenreaktion eine essentielle Rolle zu. In der Therapie sollten daher enzymatische Defekte nicht nur – sofern überhaupt möglich – mit dem fehlenden oder defizienten Katalysator beeinflusst, sondern auch mit den Intermediärprodukten gezielt hinter der Enzymblockade behandelt werden.

Zur Funktionsbereitschaft müssen dabei die Intermediärprodukte in einen reagiblen, aktivierten Zustand versetzt werden. Am Beispiel des Zitronensäurezyklus wird die Bedeutung der Intermediärprodukte besonders deutlich. Wichtige Intermediärprodukte sind:

Acidum aceticum	➜	Acetat
Acidum pyruvicum	➜	Pyruvat
Acidum phosphoricum	➜	Phosphat
Acidum fumaricum	➜	Fumarat

Der therapeutische Einsatz dieser Intermediärprodukte als Monosubstanzen ist sinnvoll, wenn der Stoffwechseldefekt lokalisiert und der Mangel an diesem Produkt gesichert oder wahrscheinlich ist. In homöopathischen Tiefpotenzen (D4 bis D8) dienen diese Einzelprodukte der Substitution.

Für den Zitronensäurezyklus stehen als Einzel-Intermediärprodukte zur Verfügung:

Acidum citricum-Injeel	Acidum DL-malicum-Injeel
Acidum cis-aconiticum-Injeel	Acidum succinium-Injeel
Acidum fumaricum-Injeel	Natrium oxalaceticum-Injeel
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel	Natrium pyruvicum-Injeel

Die für den Funktionsablauf erforderlichen Coenzyme wurden bereits bei den Einzel-Katalysatoren im Zusammenhang mit den Katalysatorkombinationen besprochen.

Katalysatoren, speziell die Enzyme, sind „Lotsen“, die ein Substrat als Edukt in ein anderes Substrat, auch Produkt genannt, überführen. Bei Katalysatormangel kommt es deshalb einerseits zu einem Defizit an Substrat 2 (Mangelsituation: Funktionsschwäche, Entwicklungsstörung, Funktionsausfall), andererseits aber auch gleichzeitig zu einem Stau vor dem Engpass (Block) mit anflutendem Überschuss an Vorblock-Substraten.

In Stoffwechselketten führt ein initialer oder intermediärer Katalysatormangel zu einer Kettenreaktion mit zunehmendem Mangel an Intermediärprodukten und einem Defizit des Endproduktes.

4.3.2.2 Kombinationen intermediärer Katalysatoren

Indikationen für den therapeutischen Einsatz von Katalysator-Intermediärprodukt-Kombinationen ergeben sich bei:

Defizienzen an mehreren Stellen von Stoffwechselketten
genereller Unterfunktion der produzierenden Strukturen (Zellorganellen)
Membrantransportstörungen
anlagebedingten Fehlsteuerungen

Eine oder mehrere dieser Voraussetzungen liegen vor bei:

generellen Zell-Matrix-Dysfunktionen (Imprägnations-, Degenerationsphasen)
mitochondrialen Defekten
lysosomalen Defekten

Mitochondriale Defekte wirken sich in besonderem Maße auf den Energiestoffwechsel und die Summe der Stoffwechselketten aus, lysosomale Insuffizienzen hingegen auf den Stoffwechsel der Schleimhäute, die Matrixfunktion und das Bindegewebe.

Stoffwechselstörungen sowie krankheits- oder altersbedingte Leistungsminderungen dieser Zellorganellen können nur mit einer umfassenden Kombination von intermediären Katalysatoren, Intermediärprodukten und Cofaktoren sinnvoll behandelt werden. Für die lysosomalen Defekte stehen entsprechende Präparate zur Verfügung, wobei die Applikation dieser sauren Enzyme ein besonderes Problem darstellt.

Intermediäre Katalysatoren können mit organischem Material kombiniert werden (z.B. Suis-Organpräparate). Die Sinnhaftigkeit solcher Kombinationen liegt im gleichzeitigen Angebot von dynamischen Faktoren – Katalysatoren – und Bausteinen zur Regeneration und Reparation struktureller Defekte.

Intermediäre Katalysatoren haben integrale Funktionen inne und folglich strukturelle Auswirkungen auf gekoppelte Biosysteme. Ihre therapeutischen Anwendungsgebiete sind deshalb weit gefächert. Wenn die tatsächliche Nutzung bislang nur einem Bruchteil der sinnvollen Indikationen zugute kommt, liegt dies vornehmlich noch am Vorherrschen linearer Denkschienen in der heutigen Medizin. Das Denken in vernetzten Systemen, Wechselwirkungen und dem Ineinandergreifen von Information, Formation (Struktur) und Funktion wird leider immer noch vernachlässigt.

Legt man die Hauptfunktionen der Mitochondrien, integrative Vernetzung der Stoffwechselzyklen und (oxidative) Energiegewinnung zugrunde, ergibt sich, welche zentrale Rolle diese Zellorganellen für Gesundheit, Leistungspotential und bei Krankheitsprozessen spielen. Dem komplexen Geschehen bei mitochondrialen Struktur- und Funktionsanomalien ist mit Monosubstanzen nicht beizukommen. Nur organotherapeutische Katalysatoren und Substrate im Zusammenwirken mit unspezifischen Cofaktoren (Vitaminen, Coenzymen) können der Komplexität Rechnung tragen.

4.3.2.3 Stimulierung blockierter Enzymsysteme

Der Therapie mit homöopathisierten Faktoren des Zitronensäurezyklus kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sich nämlich nicht nur Stauungen gezielt beseitigen lassen (z.B. ein Pyruvatstau bei einer erheblichen Verlangsamung der Endoxidation), sondern mittels Induktion der entsprechenden Teilschritte wird der Ablauf des Zitronensäurezyklus wieder in Gang gesetzt und gleichzeitig die Atmung der Zelle beeinflusst.

Viele Enzymreaktionen benötigen Magnesium- oder Manganionen als zusätzliche Aktivatoren. So brauchen z.B. alle Kinasereaktionen für die Phosphatübertragung noch Magnesiumionen, während alkalische Phosphatasen durch Magnesium- und Manganionen sowie zahlreiche Peptidasen durch Manganionen aktiviert werden. In vielen Fällen können die Magnesiumionen ggf. auch durch Manganionen ersetzt werden. Daher ist es sinnvoll und verständlich, dass eine gezielte Therapie mit den intermediären Katalysatoren des Zitronensäurezyklus wegen der Bedeutung des anorganischen Phosphats durch eine Injektion von Magnesium- und Manganionen in Form ihrer Phosphatverbindungen eingeleitet oder kombiniert wird.

Eine solche Therapie eröffnet die Möglichkeit, direkt in das Zentrum des Geschehens einzugreifen. Mit den intermediären Katalysatoren lassen sich Heilreaktionen in bestimmter Weise katalytisch beeinflussen, wobei zentrale und kausale Regulationsmechanismen genutzt werden.

Hierbei spielt der Begriff der Feedback-Hemmung eine wichtige Rolle. Er besagt, dass ein Intermediärprodukt hemmend auf den weiteren Ablauf der Reaktion im Sinne einer Rückkopplung wirkt. Der Reaktionsablauf kann jedoch erst wieder in Gang gebracht werden, wenn die abzubauenden Produkte Abfluss erhalten bzw. verdünnt werden, wie das z.B. bei Entzündungen durch eine Ödemeinschwemmung geschieht. Jedes Substrat, besonders in verdünnter Form, kann also einen Reiz zur Synthese geeigneter Enzyme setzen, und umgekehrt wird durch eine starke Substratanflutung die Produktion von Enzymen, die zur Verstoffwechselung der Substrate führen, gedrosselt.

Viele Erkrankungen führen zu Störungen einzelner Enzymfunktionen, wodurch aber in Folge der gesamte Regelmechanismus versagt. Daraus ergibt sich wiederum, dass derartige Stoffwechselmetaboliten, die hemmend oder anregend auf die Enzyme wirken, entsprechend dem Arndt-Schulz-Gesetz des Umkehreffektes therapeutisch zur Bildung entsprechender Enzyme genutzt werden können. Sobald ein Spaltprodukt nicht weiterverwertet werden kann, da das notwendige Enzymsystem blockiert ist, lässt sich gerade dieses zur Induktion der Synthese des blockierten Enzymsystems nutzen.

Dieser therapeutische Ansatz ist für die zellulären Phasen von besonderer Bedeutung, da bei ihnen Schädigungen der Atmungskette bzw. der Endoxidation in den Mitochondrien vorliegen dürften. Sowohl die beteiligten Enzymsysteme als auch die Funktion der Mitochondrien ist seit langem bekannt. In letzteren sind sowohl der Zitratzyklus als auch die oxidative Phosphorylierung kompartimentiert, so dass dort über energiereiche Phosphate die für die Zelle notwendige Lebens- und Überlebensenergie bereitgestellt werden kann.

Die Enzymhemmung kann aber auch so erfolgen, dass eine in vielen Enzymen aktive Stoffgruppe wie die Thiolgruppe blockiert oder fremdbesetzt wird. Zahlreiche Stoffe wie beispielsweise das Coenzym A sind jedoch durch die freien Thiolgruppen in ihrer Aktivität gekennzeichnet. In anderen Fällen liegt der Enzymhemmung ein Mangel oder eine Blockierung der Spurenelemente zugrunde. Bei derartigen Blockierungen kommt es nachfolgend ebenfalls zu fortschreitenden Krankheitsprozessen.

Nicht zuletzt spielt auch das Histamin bei der Entstehung der zellulären Phasen eine entscheidende Rolle. Wenn das Histamin nicht auf biologischem Wege ausgeschieden werden kann, wird es aus der Inflammationsphase in Richtung auf die zellulären Phasen hin verdrängt und wirkt dann an anderen Organen und Geweben wie z.B. in der Bronchialschleimhaut durch Erzeugung eines Asthma bronchiale.

Wird der pH-Wert der Matrix verändert, d.h. wird die saure Umgebung der Zellen bei einem entzündlichen Prozess durch geeignete Maßnahmen neutralisiert oder alkalisiert, kommt es zu einer Kopplung des Histamins mit Karbonylgruppen unter Bildung von Schiffschen Blasen, die sich jedoch als labile Strukturen in sauerer Reaktionsumgebung sofort wieder in die Ausgangsprodukte aufspalten und somit Asthmaanfälle durch das plötzliche Auftreten von Histamin hervorrufen können.

Zusammenfassend ist festzustellen:
Die Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salze bewirken eine Stimulierung blockierter Enzymsysteme und auch der anderen verknüpften Stoffwechselprozesse.

Der therapeutische Einsatz von Bestandteilen des Zitronensäurezyklus übt einen therapeutischen Reiz aus, durch den es möglich ist, derartige Schädigungen wieder auszugleichen.

Durch die Anwendung der einzelnen Stufen des Zitronensäurezyklus werden Stoffwechselblockierungen gelöst und im Gewebe vorliegende toxische Metaboliten ausgeschieden.

4.3.2.4 Gruppen von Katalysatoren
Gruppe A: Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salze

Anwendungsgebiete
Alle Erkrankungen, die den zellulären Phasen zuzuordnen sind (Degenerationsphasen, Dedifferenzierungsphasen) und damit durch enzymatische Fehlsteuerungen oder Blockierungen bzw. Störungen der Zellatmung gekennzeichnet sind, z.B.:

Paresen, Neuralgien, toxische Neuritiden, vegetative Dystonie, Migräne,
Dermatosen, Neurodermitis, Pruritus (auch Pruritus vulvae), Psoriasis, Vitiligo, Pemphigus, Sklerodermie,
Asthma bronchiale,
Ulcus ventriculi et duodeni, Hepatosen, Leberzirrhose und sonstige Leberschäden, Pankreopathien,
Nephropathien, z.B. Nephrosen und chronische Nephritiden,
Herzmuskelschäden, Angina pectoris, Myokardinfarkt-Nachbehandlung, Arteriosklerose, Zerebralsklerose,
Dysfunktionen und Dysregulationen innersekretorischer Drüsen, z.B. Diabetes mellitus, Dysthyreosen,
Präkanzerosen und Dedifferenzierungsphasen (früher: Neoplasmaphasen) an allen möglichen Geweben,
bei und nach Röntgen- und radioaktiven Bestrahlungen (einige Enzyme, z.B. die Malat-Dehydrogenase, sind strahlensensibel),
Thrombozytopenie, Leukopenie.

Dosierungsanleitung
Die einzelnen Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salze werden zweckmäßigerweise in derjenigen Reihenfolge injiziert, wie sie auch innerhalb der Zelle im Ablauf des Stoffwechsels entstehen, um alle möglichen Defekte, Stauungen und Fehlregulationen zu erfassen.

Es empfiehlt sich dabei stets, zwei bis drei Säuren (bzw. deren Salze) in einer Mischspritze auf einmal zu injizieren.

Da Magnesium- und Mangan-Ionen viele enzymatische Prozesse – besonders die phosphatverschiebenden Kinasereaktionen – aktivieren, wird das der Sammelpackung beiliegende Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel der ersten Injektion zugegeben (Mischspritze).

Im Allgemeinen wird zwei- bis einmal wöchentlich injiziert. Nach einer Serie – also nach 4 Mischinjektionen (siehe unten) – wird eventuell ein behandlungsfreies Intervall bezüglich der Katalysatorentherapie von 2 bis 4 Wochen eingelegt, bis die Wirkung der Injektionen abgeklungen ist. Während dieser Zeit sollen jedoch die indizierten Biotherapeutika-Antihomotoxika-Heel (Injeele, Homaccorde, sonstige Kombinationspräparate-Heel, Suis-Organpräparate, Nosodenpräparate) verabreicht werden, welche auch während der Behandlung zusammen mit den Säuren des Zitronensäurezyklus bzw. deren Salzen angewandt werden können. Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In der Gebrauchsinformation wird der Patient darauf hingewiesen, sich an seinen Therapeuten zu wenden.

Injektionsschema

1. Injektion	Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel + Natrium pyruvicum-Injeel + Natrium oxalaceticum-Injeel
2. Injektion	Acidum citricum-Injeel + Acidum cis-aconiticum-Injeel
3. Injektion	Baryum oxalsuccinicum-Injeel + Acidum α-ketoglutaricum-Injeel
4. Injektion	Acidum succinicum-Injeel + Acidum fumaricum-Injeel + Acidum DL-malicum-Injeel

Nach einer Pause von 2 bis 4 Wochen Wiederholung dieser Injektionsserie.

Die einzelnen Säuren bzw. deren Salze können auch jeweils für sich allein in der Injeel-forte-Form wiederholt injiziert werden. Dies ist vor allem dann angezeigt, wenn bei einer der oben aufgeführten Mischinjektionen (1. bis 4.) eine besonders gute Wirkung zu erzielen war. Man soll nachfolgend dann die in dieser Mischung enthaltenen Ampullen einzeln applizieren.

Empfehlenswert ist der Genuss von viel frischem Obst, Traubensaft, Heidelbeeren, roter Bete. Die letztgenannten sind reich an Anthozyanen (Zellatmungsaktivatoren, Wasserstoffakzeptoren).

Darreichungsform und Packungsgrößen
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml. Sammelpackung Zitronensäurezyklus-Heel (enthält 9 Ampullen der Einzelmittel-Injeele + 1 Ampulle Magnesium Manganum-phosphoricum-Injeel).

Präparateliste der Katalysatoren Gruppe A

Acidum cis-aconiticum-Injeel
Acidum cis-aconiticum-Injeel forte
Acidum citricum-Injeel
Acidum citricum-Injeel forte
Acidum fumaricum-Injeel
Acidum fumaricum-Injeel forte
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel forte
Acidum DL-malicum-Injeel
Acidum DL-malicum-Injeel forte
Acidum succinicum-Injeel
Baryum oxalsuccinicum-Injeel
Baryum oxalsuccinicum-Injeel forte
Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel
Natrium oxalaceticum-Injeel
Natrium oxalaceticum-Injeel forte
Natrium pyruvicum-Injeel
Natrium pyruvicum-Injeel forte

Die Injeel-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenaccord: D10, D30, D200 jeweils 0,367 ml. Ausnahme: Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel D12, D30, D200.

Die Injeel-forte-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenaccord D6, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml.

Gruppe B:
Chinone sowie sonstige intermediäre Atmungskatalysatoren

Allgemeine Hinweise
Als Chinone wird eine umfassende und wichtige Gruppe von organischen Verbindungen bezeichnet, welche aus aromatischen Dioxyverbindungen in einer reversiblen Reaktion durch Abspaltung zweier H-Atome entsteht. Chinone sind natürliche und synthetische Farbstoffe, sie kommen meist als gelb-, orange-, rot- oder blauschwarzfarbene, d.h. gefärbte Dioxyverbindungen vor.

In der Natur kommen Chinone in einigen Pilzen (Pilzfarbstoffe, Bakterien und Antibiotika), in höheren Pflanzen (als Blüten-, Rinden- und Wurzelfarbstoffe), in Blattdrüsen verschiedener Labiaten, im tierischen Organismus bei Gliederfüsslern, Stachelhäutern und Säugetieren vor.

In einem gesunden Körper kommen Chinone als Stoffwechselbestandteile in nur geringem Maße vor. Meist sind sie Bestandteile der Nahrungsstoffe oder der Teerstoffe, die in der eingeatmeten Luft enthalten sind.

Die Chinone haben die besondere Eigenschaft, überschüssige Sauerstoffradikale zu neutralisieren. Eine Chinontherapie verbessert die Zellatmung (biologische Oxidation).

Die Toxine, die im Laufe des Lebens entfernt werden müssen, können u.a. durch Oxidation abgebaut werden. Oxidation bedeutet Sauerstoffverbrauch und folglich besteht die Gefahr eines ineffizienten Stoffwechsels. Mit Chinonen ist es möglich, die Folgen einer Dysregulation zu behandeln. Die Chinontherapie stellt große Anforderungen an den Giftabwehrmechanismus des Organismus. Die Unterstützung des Toxinabwehrsystems und eine gezielte Ausleitungstherapie sind wichtig.

Gedanken von Dr. med. E. Reinstorff zum Buch „Das Überleben bei Krebs und Viruskrankheiten“ von William Frederick Koch:
Koch eröffnete durch sein Buch mit dem gleichnamigen Titel eine neuartige Schau des Krankheitsgeschehens und der sich daraus ergebenden erfolgreichen Therapie. Sie basiert auf einer ergänzenden Interpretation der Gewebsoxidationen, die den bekannten Gesetzen der Chemie entspricht, wobei die Phänomenologie des freien Radikals und der Doppelbindung eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Freie Radikale sind kurzlebige hochreaktive Stoffwechselprodukte, die ein oder mehrere ungepaarte Elektronen enthalten (Moleküle, Atome und Ionen). Schon in den 30iger Jahren hat William Koch die freien Radikale und ihre katalytischen Effekte in die medizinische Forschung eingeführt und mit bestem Erfolg für die Heilung verschiedener Krankheiten verwendet. Damals entwickelte sich aufgrund seiner Forschungen die Kenntnis von der Existenz freier Radikale, und in der technischen Chemie wurde die heute so bedeutungsvolle Kunststoffindustrie begründet.

Dr. Kochs grundlegende Thesen decken ein Schlüsselprinzip auf, das sowohl im physiologischen wie auch im pathologischen Geschehen eine Art Weichenstellung darstellt. Er nennt es einen „Least common denominator in disease condition“, einen letzten Generalnenner im Krankheitsgeschehen. Er erklärt diesen so rätselhaften Pasteur-Effekt auf der gleichen Basis wie die Verankerung von Pathogenen verschiedener Art mit dem energieproduzierenden Mechanismus einer Zelle. Er behauptet, dass dieser Vorgang bei verschiedenen Zellarten nach dem gleichen Muster abläuft, jedoch daraus ganz verschiedene Krankheitserscheinungen entsprechend der Eigenart der Wirtszelle und deren funktionell energetischen Aufgaben entstehen. Diese würden auf eine einheitlich gleichartige Weise in umgekehrter Richtung dem pathophysiologischen Ablauf einer erzwungenen Oxidation folgen, so dass Heilung eintreten kann.

Dr. Koch hat in seinem Buch durch Röntgenbilder, Zeugnisse und Biopsiebefunde amerikanischer Fachärzte und Kliniken eine große Zahl Belege für seine Fälle geschaffen.
Die Chinone stellen aufgrund ihrer Karbonylgruppe ein Oxidations-Reduktions-System dar (Redox-System; Chinon ÷ Hydrochinon).

Da beim Übergang von Chinon zu Hydrochinon freie Sauerstoffradikale entstehen, brechen über den dabei ablaufenden Wasserstoffentzug die Kondensationsvorgänge auf im Sinne einer Depolymerisation. Imprägnations-, Degenerations- und besonders Dedifferenzierungsphasen sind solche Kondensationsvorgänge.

Karbonylgruppen enthaltende Präparate „brennen“ retoxisch oder sonst verankerte Aminogruppen aus Azomethinverbindungen (Azomethin-Doppelbindung) weg. Obwohl Methylenblau keine „Chinon-Struktur“ hat, ist es dennoch ein wichtiger Wassserstoffüberträger bzw. Wasserstoffakzeptor (siehe oben!) für biochemische Redoxprozesse im Sinne der „sauerstofflosen Oxidation“.

Sowohl die Chinone als auch das Methylenblau haben z.B. die Fähigkeit, unter Sauerstoffabschluss das Ferment Succinodehydrogenase (Dehydrierung der Bernsteinsäure in die Fumarsäure) zu vertreten; d.h. Methylenblau kann bei Abwesenheit von Sauerstoff an dessen Stelle als Elektronenakzeptor dienen.

Anwendungsgebiete
Die Präparate der Gruppe B sind vorzugsweise bei Krankheitsbildern bzw. zellulären Phasen rechts des biologischen Schnittes einzusetzen, also bei Imprägnations-, Degenerations- und Dedifferenzierungsphasen (früher: Neoplasmaphasen).

Dosierungsanleitung
Die Dosierung soll stets individuell erfolgen und ist abhängig zu machen vom Befund, vom Befinden und vom jeweiligen Ansprechen auf diese Präparate, was von Fall zu Fall – auch bei gleicher Diagnose! – recht unterschiedlich sein kann.

Im Allgemeinen ist es empfehlenswert, die Katalysatorenpräparate der Gruppe B 1- (bis 2-)mal wöchentlich zu applizieren (i.m., s.c., i.c.; gegebenenfalls auch in die entsprechenden Akupunkturpunkte und eventuell i.v.).

Darauf hingewiesen sei, dass die Katalysatorenpräparate der Gruppe B bei den zellulären Phasen mit Vorteil auch zu interponieren bzw. zwischenzuschalten sind (ähnlich wie die Nosodenpräparate) neben der sonst erforderlichen Therapie mit weiteren Biotherapeutika.

Einige spezielle therapeutische Hinweise

Glyoxal sollte generell nur relativ selten appliziert werden. Dieses Präparat sollte man deshalb stets auch über einen längeren Zeitraum nachwirken lassen.

Bei der Anwendung von Para-Benzochinon ist es empfehlenswert, dass vor einer Behandlung mit diesem Präparat zunächst Hydrochinon etwa dreimal appliziert wird und erst anschließend dann Para-Benzochinon zur Anwendung kommt.

Darreichungsform und Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Präparateliste der Katalysatoren Gruppe B

Anthrachinon-Injeel forte
Glyoxal-Injeel
Hydrochinon-Injeel forte
Naphthochinon-Injeel forte
Para-Benzochinon-Injeel
Para-Benzochinon-Injeel forte
Trichinoyl-Injeel forte
Ubichinon-Injeel forte

Die Injeel-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenaccord: D12, D30, D200 jeweils 0,367 ml.

Die Injeel-forte-Zubereitungen beinhalten bei allen Präparaten folgenden Potenzenaccord D8, D12, D30, D200 jeweils 0,275 ml.

Gruppe C: Sonstige stimulativ wirkende Verbindungen

Allgemeine Hinweise
Sonstige stimulativ wirkende Verbindungen mit katalytischen Effekten auf Stoffwechsel- und Atmungsfunktionen sind u.a.: Homöopathisierte Vitamine der Vitamin B-Gruppe sowie von Vitamin C – in tiefster Potenz jeweils D6 – als Co-Faktoren bzw. Co-Enzyme, stimulativ wirkende Verbindungen mit Katalysator-Effekten, z.B. biogene Amine wie Adrenalin, Serotonin (5-Hydroxi-tryptamin) und Histamin (4-(2'-Aminoäthyl)-Imidazol) bzw. deren Vorstufen wie die Aminosäuren Tryptophan (β-Indolalanin = Vorstufe des Serotonins) und Histidin (β-Imidazolalanin bzw. β-Imidazolylalanin = Vorstufe des Histamins) sowie die Aminosäuren Cystein (schwefelhaltig), Acidum L(+) asparagicum und Acidum glutaminicum, ferner die Tryptophan-Abbauprodukte Indol und Scatol (β-Methylindol) und die Aminosäuren-Abkömmlinge Guanidin (Imino-Harnstoff) und Methylguanidin sowie Anthozyane (Zellatmungsaktivatoren; Wasserstoffakzeptoren) und Elemente (Spurenelementfaktoren), z.B. Caesium und Cer (redoxkatalytische Wirkung).

Dosierungsanleitung
Im Allgemeinen wird ein- bis zweimal wöchentlich injiziert. Die erneute Injektion eines oder mehrerer Katalysatoren wird erst dann durchgeführt, wenn die Wirkung der vorhergehenden abgeklungen ist. Mit der sich konsolidierenden Heilung werden im Allgemeinen immer seltenere Injektionen erforderlich.

Darreichungsform und Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Präparateliste der Katalysatoren Gruppe C

Acetylcholinchlorid-Injeel
Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte
Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte
Adrenalin-Injeel forte
cAMP D8; D12; D30
Cortison-Injeel
Cortison-Injeel forte
Cystein-Injeel
Histamin-Injeel
Histamin-Injeel forte
Histamin D200
Serotonin-Injeel
Vitamin B_2-Injeel
Vitamin B_6-Injeel
Vitamin B_{12}-Injeel
Vitamin C-Injeel

Therapeutische Methodenwahl

Allgemeine Empfehlungen
Der Einsatz von Biokatalysatoren hat eine starke Reizwirkung auf den Patienten (z.B. starke Müdigkeit nach Medikamentengabe). Es wird empfohlen, während der ersten drei Kurtage minimal 2 bis 3 Liter zu trinken und auch weitgehend auf körperliche Aktivitäten zu verzichten. Daneben ist eine toxinarme Diät erwünscht. Anzeichen einer regressiven Vikariation sollten nicht unterdrückt werden, sondern mit Hilfe biologischer Therapeutika ausgeleitet werden.

Ein exaktes Timing ist für den Einsatz von Katalysatoren von größter Wichtigkeit. Falsches Timing kann in manchen Fällen progressive Vikariationen auslösen. Dieses Phänomen tritt ein, wenn der Körper sich in einem äußerst labilen Zustand befindet oder zu schwach ist, einer Reiztherapie unterzogen zu werden.

Bei Patienten in geschwächtem Zustand muss besonders darauf geachtet werden, dass sehr langsam mit der Behandlung begonnen wird und nicht mit massiven Medikamentengaben eingesetzt wird.

Beispiel: Beginn mit einer ½ Ampulle oral 2 mal wöchentlich oder 2 mal wöchentlich 1 Ampulle in 1½ l Wasser auflösen und diese Lösung über den Tag verteilt in kleinen Schlucken trinken. Oft erzielen die Biokatalysatoren dann bereits die gewünschte Wirkung, ohne dass heftige Heilkrisen auftreten.

Hinweis zur Dosierung
Für alle Katalysatoren-Präparate der Gruppe B gilt, dass eine Wiederholung der Injektionen erst nach Abklingen eventuell auftretender, seltener Reaktionen (Erstverschlimmerungen) erfolgen soll sowie stets dann, wenn erneut Beschwerden auftreten.

Wichtig ist ferner eine gute Drainage, d.h. bei Patienten mit schwerer toxischer Belastung sollte vor der Therapie mit Katalysatoren eine Mobilisation der körpereigenen Abwehr erfolgen.

Bei der Bioregulationstherapie lassen sich im Allgemeinen drei Phasen unterscheiden:

1. Stabilisierung des Krankheitsprozesses,
d.h. Behandlung möglicher Entzündungsprozesse, wobei in manchen Fällen die schulmedizinische Therapie nicht ohne weiteres abrupt abgebrochen werden darf. Eine Stabilisierung kann durch Diät, vernünftige Lebensführung, ausreichende Bewegung, Unterstützung der körpereigenen Abwehr etc. erzielt werden.

2. Ergänzung fehlender Stoffe,
wobei an Vitamine und Spurenelemente zu denken, ist sowie Behandlung vorliegender Dysbiosen. Ein geschwächter Organismus mit schweren Mangelerscheinungen und Dysbiosen muss vorab mit parenteralen Vitaminpräparaten behandelt werden. Im Sinne von Mineral- und Spurenelementen ist vor allem auf Zink, Calcium, Kalium und Magnesium zu achten.

3. Chirurgische Behandlung;
Entfernung von Entzündungsherden: z.B. Zahnextraktionen, Nasennebenhöhlensanierung, Entfernung von Amalgam etc.

• 4.3.3 NOSODEN

Definition von Nosoden
Nosoden sind krankheitsauslösende Agenzien, deren Virulenz oder Toxizität durch die homöopathische Zubereitung ausgelöscht wurde, deren Information aber die immunologischen Erkennungsmechanismen voll erreicht und entsprechende heilungsfördernde Stimulationen möglich macht.

Ausgangsmaterial
Nosoden sind nach einer homöopathischen Verfahrenstechnik hergestellte Zubereitungen aus pathologisch veränderten Organen oder Organteilen von Mensch oder Tier, ferner aus abgetöteten Kulturen von Mikroorganismen oder aus Zersetzungsprodukten tierischer Organe oder aus Körperflüssigkeiten, die Krankheitserreger bzw. Krankheitsprodukte enthalten, z.B. Blut, Liquor oder Punktionsflüssigkeit; vgl. in diesem Zusammenhang AMG vom 24.08.1976, § 3 (= Stoffliste) Abs. 3 und 4 und HAB 2000, amtliche Ausgabe, Vorschrift 43 und 44.

Die Identität des Ausgangsmaterials wird durch fachärztlichen Befund des Operationsmaterials oder durch Laborbefund protokollarisch belegt, ggf. auch durch Zertifikate der Lieferanten von Bakterien und Viren.

Das HAB sieht vor, dass das Ausgangsmaterial für Nosoden zunächst sterilisiert wird und danach, vor dem Verarbeiten, der Prüfung auf Sterilität des Arzneibuches (DAB 10) entsprechen muss. Erst dann kann die homöopathische Aufbereitung erfolgen. Es handelt sich also bei den Nosoden um reine Homöopathika, die nicht als Impfstoffe, Seren oder dergleichen verwendet werden können. Aus diesem Ausgangsmaterial werden Urtinkturen nach den Vorschriften 43 oder 44 hergestellt.

Die Definition der Nosoden entspricht somit auch dem Stoffbegriff, der im § 3 des Arzneimittelgesetzes festgehalten ist, insbesondere in den Punkten 3 und 4. Stoffe im Sinne des Gesetzes sind demnach:

chemische Elemente
Pflanzen und Pflanzenteile
Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, Bestandteile und Stoffwechselprodukte von Mensch oder Tier in bearbeitetem Zustand
Mikroorganismen einschließlich Viren, sowie deren Bestandteile oder Stoffwechselprodukte

Für die Herstellung von Nosoden gibt es zwei verschiedene Vorschriften, nämlich die HAB 2000, Vorschrift 43 für Urtinkturen aus pathologisch veränderten Organen oder Organbestandteilen von Mensch oder Tier und die Vorschrift 44 für Urtinkturen aus abgetöteten Kulturen von Mikroorganismen oder aus Zersetzungsprodukten tierischer Organe oder aus Körperflüssigkeiten, die Krankheitserreger bzw. Krankheitsprodukte enthalten.

Einteilung der Nosoden

Auto-Nosoden
Das sind aus dem eigenen Organismus von Kranken gewonnene Substanzen wie z.B. Blut, Harn, Tränenflüssigkeit, Sputum, Eiter, Stuhl oder krankes Gewebe.
Diese Ausgangsstoffe werden homöopathisiert und bei demselben Patienten angewendet.

Hetero-Nosoden
Das sind Stoffe, die nicht aus dem eigenen Organismus stammen.

Gruppen von Hetero-Nosoden
Es gibt virale, bakterielle und Impfstoff-Nosoden. Dies sind Nosoden, die aus Mikroorganismen oder Impfstoffen hergestellt werden. Es gibt weiterhin Gewebenosoden, zu denen wir auch Körpersekrete rechnen möchten.

Als Beispiele für *virale Nosoden* sollten genannt werden:

Die Coxsackie-Virus-B_4-Nosode	Diese wird hergestellt aus auf 109 plaquebildende Einheiten pro Milliliter eingestellte und abgetötete Coxsackie-B_4-Viren.
Die Herpes Zoster-Nosode	Diese wird hergestellt aus auf 106 plaquebildende Einheiten pro Milliliter eingestellte und abgetötete Herpes-Zoster-Viren.

Als Beispiele für *bakterielle Nosoden* seien genannt:

Die Bacterium coli-Nosode	Diese ist ein aus Escherichia-coli-Bakterienkulturen, die auf einen bestimmten Titer (107 KBE/g) eingestellt werden, hergestelltes Präparat.

Gewebenosoden sind Nosodenpräparate aus pathologisch veränderten Organen bzw. Geweben und Stoffwechselprodukten.
Beispielsweise die Tonsillitis-Nosode, die aus chirurgisch entfernten entzündeten Mandeln (Tonsilla palatina) hergestellt wird.
Das Ausgangsmaterial der Sinusitis-Nosode ist die aus entzündeten Nebenhöhlen gewonnene schleimige Masse.
Das Ausgangsmaterial der Otitis media-Nosode ist Eiter von an Mittelohrentzündung leidenden Patienten.

Gruppen von Nosodenzubereitungen

1.	Virale Nosoden	Herpes zoster-Nosode Coxsackie A_9 bzw. Coxsackie B_4
2.	Bakterielle Nosoden	Staphylococcinum Streptococcinum
3.	Impfstoff-Nosoden	Grippe-Nosode Tollwut-Vakzine
4.	Gewebe (Organ)-Nosoden	Tonsillitis-Nosode
5.	Sekretnosoden	Sinusitis-Nosode

Auswahlprinzip der Nosoden
Je nach Ätiologie der ursprünglichen Erkrankungen, die zu einer unzureichenden immunologischen Aufarbeitung und damit in die Chronifizierung geführt haben, kommen verschiedene Arten von Nosoden zum Einsatz.

1.	Bakterien-Nosoden
2.	Viren-Nosoden
3.	Misch-Nosoden
4.	Organ-Nosoden
5.	Erb-Nosoden
6.	Auch homöopathisierte Allopathika können vom Prinzip her im weitesten Sinne zu den Nosoden gerechnet werden. Schließlich sind sie, wie wir bei vielen Therapieschäden feststellen müssen, häufig genug als krankheitsauslösende Agentien zu bezeichnen.
7.	Nosoden können ebenfalls aus unbelebten Stoffen, Schwermetallen, Umweltschadstoffen und sämtlichen chemischen Substanzen hergestellt werden. Diese besondere Form von Nosoden gewinnt in unserer umweltbelasteten Zeit immer mehr an Bedeutung und ihre Entwicklung muss den entsprechenden vitalen Erfordernissen angepasst werden.

Therapeutische Methodenwahl
Bei der Therapie mit Nosodenpräparaten sind unterschiedliche prinzipielle Gesichtspunkte zu beachten (in Anlehnung an *Allendy/Fortier-Bernoville/Martiny)*:

Anwendung gemäß der

a. symptomatischen/anamnestischen Ähnlichkeit (Simile-Prinzip).
b. am Ende bzw. nach soeben durchgemachter akuter Erkrankung.

Hierzu ist im Einzelnen Folgendes zu sagen:
Ad a. Die Anwendung der Nosoden soll also nach der symptomatischen Ähnlichkeit, d.h. nach der grundlegenden homöopathischen Regel des Simillimum bzw. nach der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit hinsichtlich einer alten, scheinbar geheilten Krankheit erfolgen.

Zur Anwendung von Nosodenpräparaten unter dem Gesichtspunkt der aktuellen ätiologischen Ähnlichkeit ist Folgendes von Wichtigkeit:
Alle Nosoden können als spezifisches Heilmittel, als Isotherapeutikum bei der entsprechenden Krankheit angewendet werden, der sie entstammen. Im Allgemeinen werden sie in diesem Falle als Zwischenmittel neben den angezeigten homöopathischen Mitteln verabfolgt, wobei vor allem ausleitende, matrixkanalisierende Antihomotoxika (z.B. Lymphomyosot N, Galium-Heel N) eine große Rolle spielen.

Ad b. Nach überstandener Krankheit stellen die Nosoden allerdings ein ausgezeichnetes Mittel dar, die in der Matrix abgelagerten Toxine zur (schnelleren) Ausscheidung zu bringen.
Oft genug handelt es sich bei solchen Fällen nicht nur um die Ausscheidung der Erregertoxine, sondern auch um Restbestände der Erreger mit latenten Krankheitsherden sowie um nicht mehr pathogene Erregeransiedlungen (Dauerausscheider).

Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf soeben überstandene Infektionskrankheiten wie Masern, Röteln, Windpocken, Grippe, Erysipel, Scharlach, Typhus, Diphtherie usw.

Auch können wir davon ausgehen, dass durch die Nosoden die spezifischen Abwehrvorgänge gegen die Krankheitsauslöser neu induziert werden. Die klinische Bestätigung für diesen immunmodulativen Effekt finden wir im Rückgang aktuell forcierter Antikörperbildungen als Ausdruck der nicht abgeschlossenen Toxinausschüttung der Krankheitserreger. So beobachtet man häufig die Normalisierung eines pathologisch erhöhten Antistreptolysintiters nach Einsatz der Streptokokken-Nosoden.

Indikationen für eine Nosodentherapie

- Chronisch-exsudative Erkrankungen
- Chronisch-proliferative Erkrankungen
- Degenerative Erkrankungen
- Autoaggressionserkrankungen (Cave!)
- Therapieschäden

Die Nosoden können als *Heilmittel des Terrains* bezeichnet werden. Sie sind deshalb besonders bei Dyskrasien, d.h. bei Krankheiten der Konstitution bzw. bei Summationszuständen von sich integrierenden bzw. bei integrierten Dispositionen indiziert, also im Sinne der Homotoxinlehre bei allen zellulären Phasen, besonders bei retoxisch gehemmten Phasen, bei Autoaggressionskrankheiten (Cave!), bei den psorischen Krankheiten im Sinne von Hahnemann sowie bei Allergien.

Im Falle von Autoaggressionserkrankungen sollte nur nach entsprechender Vorbehandlung, wie ausleitenden Therapien mit Matrixkanalisierenden Antihomotoxika, behandelt werden.

Nosoden sind aber nicht nur bei zellulären Phasen indiziert, sondern häufig auch bei humoralen Phasen und zwar speziell dann, wenn eine dyskrasische Komponente mit im Spiel ist oder den Verlauf zu komplizieren droht oder bei reduzierter Immunpotenz.

Die Wirkung der Nosoden erfolgt im Sinne einer positiven Vikariation mit Entgiftung und Ausscheidung der Homotoxine. Dies bedeutet gleichzeitig eine Steigerung der abwehrgesteuerten Selbstheilungsvorgänge.

In der Mehrzahl der Fälle ist eine Summation bekannter und ggf. auch nicht bekannter Giftstoffe (Homotoxine) anzunehmen, und auf dieser Erkenntnis basiert auch die Notwendigkeit und die Berechtigung zu einer gleichzeitigen Anwendung, einer Reihe von Nosoden, die - eventuell auch gekoppelt mit anderen Einzelmittel-Injeelen, Kombinationspräparaten usw. - gleichsam als *Breitband-Antihomotoxikum* zu applizieren sind, um das genannte Terrain zu bereinigen.

Nosodenpräparate haben eine tiefgreifende konstitutionelle Wirkung. Mit Nosoden kann praktisch jede Therapie wirkungsvoll unterstützt werden. Sie stellen bei der Heilung oft das fehlende Glied einer Reaktionskette dar, welche ohne das Nosodenpräparat nicht endgültig oder nur unter großen Schwierigkeiten ablaufen kann. Die Wirkung erfolgt dabei sowohl über unterschwellige Antigen-Antikörper-Reaktionen als auch über den homöopathischen Gegentakt-Mechanismus von Co-Repressoren.

Dosierungshinweise
Die Dosierung soll stets und prinzipiell streng individuell erfolgen und ist abhängig zu machen vom Befund, vom Befinden und vom jeweiligen Ansprechen auf die entsprechenden Nosodenpräparate, was von Fall zu Fall recht unterschiedlich sein kann.
Im Allgemeinen gibt man 1 bis maximal 3 mal wöchentlich je 1 Ampulle.

Auch die *Dauer der Behandlung* mit den Nosodenpräparaten ist individuell unterschiedlich zu gestalten. Nach akuten Erkrankungen empfiehlt sich eine kurze Therapiedauer von etwa 2 - 4 Wochen, während sich die Behandlung einer chronischen Erkrankung – je nach Reaktionslage – über einen längeren Zeitraum (ca. 6 Monate) erstrecken kann.

Es empfiehlt sich, mit der normalen Injeel-Form die Nosodentherapie zu beginnen, anschließend dann in o.a. Gruppen a. und b. auf die forte-Injeel-Form überzugehen, und zwar insbesondere dann, wenn sich auf die normale Injeel-Form keine entsprechenden Reaktionen bzw. Besserungen einstellen sollten.

Ganz Allgemein gilt und ganz besonders auch für die Nosodentherapie:

Höhere Potenzen (D12, D30 usw.) sind angezeigt:

- bei erhöhter Reizbarkeit (As-, P-, J-Typ, Chamomilla-Typ),
- bei Diathesen,
- bei Allergien,
- bei chronischen Leiden.

Niedere Potenzen (etwa bis D6 bzw. bis D8) sind angezeigt:

- bei mehr oder minder akuter Erkrankung,
- bei trägen Reaktionstypen (Sepia-, Nux vomica-, Graphites-, Silicea-Typ), wenn eine organotrope Wirkung auf ein bestimmtes Organ erwünscht ist.

Indikationen für höhere Potenzen verlangen meist relativ große Applikationsintervalle, bis zu mehreren Wochen.

Indikationen für niedere Potenzen verlangen dagegen in der Regel kurze Applikationsintervalle von etwa 2 bis 3 Gaben pro Woche.

Empfehlenswert ist es, mit der i.m.- bzw. mit der s.c.- oder i.c.- (Neuralpunkte, Akupunktur) Injektion zu beginnen und erst dann, falls kein Ansprechen auf diese Injektionsmethodik erfolgen sollte, ggf. auf die i.v.-Applikation der entsprechenden Nosodenpräparate überzugehen.

Sehr günstig lassen sich die Nosoden-Injeele im Rahmen einer Auto-Sanguis-Stufentherapie verwenden. Sie sollten allerdings immer in der letzten Stufe appliziert werden.

Zur Dosierung und Potenzierung von Nosodenpräparaten im Kindesalter ist Folgendes zu sagen: Die Dosierung von Nosodenpräparaten im Kindesalter unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der Dosierung der übrigen Homöopathika im Kindesalter; d.h., dass man bei Kindern (etwas) weniger geben wird als bei Erwachsenen.

Niedere Potenzen, D4-D8, werden auch bei Kindern am Anfang der Therapie gegeben sowie bei einer mehr oder minder akuten Erkrankung – also gleiches Vorgehen wie beim Erwachsenen.

Höhere Potenzen, etwa D12-D30, werden auch im Kindesalter zur Anwendung gebracht, nach einer anfänglichen Behandlung mit niederen Potenzen (D4-D8) bzw. bei chronischen Leiden. Hier gelten also die gleichen Potenzierungsangaben wie bei den Erwachsenen.

Generell gilt: Mit Nosoden – als „Heilmittel des Terrains“ – kann praktisch jede Therapie wirkungsvoll unterstützt werden.

Nosoden stellen in der Therapie oft das fehlende Glied einer Reaktionskette dar, wobei eine Heilung ohne das Nosodenpräparat nicht endgültig oder nur unter großen Schwierigkeiten erzielt werden kann.

Aus homotoxikologischer Sicht werden Nosoden hauptsächlich eingesetzt, um zelluläre Phasen in humorale Phasen zu überführen, d.h. um eine regressive Vikariation zu erzielen.
Jedoch sind Nosoden auch bei humoralen Phasen angezeigt, wenn ein Abgleiten in einen chronischen Zustand, d.h. eine progressive Vikariation befürchtet werden muss.

Die Therapie mit Nosodenpräparaten ist vor allem auch für den Elektroakupunkteur von sehr großem Interesse, da dieser die entsprechende(n) Nosode(n) mittels der Medikamententestung exakt bestimmen kann.

Zusammensetzung
Aus Platzgründen ist die Angabe der Bezugsgrößen und Menge bei den einzelnen Präparaten nicht aufgeführt. Für die folgenden Nosodenpräparate gilt als Beispiel:

Medorrhinum-Injeel	1,1 ml Injektionslösung enthalten: Medorrhinum-Nosode D12, Medorrhinum-Nosode D30, Medorrhinum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml.
Medorrhinum-Injeel forte	1,1 ml Injektionslösung enthalten: Medorrhinum-Nosode D10, Medorrhinum-Nosode D12, Medorrhinum-Nosode D30, Medorrhinum-Nosode D200 jeweils 0,275 ml.

Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Tab. 3: Präparateliste Nosoden

Präparateliste Nosoden	
Asthma-Nosode-Injeel	Medorrhinum-Injeel forte
Bacillinum humanum-Injeel	Myoma uteri-Injeel
Bacterium coli-Injeel	Nagelmykose-Nosode-Injeel
Calculi bili-Injeel	Neurofibroma-Injeel
Carcinoma coli-Injeel	Osteomyelitis-Nosode-Injeel
Carcinoma mammae-Injeel	Otitis media-Nosode-Injeel
Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel	Ovarialcyste-Injeel
Coxsackie-Virus-A9-Injeel	Parodontose-Nosode-Injeel
Coxsackie-Virus-A9-Injeel forte	Polypus nasalis-Injeel
Coxsackie-Virus-B4-Injeel	Psorinum-Injeel
Coxsackie-Virus-B4-Injeel forte	Salmonella typhi-Injeel
Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel	Salmonella typhi-Injeel forte
Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel forte	Sinusitis-Nosode-Injeel
Granuloma dentis-Injeel	Staphylococcus-Injeel
Grippe-Nosode-Injeel	Streptococcushaemolyticus-Injeel
Herpes simplex-Nosode-Injeel	Streptococcus viridans-Injeel
Herpes zoster-Nosode-Injeel	Struma nodosa-Injeel
Kieferostitis-Nosode-Injeel	Tonsillitis-Nosode-Injeel
Medorrhinum-Injeel	Vaccininum-Injeel

• 4.3.4 SUIS-ORGANPRÄPARATE

Was sind Suis-Organpräparate?
Ein wichtiger Bestandteil der Antihomotoxischen Therapie ist die Gabe von Suis-Organpräparaten. Diese werden bevorzugt bei chronischen Krankheitsverläufen in den zellulären Phasen eingesetzt. Sie sind damit insbesondere für den älteren Patienten eine hervorragende Möglichkeit, die Organfunktionen zu reaktivieren. Die Präparate werden nach dem Simile-Prinzip eingesetzt, d.h. man verwendet jeweils das Präparat des zu therapierenden Organs.
Die Suis-Organpräparate sind nach Vorschrift 42 des amtlichen Homöopathischen Arzneibuches 2000 (HAB 2000) homöopathisch aufbereitete, d.h. verdünnte und potenzierte Organgewebe, deren Ausgangsstoffe von gesunden Schweinen stammen.

Die Suis-Organpräparate können wirkungsmäßig als organspezifische Arzneimittel mit stimulativen Eigenschaften charakterisiert werden. Der Wirkmechanismus der Suis-Organpräparate beruht auf einer organotropen Wirkung der zugeführten Substanzen bzw. Reize.

Haltung der Spendertiere und Organgewinnung
Zur Aufzucht der Schweine für die Herstellung der Suis-Organpräparate ist Folgendes zu sagen: Die für die Organentnahme vorgesehenen Tiere stammen alle aus derselben Zuchtlinie eines als SPF-Bestand („spezifisch pathogenfrei“) anerkannten Ferkelerzeugerbetriebes, der in sechswöchigen Abständen vom zuständigen Staatlichen Tiergesundheitsdienst überwacht wird.

Die Aufzucht der Ferkel erfolgt in einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb. Dort wird zunächst eine Eingangsuntersuchung durch einen Tierarzt vorgenommen. Nachdem die Ferkel diese passiert haben, werden sie auf dem Hof von anderen Tieren getrennt gehalten und unter tierärztlicher Überwachung aufgezogen. Tiere, die wegen Erkrankung medikamentös behandelt werden mussten, werden von der Organentnahme ausgeschlossen. Als Futter werden hofeigene, vegetabile Futtermittel verwendet. Für beide Betriebsinhaber besteht eine vertragliche Verpflichtung, keine aus Säugetieren hergestellten Tiermehle oder Abfälle zu verfüttern.

Nach Erreichen des Schlachtgewichtes und durchgeführter Abgangsuntersuchung durch den zuständigen Amtstierarzt werden die Schweine auf dem nächstgelegenen Schlachthof, der EG-Status haben muss, nach der fleischbeschaurechtlich geforderten Lebendbeschau geschlachtet und anschließend daran die Schlachtkörperbeschau durchgeführt. Falls diese zu der Beurteilung „tauglich zum menschlichen Verzehr“ führt, werden Proben für folgende weitere Untersuchungen entnommen: Eine bakteriologische Untersuchung, eine Untersuchung auf Hemmstoffe sowie eine serologische Untersuchung auf Brucellose, Leptospirose sowie Yersiniose gemäß den „Zoonosen-Empfehlungen“ des Bundesministeriums für Gesundheit vom 08.07.1991.

Anschließend werden dann in speziellen, vom übrigen Schlachthof abgetrennten und eigens für diesen Zweck errichteten Räumlichkeiten die für die Herstellung der Suis-Organpräparate benötigten Organe entnommen, die zunächst so lange unter Quarantäne bleiben, bis die Ergebnisse aller in die Wege geleiteten Untersuchungen vorliegen.

Erst dann werden die entnommenen Organe von der Qualitätskontrolle der Firma zur weiteren Verarbeitung freigegeben.

Eine Sterilisation erfolgt erst, wenn die Fertigung der potenzierten Organzubereitungen abgeschlossen ist. Damit behält das Material während der Potenzierung den Charakter des lebendigen Gewebes, und die Präparate haben eine direkte Eiweißbeziehung zu den erkrankten Organen.

Die aufgezeigten Maßnahmen, die auch alle in einem Tierprotokoll dokumentiert werden, dienen dem Ziel, einen höchstmöglichen Standard bezüglich der Arzneimittelsicherheit (Zoonosen) für die Suis-Organpräparate zu gewährleisten.

Das Schwein als Spendertier weist in seiner chemischen und biologischen Konstitution mit dem menschlichen Organismus zahlreiche Ähnlichkeiten auf, es entspricht also dem homöopathischen Simile.

Über die morphologische bzw. biologische Ähnlichkeit zwischen dem Organismus des Schweines und dem des Menschen wurde in den letzten Jahrzehnten wiederholt berichtet.
Einen Überblick über die Gemeinsamkeiten zwischen Schwein und Mensch gibt *Kirkman* (*Kirkman RL.*, 1989: Of swine and man: organ physiology in different species. In: Hardy MA (ed.): Xenograft 25. Elsevier, Amsterdam u.a.).

Ähnliche Merkmale von Schwein und Mensch (*nach Kirkman*, 1989)

1.	Größe
2.	Ernährungsgewohnheiten: Allesfresser
3.	Verdauungsphysiologie
4.	Nierenstruktur und -funktion
5.	Atemfrequenz und Atemvolumen
6.	Verlauf der Koronararterien
7.	Hämodynamik
8.	Neigung zum Fettansatz
9.	Krankheitsanfälligkeit
10.	Sozialverhalten

Aus homöopathischer Sicht kann damit ein vom Schwein gewonnenes und homöopathisch aufbereitetes Organpräparat als Simile zu den homologen menschlichen Organen angesehen werden, da trotz der Zugehörigkeit zu verschiedenen Spezies zahlreiche funktionale und strukturelle Ähnlichkeiten bestehen.
Reckeweg spricht deshalb den Organzubereitungen vom Schwein eine stärkere Wirkung zu als Präparaten, die vom Rind oder vom Schaf gewonnen wurden.

Anwendungsgebiete der Suis-Organpräparate
Die Suis-Organpräparate werden eingesetzt bei Erkrankungen der homologen humanen Organe. In der Stoffcharakteristik für nach HAB 2000 hergestellte Organpräparate, die von der für die Homöopathie zuständigen Aufbereitungskommission D am Bundesgesundheitsamt erarbeitet wurde, heißt es: „Organpräparate in homöopathischen Zubereitungen werden aus der Vorstellung heraus angewendet, dass bei einer Schwäche oder Störung des homologen Zielorgans im Menschen durch das entsprechende Organpräparat eine Unterstützung bewirkt wird“, und als Anwendungsgebiet wird dort genannt: „Unterstützende Behandlung bei einer Schwäche oder Störung des homologen Zielorgans im Menschen.“

Die Suis-Organpräparate sind besonders und vornehmlich bei zellulären Phasen, speziell bei chronischen Erkrankungen (Imprägnations-, Degenerations-, Dedifferenzierungsphasen) indiziert, können durchaus aber auch bei Phasen links des Biologischen Schnittes Anwendung finden, z.B. bei pathologisch gestörten Exkretionsphasen (Hyperhidrosis, Dysmenorrhoe, Obstipation, Ausscheidungsschwäche der Nieren u.a.).
Darauf hingewiesen sei, dass auch bei einer Vielzahl von Depositionsphasen, z.B. rheumatischen Erkrankungen, Myomen, Adipositas, Steinleiden usw. eine Therapie mit Suis-Organpräparaten angezeigt ist.

Hinweise zur Dosierung und zu den Applikationsarten der Suis-Organpräparate
Ein allgemeines Schema eines Therapieplanes zur Anwendung von Suis-Organpräparaten bei chronischen bzw. degenerativen Organschäden zeigt die folgende Darstellung.

Dauer ca.	Behandlung
3 - 4 Wochen	Vorbehandlung mit Entgiftungsmitteln (Hepeel N, Lymphomyosot N, Galium-Heel N, Engystol, Ubichinon compositum Ampullen, Coenzyme compositum Ampullen u.a.)
4 - 5 Wochen	1 bis 2 mal wöchentlich Verabreichung der Suis-Organpräparate (i.m., s.c., i.c., in Akupunkturpunkte, auch oral oder als Auto-Sanguis-Stufentherapie; zunächst Injeel-Form, nach 6 - 8 Injektionen Injeel forte-Form) zusammen mit individuell gewählten antihomotoxischen Arzneimitteln
3 - 4 Wochen	Absetzen der Suis-Organpräparate, nur die antihomotoxische Begleitmedikation wird weitergegeben. Falls nötig, zweite Injektionsserie mit Suis-Organpräparaten. Evtl. nach der klinischen Heilung Fortsetzung der Verabreichung der Organpräparate alle 2 - 3 Wochen

Nach der vierten bis fünften Woche der Verabreichung der Injeel-Form des Suis-Organpräparates wird versuchsweise – also gewissermaßen als Testampulle – die Injeel forte-Form i.m. bzw. s.c. verabfolgt, um festzustellen, inwieweit das betreffende Organ funktionsmäßig schon regeneriert ist bzw. ob sich die Heilung schon weitgehend durchgesetzt hat.

Bei schweren degenerativen Phasen sowie versuchsweise auch bei Dedifferenzierungsphasen müssen die Injektionen eventuell häufiger (alle 2 bis 3 Tage) verabfolgt und mit Präparaten, durch welche regressive Vikariationen provoziert und gefördert werden (Galium-Heel N, Engystol, Traumeel S), unterstützt werden, was zweckmäßig in Form von Mischspritzen erfolgt.

Auch Mischspritzen mit dem jeweils organtherapeutisch indizierten Biotherapeutikum sind oft zweckmäßig (z.B. mit Hepeel N).

Desgleichen ist es oft angezeigt, mehrere Suis-Organpräparate entweder in Form einer Mischspritze gleichzeitig oder im alternierenden Rhythmus einzusetzen.

Mit der i.v.-Injektion der Suis-Organpräparate soll man anfangs zurückhaltend sein und diese Applikationsart erst nach längerer Anwendung der i.m.-, s.c.- bzw. i.c.-Injektionen (siehe auch oben!) durchführen.

Bei vielen Fällen empfiehlt es sich, vor Anwendung des jeweils organtherapeutisch indizierten Suis-Organpräparates über 2 bis 3 Wochen das entsprechende ableitende (= kanalisierende), funktionsmäßig tiefer gelegene Suis-Organpräparat zu applizieren, also bei Leberschäden Vesica fellea suis vor Hepar suis, bei Nierenleiden Vesica urinaria suis und Ureter suis sowie Pyelon suis vor Ren suis usw.

Bei schweren Giftbelastungen ist vor Anwendung des spezifisch indizierten Suis-Organpräparates zweckmäßigerweise das die Ausscheidungsfunktion des Darmes regulierende Organpräparat Colon suis D10, D30, D200 (ein- bis zweimal wöchentlich i.m. oder s.c. über 2 bis 3 Wochen) einzusetzen.

Über die Anwendung der Suis-Organpräparate im Rahmen der Auto-Sanguis-Stufentherapie z.B. bei Therapieschäden, bei toxischen Leberschäden, bei Migräne, bei chronischen Ekzemen, bei Asthma bronchiale, bei Ulcus duodeni bzw. ventriculi, bei Arthrosen und bei Lymphatismus gibt Kapitel 6 Auskunft, wo auch über die Hyperimmunisierungstherapie mit Suis-Organpräparaten berichtet wird.

Anwendungseinschränkungen
Da durch die Suis-Organpräparate immunologische Mechanismen angeregt werden, ist bei Fällen von ausgeprägter Kachexie bzw. von Marasmus eine stimulative Wirkung der Suis-Organpräparate vielfach nicht mehr zu erwarten. Andererseits würde eine eventuell auftretende Herdreaktion beim Abbau geschädigter Zellen kachektische und marantische Patienten unter Umständen gefährden.

Handelsformen der Suis-Organpräparate
Die Suis-Organpräparate stehen in Ampullen zu 1,1 ml als Potenzenaccorde in zwei Stärkegraden zur parenteralen (und ggf. auch zur oralen – Trinkampullen; s. auch Punkt 4!) Organotherapie zur Verfügung, und zwar jeweils mit dem Potenzenaccord D10, D30, D200 und mit dem Potenzenaccord D8, D12, D30, D200 (= forte-Form).

Zusammensetzung
Aus Platzgründen ist nachfolgend eine vereinfachte Schreibweise gewählt worden. Die beiden Stärkegrade – jeweils mit Zusatz Injeel bzw. Injeel forte bezeichnet – haben grundsätzlich die gleichen oben genannten Werte.

Beispiel:

Arteria suis-Injeel	1,1 ml Injektionslösung enthalten: Arteria suis D10, Arteria suis D30, Arteria suis D200 jeweils 0,367 ml.
Arteria suis-Injeel forte	1,1 ml Injektionslösung enthalten: Arteria suis D8, Arteria suis D12, Arteria suis D30, Arteria suis D200 jeweils 0,275 ml.

Nach dem gleichen Schema sind alle Suis-Organpräparate aufgebaut. Die Rezeptierung erfolgt immer mit der Zusatzbezeichnung Injeel oder Injeel forte, um die Beschaffung über Apotheke und Großhandel zu beschleunigen.

Packungsgrößen
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Hinweise zur Erstattung
Bitte beachten Sie, dass einige Privatkrankenkassen bei der Erstattung von Suis-Organpräparaten Schwierigkeiten machen. Die Verordnung auf Kassenrezept ist bei der Beachtung der geltenden Vorschriften möglich.

Präparateliste Suis-Organpräparate

Arteria suis-Injeel
Arteria suis-Injeel forte
Bronchus suis-Injeel
Bronchus suis-Injeel forte
Cartilago suis-Injeel
Cartilago suis-Injeel forte
Cerebellum suis-Injeel
Cerebellum suis-Injeel forte
Cerebrum suis-Injeel
Cerebrum suis-Injeel forte
Cerebrum totalis suis-Injeel
Cerebrum totalis suis-Injeel forte
Colon suis-Injeel
Colon suis-Injeel forte
Cor suis-Injeel
Cor suis-Injeel forte
Corpus luteum suis-Injeel
Corpus pineale suis-Injeel
Corpus pineale suis-Injeel forte
Corpus vitreum suis-Injeel forte
Cutis suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel forte
Duodenum suis-Injeel
Embryo totalis suis-Injeel
Funiculus umbilicalis suis-Injeel
Funiculus umbilicalis suis-Injeel forte
Gingiva suis-Injeel

Glandula lymphatica suis-Injeel	Os suis-Injeel forte
~~Glandula lymphatica suis-Injeel forte~~	Ovarium suis-Injeel
Glandula parathyreoidea suis-Injeel	Ovarium suis-Injeel forte
Glandula suprarenalis suis-Injeel	Pankreas suis-Injeel
Glandula thymi suis-Injeel	Pankreas suis-Injeel forte
Glandula thyreoidea suis-Injeel	Placenta suis-Injeel
Hepar suis-Injeel	Placenta suis-Injeel forte
Hepar suis-Injeel forte	Prostata suis-Injeel
Hypophysis suis-Injeel	Prostata suis-Injeel forte
Hypophysis suis-Injeel forte	Pulmo suis-Injeel
Hypothalamus suis-Injeel	Pulmo suis-Injeel forte
Hypothalamus suis-Injeel forte	Pulpa dentis suis-Injeel
Larynx suis-Injeel forte	Pyelon suis-Injeel
Mamma suis-Injeel	Ren suis-Injeel
~~Mamma suis-Injeel forte~~	Ren suis-Injeel forte
Medulla oblongata suis-Injeel	Retina suis-Injeel
~~Medulla oblongata suis-Injeel forte~~	Retina suis-Injeel forte
Medulla ossis suis-Injeel	Splen suis-Injeel
Medulla ossis suis-Injeel forte	Sympathicus suis-Injeel
Medulla spinalis suis-Injeel	Testis suis-Injeel
Medulla spinalis suis-Injeel forte	Testis suis-Injeel forte
Mucosa nasalis suis-Injeel	Tonsilla suis-Injeel
~~Mucosa nasalis suis-Injeel forte~~	Tuba Eustachii suis-Injeel forte
Musculus suis-Injeel	Ureter suis-Injeel
Musculus suis-Injeel forte	Urethra suis-Injeel
Nervus opticus suis-Injeel	Uterus suis-Injeel
~~Nervus opticus suis-Injeel forte~~	Vena suis-Injeel
Oculus totalis suis-Injeel	~~Vena suis-Injeel forte~~
Oculus totalis suis-Injeel forte	Vesica fellea suis-Injeel
~~Os petrosum suis-Injeel forte~~	Vesica urinaria suis-Injeel
Os suis-Injeel	Vesica urinaria suis-Injeel forte

5 Biotherapeutika-Antihomotoxika, ihr stofflicher Aufbau und ihre medizinisch-therapeutische Wirkungsweise

5.1 Der Unterschied der Biotherapeutika-Antihomotoxika zu klassischen Homöopathika

Während der klassisch therapierende, homöopathische Arzt ausschließlich mit so genannten Einzelmitteln therapiert, deren Inhaltsstoffe nach den festgelegten Herstellungsregeln des homöopathischen Arzneibuches potenziert werden und deren Anwendung nach Anamnese und anschließender Repertorisation gemäß der Simile-Regel erfolgt, werden Biotherapeutika-Antihomotoxika vom antihomotoxisch therapierenden Arzt in der Regel indikationsmäßig eingesetzt. Die Biotherapeutika-Antihomotoxika bestehen meist aus Kombinationen homöopathischer Stoffe und sind nach der Legaldefinition der EU-Richtlinie 92/73 EC homöopathische Arzneimittel, die ausschließlich nach den Vorschriften des amtlichen deutschen Homöopathischen Arzneibuches (HAB 2000) hergestellt werden.

Im Gegensatz zu den klassischen homöopathischen Einzelmitteln kommt es beim therapeutischen Einsatz der Biotherapeutika-Antihomotoxika wesentlich darauf an, dass diese Arzneimittel entsprechend den Maßgaben der Homotoxikologie nach Reckeweg eingesetzt werden. Dies bedeutet im Einzelnen, dass der Arzt zunächst die Phase, in der sich die Krankheit des zu behandelnden Patienten gemäß der Sechs-Phasen-Tabelle nach Reckeweg zurzeit befindet, bestimmt.

Wegen des phasenhaften Verlaufs von Krankheiten muss der Arzt sein Augenmerk auf so genannte Vikariationseffekte, darunter versteht man den Wechsel einer Krankheit von einer Phase in eine andere, richten. Therapeutisches Ziel ist die Rückführung der Krankheit aus einer Phase rechts des Biologischen Schnittes (Phasen 4 bis 6) in eine Phase links des Biologischen Schnittes (Phasen 1 bis 3). Dazu muss in jedem Falle die Ausleitung von Homotoxinen mit den entsprechenden Biotherapeutika-Antihomotoxika in Gang gesetzt werden.

Wegen der hohen Komplexität von Krankheiten, besonders wenn diese chronifiziert sind, kommt es für den Erfolg der antihomotoxischen Therapie entscheidend darauf an, die Biotherapeutika-Antihomotoxika „phasen-gerecht“ einzusetzen. Dabei kann als Daumenregel gelten, dass insbesondere die so genannten Compositum-Präparate bei den Krankheiten in den so genannten Matrixphasen 3 und 4 sowie in der Degenerations- und Dedifferenzierungsphase indiziert sind. Dies im Wesentlichen aus dem Grund, weil neben den spezifischen klassischen homöopathischen Wirkstoffen weitere antihomotoxische Wirkstoffe wie potenzierte Suis-Organauszüge, Katalysatoren, Nosoden und in einigen Fällen auch die so genannten Homöopathisierten Allopathika in diesen Präparaten enthalten sind. Wie sich nämlich in der Praxis gezeigt hat, können klassische homöopathische, gut gewählte Simile eine Krankheit, die sich in den zellulären Phasen 4 oder 5 befindet, oft nicht in eine regressive Vikariation überführen, wenn nicht dafür Sorge getragen wird, dass z.B. bestimmte Enzymdeffekte oder Blockaden auf der zellulären Ebene vorher durch richtig gewählte antihomotoxische Wirkstoffe wie Katalysatoren, Suis-Organbestandteile, Nosoden und homöopathisierte Allopathika aufgehoben werden. Erst nach Aufhebung der Blockaden tritt die Wirkung des angezeigten Similes ein. Denn das homöopathische Einzelmittel setzt ein noch zumindest teilweise auf stimulative Reize antwortendes Terrain voraus. Reaktionsblockaden müssen mit anderen Strategien aufgebrochen werden wie z.B. der antihomotoxischen Ausleitung, der Auto-Sanguis-Stufenkur, der Neuraltherapie und der Diätetik.

Zur Erreichung der „regressiven“ Vikariation sind demnach gut gewählte Einzelmittel + Injeele/forte aus dem Bereich der Katalysatoren, Nosoden und Suis-Organe oder entsprechende Kombinationen, besonders die so genannten Compositum-Präparate geeignet. Wenn jedoch ein regressiver Vikariationseffekt eingetreten ist und sich die

Zweit- oder Drittkrankheit (Stellvertreterkrankheit) z.B. in die Phase 2 zurückentwickelt hat, dann sind auch klassische Einzelmittel oder die üblichen Spezialitäten der Biotherapeutika-Antihomotoxika, welche lediglich Kombinationen klassischer Einzelbestandteile enthalten, erfolgreich anwendbar.

Für die zielführende Anwendung der Biotherapeutika-Antihomotoxika ist aus dem oben Gesagten Folgendes festzuhalten:

- die Festlegung der Phase, in der sich die Krankheit befindet
- die Erfassung von Vikariationseffekten
- die Ausleitung von Homotoxinen und
- die antihomotoxische oder homöopathische Behandlung der nach der Vikariation entstandenen Krankheit in der Ausleitungsphase.

Das Arzneimittelbild der Homöopathie kann durch Kombination mehrerer Arzneimittelbilder, wie es z.B. in den antihomotoxischen Compositum-Präparaten gegeben ist, schärfer individuell eingestellt werden. Die Antihomotoxika eignen sich gleichzeitig zum indikationsbezogenen Einsatz.

5.2 Die Behandlung von Krankheiten rechts des Biologischen Schnittes mit Biotherapeutika-Antihomotoxika

Den so genannten zellulären Phasen rechts des Biologischen Schnittes sind folgende Eigenschaften gemeinsam:

- sie haben eine längere Entwicklungszeit hinter sich, d.h. die Erkrankungen weisen Chronizität auf;
- als Folge der Chronizität sind in der Regel intrazelluläre, strukturelle Schäden an Organellen der Zelle eingetreten;
- die strukturellen Schäden sind häufig auf Blockaden von physiologischen metabolischen Prozessketten zurückzuführen (Enzymblockaden);
- die Matrix ist in ihrer Funktion durch Ablagerung von Stoffwechselmetaboliten (= Homotoxinen) und durch die häufig begleitende Azidose in ihrer Funktionalität stark verändert;
- die Veränderung der Matrix hat wiederum Auswirkungen auf die immunologischen Reaktionen innerhalb der Matrix (immuntoxische und paradox verlaufende Reaktionen);
- dadurch bedingt ist die ordnungsgemäße Versorgung von angrenzenden Parenchymzellen mit den über die Blutkapillaren herangebrachten Nährstoffen stark verändert oder eingeschränkt (Störung der Transitstreckenfunktion der Matrix).

Mit der Veränderung der Matrix und der physiologischen Reaktionsweise der Matrix wird gleichzeitig der Abtransport von Schadstoffen und Metaboliten behindert mit der Folge der Rückgiftwirkung dieser Abfallstoffe (Homotoxine) auf die zu entsorgenden Organparenchymzellen.

Aus diesen oben genannten Veränderungen insbesondere in der Matrix ergibt sich bei Erkrankungen rechts des Biologischen Schnittes zwanglos die allgemeine antihomotoxische Strategie zur Behebung dieser Schäden durch:

- Drosselung der weiteren Schadstoffzufuhr z.B. durch Kostumstellung (Diät),
- Deblockade von Enzymsystemen besonders in den stoffwechselaktiven Organen wie Leber und Niere sowie Intestinaltrakt und Lunge mit Hilfe der Katalysatoren-Präparate,
- Beseitigung der Gewebsazidose, z.B. durch alkalische Kost,
- Drainage der Matrix über die verschiedenen Entgiftungstechniken wie Lymphdrainage, physikalische Therapie (Sauna), Gabe von homöopathischen Lymphmitteln (z.B. Lymphomyosot N),
- therapeutische Restitution von geschädigten intrazellulären Strukturen mittels geeigneter Biotherapeutika-Antihomotoxika (z.B. Suis-Organpräparate).

Bei der Drainage der Matrix empfiehlt sich neben der Gabe von Lymphmitteln die Gabe von Nosoden, da die Nosode als Isotherapeutikum einen hochspezifischen Reiz zur Veränderung der Giftlage bewirkt. Nosoden sind bekanntlich Therapeutika des Terrains und haben die Eigenschaft, den Körper spezifisch an die „ähnliche“ oder vergleichbare toxische Gesamtsituation der durch die Nosoden repräsentierten Erkrankungen zu „erinnern“.

Darüber hinaus kann es zur Behandlung einer Rückgiftwirkung durch häufige Einnahme von stark wirksamen allopathischen Substanzen erforderlich sein, das jeweilige homöopathisierte Allopathikum quasi als „Arzneimittel-Nosode“ dem kranken Organismus anzubieten. Durch die Homöopathisierung des Allopathikums, im Allgemeinen gilt dies etwa ab der D6-Potenz, wird eine Umkehrung der Giftwirkung dieses Allopathikums induziert. Für diese Umkehrwirkung liefern die Arndt-Schulz'sche Regel bzw. der Hormesis-Effekt eine schlüssige wissenschaftliche Erklärung.

Die Deblockade von Enzymen oder Stoffwechselketten wird sehr wirkungsvoll durch die Gabe von antihomotoxischen Katalysatoren-Präparaten wie Coenzyme compositum im Wechsel mit Ubichinon compositum erreicht. Beide Präparate enthalten eine sinnvolle Kombination wichtiger Vitamine und Coenzyme sowie Zwischenprodukte der energieliefernden Stoffwechselzyklen in homöopathischer Potenzierung ab D6. Nach Schmid (1) greifen diese Präparate auf der molekularen Ebene an den Mitochondrien an und helfen dem Organismus, die energieliefernden intrazellulären Prozesse wieder einzuregulieren. Dabei sind die Potenzen in der Größenordnung von D6 bis D10 substitutiv und können metabolische Entgleisungen in den energieliefernden Zyklen durch Substitution wieder in Gang setzen.

Da jede schwere Erkrankung, die keine Selbstheilungstendenz mehr aufweist, gekoppelt ist mit Entgleisungen auf der Ebene der energieliefernden Prozesse, ist deshalb eine begleitende, eventuell intermittierende Gabe dieser Präparate in allen Fällen angezeigt, was in der therapeutischen Praxis sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin immer wieder erfolgreich bestätigt werden konnte.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass die Katalysatoren, Mineralien und Spurenelemente enthaltenden Compositum-Präparate bei allen mit Energiedefiziten verbundenen, chronischen Erkrankungen angezeigt sind wie z.B. dem Chronic Fatigue-Syndrome oder bei altersbedingten Verschleißkrankheiten.

5.3 Das Vikariationsphänomen

Durch die Einführung des Vikariationsprinzips in die antihomotoxische Therapie hat Reckeweg auf die Dynamik jedes Krankheits- bzw. Gesundungsprozesses aufmerksam gemacht. Die Wechselbeziehungen, die zwischen einem Biosystem und den schädigenden Homotoxinen bestehen, ändern sich während einer Erkrankung und bei dem Gesundungsprozess ständig. Die zielgerichteten selbstregulatorischen Kräfte des Organismus bleiben in der Regel bei Erkrankungen bis einschließlich der 3. Phase der 6-Phasen-Tabelle der Homotoxikosen noch erhalten. Dagegen sind nach Überschreitung des Biologischen Schnittes ab Phase 4 die Selbstregulation und eine Heilung aus eigener Kraft für den Organismus praktisch nicht mehr möglich. In diesem Falle muss deshalb therapeutisch-medizinisch eingegriffen werden, um doch noch eine Gesundung zu erzielen.

Da die Rückführung einer Krankheit nach einer „regressiven“ Vikariation meist in die Phasen 3 oder 2 einmündet, treten nach der Rückführung von zellulären Erkrankungen rechts des Biologischen Schnittes häufig Entzündungsphasen auf. Dadurch wird in der Regel auch ein Wechsel des antihomotoxischen Therapeutikums erforderlich, da in der Phase 2 das symptomatisch angezeigte Akutmittel angezeigt ist.

In den Phasen 2 und 3, die zu den so genannten humoralen Phasen nach Reckeweg gehören, ist die Selbstregelungskapazität des Organismus – wie gesagt – noch vorhanden, so dass es lediglich stimulativer Arzneireize bedarf, um insbesondere in der Matrix Entzündungsmechanismen in Gang zu setzen und in kontrollierter Weise ablaufen zu lassen. Dabei tritt meist die Ausleitung der Krankheit über die Haut oder die Schleimhäute auf. Vermehrtes Schwitzen, Auswurf, kräftige Harnbildung, leichte Diarrhöe und Fieber sind begrüßenswerte Anzeichen einer Verschiebung aus den zellulären Krankheitsphasen

4 bis 6 und Zeichen einer regressiven Vikariation und Besserung des Grundleidens. In den Akutphasen 1 und 2 sind Compositum-Präparate der vorher beschriebenen Art im Grunde nicht mehr erforderlich, sondern es sind Akutpräparate wie z.B. Traumeel S oder gut gewählte Homaccord-Präparate oder Einzelmittel-Injeele die Mittel der Wahl.

5.4 Die Wirkung der Homaccorde und Injeele

Homaccorde und Injeele oder Misch-Injeele sind Präparate, die einen oder mehrere homöopathische Wirkstoffe in jeweils mehreren Potenzstufen enthalten. Dabei ist in der Regel eine Tiefpotenz mit einer mittleren Potenz und einer Hochpotenz kombiniert. Hintergrund dieser Potenzenkombination, genannt Potenzenaccord, ist die bereits seit fast 100 Jahren bestehende therapeutische Erfahrung, dass die gleichzeitige Gabe von niedriger, mittlerer und hoher Potenz eine Verminderung der Erstverschlimmerung bewirkt. Bekanntlich treten Erstverschlimmerungen besonders häufig bei der Gabe von einzeln gegebenen Hochpotenzen auf.

Mit der Gabe eines Potenzenaccordes wird der Organismus auf mehreren hierarchischen Ebenen angesprochen, nämlich auf der organotropen Ebene durch die Tiefpotenz, auf der funktiotropen Ebene durch die mittlere Potenz und auf der „informativen“ oder „geistigen“ Ebene mit Hilfe der Hochpotenz. Da insbesondere im Verlaufe von regressiven Vikariationen chronischer oder schwerer Erkrankungen aus den Phasen 4, 5 oder gar 6 erhebliche funktionale und informative neben den makroskopisch fassbaren organisch-strukturellen Fehlern auftreten, sind solche Potenzenaccord-Präparate wegen der darin enthaltenen Hochpotenz auch zur Ausleitung zellulärer Erkrankungen geeignet.

5.5 Erkrankungen in der humoralen Phase (Phase 1 bis 3 der 6-Phasen -Tabelle) und ihre antihomotoxische Behandlung

Die Behandlung von Krankheiten der humoralen Phase (1 bis 3) kann mit relativ „unspezifischen“ homöopathischen Substanzen erfolgen. Unspezifisch soll hier heißen, dass der Angriffspunkt des Präparates sich nicht auf ein bestimmtes, z.B. degenerativ geschädigtes Organ konzentriert, sondern dass es eine Wirkung auf den gesamten Organismus ausübt und insbesondere über das Blut und das Lymphsystem einwirkt.

Dabei hat sich in der Praxis herausgestellt, dass solche Erkrankungen der humoralen Phase insbesondere der Depositionsphase (Phase 3) sehr wirksam durch eine so genannte Auto-Sanguis-Stufenkur, d.h. eine Eigenblut-Nosode in Kombination mit Spezialitäten bzw. Reaktionstherapeutika, zu behandeln sind. Typische Vertreter dieser Präparate sind beispielsweise die unspezifisch stimulierenden Präparate bei allen Infektionserkrankungen wie z.B. Gripp-Heel, Engystol oder auch Traumeel S. Die Wirkung dieser Präparate wird durch die Auto-Sanguis-Stufenkur in sehr effizienter Weise verstärkt, weil durch diese Eigenblutnosode ein zusätzlicher immunologischer Reiz besonders auf die Matrix ausgeübt wird.

Auch die so genannten Einzelmittel-Injeele der klassischen homöopathischen Substanzen gehören in die Behandlung von Erkrankungen der humoralen Phase, wobei bei diesen die Kombinationen von tiefen und hohen Potenzen den Vorteil haben, dass sie eine recht schonende und meist ohne Erstverschlimmerung verlaufende therapeutische Wirksamkeit haben.

Bei allen Erkrankungen der humoralen Phase ist davon auszugehen, dass die intrazellulären Strukturen noch intakt sind und Enzymblockaden oder zelluläre Strukturdefekte noch nicht aufgetreten sind. Aus diesem Grunde kann der Organismus hier direkt durch das homöopathische Simile im gegengiftspezifischen Sinne angeregt und dieser Effekt ggf. durch die Eigenblut-Nosode noch verstärkt werden. Das homöopathische Arzneimittelbild wird bekanntlich am gesunden Probanden bestimmt, der keine zelluläre Erkrankung hat.

Die 3. Phase, die so genannte Depositionsphase, wird noch zu den humoralen Phasen gerechnet, da das Homotoxin hier lediglich in der Matrix abgekapselt wird und quasi wie auf einer Mülldeponie aus dem Verkehr gezogen wird. Diese Phase tritt immer dann ein, wenn Homotoxine vom Körper nicht mehr in der Inflammationsphase 2 abgebaut werden können.

Bei der Depositionsphase werden die Homotoxine kondensiert abgelagert, jedoch meist ohne strukturelle Änderungen der Matrix bzw. funktionelle Beeinträchtigungen größeren Ausmaßes in ihr zu verursachen. Solange die physiologischen Filter- und Schutzfunktionen durch die Matrix noch wahrgenommen werden können, ist die reguläre Versorgung der umgebenden Parenchymzellen und Gewebe gewährleistet. Dramatisch ändert sich die Situation erst bei der Überschreitung des Biologischen Schnittes, wenn durch immer mehr deponierte, kondensierte Homotoxine die Eigenstruktur der Matrix so belastet wird, dass sie ihre Filter- und Schutzfunktion im Rahmen der Versorgungsleistungen nicht mehr wahrnehmen kann und die Homotoxine in die zu versorgenden Gewebezellen einwandern und dort zelluläre, d.h. strukturelle Veränderungen an Zellorganellen wie z.B. Mitochondrien oder Nukleus bewirken.

5.6 Die Applikationsarten von Biotherapeutika-Antihomotoxika

Biotherapeutika-Antihomotoxika können oral, parenteral oder lokal/extern angewendet werden. Dabei empfiehlt sich insbesondere bei gut zu lokalisierenden Beschwerden eine Kombination von oralen mit lokalen Maßnahmen, z.B. bei Verletzungsfolgen oder Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Darüber hinaus ist eine segmentale parenterale Behandlung von bestimmten Körperarealen mittels subkutaner oder intrakutaner Quaddelung oder Infiltration ein häufig praktiziertes Vorgehen bei der Behandlung schmerzhafter Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die am meisten verbreitete Applikationsart ist – wie allgemein bei homöopathischen Präparaten – die systemische orale Applikation mittels Tabletten oder Tropfen bzw. bei Kindern auch die Anwendung von Suppositorien.

Im Einzelfall können Injektabilia anstelle einer parenteralen Applikation auch im Rahmen einer oralen Trinkampullen-Medikation verabfolgt werden. Diese Anwendung empfiehlt sich insbesondere, wenn alkoholische Tropfen nicht zur Anwendung gelangen sollen wie bei Kleinkindern oder alkoholgefährdeten Patienten.

Die Anwendung von Injektabilia ist sehr vielgestaltig. Sie umfasst die intravenöse, die intramuskuläre, subkutane und intrakutane Applikation oder Quaddelung, aber auch die segmentale, die periartikuläre sowie – in einzelnen Fällen – auch die intraartikuläre Anwendung. Die parenterale Applikation empfiehlt sich als periartikuläre oder subkutane Injektion besonders bei Gelenkbeschwerden und gut lokalisierbaren Schmerzen. Durch Infiltration von Biotherapeutika-Antihomotoxika in Kombination mit neuraltherapeutischen Substanzen wie Procain oder Xylocain kann sehr rasch und komplikationslos Beschwerdefreiheit erreicht werden. Und schließlich ist die Applikation an Akupunkturpunkte eine sehr wirkungsvolle Applikationsart für Biotherapeutika-Antihomotoxika (Homöosiniatrische Anwendung (6, 7, 9)).

5.7 Literatur

(1) Schmid F., Antihomotoxische Medizin, Band I: Grundlagen, Klinik, Praxis; Aurelia-Verlag, Baden-Baden, 1. Aufl., 1996

(2) Reinhart E., Suis-Organ-Präparate in der Homotoxikologie; Aurelia-Verlag, Baden-Baden, 1. Aufl., 1994

(3) Heine H., Lehrbuch der biologischen Medizin – Grundlagen und Systematik; Hippokrates Verlag, Stuttgart, 2. Aufl., 1997

(4) Luckey T.D., Hormology with Inorganic Compounds. In: Luckey T.D., Vleingopal B., Hutcheson D., editors. Heavy metal - toxicity, safety and hormology. Stuttgart, New York, San Francisco, London, Georg-Thieme-Verlag, 1975; 81-103

(5) Calabrese E. J., Biological Effects of Low Lever Exposures to Chemicals and Radiation; Lewis Publishers, Inc., Michigan, 1991

(6) Skribot E.W., Anwendung von Homöopathika in die homöosiniatrischen Akupunkturpunkte; Biologische Medizin, Band 9, Heft 2, 1980; 51-63

(7) Ebert H., Homöosiniatrie, Haug-Verlag, Heidelberg, 1992

(8) De la Fuye R., Schmidt, H.; Die moderne Akupunktur; Hippokrates-Verlag, Stuttgart, 1952

(9) Frase, W., Behandlung von Schmerzzuständen an Gelenken mit Antihomotoxika, EHK 2/2000; 93–97

6 Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg

6.1 Zusammenfassung

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg stellt eine Sonderform der Eigenblutbehandlung dar. Sie wurde auf der Grundlage der Homöopathie in Verbindung mit der Reckeweg'schen Homotoxinlehre entwickelt und hat sich bei den verschiedensten chronischen bzw. degenerativen Erkrankungen wie z.B. Asthma bronchiale, Ekzeme, Leberschäden und vielen anderen mehr in der Praxis hervorragend bewährt.

Durch Entnahme von Patientenblut, dessen homöopathische Potenzierung über mehrere Stufen und anschließende Re-Injektion können nach Reckeweg genau diese Krankheitsgifte in ein homöopathisch wirksames Reiztherapeutikum verwandelt werden, welches nach dem Arndt-Schulz'schen-Gesetz im Sinne einer Umkehrwirkung die körpereigenen Abwehrkräfte zu verstärkter Entgiftung anregt und dadurch die Heilung der Krankheit fördert.

Die Kombination mit anderen Eigenbluttherapien wie UVA/B/E, Ozontherapie oder HOT ist ebenfalls möglich und außerordentlich erfolgreich. Man verwendet für die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie einen bei diesen genannten Methoden immer übrigbleibenden Blutstropfen zur weiteren Potenzierung. Es wird nicht empfohlen, die homöopathischen Präparate mit UV-Licht zu bestrahlen oder mit Ozon zu versetzen, da nicht bekannt ist, ob dadurch die homöopathische Information verändert wird.

Die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie wird heute nach folgenden Regeln durchgeführt:

1. Stufe	Symptomatisches Mittel (z.B. Traumeel S, Belladonna-Homaccord, Apis-Homaccord, Engystol)
2. Stufe	Drainagemittel (Terrainmittel, z.B. Lymphomyosot N, Galium-Heel N)
3. Stufe	Organpräparat (z.B. Suis-Organpräparate, geeignete Composita wie Hepar comp. Heel, Mucosa compositum)
4. Stufe	Nosode (z.B. Echinacea compositum SN, Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, oder homöopathisiertes Allopathikum wie Penicillin-Injeel, Cortison-Injeel)

Die Auto-Sanguis-Stufenkur (1. bis 4. Stufe) wird jeweils in einer einzigen Sitzung zur Durchführung gebracht.

Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzungen sollten in der Regel mindestens 4 bis 5 Tage betragen, da die zu erwartende Reaktion des Organismus aus biologischen Gründen diesen Zeitraum benötigt.

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg mit Biotherapeutika-Antihomotoxika hat sich u.a. zur Behandlung folgender Krankheitsbilder in der Praxis besonders bewährt:

1.	Therapieschäden durch Arzneimittel
2.	Rezidivierende Virusinfekte
3.	Präkanzerosen
4.	Toxische Leberschädigungen
5.	Migräne
6.	Chronische Ekzeme
7.	Asthma bronchiale
8.	Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi
9.	Arthrosen
10.	Lymphatische Diathese/Lymphatismus.

Selbstverständlich muss die Auswahl der zu verabreichenden Präparate stets individuell dem Krankheitsbild und der Reaktionslage des Patienten angepasst werden.

Am Beispiel von 10 Krankheitsbildern werden anhand einiger bewährter Therapieschemata auch die wichtigsten Präparate aufgezeigt, wobei zum Teil auch Nosoden-Präparate mit einbezogen sind, die allerdings immer in der letzten Stufen appliziert und nicht potenziert werden sollten.

Sobald es gelungen ist, durch die Auto-Sanguis-Stufentherapie das chronische Stadium der jeweiligen Krankheit zu durchbrechen, braucht in vielen Fällen nur noch oral weiterbehandelt zu werden.

6.2 Einführung und theoretische Hinweise

Aus der Medizingeschichte gibt es Hinweise, dass die Wirksamkeit der Eigenblutbehandlung dadurch bemerkt wurde, dass nach stumpfen Traumen mit Hämatombildung auch andere Erkrankungen im Rahmen der Hämatomresorption verschwunden waren. Dies hat dazu geführt, dass in den Anfängen der Eigenbluttherapie (Autohämotherapie) dem Patienten eine kleine Menge Blut abgenommen und sofort wieder intramuskulär injiziert wurde. Damit wurde auf künstliche Weise ein Hämatom geschaffen. Man stellte sich vor, dass durch die Injektion des Eigenblutes Abwehrkräfte freigesetzt würden, die sich gegen die „krankmachenden Kräfte des Blutes“ wendeten. In der Folgezeit wurde die Eigenbluttherapie auf verschiedenste Weise modifiziert und vervollkommnet, wobei die ursprüngliche Eigenbluttherapie – als Reizkörpertherapie, als Umstimmungstherapie, als unspezifische Reiztherapie bzw. als unspezifische Stimulationstherapie – in der Praxis in vielen Einzelfällen wie z.B. der Akne mit guten Erfolgen Anwendung findet.

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg stellt eine Sonderform der Eigenblutbehandlung dar. Sie wurde auf der Grundlage der Homöopathie in Verbindung mit der Reckeweg'schen Homotoxinlehre entwickelt und hat sich bei den verschiedensten chronischen bzw. degenerativen Erkrankungen wie z.B. Asthma bronchiale, Ekzeme, Leberschäden und vielen anderen mehr in der Praxis hervorragend bewährt (siehe auch „Bewährte Indikationen“).

Nach der Homotoxinlehre Reckeweg's werden praktisch fast alle Krankheiten entweder als Abwehrreaktionen des Organismus gegen Gifte oder als Ausdruck von Giftschädigungen definiert. Daraus folgt, dass im Blut eines jeden Patienten die für seine Erkrankung typischen Krankheitsgifte (Homotoxine) wiederzufinden sind.

Durch Entnahme von Patientenblut, dessen homöopathische Potenzierung über mehrere Stufen und anschließende Re-Injektion können nach Reckeweg genau diese Krankheitsgifte in ein homöopathisch wirksames Reiztherapeutikum verwandelt werden, welches nach dem Arndt-Schulz'schen-Gesetz im Sinne einer Umkehrwirkung die körpereigenen Abwehrkräfte zu verstärkter Entgiftung anregt und dadurch die Heilung der Krankheit fördert.

Durch Zugabe geeigneter homöopathischer Injektionspräparate wird die Wirkung des potenzierten Eigenblutes nach dem Bürgischen Prinzip noch zusätzlich verstärkt. Es hat sich daher als zweckmäßig erwiesen, im Rahmen der Auto-Sanguis-Stufentherapie die für den jeweiligen Krankheitsfall indizierten homöopathischen Ampullenpräparate zum Potenzieren des Patientenblutes zu verwenden.

Insgesamt soll mit der Auto-Sanguis-Stufentherapie eine Gegenwirkung gegen exogene und endogene Homotoxine (z.B. auch gegen toxische Abbauprodukte körpereigener Zellen) erreicht werden, welche die naturgerechte Heilung chronischer Krankheiten fördert.

Daneben werden weitere Wirkungsmechanismen diskutiert, insbesondere ein homöopathischer Umkehreffekt gegen Autoantikörper sowie gegen Antigen-Antikörper-Reaktionen durch das in steigenden Verdünnungen mitinjizierte Komplement aus dem körpereigenen Blut (so genannter Komplement-Umkehr-Effekt; in der 4. Stufe besteht eine Potenzierung des Blutes, die etwa einer C4 entspricht!).

Hierdurch fänden auch die häufig zu beobachtenden günstigen Wirkungen der Auto-Sanguis-Stufentherapie – im Sinne einer Desallergisierung/Desensibilisierung/Hyposensibilisierung – auf Autoaggressionskrankheiten eine Erklärung. Man muss allerdings hierzu sagen, dass es zurzeit keinerlei größere wissenschaftliche Untersuchungen hierüber gibt. Es handelt sich hierbei um hypothetische Überlegungen, die aus den positiven Beobachtungen in der täglichen Praxis resultieren.

6.3 Praktische Hinweise zur Durchführung

Die Auto-Sanguis-Stufenkur (1. bis 4. Stufe) wird jeweils in einer einzigen Sitzung zur Durchführung gebracht.

Das für die Herstellung der verschiedenen Eigenblutpotenzstufen benötigte Blut kann wie bei einer üblichen Blutabnahme durch Punktion einer Vene und anschließender Aspiration gewonnen werden. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, nach Durchführung einer intravenösen Injektion dieselbe Spritze mit den darin noch enthaltenen Blutresten für die Herstellung der benötigten Eigenblutverdünnungsstufen zu verwenden. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Spritze anschließend vollständig ausgespritzt wird, so dass nur im Konus noch winzige Mengen Blut, eventuell vermischt mit Resten der vorher applizierten Injektionslösung, verbleiben.

Anmerkung
Falls eine Venenpunktion aus technischen oder aus sonstigen Gründen bei der Durchführung der Auto-Sanguis-Stufenkur nicht möglich ist, kann der benötigte Blutstropfen auch mittels Schnepper aus der Fingerbeere oder aus dem Ohrläppchen entnommen werden. Mit dieser Methode braucht dann selbstverständlich auch die erste Stufe nicht intravenös appliziert werden. Vielmehr kann bei dieser „Schnepper-Methode" die Applikation der ersten Stufe bei der Durchführung der Auto-Sanguis-Stufenkur mittels intramuskulärer bzw. subkutaner oder intrakutaner Injektion erfolgen bzw. segmental unter neuraltherapeutischen Gesichtspunkten.

Die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie wird heute nach folgenden Regeln durchgeführt:

1. Stufe	Symptomatisches Mittel (z.B. Traumeel S, Belladonna-Homaccord, Apis-Homaccord, Engystol)
2. Stufe	Drainagemittel (Terrainmittel, z.B. Lymphomyosot N, Galium-Heel N)
3. Stufe	Organpräparat (z.B. Suis-Organpräparate, geeignete Composita wie Hepar comp. Heel, Mucosa compositum)
4. Stufe	Nosode (z.B. Echinacea compositum SN, Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, oder homöopathisiertes Allopathikum wie Penicillin-Injeel, Cortison-Injeel)

Alle vier Stufen werden grundsätzlich in einer Sitzung durchgeführt. Die Applikation der 1. Stufe wurde bereits oben dargestellt. Nachdem die erste Stufe appliziert und die Spritze so gut wie möglich ausgespritzt wurde, so dass sich im Konus der Spritze nur noch Spuren der Injektionsflüssigkeit der 1. Stufe befinden, wird mit derselben Spritze das Präparat der 2. Stufe aufgezogen. Dabei wird ein Schüttelraum in der Spritze freigelassen und 10mal kräftig durchgeschüttelt. Die so erhaltene 2. Stufe wird dann intramuskulär oder subkutan, eventuell segmental oder auch in Akupunkturpunkte, Schmerzpunkte usw. gespritzt. Die 3. Stufe erhält man, indem man mit derselben Spritze nun das Organpräparat aufzieht, einen Schüttelraum freilässt und wiederum 10mal kräftig im homöopathischen Sinne verschüttelt. Diese 3. Stufe kann dann wie die 2. Stufe i.m., s.c. oder i.c. gespritzt werden. Die 4. Stufe wird dann in gleicher Weise wie die vorigen Stufen mit Nosodenpräparaten oder homöopathisierten Allopathika zubereitet. Wichtig ist dabei zu beachten, dass alle Stufen mit ein und derselben Spritze zubereitet werden. Nur so ist es gewährleistet, dass der Tropfen Blut, der anfänglich im Rahmen der Applikation der 1. Stufe gewonnen wird, auch stufenweise hochpotenziert wird.

Wiederholung
Zu Beginn der Kur sollten Injeele in der forte-Form noch nicht eingespritzt werden. Diese können jedoch nach ca. 2 bis 3 Wochen zum Einsatz kommen, sofern bei den einfachen Injeelen keinerlei überschießende Reaktionen aufgetreten sind (so genannte Heilkrisen).

Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzungen sollten in der Regel mindestens 4 bis 5 Tage betragen, da die zu erwartende Reaktion des Organismus aus biologischen Gründen diesen Zeitraum benötigt. Sofern irgendwelche Erstverschlimmerungen aufgetreten sind, müssen diese *v o r* erneuter Durchführung abgeklungen sein.

Eine Wiederholung der Auto-Sanguis-Stufenkur in kürzeren Abständen als oben angegeben, z.B. alle 3 Tage oder öfter, sollte besonderen Fällen vorbehalten bleiben und nur bei entsprechender Erfahrung mit dieser Therapiemethode durchgeführt werden.
Die Kombination mit anderen Eigenbluttherapien wie UVA/B/E, Ozontherapie oder HOT ist ebenfalls möglich und außerordentlich erfolgreich. Man verwendet für die Durchführung der Auto-Sanguis-Stufentherapie einen bei diesen genannten Methoden immer übrigbleibenden Blutstropfen zur weiteren Potenzierung. Es wird nicht empfohlen, die homöopathischen Präparate mit UV-Licht zu bestrahlen oder mit Ozon zu versetzen, da nicht bekannt ist, ob dadurch die homöopathische Information verändert wird.

6.4 Hyperimmunisierung nach Reckeweg

Bei fehlenden, zu schwachen oder zu schnell nachlassenden Reaktionen auf die Auto-Sanguis-Stufentherapie sollte die Hyperimmunisierung nach Reckeweg zwischengeschaltet werden. Diese Behandlung spricht die Ausscheidungsorgane an und stimuliert diese in ihrer Funktionsfähigkeit. Dies ist erforderlich, da bei der Auto-Sanguis-Stufentherapie eben diese Funktionen mitverantwortlich für die Wirkung sind. Die Hyperimmunisierung besteht darin, dass man, soweit dies praktikabel ist, in kurzen Zeitabständen (z.B. alle 3 bis 4 Stunden) dasselbe Suis-Organpräparat eventuell sogar in steigenden Stärken oder verschiedene Suis-Organpräparate hintereinander subkutan oder intramuskulär injiziert. Ein allgemeines Schema könnte wie folgt aussehen:

1.	Vesica urinaria suis-Injeel
2.	Ren suis-Injeel
3.	Colon suis-Injeel
4.	Hepar suis-Injeel
5.	Pulmo und Bronchus suis-Injeel

Man muss hier hinzufügen, dass die Hyperimmunisierung nach Reckeweg allerdings nur in sehr seltenen Fällen indiziert ist, zumal hierbei auch an die Mitarbeit des Patienten hohe Anforderungen gestellt wird. Sollte die Injektion der entsprechenden Suis-Organpräparate aus zeitlichen Gründen nicht getrennt möglich sein, kann man alle Präparate mischen und in einer Injektion s.c. geben. Die Wirkung ist dadurch etwas abgeschwächt, und man muss die Injektion am nächsten Tag noch einmal wiederholen.

6.5 Bewährte Indikationen

Die Auto-Sanguis-Stufentherapie nach Reckeweg mit Biotherapeutika-Antihomotoxika hat sich u.a. zur Behandlung folgender Krankheitsbilder in der Praxis besonders bewährt:

1.	Therapieschäden durch Arzneimittel
2.	Rezidivierende Virusinfekte
3.	Präkanzerosen
4.	Toxische Leberschädigungen
5.	Migräne
6.	Chronische Ekzeme
7.	Asthma bronchiale
8.	Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi
9.	Arthrosen
10.	Lymphatische Diathese/Lymphatismus.

Selbstverständlich muss die Auswahl der zu verabreichenden Präparate stets individuell dem Krankheitsbild und der Reaktionslage des Patienten angepasst werden.

Am Beispiel der folgenden 10 Krankheitsbilder werden anhand einiger bewährter Therapieschemata auch die wichtigsten Präparate aufgezeigt, wobei zum Teil auch Nosoden-Präparate mit einbezogen sind, die allerdings immer in der letzten Stufen appliziert und nicht potenziert werden sollten.

Weiterhin werden bei diesen Krankheitsbildern zusätzlich oral zu verabreichende und andere Begleittherapien aufgezeigt, damit die Behandlung insgesamt ein abgerundetes Ganzes darstellt. Auch hier sind natürlich gewisse Abänderungen je nach Lage des entsprechenden Behandlungsfalles möglich und auch sinnvoll.

Sobald es gelungen ist, durch die Auto-Sanguis-Stufentherapie das chronische Stadium der jeweiligen Krankheit zu durchbrechen, ist in vielen Fällen nur noch eine orale Weiterbehandlung angezeigt.

6.6 Therapieschemata

Die genannten Präparate sind eine Auswahl der bei diesen Indikationen häufig angewendeten Antihomotoxika. Sie können je nach Indikation und Symptomatik des Patienten einzeln oder auch als Mischung mehrerer Ampullenpräparate pro Stufe injiziert werden. Selbstverständlich müssen nicht in jedem Falle alle genannten Mittel gegeben werden.

Anmerkung
Die in den einzelnen Stufen der Auto-Sanguis-Stufentherapie zu verabreichenden Arzneimittel sind in den nachfolgend aufgeführten Therapieschemata nicht durch Zahlen, sondern durch Buchstaben gekennzeichnet. Dies erfolgte aus dem Grund, weil je nach Gewinnung des Ausgangsblutes die Zuordnung der Präparate zu den einzelnen Stufen unterschiedlich ist. Das unter Stufe 1 aufgeführte Präparat kann entweder unmittelbar in der Spritze aufgezogen und sofort intravenöse injiziert werden (was genaugenommen der Stufe 0 der Auto-Sanguis-Stufentherapie entsprechen würde) oder erst nach Aspiration eines Blutstropfens (aus der Vene oder mittels „Schnepper-Methode“) und Ausspritzen desselben aufgezogen und anschließend injiziert werden (1. Verdünnungsstufe des Blutes). Beide Vorgehensweisen sind therapeutisch als gleichwertig zu betrachten. Die unter Stufe 2, 3 usw. angegebenen Präparate werden in der angegebenen Reihenfolge zur Herstellung der weiteren Verdünnungsstufen verwendet.

• 6.6.1. THERAPIESCHÄDEN DURCH ARZNEIMITTEL

a.	Engystol
b.	Hepar comp. Heel + Lymphomyosot N + Coenzyme compositum
c.	Ubichinon compositum Ampullen + analoges Suis-Organpräparat und eventuell analoges homöopathisiertes Allopathikum (Anamnese bzw. Medikamententestung!)

Wegen der Simile-Wirkung sollte in der letzten Stufe bei dem analogen homöopathisierten Allopathikum besser eine chemisch ähnlich definierte Substanz (= „Ähnlichkeits-Prinzip“) gewählt werden als das exakte Isopathikum (= „Gleichheits-Prinzip“). Der Simile-Effekt ist hierbei deutlich stärker. Als Beispiel dazu die Glukokortikoid-Therapie. Hierbei zeigt sich die Wirkung von Mineralokortikoid deutlich im Vorteil.

Wirkung
Immunstimulativ, Anregung der Funktion der Zellorganellen, Anregung gestörter Hormonfunktionen, Anregung der Entgiftung und der Entschlackung der Matrix.

Zusätzlich
Lymphomyosot N (Tropfen)
Galium-Heel N (Ampullen in Form der Trinkampullen-Medikation)

• 6.6.2. REZIDIVIERENDE VIRUSINFEKTE

a.	Traumeel S + Engystol
b.	Hepar comp. Heel + Lymphomyosot N
c.	Mucosa compositum + Coenzyme compositum + Ubichinon compositum
d.	Grippe-Nosode + Euphorbium comp. SN

Wirkung
Anregung der Funktion der Zellorganellen, Anregung der Entgiftung, Anregung der Entschlackung der Matrix, entzündungshemmend, Neutralisation blockierender, retoxisch vikariierter Erkrankungen und/oder allopathischer Therapieschäden.

Zusätzlich
Gripp-Heel (Tabletten)
Lymphomyosot N (Tropfen)

• 6.6.3. PRÄKANZEROSEN

a. Engystol + Lymphomyosot N + Galium-Heel N
b. Solidago comp. Heel
c. Mucosa compositum
d. Ubichinon compositum + Coenzyme compositum

Wirkung
Anregung der Zellorganellfunktionen, Anregung der Entgiftung, Optimierung der Hormonfunktionen, Anregung der Organdurchblutung mit Revitalisierung, Anregung der Leukozytenmigration und Stimulation der spezifischen Lymphozyten sowie Deblockierung alter Infektauswirkungen.

Zusätzlich
Lymphomyosot N (Tropfen)
Galium-Heel N (Ampullen in Form der Trinkampullen-Medikation)

• 6.6.4. TOXISCHE LEBERSCHÄDEN

a. Engystol
b. Hepeel N + Carduus marianus-Injeel forte
c. Vesica fellea suis-Injeel + Testis compositum N (bei Männern)
d. Ubichinon compositum

Wirkung
Anregung der biliären Entgiftung sowie der Funktion der Zellorganellen, Anregung der Revitalisierung und Verbesserung der Leberfunktion.

Zusätzlich
Galium-Heel N (Ampullen in Form der Trinkampullen-Medikation)
Hepeel N (Tabletten)
Traumeel S (Tabletten)

• 6.6.5. MIGRÄNE

a. Engystol + eventuell Kalium bichromicum-Injeel
b. Cerebrum compositum NM + Hepar comp. Heel
c. Arteria suis-Injeel + Vena suis-Injeel
d. Coenzyme compositum + Ubichinon compositum + Sinusitis-Nosode-Injeel oder Granuloma dentis-Injeel

Wirkung
Anregung der zellulären Funktionen und der Immunstimulation, Verbesserung der Ausscheidungsvorgänge, Verbesserung der zentralvenösen Steuerung, Neutralisierung eventueller Streueffekte aus sogenannten Foci (Fokaltoxikosen).

Im Anfall

a. Gelsemium-Homaccord
b. Spigelon
c. Ferrum phosphoricum-Injeel forte
d. Aconitum-Homaccord
e. Belladonna-Homaccord
f. Procain 1% 0,5 ml

Alle 5 Ampullenpräparate (jeweils 1,1 ml) und das Procain in der Mischspritze aufziehen und langsam intravenös injizieren.

Im Intervall
folgende Mischung als „Migränetropfen“:
Rp.: Spigelon (Tropfen)
Gelsemium-Homaccord (Tropfen)
Lymphomyosot N (Tropfen)
āā ad 90,0
M.D.S.: Migränetropfen 3 mal täglich 10 Tropfen vor dem Essen.

• 6.6.6. CHRONISCHE EKZEME

a. Traumeel S
b. Hepar suis-Injeel + Lymphomyosot N + Graphites-Homaccord
c. Cutis suis-Injeel + Arsenicum album-Injeel S
d. Ubichinon compositum + Coenzyme compositum + evtl. Histamin Injeel

Wirkung
Anregung der Entgiftung und der Zellorganellenfunktionen, regenerativ-antiphlogistische Wirkung, desallergisierend, Stabilisierung der Zellmembran.

Oral
Traumeel S Tabletten

Lokal
folgende Mischung als „Ekzemsalbe“
Rp.: Urea pura 2,5
Sulfur präcipitatus 1,0
Traumeel S Salbe ad 50,0
M. ft. ungt. d. s.: Ekzemsalbe mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen.

• 6.6.7. ASTHMA BRONCHIALE

a. Lymphomyosot N + Hepar comp. Heel
b. Cutis suis-Injeel + Funiculus umbilicalis suis-Injeel
c. Histamin-Injeel + Cuprum-Injeel

Wirkung
Verbesserung der Funktion der Zellorganellen, desallergisierende Wirkung, spasmolytisch, Verbesserung der Entgiftungsfunktionen.

Zusätzlich
Folgende Mischung gegen Asthma:
Rp.: Tartephedreel N (Tropfen)
Drosera-Homaccord (Tropfen)
Husteel (Tropfen) āā ad 90,0
M.D.S.: Hustentropfen bzw. Asthmatropfen 3 mal täglich 10 Tropfen vor dem Essen.

• 6.6.8. ULCUS DUODENI ET VENTRICULI

a. Traumeel S
b. Lymphomyosot N + Hepar comp. Heel
c. Glandula suprarenalis suis-Injeel + Mucosa compositum
d. Salmonella typhi-Injeel + Coxsackie-Virus-A_9-Injeel

Wirkung
Entzündungshemmend, Anregung der Zellorganellenfunktionen, Regulation des Neurovegetativums, Deblockierung von bakteriellen Vorschäden.

Zusätzlich
Gastricumeel (Tabletten)
Duodenoheel (Tabletten)
Anacardium-Homaccord (Tropfen)

• 6.6.9. ARTHROSEN

a. Traumeel S + Zeel comp. N
b. Lymphomyosot N + Coenzyme compositum
c. Cartilago suis-Injeel + evtl. Funiculus umbilicalis suis-Injeel + evtl. Glandula suprarenalis suis-Injeel + evtl. Glandula parathyreoidea suis-Injeel
d. Ubichinon compositum + evtl. homöopathisiertes Allopathikum

Wirkung
Entzündungshemmende und regenerative Wirkung, daneben Verbesserung des Knorpelstoffwechsels, Verbesserung der Hormonfunktionen.

Oral
Zeel comp. N Tabletten
Traumeel S Tabletten (bei entzündlicher Komponente)

Lokal
Salbenverbände mit Zeel comp. N und bei entzündlicher Komponente mit Traumeel S. Periartikuläre Injektionen mit Zeel comp. N und Traumeel S in der Mischspritze bei akuten entzündlichen Exazerbationen. Sonst nur mit Zeel comp. N (periartikulär).

Dieselben Präparate sind auch indiziert bei Harnsäure-Diathese und bei Periarthropathia humeroscapularis. Bei Periarthropathia humeroscapularis zusätzlich noch Ferrum-Homaccord (Tropfen).

• 6.6.10. LYMPHATISMUS

a.	Traumeel S
b.	Lymphomyosot N + Galium-Heel N
c.	Hypophysis suis-Injeel + Coenzyme compositum
d.	Ubichinon compositum + Echinacea compositum SN

Wirkung
Entzündungshemmend, Anregung der Zelltätigkeit, Anregung der biliären Entgiftung, Anregung der Entschlackung der Matrix und der Lymphdrainage.

Zusätzlich
Lymphomyosot N (Tropfen)
Traumeel S (Tabletten)

7 Dedifferenzierungsphasen

7.1 Grundlagen der antihomotoxischen Tumorbehandlung

Das Handeln des Arztes, besonders bei der klinischen Tumorbehandlung, steht häufig unter dem Diktat kollektiver Zwänge, herrührend von einem gesellschafts-psychologischen Prinzip der Beharrlichkeit des Paradigmas der monokausalen „Search-and-destroy-Strategie“ mit der Tumorzelle als Zielgebiet.

Dieser Therapieansatz wandelt sich derzeit dahin, dass weitgehend die körpereigene Abwehr die Tumorresistenz mit ihrer seelisch-geistigen-körperlichen Basis den Therapieerfolg und auch die weitere Prognose bestimmt („Psychoonkologie“ 1, 4).

In den 70er Jahren erkannte man zunehmend, dass man bei der Tumorbehandlung auf der Stelle trat. Immer häufiger entschieden sich auch die Patienten selbst für alternative Möglichkeiten der Behandlung. Heute lassen sich die scharfen Frontverläufe der einzelnen Vorstellungen nicht mehr halten, immer häufiger kommt es zu biologischen Begleitbehandlungen im Rahmen der konventionellen Krebstherapie (eine aktuelle Übersicht bietet das Schwerpunktthema „Komplementäre Onkologie“ in: Erfahrungsheilkunde 1998, Heft 2, Band 47).

Je nach Ausprägung und Schweregrad stehen vielfältige Arzneimittel allopathischen, homöopathischen und phytopharmazeutischen Ursprungs zur Verfügung.

Die Tumorvalenz ist die eigentliche Determinante, die das Resultat der Behandlung weitgehend festlegt. Sie wird bestimmt durch:

die Tumorlokalisation und Ausdehnung
die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors
die Streufähigkeit des Tumors.
Dies sind Bedingungen, die die Umgebung des Tumors – der Gesamtorganismus – dem malignen Geschehen vorgibt.
das Tumorgeschehen; Störung des Grundsystems und der Homöostase
Tumor als Endpunkt der malignen Entwicklung.

Der Zellstoffwechsel ist von der Zufuhr, von Baustoffen und Abtransport der Endprodukte abhängig, vor allem von entstehenden freien Radikalen. Unser Blutgefäßsystem und Lymphsystem ist abhängig von besonderen nervalen, afferenten und efferenten Einflüssen. Die Körperzelle darf von der sie umgebenden extrazellulären Matrix (Grundsubstanz) nicht getrennt gesehen werden, der Zustand der Matrix entscheidet über den Zustand der Zelle und damit *auch* der *Tumorzelle*. (1, 4)

Die Tumorvalenz ist also abhängig von einem feinstregulierten und durch eine Vielzahl von Interdependencen charakterisierten kybernetischen System.

Jahrelange Störungen z.B. durch Umwelteinflüsse, Stress, falsche Ernährung u.a.m. verursachen Störungen der Matrix und Minderung der Abwehrfähigkeit, wodurch einer malignen Entwicklung Vorschub geleistet wird. Auch Metastasen sind nur in einer „gestörten“, d.h. für sie geeigneten Matrix, überlebensfähig. (Übersicht bei 1)

Da von einem Tumorgeschehen stets der Gesamtorganismus betroffen ist, ist die Tumorkrankheit als Allgemeinkrankheit zu verstehen.

Die im Krebsgeschehen bei zellulärer Dedifferenzierung freigesetzten matrixgeschädigten Substanzen (Radikalionen, Aktivatoren proteolytischer Enzyme, Zytokine, Wachstumsfaktoren u.a.m.) führen global zu einer latenten Azidose der Matrix, wodurch wiederum der Tumorprozess aktiviert wird usw. Letztlich treibt das Geschehen auf eine biologische Reaktionsstarre hin mit immunologischer Erblindung begleitet von einem Mangel an seelischer Wahrnehmungs-, Begegnungs- und Auseinandersetzungsfähigkeit.

Der große Nachteil jeder Chemotherapie ist ihre direkte Ausrichtung auf die Tumorzelle ohne zu berücksichtigen, dass vor und um jede Zelle ein Extrazellulärraum mit Grundsubstanz als funktioneller Wächter liegt.

Die Zytostase führt daher zwangsläufig zu schweren Störungen der Grundsubstanz und damit auch ihrer Regulationsbedingungen:

Die Abwehrschwäche nimmt zu;

aufgrund von Zellstoffwechselstörungen treten vermehrt Radikalionen auf;

die latente Gewebsazidose nimmt zu;

damit erhöht sich das proteolytische Gewebspotential;

die Gefährdung der Gewebsregulation nimmt zu.

Chemotherapien müssen daher im Sinne eines Erhaltes bzw. Wiederherstellung der Grundregulation und Aktivierung der Abwehr abgeschirmt werden. Hier kann adjuvant Antihomotoxische Therapie sehr hilfreich sein. Dies besonders aufgrund der Aktivierung regulatorischer Lymphozytenklone durch Antihomotoxika, die in die gegenseitige Abstimmung des zellulären und humoralen Abwehrsystems eingeschaltet sind. (3,4).

Die konventionelle Tumorbehandlung besteht in der lokalen und lokoregionalen, makroskopischen, chirurgischen Ausschaltung, ebenso in einer computergesteuerten Strahlenbehandlung und einer systemischen Chemotherapie entsprechend des jeweiligen Tumorstadiums auch mit dem Ziel der mikroskopischen Tumorausräumung. Abgesehen von multiplen Nebenwirkungen sind selbst verfeinerte chirurgische und radiologische Behandlungsstrategien bei multimodalen Konzepten nicht generell erfolgsversprechend.

Die Tumorforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Mineralien und Spurenelemente, die Vitamine A, C und E sowie bestimmte Enzyme für eine Reihe von Regelkreisen essentiell sind. Diese Stoffe müssen substituiert werden.

Zur ganzheitlichen Tumorbehandlung gehören auch die Lösung seelischer Probleme der Kranken und die Stärkung seiner geistigen Durchhaltekräfte während und nach der Tumorbehandlung.

Die ganzheitliche Tumorbehandlung besteht deshalb aus drei Hauptkomponenten:

1. Die konventionelle Tumorbehandlung durch

Chirurgische Maßnahmen

Radiotherapie

Chemotherapie

2. Biologische Begleittherapie

Stärkung der körpereigenen Abwehr

Substitutionsbehandlung und Regenerationsbehandlung

3. Seelisch-geistige Komponente

Mit entsprechenden psychologisch erlernbaren mentalen Tumorabwehrmethoden

Obwohl es sich bei einem Karzinom aus der Sicht der Homotoxinlehre um eine Dedifferenzierungsphase, d.h. um die am weitesten fortgeschrittene Phase der Homotoxikosen handelt, sind unter gezielter adjuvanter biologischer Therapie Remissionen beobachtet worden.

Es ist zu betonen, dass die biologische Therapie keine Kollision mit den bewährten schulmedizinischen Therapieformen anstrebt. Sie wird additiv (zusätzlich) und komplementär (ergänzend) durchgeführt. Zunächst muss die Tumormasse durch Operation und Bestrahlung verkleinert werden.

Folgende Grundprinzipien sind wichtig:

1. Ausleitung + Entgiftung

2. Ernährung

3. Antihomotoxische Therapie

1. Am Anfang der Behandlung steht eine mehrwöchige, *reine Ausleitungs- und Entgiftungstherapie.*

2. Die *Ernährungstherapie* sollte so aussehen, dass auf Vollwerternährung unter Verzicht auf Mastfleischsorten geachtet wird. Tierische Fette und Proteine sollten im Wesentlichen stark reduziert werden. (Hinweis auf Verzicht arachidonsäurehaltiger Lebensmittel und Entzündungsmediatoren etc.).

Ferner sollten alle mit Farb- und Konservierungsstoffen zubereiteten Lebensmitteln aus dem Speiseplan gestrichen werden. Es herrscht Alkohol- und Nikotinverbot.

Beispiele für eine orale Therapie sind: Leber-Galletropfen, Magen-Darmtropfen N und Nierentropfen oder die entsprechenden Tablettenpräparate: Nux vomica compositum Cosmoplex, Scrophularia compositum Cosmoplex und Solidago compositum Cosmoplex. Diese Präparate sollten in der jeweiligen Normaldosierung verordnet werden.

Da aufgrund des laufenden Anfalls intermediärer Homotoxine ein chronischer Stress besteht, verstärkt sich die Erschöpfung der Nebennierenrinde. Daher ist es zweckmäßig, Berberis-Homaccord zu interponieren.

7.2 Therapieschema

Zur parenteralen Therapie eignen sich Hepar comp. Heel, Solidago comp. Heel, Lymphomyosot N und Nux vomica-Homaccord. Die Ampullenpräparate werden 3 mal wöchentlich intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injiziert oder in Form einer Trinkampullenmedikation gemischt. Das Präparat Lymphomyosot N kann sowohl als auch verabreicht werden, d.h. auch oral in Form von Tropfen (3 mal täglich 20 Tropfen).

Sehr häufig findet man bei Karzinompatienten aufgrund einer latenten Gewebsazidose extra- und intrazelluläre Stoffwechselblockaden, die durch den Einsatz der Katalysatorenpräparate Coenzyme compositum Ampullen und Ubichinon compositum gelöst werden können (ebenfalls 3 mal wöchentlich in der o.g. Applikationsform).

Als Anregung der Depolymerisation zusätzlich zu Ubichinon compositum ist der Einsatz von Glyoxal compositum zu empfehlen, welches im Allgemeinen nur bei Nachlassen der Besserung zwischengeschaltet wird. Als Wechselmittel kommen Para-Benzochinon-Injeel (D30) und cAMP D30 in Frage.

Nach einer Ausleitungsphase von etwa vier Wochen kann eine spezielle immunstimulierende bzw. immunmodulierende Therapie angeschlossen werden.

• 7.2.1 ANTIHOMOTOXISCHE THERAPIE

Echinacea compositum SN (Firma Heel)

Engystol

Lymphomyosot N

eventuell auch spezifische Nosodentherapie:
Carcinoma coli-Injeel, Carcinoma mammae-Injeel

Carcinom-Nosoden stehen nicht für alle Krebserkrankungen zur Verfügung, sie können aber nach dem homöopathischen Simile-Prinzip eingesetzt werden. Die Auswahl erfolgt nach Tumorart und -lokalisation, am besten auch durch naturheilkundliche Testverfahren (EAV, Kinesiologie).

• AUTO-SANGUIS-STUFENTHERAPIE

(siehe Auto-Sanguis-Stufentherapie)

• 7.2.2 THYMUSTHERAPIE (THYMUS THX)

• 7.2.3 MISTELPRÄPARATE (ISCADOR, PLENOSOL, HELIXOR)

• 7.2.4 ZYTOPLASMATISCHE THERAPIE

Ney-Tumorin

• 7.2.5 SAUERSTOFFTHERAPIEN

Ozon-Sauerstoff-Therapie/HOT
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

• 7.2.6 HYPERTHERMIE

Zur speziellen medikamentösen Behandlung von lokalisierten Karzinomen stehen eine Reihe biologischer Präparate zur Verfügung. Diese Präparate können per Elektroakupunktur ausgetestet werden.

Zu der genannten Therapie mit Heel-Spezialitäten empfehlen sich im Rahmen einer biologischen Behandlung additiv:

eine hochdosierte Dauertherapie mit Enzympräparaten
hochdosiertes Vitamin C, Vitamin A bzw. β-Carotin + Vitamin E
Darmsanierung
Selen-Trinkampullen täglich als Dauertherapie
zur Entgiftung täglich Orthosiphonblätter, Indischer Nierentee der Firma Fides
Rote Bete-Konzentrate täglich oder einfacher Rote-Bete-Saft

Begleittherapie bei Chemotherapie
Jeweils zwei Tage vor und zwei Tage nach der Chemotherapie sollte eine HOT durchgeführt werden.

Während der Chemotherapiezeit (mehrere Wochen bis Monate):

Iscador (Firma Weleda)	2 mal wöchentlich s.c.
Ubichinon compositum Amp.	2 mal wöchentlich s.c.
Wobe-Mugos (Firma Mucos)	3 mal täglich 3 Tabl. oder Dragees
Nux vomica-Homaccord	3 mal täglich 15 Tropfen
Vitamin C	4 g täglich
Selenase (Firma G.N. Pharm)	3 mal wöchentlich 1 Trinkampulle
A-E-Mulsin Emulsion (Firma Mucos)	

Außerdem sollten große Mengen rechtsdrehender Milchsäure sowie Zink und Kupfer in Abhängigkeit der spektralanalytischen Werte eingenommen werden.

Nach der Chemotherapie:

	Symbioselenkung, Thymusinjektionen, 2 mal wöchentlich 2 Ampullen (während der Thymusinjektionen Iscador-Pause).

Außerdem:

Entzündungstropfen Cosmochema	20 Tropfen morgens
Hepeel N oder	2 mal täglich 2 Tabletten
Hepar comp. Heel	zusammen 2 mal wöchentlich
Ubichinon compositum Ampullen	je 1 Ampulle

Einige biologische Verfahren können und sollen kombiniert angewandt werden, um den Therapieerfolg zu steigern, wie z.B. antihomotoxische Therapie und Ozontherapie.

Die biologische Therapie ist eine Dauertherapie. Sie führt nicht nur zu einer Steigerung der körpereigenen Abwehr und somit der Tumorabwehr, sondern auch zur Verminderung der Nebenwirkungen der Bestrahlungen und Zytostatika-Therapie.

Eine Verbesserung der körperlichen Verfassung (z.B. durch Appetitsteigerung) sowie der psychischen Situation (z.B. weniger Angst, mehr Lebensmut) ist als positive Wirkung zu erkennen und trägt zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Daher ist die Immuntherapie nicht nur eine Säule, sondern das Fundament der biologischen Krebsbehandlung.

Sie sollte von Anfang an neben Chirurgie, Strahlen und Chemotherapie in den Therapieplan miteinbezogen werden.

7.3 Literatur

(1) Heine H., Psychoonkologie. Z Onkol 1996; 28(1): 10-4

(2) Heine H., Neurogene Entzündungen als Basis chronischer Schmerzen – Beziehungen zur Antihomotoxischen Therapie. Biol Med 1997; 26(6): 246-50

(3) Heine H., Schmolz M., Immunologische Beistandsreaktion durch pflanzliche Extrakte in Antihomotoxischen Präparaten. Biol Med 1998; 27(1): 12-4

(4) Uexküll Th. v., Wesiak W., Theorie der Humanmedizin. München: Urban und Schwarzenberg 1988

8 Schmerzbehandlungen

Die Nosodentherapie kann Restgifte früher durchgemachter Erkrankungen aus dem Körper beseitigen. Bei der Anamneseerhebung führt die Frage nach grippalen Infekten, Anginen, Gelbsucht, Nierenstörungen, Zahnschmerzen oft auf den richtigen Weg. Auch Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps, Windpocken können dem Schmerzgeschehen ursächlich zugrunde liegen.

Durch Infiltration eines Lokalanästhetikums in den Herd kann man das Störfeld vorübergehend ausschalten und den Schmerz innerhalb von Sekunden beeinflussen. Die diagnostische und therapeutische Lokalanästhesie ist bei richtiger Anwendung die Methode der Wahl zur Behandlung chronischer Schmerzzustände. Durch die Kombination mit homöopathischen Komplexmitteln kann man den therapeutischen Effekt noch verbessern.

Therapieformen
Injektionen am Locus dolendi
Injektion in das Segment
Injektionen an Nervenwurzeln oder Ganglien
Injektionen an und in Gelenke
Injektionen an das Periost
Injektionen am Störfeld

• INDIKATIONEN UND THERAPIEVORSCHLÄGE

Zunächst muss man feststellen, dass es kein hochwirksames homöopathisches oder pflanzliches Analgetikum gibt. Die orale Therapie kann daher zunächst immer nur eine Begleittherapie sein. Erst im Verlauf und nach längerer Zeit kann man deutliche Erfolge sehen. Durch die Darreichung des passenden Biotherapeutikums wird die dem Schmerz zugrundeliegende Homotoxinlage beeinflusst. Am Anfang der Behandlung steht daher zumeist die Injektionstherapie. Je nach Art des Schmerzes kann man folgende Empfehlung geben:

Gelsemium-Homaccord, Spigelon Spascupreel Ranunculus-Homaccord Rhododendroneel S Belladonna-Homaccord Bryaconeel	Migraine cervicale Kopfschmerz, Migräne stechende und krampfende Schmerzen Interkostalschmerz Wetterfühligkei klopfender Entzündungsschmerz neuralgische Entzündungsschmerzen

• ERKRANKUNGEN DER WIRBELSÄULE

Halswirbelsäule

Die Symptomatik im Bereich der Halswirbelsäule ist je nach Lage der Veränderung ganz unterschiedlich.

oberes Zervikalsyndrom	Nackenschmerzen, Hinterkopfschmerzen, Migraine cervicale
mittleres Zervikalsyndrom	Schulterschmerzen
unteres Zervikalsyndrom	Brachyalgien, Myalgien im Schulter-und Nackenbereich, Epikondylitis

Zur Therapie empfiehlt sich die Mischung eines Lokalanästhetikums mit einem homöopathischen Komplexmittel. Man kann so die sofortige Wirkung der diagnostischen und therapeutischen Lokalanästhesie mit dem heilenden Effekt der Homöopathie verbinden.

Degenerative Wirbelsäulenveränderung	1 Amp. Discus comp. N mit Kalmia + 3 ml Neuraltherapeutikum
Migränekopfschmerz	1 Amp. Spigelon + 1 Amp. Gelsemium-Homaccord + 2 ml Neuraltherapeutikum
Periarthritis und Epikondylitis	1 Amp. Traumeel S + 3 ml Neuraltherapeutikum

Brustwirbelsäule

Interkostalschmerzen	
Tietze-Syndrom	
Postherpetischer Schmerz, Interkostalschmerz	1 Amp. Ranunculus-Homaccord + 3 ml evtl. Neuraltherapeutikum + Vitamin B12
Zostertherapie	1 Amp. Mezereum-Homaccord + 1 Amp. Ranunculus-Homaccord + 3 ml zusätzlich auch Neuraltherapeutikum + Vitamin-B-Komplex

Lendenwirbelsäule

Lumbalgie, Lumbago, Lumbalsyndrom	
Ischialgie	
L4/LS-Wurzelsymptomatik	
S1-Wurzelsymptomatik	
Ischiasneuritis	1 Amp. Discus comp. N mit Kalmia + 1 Amp. Traumeel S + 5 ml Neuraltherapeutikum dazu 1 Amp. Neuralgo-Rheum-Injeel i.m.

• ERKRANKUNGEN DER EXTREMITÄTEN

Arthrosetherapie

kleine Gelenke	1 Amp. Zeel comp. N + 2 ml Neuraltherapeutikum
große Gelenke	2 Amp. Zeel comp. N + 3 ml Neuraltherapeutikum

Arthritisbehandlung

Arthritis	1 Amp. Traumeel S + 1 Amp. Zeel comp. N + 3 bis 5 ml Neuraltherapeutikum

Schulter-Arm-Syndrom

Periarthritis humeroscapularis	Zeel comp. N, Traumeel S, Discus comp. N mit Kalmia, Neuralgo-Rheum-Injeel
Bursitis subacromialis	1 Amp. Traumeel S + 3 ml Neuraltherapeutikum
Schulterarthrose	Zeel comp. N, bei Aktivierung mit Traumeel S
Frozen shoulder	Traumeel S + Neuraltherapeutikum

Ellenbogenschmerzen

Epicondylitis humeri radialis Epicondylitis humeri ulnaris Bursitis olecrani	Traumeel S und Discus compositum N mit Kalmia mit Neuraltherapeutikum
Karpaltunnelsyndrom	1 Amp. Graphites-Homaccord + 2 ml Neuraltherapeutikum (evtl. Operation notwendig!)

Hüftgelenksschmerzen

Koxarthritis	1 Amp. Zeel comp. N + 1 Amp. Traumeel S + 3 bis 5 ml Neuraltherapeutikum
Koxarthrose	2 Amp. Zeel comp. N

Kniegelenksschmerzen

Gonarthritis Gonarthrose Bursitiden	Zeel comp. N und Traumeel S auch in Verbindung mit Neuraltherapeutikum o.ä.

- **SCHMERZEN IM KOPFBEREICH**

Kopfschmerz und Migräne

Kopfschmerz, Migräne	1 Amp. Gelsemium-Homaccord + 1 Amp. Spigelon + 3 ml Neuraltherapeutikum

Tinnitus aurium

Tinnitus aurium	1 Amp. Vertigoheel + 3 ml Neuraltherapeutikum auch mit Graphites-Homaccord und Barijodeel

- **ANTIHOMOTOXISCHE EINZELMITTEL**

Indikationsbezogen siehe Reckewegs Homoeopathia antihomotoxica, 6. völlig überarbeitete Auflage 1999, Seiten 3 bis 142.

- **SONSTIGE THERAPIEMETHODEN**

Diät, Fasten
physikalische Therapie, Hydrotherapie
Akupunktur, Elektroakupunktur
Chirotherapie
Eigenblutbehandlung, Auto-Sanguis-Stufenkur
Ozon- und Sauerstofftherapie
Psychotherapie, Entspannungsübungen

- **AUTO-SANGUIS-STUFENTHERAPIE NACH RECKEWEG BEI ERKRANKUNGEN DES RHEUMATISCHEN FORMENKREISES**

Stufe		
A	Zeel comp. N	bei allen degenerativen Skeletterkrankungen
	Traumeel S	bei entzündlichen Reaktionen im Vordergrund
	Neuralgo-Rheum-Injeel	bei Neuralgien und Myalgien
	Discus comp. N mit Kalmia	bei wirbelsäulenabhängigen Schmerzen
B	Lymphomyosot N	zur Lymphdrainage und Bindegewebsentschlackung
C	Engystol	bei oder nach Virusinfektionen
	Echinacea compositum SN	zur Stärkung der Abwehrkräfte
	Coenzyme compositum	zur Stoffwechselaktivierung
	Ubichinon compositum	Aktivierung der Giftabwehr und Fermentsysteme
	Zitronensäurezyklus-Heel	Induktion der Fermentsysteme
D	Suis-Organpräparate, wie z.B. Musculus, Os, Funiculus umbilicalis, Hepar	Grippe, Arthritis urica, Herpes zoster und simplex usw.
	Nosodenpräparat, z.B. Streptococcus, Staphylococcus	

Die oben genannten Ampullen werden nach den Regeln der Auto-Sanguis-Kur einzeln oder auch gemischt verabreicht.

- **PHYSIKALISCHE THERAPIE MIT TRAUMEEL S- UND ZEEL COMP. N-SALBEN**

Die Anwendung oben genannter Salben erfolgt vorzugsweise mit Okklusiv- und Stützverbänden, man kann sie auch als Massagecreme verwenden. In der Iontophorese ist der Einsatz ebenfalls möglich, man muss aber die Polarität zur Hälfte der Behandlungszeit wechseln, weil die Inhaltsstoffe unterschiedliche Ladungen besitzen.

9 Schadstoffbelastung

Die Auswirkungen toxischer Belastung (Homotoxine) auf das Krankheitsgeschehen der Patienten waren in der antihomotoxischen Therapie schon immer bekannt. Zunehmend wird die Wichtigkeit auch in der Schulmedizin registriert. Mittlerweile gibt es die Zusatzbezeichnung „Umweltmedizin“.

Schadstoffe können bis zum Nachweis einzelner Moleküle erkannt werden. Relativ schwierig ist aber die Diagnosestellung, da die Symptomatik recht unspezifisch ist. Man beobachtet Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Kopfschmerzen, Hyperaktivität, Infektanfälligkeiten und Allergien. Oft werden diese Symptome als psychosomatisch fehlinterpretiert. Auch chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Stoffwechselstörungen und Herz-Kreislauferkrankungen sowie Nieren- und Blasenerkrankungen können schadstoffabhängig entstehen.

Die stärkste Symptomatik zeigen diese Umweltbelastungen in dem Krankheitsbild *Multiple Chemikaliensensibilität (MCS)*. Der Begriff Multiple Chemical Sensitivity wurde in den 60er Jahren von dem Amerikaner Randolph geprägt. Nach dieser Definition handelt es sich um eine erworbene Erkrankung, hervorgerufen als Folge einer Überlastung des menschlichen Organismus mit exogenen Stoffen. Die Patienten reagieren auf zahlreiche Chemikalien mit relativ gleichförmiger Symptomatik.

Die Diagnostik ist außerordentlich schwierig und zeitaufwendig, eine Repertorisation nach antihomotoxischen Gesichtspunkten ist in diesen Fällen hilfreich. Folgende Diagnosekriterien sprechen für eine MCS:

Es besteht eine Intoleranz gegenüber mehreren chemischen Substanzen in Belastungshöhen, welche problemlos von der übrigen Bevölkerung vertragen werden.
Die Dauer der Erkrankung beträgt mehrere Monate.
Es bestehen multiple Symptome in mehreren Organbereichen, welche uniform nach unterschiedlichen Belastungen auftreten.
Es besteht eine zeitliche Abhängigkeit von Exposition und Symptomatik.
Andere Erkrankungen wie Allergien, Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen usw. konnten ausgeschlossen werden.

Die Leitsymptome sind unspezifische zentralnervöse Beschwerden wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gedächtnis-, Konzentrations- und Schlafstörungen, Störungen der Befindlichkeit, weiter Reizerscheinungen an den Schleimhäuten der Augen und des Respirationstraktes sowie unspezifische Magen- und Darmstörungen. Typisch sind auch Reizerscheinungen im Hautbereich sowie Schmerzen im Muskel- und Gelenksbereich.

Ein weiteres Krankheitsbild, das ebenfalls zu Schwierigkeiten in Diagnostik und Therapie führt, ist das Sick-Building-Syndrom (SBS). Dies ist ein international gebräuchlicher Begriff für Gesundheits-, Befindlichkeits- und Behaglichkeitsstörungen, die in den Innenräumen auftreten. Die WHO definierte 1983 das Sick-Building-Syndrom wie folgt:

Eine bestimmte Anzahl von Personen im gleichen Raum/Gebäude (etwa 20 %) klagen spontan über unspezifische Beschwerden/Befindlichkeitsstörungen, die beim Aufenthalt in diesen Räumen/Gebäuden auftreten, sich hier ggf. verschlimmern und sich nach Verlassen des Raumes/Gebäudes bessern oder ganz verschwinden.

Typischerweise beklagen Patienten beim Sick-Building-Syndrom folgende Beschwerden oder Beeinträchtigungen:

Haut	Trockenheit, Reizungen, Juckreiz, Ausschlag
Augen	Brennen, Rötungen, Bindehautreizungen, Tränenfluss
Nase	Trockenheit, Schnupfen, Reizungen
Rachen	Kratzen, Heiserkeit, Trockenheit
Lunge	Reizhusten, unspezifische Überempfindlichkeit, Infektanfälligkeit
zentrales Nervensystem	Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, rheumatische Beschwerden

Frauen klagen wesentlich häufiger als Männer über Beschwerden im Sinne eines Sick-Building-Syndroms, höheres Alter und längere Betriebszugehörigkeit begünstigen das Auftreten. Es erkranken bevorzugt Personen in beruflich untergeordneter Position, der Chef leidet meist nicht an einem Sick-Building-Syndrom.

Risikofaktoren sind:

- **PHYSIKALISCHE FAKTOREN**

Klima (Raumtemperatur, relative Luftfeuchte, Belüftungsrate)
raumlufttechnische Anlagen
Beleuchtung
Lärm
Elektrosmog
Radonkonzentration
Vibration
Ergonomie
Farbgebung

- **CHEMISCHE FAKTOREN**

allgemeine Schadstoffanreicherung von außen
allgemeine Schadstoffanreicherung von innen (organische Lösungsmittel, Kunststoffausdünstungen, Kunstharze)
Klimaanlage (Biozide)
Formaldehyd (Möbel)
Reinigungsmittel
Staub (Teppiche, Papier, Zigarettenrauch)
Ozon
CO_2 (Hauptemittent ist der Mensch)
VOC-Emissionen (Volatile Organic Compounds aus Klebern, Bodenbelägen, Isoliermaterialien, Dichtmassen, Lacken, Farben, Tapeten, Wandverkleidungen, Holzverkleidungen, Spanplatten)
Gerüche

- **BIOLOGISCHE FAKTOREN**

Pilze
Bakterien
Viren
Allergene
Geschlecht
Alter
allergische Disposition

- **PSYCHISCHE FAKTOREN**

Überforderung
Unterforderung
sozial niedrige Position
fehlende Einflussnahme auf den Arbeitsprozess und die Arbeitsplatzgestaltung
fehlende menschliche Kommunikation am Arbeitsplatz
Mobbing
Teiltätigkeit mit Kontrollverlust des Ganzen
drohende Arbeitslosigkeit
private Probleme
„was kränkt, macht krank“

Die Diagnostik macht zunehmend Fortschritte. Wenn es um die Therapie geht, gibt es so gut wie keine schulmedizinischen Behandlungskonzepte. Hier müssen naturheilkundliche Verfahren als durchaus besser angesehen werden.

Die Antihomotoxische Therapie besteht aus drei Säulen:

1. Vermeidung weiterer Zufuhr von Homotoxinen
2. Verbesserung der Zell- und Organfunktionen
3. Optimierung der entgiftenden und ausleitenden Funktionen

Bei der Vorbeugung toxischer Belastung spielt die orthomolekulare Therapie eine zunehmend wichtige Rolle. Durch hohe Dosen von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen (z.B. Vitamin E, Vitamin C, Beta-Karotin, Magnesium und Selen) können Patienten recht gut geschützt werden.

Für die Ausleitungs- und Entgiftungstherapie sowie die Besserung der Organfunktionen ist die Antihomotoxische Therapie der beste Weg. Basismitttel zur Entgiftungstherapie ist das Lymphomyosot N. Dieses Präparat hat eine entgiftende Wirkung auf Matrix und Lymphosystem. Besonders hat es sich bei der Entgiftung von Schwermetallbelastungen bewährt. Aus diesem Grunde wird es routinemäßig vor, während und nach einer Amalgamsanierung (siehe Kapitel Amalgamausleitung) angewendet.

Sehr häufig gibt man zur Entgiftung des Zytoplasmas zusätzlich das Präparat Galium-Heel N. Da Umweltbelastungen oft sog. Stoffwechselblockaden hinterlassen, ist die Gabe der Biokatalysatoren essentiell. Zumeist werden die beiden Präparate Coenzyme compositum Ampullen und Ubichinon compositum Ampullen gemeinsam 2-3 mal pro Woche gegeben.

Besonders empfehlenswert ist eine Infusionstherapie zur allgemeinen Ausleitung und Entgiftung. Einer handelsüblichen Vollelektrolytlösung (250 ml) gibt man die Präparate Hepar comp. Heel für die Leber, Solidago comp. Heel für die Nieren, Nux vomica-Homaccord für Magen und Lymphomyosot N für das Lymphgewebe zu. Man gibt diese Infusion üblicherweise 2 mal pro Woche, insgesamt fünf- bis zehnmal.

Bei erheblich stoffwechselblockierten Patienten (metabolisches Syndrom) gibt man initial die sogenannte Katalysatoreninfusion. Einer Infusionslösung gibt man alle zehn Ampullen der Sammelpackung Zitronensäurezyklus Heel zu.

Eine orale Ausleitungstherapie ist ebenfalls möglich:

Lymphomyosot (Tbl.)	3 mal täglich 3 Tabletten oder
Lymphomyosot N (Tropf.)	3 mal täglich 15 bis 20 Tropfen
Hepeel N (Tbl.)	3 mal täglich 1 Tablette
Reneel NT (Tbl.)	3 mal täglich 1 Tablette
Nux vomica-Homaccord (Tr.)	3 mal täglich 10 Tropfen

Zum Abbau von Verschlackungen ist auch eine Enzymtherapie geeignet. Die genannte Präparatekombination ist als eine optimale Entgiftungstherapie aufzufassen und sollte im Zusammenhang mit ganzheitlichen Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, Darmsanierung, Stressreduktion, leichter sportlicher Betätigung etc., über einige Monate durchgeführt werden.

9.1 Literatur

(1) Wolf C., Arzneimittel-, Therapie-Kritik & Medizin und Umwelt. Marseille Verlag München, 1. Quartal 1998, Jg. 30, Heft 1, S. 95-99

(2) Brede-Weisflog B., Arzneimittel-, Therapie-Kritik & Medizin und Umwelt. Marseille Verlag München, 1. Quartal 1998, Jg. 30, Heft 1, S. 105-111

10 Amalgam-Ausleitung

Unter Amalgam-Schäden versteht man in der Regel alle negativen Auswirkungen auf den Organismus durch freigesetztes Quecksilber aus Amalgamfüllungen.

Seit Jahren werden die Zahnärzte mit den Beschwerden von amalgamtragenden Patienten konfrontiert. Durch die Beobachtung von Folgekrankheiten durch Quecksilberbelastungen im Körper mehrt sich in letzter Zeit weltweit die Kritik an der Anwendung von Amalgam.

Hierzu muss zunächst gesagt werden, dass die Frage, ob und inwieweit Schäden durch Amalgamfüllungen überhaupt auftreten können, zur Zeit in der Wissenschaft sehr konträr diskutiert wird und sich vorerst noch kein übereinstimmendes Urteil zwischen den Fachleuten abzeichnet. Grundsätzlich dürften aber eine gesunde Ernährung, z.B. mit Vollwertkost sowie eine intensive Mundhygiene zur Prophylaxe der Zahnkaries die beste „Vorbeugung“ zur Vermeidung von Amalgamfüllungen darstellen.

Wie bei allen chronisch toxischen Belastungen ist bei der Therapie auch die Zufuhr von essentiellen Nahrungsstoffen von großer Bedeutung. Hierzu gehören die essentiellen Aminosäuren (Valin, Leucin, Isoleucin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin, Threonin), die essentiellen Fettsäuren (höher ungesättigte Fettsäuren wie Linol- und Linolensäure), Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.

Besonders die essentiellen Spurenelemente (Selen, Zink, Molybdän, Mangan, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Silizium, Vanadium, Jod und Fluor), die im Körper nur in sehr geringen Mengen vorkommen, deren Fehlen aber zu Störungen biochemischer Abläufe führt, müssen in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen (Literatur: „Documenta Geigy, Wissenschaftliche Tabellen“, 7. Auflage [1977], Geigy Pharmazeutika, Wehr/Baden).

Ein Mangel an Spurenelementen kann sich äußern in Geruchs- und Geschmacksstörungen, neurologischen Störungen, Nachtblindheit, Adynamie, Immunschwäche, verringerter Belastbarkeit gegenüber toxischen Elementen, Peroxiden und Sauerstoffradikalen.

Amalgam ist eine Legierung, die in der Regel zu 53% aus Quecksilber, ca. 20% Silber, ca. 16% Zinn und 10% Kupfer besteht.

Die Giftigkeit des Quecksilbers beruht vor allem auf seiner Wirkung als Zellgift. Das Schwermetall bindet die Sulfhydryl-Gruppen der Proteine und blockiert somit verschiedene lebenswichtige Enzymsysteme.

Unser gegenwärtiges Wissen über die Kinetik und die toxischen Effekte von Hg und Methyl-Hg reicht aus, um bereits heute für eine Minimierung der Quecksilberbelastung einzutreten.

Quecksilber ist ein Zell- und Protoplasmagift und wird in Leber, Nieren, Milz sowie im Gehirn gespeichert und extrem langsam wieder ausgeschieden (normaler Hg-Spiegel im Harn 0,5 - 5 Mikrogramm/Tag). Insbesondere die lange Halbwertzeit von Quecksilber im Gehirn von etwa 18 Jahren lässt die Aussage zu, dass einmal in das Gehirn gelangtes Quecksilber dieses Organ zu Lebzeiten kaum wieder verlässt.

Die akute Quecksilbervergiftung zeigt sich in Speichelfluss, Stomatitis, Gastroenteritis, ulzeröser hämorrhagischer Kolitis mit Erbrechen, Koliken und Diarrhöen, Nephritis mit Anurie und Urämie.

Die chronische Quecksilbervergiftung bringt Symptome mit sich wie Mattigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Speichelfluss, Stomatitis, Albuminurie, zentralnervöse Symptome wie Stimmungslabilität, Angst, Erregung, Muskelzucken, Seh-, Hör-, Sprach- und Gangstörungen, Merkschwäche, Persönlichkeitsabbau sowie sensible, distal betonte, symmetrische Polyneuropathien (Parästhesien, Analgesien) (Literatur: „Handlexikon der Medizin“, Autor: G. Thiele, Verlag Urban & Schwarzenberg, München – Wien – Baltimore).

Auch auf die Gefahr einer Immunsuppression, hervorgerufen durch die Mobilisierung von Quecksilber aus Amalgamfüllungen, ist hinzuweisen. Durch die mechanische Belastung beim Kauvorgang und durch das Einwirken von Säuren aus der Nahrung unterliegen Dental-Amalgame einer ständigen Korrosion. Dabei gelangt kontinuierlich freigesetztes Quecksilber in den Organismus, wo es besonders die zelluläre Immunität negativ beeinflusst.

Bereits wenige Minuten nach Quecksilber-Mobilisierung durch 20-minütiges Kaugummi-Kauen oder schluckweises Trinken von heißem Zitronensaft kommt es zu einer Reaktion des Immunsystems, wobei die Aktivität der T-Lymphozyten, der T-Helferzellen und der natürlichen Killerzellen signifikant abnimmt.

Quecksilber und seine Komponenten sind in der Lage, das System der Energieleitbahnen (Meridiane, Energiegefäße nach Voll) in Unordnung zu bringen. Vom Standpunkt ganzheitlichen, kybernetischen Denkens können von den metallischen Komponenten des Amalgams Informationsimpulse feinster Art ausgehen, welche die Energieleitbahnen nach Voll beeinträchtigen.

Wenn durch ein regulationsdiagnostisches Verfahren wie die Elektroakupunktur nach Voll das Amalgam oder dessen Komponenten als Regelkreisstörungen erkannt worden sind, sollten in der ersten Therapiephase in größeren zeitlichen Abständen alle Amalgamfüllungen entfernt werden. Danach muss sich eine Ausleitungs- und Regulationstherapie besonders mit biologischen Therapeutika anschließen, um die im Gewebe deponierten Metalle zu entfernen.

Die Ausleitungstherapie kann in einfachen Fällen mittels homöopathischer Komplex- oder Einzelmittel erfolgen. Schwer gestörte Patienten bedürfen einer Regulationstherapie mittels getesteter homöopathischer und isopathischer Medikamente, unter Umständen ist in schweren Fällen zusätzlich eine parenterale Gabe von schwermetallbindenden Antidoten wie DMPS (Dimaval) angezeigt.

Erste Erfahrungen mit Heel-Präparaten bei Amalgamschäden liegen vor für Lymphomyosot N (Tropfen), das wegen seiner ausgeprägten Matrixentschlackenden und kanalisierenden Wirkung eine Ausscheidung eventuell resorbierten Quecksilbers fördert.
Als Dosierung empfehlen wir 3 mal täglich 15-20 Tropfen Lymphomyosot N.

Mehrere der Injeel-Präparate (z.B. Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel u.a.) enthalten potenziertes Quecksilber als Potenzenaccord und können im Sinne eines homöopathischen Similes zu diesem Zweck eingesetzt werden.

Weitere Entgiftungsmittel aus dem Präparateprogramm, die neben Lymphomyosot N bei allen zellulären Phasen zur Anwendung kommen sollten, sind Galium-Heel N (Ampullen in Form der Trinkampullen-Medikation) sowie Nux vomica-Homaccord. Ihre Dosierung beträgt in der Regel jeweils 3 mal täglich 20 Tropfen.

Als Schutz wichtiger Zellorganellen (z.B. der Mitochondrien) gegen freie Radikale (besonders Sauerstoff-Radikale) sollte auch eine Selentherapie in Verbindung mit Antioxidantien wie Vitamin E in den Therapieplan einbezogen werden.

Auf dem III. Stuttgarter Mineralstoff-Symposium 1990 machte Herr Dr. med. W. Köstler, Universitäts-Lektor aus Wien, folgende Vorschläge für Amalgamträger:

Lassen Sie sich nur jeweils eine Amalgamfüllung im Abstand von drei Wochen entfernen. Dadurch werden Spitzenwerte in der Quecksilberbelastung vermieden und die vorhandenen Entgiftungsmechanismen nicht überfordert.

Nehmen Sie während der Entfernungsphase ständig Selen zu sich, damit Sie genügend bioverfügbares Selen besitzen, das sowohl für die Quecksilberentfernung als auch für den allgemeinen Oxidationsschutz benötigt wird.

Lassen Sie sich nach der Entfernung des Amalgams keine anderen Metalle in die Zahndefekte einbringen. Verwenden Sie Steinzement zur zwischenzeitlichen Füllung der Kavitäten.

Lassen Sie nach der Entfernung des Amalgams die Blutspiegel der Spurenelemente Selen, Kupfer und Zink bestimmen und füllen Sie eventuell vorhandene Mangelzustände wieder auf. Für die Selenzufuhr eignen sich vor allem die beiden Präparate Selenase (Trinkampullen) und Selenminerase (Tabletten).

Lassen Sie in regelmäßigen Abständen nach der Amalgamentfernung das Verhältnis der immunkompetenten Zellen zueinander kontrollieren.

11 Mikrobiologische Therapie: Ein Therapiekonzept zur Immunmodulation

11.1 Grundlagen

• IMMUNOLOGISCHE ASPEKTE

Die Grundlage immunmodulatorischer Therapieansätze ist das Immunsystem, von dem wir heute wissen, dass es sehr viel komplexer aufgebaut ist als ursprünglich angenommen (3, 8). Das Immunsystem vermittelt nicht nur „Immunität“, d.h. Schutz vor Ansteckungen, sondern dient der Erledigung zahlreicher weiterer Aufgaben in Vernetzung mit der Mikroflora, den Schleimhäuten, dem Stoffwechsel, dem Nervensystem und dem Hormonsystem. Aus phylogenetischer Sicht ist der Darm als die Wiege des Immunsystems anzusehen. Die Haut und insbesondere die Schleimhäute im Verdauungstrakt sind die unmittelbaren Grenzflächen zu unserer Umwelt, so dass es durchaus logisch erscheint, dass diesen Grenzflächen eine besondere immunologische Bedeutung zukommt. Erst in den letzten Jahren haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass etwa 85% des Immunsystems den Mukosa des menschlichen Körpers zugeordnet sind. In der Ontogenese sind die morphologischen Grundlagen dieses relativ autonomen Systems die aus dem Entoderm hervorgehenden Organe. Zuerst wurde begriffen, dass es ein eigenständiges darmassoziiertes Lymphgewebe gibt (GALT). Der jüngste Stand der Erkenntnisse ist, dass allen Schleimhäuten das Mukosa-Immunsystem, das die unterschiedlichen Organe miteinander vernetzt (1, 2, 13), gemeinsam ist. Die im Mukosa-Immunsystem repräsentierten Grenzflächen haben eine außerordentlich große Ausdehnung, z.B.: 400 m^2 Dünn- und Dickdarm, 80 m^2 Lunge, 2,5 m^2 Haut. Ein Großteil dieser Schleimhäute ist normalerweise von Mikroorganismen besiedelt (1, 15, 16).

• MIKROBIOLOGISCHE ASPEKTE

Der Mensch ist mit einer ungeheuren Vielfalt und Vielzahl an Mikroorganismen kolonisiert. In verschiedenen Habitaten siedeln verschieden zusammengesetzte Mikrobengesellschaften in unterschiedlichen Populationsdichten. Alleine in Dünndarm und Dickdarm siedeln etwa 300 bis 500 verschiedene Mikrobenarten, die man in 17 Familien und 47 Genera einteilen kann.

Durch intensive Studien mit keimfreien Tieren hat man sehr viel über die Bedeutung der Mikroflora erfahren, vor allem in Hinsicht auf die Struktur und Funktion des Immunsystems. Bei keimfreien Tieren sind 85% des Immunsystems, nämlich das Mukosa-Immunsystem, überhaupt nicht ausgebildet. Die Anzahl von Granulozyten ist wesentlich erniedrigt und die Funktion dieser Granulozyten eingeschränkt. Durch Beimpfen von keimfreien Tieren mit unterschiedlichen Mikroorganismen hat man Beziehungen zwischen den Mikroben studieren können und festgestellt, dass sich die komplexen Mikrobengesellschaften in Gleichgewichten stabilisieren, die von außen eindringenden Mikroben bei dem Versuch der Kolonisierung Widerstand entgegensetzen. Diesen Widerstand bezeichnet man als Kolonisationsresistenz.

Die normale Mikroflora ist daher für Struktur und Funktion des Mukosa-Immunsystems und des Immunsystems von entscheidender Bedeutung. Darüberhinaus vermittelt die normale Mikroflora aus sich heraus auch einen gewissen Schutz gegenüber krankheitserregenden Eindringlingen. Die Mikroflora ist daher für Gesundheit und Krankheit ein ganz entscheidender Faktor. In der Anordnung der Abwehreinrichtungen in den meisten Mukosa imponiert die normale Mikroflora als eine der ersten Abwehrbarrieren (1, 15, 16).

• SYMBIOSE

Der Begriff „Symbiose“ wurde 1879 von Anton Heinrich de Bary definiert: „Die Symbiose ist das fortwährende und innige Zusammenleben ungleichnamiger Organismen“. Die Definition der Symbiose umgreift eine Vielzahl von Lebensgemeinschaften, Parasitismus, Neutralismus, Kommensalismus und Mutualismus eingeschlossen (12). Gregory äußerte schon 1951: „Der Wert des Konzepts liegt in der Ausweitung des Konzepts Organismus als strukturelle Einheit auf den Einschluss heterogener Systeme mit dem Resultat einer funktionellen Einheit oder eines funktionellen Feldes“ (siehe 10).

Dieses Konzept wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe auf die Betrachtung von Mikroflora-Populationen im Digestionstrakt übertragen (10). Ganz im Sinne von de Bary werden der Mensch und die Mikroben als eine symbiontische Lebensgemeinschaft begriffen. Die „normale“ Mikroflora des Menschen enthält auch opportunistische Krankheitserreger, mit welchen der Mensch fortwährend und innig zusammenlebt, die normalerweise unter Kontrolle neutraler, kommensaler und mutualistischer Mikroorganismen stehen und daher ihre krankheitserregenden Eigenschaften nicht entfalten können (10).

• PROBIOTIKA

Der Begriff „Probiotikum“ war bisher nur sehr diffus definiert und beinhaltete sehr unterschiedliche Vorstellungen. Im Rahmen eines im Juni 1994 durchgeführten Seminars zum Thema „Probiotika“: Aussichten der Anwendung bei opportunistischen Infektionen erarbeitete ein internationales Expertenteam die folgende Definition: Ein „Probiotikum“ ist eine mikrobielle Präparation, die lebende und/oder abgetötete Mikroben einschließlich Bestandteilen und Stoffwechselprodukten enthält. Probiotika können als Lebensmittelzusatz, als Prophylaktikum oder als Therapeutikum eingesetzt werden (17).

11.2 Mikrobiologische Therapie

• DEFINITION

Die Mikrobiologische Therapie ist definiert als die orale und parenterale Anwendung von verschiedenen lebenden und/oder abgetöteten Mikroben und/oder deren Bestandteilen zu therapeutischen Zwecken. Die wesentlichen Elemente der Mikrobiologischen Therapie sind mikrobielle Präparate und Autovakzine. In der Roten Liste sind etwa 35 mikrobielle Präparate aufgeführt (6). Trotz der enormen Artenvielfalt symbiontischer Mikroben sind im Wesentlichen nur vier Arten Grundlage der meisten Präparate: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Bifidobacterium bifidum und Lactobacillus acidophilus. An Nicht-Symbionten kommt Saccharomyces boulardii zum Einsatz.

• WIRKUNGSWEISE

Die Mikrobiologische Therapie mit mikrobiellen Präparaten und Autovakzinen (4) ist ein wissenschaftlich begründetes Therapieverfahren (6, 11). Die ursprünglich aus Erfahrungsgut resultierende, aus konventioneller Sicht unbegreifliche Behandlung der unterschiedlichsten Erkrankungen, von akuten und chronischen Entzündungen im HNO-Bereich, im Respirationstrakt, im gastrointestinalen Gebiet, im Urogenitaltrakt, bis zu Allergien und anderen reichend, gewinnt in jüngsten immunologischen Erkenntnissen ihr Verständnis. Die Freisetzung der Zytokine Interleukin-1ß, IL-6 und Interferon-g wird direkt und dosisabhängig stimuliert. Die orale Applikation mikrobieller Präparate aktiviert ruhende B-Zellen, die im Sinne einer Kaskadenreaktion proliferieren, was zu einer Erhöhung der IgA-Synthese führt. Die Stimulation der Aktivitäten des Mukosa-Immunsystems ist durch eine Erhöhung sekretorischen IgAs im Speichel belegt (7, 9, 11, 14, 17).

In das komplexe Räderwerk aus Mukosa-Immunsystem, Immunsystem, Nervensystem, Stoffwechsel und Hormonsystem wird mit unterschiedlichen immunologischen Signalen effektvoll eingegriffen. Damit erfährt die über vierzigjährige, sorgfältige ärztliche Erfahrung in der Therapie mit mikrobiellen Präparaten und Autovakzinen eine eindrucksvolle Bestätigung.

• INDIKATIONEN

Durch kontrollierte klinische Prüfungen gesicherte Indikationen sind: Immunmodulation, Erkältungskrankheiten, chronisch rezidivierende Infektionen der Luftwege, chronische Sinusitis, Entzündungen im Mund-, Nasen-, Rachenraum und Mittelohr, gastrointestinale Störungen, Colon irritabile und Harnwegsinfektionen. Aus Erfahrungsgut resultieren weitere Indikationen: Gastroenteritis, Enterocolitis, postantibiotische Colitis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Hepatopathien, Cholecystopathien, Hauterkrankungen, allergische Erkrankungen und Mykosen. Diese Indikationen sind zurzeit Gegenstand weiterer klinischer Studien. Alle diese Indikationen betreffen das aus dem Entoderm gebildete Mukosa-Immunsystem. Das breite Spektrum der Indikationen findet im Mukosa-Immunsystem als Substrat seine Erklärung (2, 13).

- **KOMBINATIONSTHERAPIE**

Im Sinne ganzheitlicher Behandlungsweisen wird die Mikrobiologische Therapie in der Praxis erfolgreich mit der antihomotoxischen Therapie und der Ernährungstherapie kombiniert.

- **ANTIHOMOTOXISCHE THERAPIE**

Zu einer erfolgreichen Mikrobiologischen Therapie sollte immer eine antihomotoxische Behandlung gehören, denn eine normale funktionsfähige Flora kann nur auf einem physiologischen Milieu gedeihen. Umweltbelastungen, fehlerhafte Ernährung, aber auch allopathische Medizin (wie z.B. häufige Antibiotikagaben) führen gerade bei chronisch kranken Patienten zu schwerwiegenden Milieuveränderungen, die mit Hilfe der antihomotoxischen Medizin behandelt werden.

Der erste Schritt in der Therapie dieser chronischen Erkrankungen ist dabei die Durchführung einer Entgiftungstherapie. Das Basismittel zur Mikrobiologischen Therapie ist Nux vomica-Homaccord. Dieses homöopathische Kombinationspräparat führt zu einer Funktionsverbesserung im Bereich des Magen-Darm-Traktes.

Das zweite ebenso wichtige Präparat zur Entgiftungstherapie ist Lymphomyosot N. Es hat eine die Lymphe mobilisierende matrixentschlackende Wirkung.

Zur Anregung der entgiftenden Lebertätigkeit verwendet man Hepar comp. Heel und zur Förderung der Nierenausscheidung Solidago comp. Heel.

Diese Behandlung unterstützt man durch eine gesteigerte Flüssigkeitszufuhr, am besten in Form von mineralarmen Wässern, Obst- und Gemüsesäften. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist auch zum Angehen der Mikrobiologischen Therapie unbedingt erforderlich.
Die notwendige normale Trinkmenge beträgt bei der Frau 2 Liter, beim Mann 3 Liter pro Tag. Bei einer Entgiftungstherapie kann diese Menge auf 4 bis 5 Liter pro Tag gesteigert werden (Cave: Herz- und Nierenerkrankungen).

Zur Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen verschiedenster Art und Lokalisation verwendet man das Präparat Mucosa compositum, bei Erkrankungen der Haut Cutis compositum N.

Bei allen entzündlichen Erkrankungen, so auch im Magen-Darmbereich, hat sich Traumeel S bewährt.

Zur Behandlung von spastischen Zuständen verwendet man Spascupreel (S), bei Übelkeit und Brechreiz verschiedener Genese Vomitusheel (S).

Es gibt noch zahlreiche andere homöopathische Komplexmittel (wie z.B. Duodenoheel, Gastricumeel, Hepeel N etc.) sowie die gesamte Palette der homöopathischen Einzelmittel, die sich im Rahmen einer Mikrobiologischen Therapie zur Immunmodulation einsetzen lassen.
Durchstandene Infektionskrankheiten können gerade im Magen- und Darmbereich zu chronischen Krankheitssymptomen führen. Eine gezielte Nosodentherapie ermöglicht in diesen Fällen eine kausale naturheilkundliche Therapie.

- **ERNÄHRUNGSTHERAPIE**

Die Lebensweise eines Patienten ist von entscheidender Bedeutung für die langfristige Sicherung des Erfolgs therapeutischer Maßnahmen. Im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie sollten vor allem auch ernährungstherapeutische Hinweise gegeben werden (5).

11.3 Literatur

(1) Berg Rodney D., Waaij van der, Dirk, Heidt Peter J., and Rusch Volker C., Interactions Between the Indigenous Microflora and the Host Immune System. Old Herborn University Seminar Monograph 2. Institute for Microecology, Herborn-Dill (1988).

(2) Castro Gilbert A., Gut Immunophysiology: Regulatory Pathways Within a Common Mucosal Immune System. NIPS 4, 59-64 (1989).

(3) Gemsa Diethard, Kalden Joachim Robert, und Resch Klaus (Herausgeber), Immunologie. Grundlagen – Klinik – Praxis. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York (1991).

(4) Institut für Mikroökologie, Kornmarkt 34, 35745 Herborn-Dill.

(5) Koerber von, Karl, Männle Thomas, und Leitzmann Claus, Vollwert-Ernährung. Konzeption einer zeitgemäßen Ernährungsweise. 7. Auflage. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg (1993).

(6) Kolb Hans, und Maaß Christian, Kompendium der Mikrobiologischen Therapie. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg (1991).

(7) Ottendorfer D., Immunologische Untersuchungen zum Wirkungsnachweis eines bakteriellen Immunmodulators nach oraler Applikation an Minischweinen. Veröffentlichung in Vorbereitung (1994).

(8) Roitt Ivan M., Borstoff Jonathan, and Male David K. (editors), Immunology. Gower Medical Publishing, London, New York (1989).

(9) Rosenkranz W., und Grundmann E., Immunmodulatorische Wirkung lebender nicht-pathogener Enterococcus faecalis-Bakterien des Menschen. Arzneimittelforschung 44(I), 5, 691-695 (1994).

(10) Rusch Volker C., Das Konzept Symbiose: Eine Übersicht über die Terminologie zur Beschreibung von Lebensgemeinchaften ungleichnamiger Organismen. Mikroökologie und Therapie 19, 33-59 (1989).

(11) Rusch Volker C., Mikrobiologische Therapie: Ein wissenschaftlich begründetes Konzept zur Immunmodulation. Erfahrungsheilkunde (1994).

(12) Schlegel Hans G., Allgemeine Mikrobiologie. 6. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart (1985).

(13) Stern Martin, Immunphysiologie des Magen-Darm-Traktes. Symposium, Harvard Medical School, August 1991. Deutsches Ärzteblatt 89 (7), 326-328 (1992).

(14) Tarkkanen P., In-vitro-Untersuchungen mit Lymphozytenkulturen zum Vergleich verschiedener mikrobieller Präparate und Autovakzine. Veröffentlichung in Vorbereitung (1994).

(15) Waaij van der, Dirk, Heidt Peter J., Rusch Volker C., and Gebbers Jan-Olaf, Microbial Ecology of the Human Digestive Tract. Old Herborn University Seminar Monograph 1.Institute for Microecology, Herborn-Dill (1990).

(16) Roitt J. M. et al., Kurzes Lehrbuch der Immunologie, 2. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1993.

(17) Mayr A., Entwicklung, Aufbau und Funktion der körpereigenen Abwehr unter besonderer Berücksichtigung des Immunsystems. In: Zilch M. J. (Hrsg.), Immunologie im Spannungsfeld individueller Disposition und Exposition. Forum Medizin Verlagsgesellschaft, Gräfelfing 1992, pp. 21-34.

12 Allgemeine Regeln zum praktischen Vorgehen beim therapeutischen Einsatz der Heel-Präparate

Die im Therapeutischen Index aufgeführten Präparate wurden aufgrund der Erfahrung zahlreicher Therapeuten aller Fachrichtungen inklusive Kliniker und Zahnärzte, die sich seit vielen Jahren mit der homöopathisch/antihomotoxischen Behandlungsmethode befassen, zusammengestellt. Weiterhin wurden auch die Ergebnisse der in neuerer Zeit durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchungen (z.B. Anwendungsbeobachtungen, „medical trials“, klinische Prüfungen usw.) bei der Erstellung der Therapievorschläge mit verwertet.

Grundsätzlich können die meisten Präparate, je nach Art der zu behandelnden Erkrankung, auf zweierlei Weise eingesetzt werden:

1. zur Akutbehandlung bei plötzlich auftretenden Erkrankungen oder Beschwerden,
2. zur Langzeitbehandlung bei chronischen Krankheitszuständen.

Bei der Akutbehandlung sind häufige Gaben des entsprechenden Präparates angezeigt, in der Regel alle 15 Minuten 1 Tablette oder 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden als initiale Stoßtherapie).

Injektabilia werden bei akuten Zuständen anfangs täglich appliziert. Als allgemeine Regel gilt, dass die angezeigten Präparate umso häufiger verabreicht werden sollten, je heftiger und akuter die Beschwerden auftreten. Nach Besserung sollte die Zahl der Arzneigaben allmählich reduziert werden.

Bei der Langzeitbehandlung chronischer Krankheitszustände werden die oral zu verabreichenden Präparate in der Regel in einer Dosierung von 3 mal täglich 10 Tropfen bzw. 3 mal täglich 1 Tablette eingenommen (Tabletten langsam im Mund zergehenlassen), Injektionslösungen werden 2-1 mal wöchentlich appliziert. Diese Dosierungen sind auch für die Nachbehandlung akuter Erkrankungen zu empfehlen.

Zu betonen ist, dass die Hinweise zur Dosierung der einzelnen Präparate lediglich Richtlinien darstellen, die dem in der homöopathisch/antihomotoxischen Therapie noch weniger erfahrenen Therapeuten eine Hilfestellung geben sollen, wie die Präparate zweckmäßigerweise dosiert werden. Mit zunehmender Erfahrung gehen die meisten Therapeuten dazu über, weitestgehend bei jedem Patienten individuell zu dosieren, wobei dann nicht nur die Schwere des jeweiligen Krankheitsverlaufes, sondern auch konstitutionelle Gegebenheiten und die individuelle Reaktionslage des Patienten mit in die Überlegungen zur Dosiswahl und/oder Applikationshäufigkeit einbezogen werden.

12.1 Dosierung bei Säuglingen und Kleinkindern

Grundsätzlich kann die Dosierung homöopathischer Arzneimittel bei Säuglingen und Kleinkindern (ebenso wie bei Erwachsenen) individuell gehandhabt werden. Aufgrund des zum Teil unterschiedlichen Ansprechens der einzelnen Patienten auf die Verabreichung dieser Präparate ist die Angabe starrer Dosierungsschemata nicht sinnvoll und würde auch den Erfahrungen der antihomotoxischen Therapie widersprechen.

Die Tropfenpräparate enthalten Alkohol, die Tablettenpräparate Milchzucker. Dies ist speziell bei der Kinderdosierung zu beachten.

Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.

Die Tabletten im Mund zergehen lassen. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann die entsprechende Einzeldosis auch mit etwas Flüssigkeit vermischt eingegeben werden.

Von den Ampullenpräparaten können Säuglinge und Kleinkinder die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung subkutan, intramuskulär, intrakutan gegebenenfalls intravenös als Einzeldosis injiziert bekommen.

Soweit bei den einzelnen Präparaten keine besonderen Angaben gemacht wurden, gilt die allgemeine Dosierung.

Grundschema:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Säuglinge* bis 12 Monate	1/3 der Einzeldosis bei Erwachsenen	4 mal tägl. 1/3 der Einzeldosis bei Erwachsenen
Kleinkinder bis 6 Jahre	1/2 der Einzeldosis bei Erwachsenen	6 mal tägl. 1/2 der Einzeldosis bei Erwachsenen
Schulkinder bis 12 Jahre	2/3 der Einzeldosis bei Erwachsenen	8 mal tägl. 2/3 der Einzeldosis bei Erwachsenen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Zäpfchenpräparate: Von dem Präparat Viburcol N Suppositorien erhalten Säuglinge (vom 1. Lebenstag an) bis zum Alter von 6 Monaten eine Dosis von bis zu 2 Zäpfchen täglich, ab 6 Monaten bis zu 3 Zäpfchen pro Tag. Von Vomitusheel S sollten ebenfalls bei Säuglingen bis zu ½ Jahr höchstens 2 Zäpfchen täglich verabreicht werden. Die mittlere Richtdosis von Spascupreel S Suppositorien beträgt bei Säuglingen bis ½ Jahr 2-3 mal täglich ½ Zäpfchen, bei Kindern ab 6 Monaten 2-3 mal täglich 1 Zäpfchen.

Anmerkung
*In Deutschland ist laut der Dosierungsempfehlung der Kommission D die Anwendung bei Säuglingen (0 - 12 Monate) nur nach Rücksprache mit dem Arzt möglich.

12.2 Auswahl der zu verordnenden Präparate

Bei der Auswahl der therapeutisch einzusetzenden Präparate sollte in der Regel folgendermaßen vorgegangen werden:

Sofern sich im therapeutischen Index oder im Präparateindex ein Arzneimittel finden lässt, dessen Indikation dem zu behandelnden Krankheitsbild exakt entspricht oder bei dem das homöopathische Arzneimittelbild des Inhaltsstoffes genau mit dem Symptomenbild des Patienten übereinstimmt, so sollte dieses Mittel vorrangig eingesetzt werden.

Bei vielfältigen Krankheitserscheinungen oder wenn sich kein exakt passendes Arzneimittel auf Anhieb ausfindig machen lässt, sollte man der Symptomatik entsprechend vorgehen und eventuell gleichzeitig mehrere Präparate gegen die verschiedenen vorliegenden Beschwerden einsetzen, z.B. gleichzeitig Mittel gegen Kopfschmerz, Herzbeschwerden, Venenstauung, Gelenkschmerzen usw.

Wenn Präparate in mehreren unterschiedlichen Darreichungsformen zur Verfügung stehen (z.B. Tropfen und Tabletten), so können diese von der therapeutischen Wirkung her in aller Regel als gleichwertig angesehen werden. Da die Tropfen laut HAB-Herstellungsregeln mit Alkohol-Wasser-Gemischen zubereitet sind, sollten diese jedoch nur mit gewisser Zurückhaltung bei solchen Patienten verordnet werden, bei denen die Zufuhr von geringen Alkoholmengen bereits zu Problemen führen könnte, wie z.B. bei Leber- und Alkoholkranken, und zwar insbesondere bei „trocken gewordenen“ Alkoholikern! Bei dieser Patientengruppe empfiehlt es sich, Ampullenpräparate zu verwenden. Andererseits sollten Tablettenpräparate bei der selten vorkommenden Laktoseintoleranz nur mit Vorbehalt gegeben werden.

Eine Diabetes mellitus-Erkrankung stellt keine Gegenanzeige für die Verabreichung der Tablettenpräparate dar. Bei schwereren Formen dieser Erkrankung, die einer streng kohlenhydratbilanzierten Diät bedürfen, sollten pro Tablette (à 300 mg) allerdings 0,025 BE (Broteinheit) angerechnet werden.

12.3 Spezielle Anwendung der Ampullenpräparate

Bei den zur Verfügung stehenden Ampullenpräparaten muss zwischen zwei Gruppen grundsätzlich unterschieden werden:

1. Kombinationspräparate (z.B. Composita, Homaccorde, Mischinjeele)
2. Einzelmittel-Injeele und Injeele forte sowie Einzelmittel in Einzelpotenzen

Die Ampullenpräparate der 1. Gruppe werden wie die Tropfen- und Tablettenpräparate weitestgehend indikationsbezogen eingesetzt. Von zahlreichen dieser Präparate stehen gleichzeitig auch orale Darreichungsformen zur Verfügung (u.a. Tropfenzubereitungen bei sämtlichen - 30 -Homaccorden). Die Frage, ob bei solchen Präparaten der Applikation der Injektionslösung oder der oralen Verabreichung der Vorzug zu geben ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Durch Auswertung der Therapieergebnisse bei großen Fallzahlen im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen konnte für einige Kombinationspräparate diese Frage in den letzten Jahren genauer untersucht werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Behandlungsresultate bei Applikation der Injektionslösung in der Regel etwas besser sind als bei Gabe der oralen Darreichungsform. Allerdings können aufgrund der unterschiedlichen Begleitumstände bei den dokumentierten Behandlungsfällen (z.B. unterschiedliche Beschwerdedauer, Zusatztherapien usw.), die vermutlich die Behandlungserfolge nicht unwesentlich mitbeeinflusst haben dürften, diese Ergebnisse noch nicht als gesichertes Wissen bezeichnet und auch nicht pauschal auf sämtliche Präparate übertragen werden.

Generell kann jedoch empfohlen werden, bei weniger schwer ausgeprägten Krankheitserscheinungen zunächst die oralen Darreichungsformen einzusetzen. Die Applikation der Ampullen kommt vor allem dann in Frage, wenn hochakute Verlaufsformen vorliegen oder wenn sich bei chronischen Krankheitsbildern durch Gabe der Tropfen- bzw. Tablettenpräparate kein ausreichender Behandlungserfolg erzielen lässt. Sehr empfehlenswert ist es auch, nach einer Injektion bzw. im Anschluss an eine Injektionsserie die entsprechende orale Darreichungsform anschließend über einen längeren Zeitraum zur Nachbehandlung zu verordnen. Bei Kindern oder sehr spritzenscheuen Patienten kann man die Ampullenpräparate auch trinken lassen. Hierzu werden die Ampullen in etwas zimmerwarmes Wasser gegeben und getrunken. (Ausnahme: Solidago comp. Heel).

12.4 Einsatzmöglichkeiten der Einzelmittel-Injeele

Die Ampullenpräparate der 2. Gruppe (Einzelmittel-Injeele und Injeele forte sowie Einzelmittel in Einzelpotenzen) unterscheiden sich von denjenigen der 1. Gruppe dadurch, dass jeweils nur ein Grundstoff in homöopathischer Zubereitung in dem Präparat enthalten ist. Bei den Injeelen bzw. Injeelen forte liegt dieser Wirkstoff in Form eines so genannten Potenzenaccordes vor, wobei neben der tiefsten Potenz auch höhere und höchste Potenzen des gleichen Grundstoffes in der Arzneilösung enthalten sind. Dadurch wird erfahrungsgemäß der therapeutische Effekt verbreitert, vertieft und nachhaltig verstärkt. Durch die in der Mischung enthaltenen Hochpotenzen werden auch etwa mögliche Erstverschlimmerungen abgedämpft.

Die Einzelmittel-Injeele und Injeele forte werden, soweit sie klassische Homöopathika als Wirkstoffe enthalten, weitestgehend nach den Arzneimittelbildern therapeutisch eingesetzt. Die beste Wirkung ist dabei in der Regel zu erzielen, wenn das Symptomenbild des Patienten mit dem Arzneimittelbild des verabreichten Homöopathikums möglichst exakt übereinstimmt. Es kann auch eine Mischung verschiedener Injeele verabreicht werden, wenn jedes einzelne Präparat mit seinem Arzneimittelbild zu den Symptomen des Patienten in irgendeiner Beziehung steht.

12.5 Wann sollten homöopathisierte Allopathika, intermediäre Katalysatoren, Nosoden und Suis-Organpräparate eingesetzt werden?

Gerade bei Patienten, deren Erkrankungen bereits mit chemischen Medikamenten behandelt wurden oder bei denen sogar der Verdacht besteht, dass arzneimittelbedingte Gesundheitsschäden vorliegen, empfiehlt es sich, neben den sonst indizierten Präparaten auch die homöopathisierten Allopathika therapeutisch einzusetzen. Diese Präparate, welche ebenso wie die klassischen Homöopathika als Injeele, als Injeele forte und z.T. auch als Einzelpotenzen zur Verfügung stehen, enthalten chemisch definierte Arzneimittel in homöopathisch potenzierter Form und werden wie die übrigen Homöopathika entsprechend der Ähnlichkeitsregel „Similia similibus curentur“ eingesetzt.

Die homöopathisierten Allopathika werden aus der Vorstellung heraus verordnet, dass der Organismus durch Verabreichung von Spurendosen derjenigen Pharmaka, die zur Behandlung früherer Erkrankungen eingesetzt wurden und dabei möglicherweise zu Arzneimittelschäden geführt haben könnten, dazu angeregt wird, diese Schäden wieder zu regenerieren. Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, exakt den gleichen chemischen Wirkstoff in homöopathischer Verdünnung zu verabreichen, der die Schädigung hervorgerufen hat, sondern es kann auch ein ähnlicher Wirkstoff zum Einsatz gelangen.

Die intermediären Katalysatoren, die ebenfalls als Injeele, als Injeele forte und z.T. auch als Einzelpotenzen zur Verfügung stehen, enthalten homöopathische Potenzen solcher Stoffe, die auch im normalen menschlichen Zell- oder Organstoffwechsel eine Rolle spielen. Durch die Verabreichung dieser Stoffe sollen feinste Reize gesetzt werden, um das Stoffwechselgeschehen zu aktivieren und blockierte Zell- und Enzymfunktionen wieder in Gang zu setzen. Die Anwendung der intermediären Katalysatoren kommt vor allem bei chronischen und degenerativen Erkrankungen in Betracht.

Die Nosoden sind nach einer homöopathischen Verfahrenstechnik hergestellte Zubereitungen aus pathologisch veränderten Organen oder Organteilen von Mensch oder Tier, ferner aus abgetöteten Kulturen von Mikroorganismen oder aus Zersetzungsprodukten tierischer Organe bzw. aus Körperflüssigkeiten, die Krankheitserreger oder Krankheitsprodukte enthalten. Auch Nosoden sind als Injeele und Injeele forte – und z.T. auch als Einzelpotenzen verfügbar. Die Nosoden können als „Heilmittel des Terrains“ bezeichnet werden. Sie entfalten keine direkten Wirkungen auf die Krankheitserreger, können aber die Abwehrlage des Organismus im Hinblick auf die endgültige Überwindung einer Infektion oder infektionsbedingten Schädigung verbessern. Die Nosoden werden in der Regel zur Nachbehandlung nach Abklingen des akuten Stadiums einer Infektion bzw. einer Infektionskrankheit eingesetzt, was einer Anwendung im Sinne der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit entspricht. Sie können aber auch im Sinne einer symptomatischen Ähnlichkeit verabreicht werden – d.h. z.B. nach den grundlegenden homöopathischen Regeln des Simillimums –, oder wenn bei einem Patienten ohne Nachweis einer stattgefundenen Krankheit lediglich Symptome bestehen, die denjenigen einer bestimmten Krankheit ähnlich sind.

Weiterhin sind auch die Suis-Organpräparate als Injeele und Injeele forte erhältlich. Suis-Organpräparate werden zur organspezifischen Stimulationstherapie eingesetzt. Besonders bei degenerativen Organschäden sowie bei Funktionsschwächen von Organen können die Suis-Organpräparate erfolgreich eingesetzt werden. In der Regel wird dabei zunächst eine Vorbehandlung mit den krankheitsspezifisch indizierten homöopathischen Kombinationspräparaten durchgeführt und anschließend das organbezogene Suis-Organpräparat – allein oder in Kombination mit den sonst erforderlichen homöopathischen Arzneimitteln – verabreicht. Gerade bei Mischungen von Suis-Organpräparaten mit anderen Homöopathika wurde oft beobachtet, dass die Organzubereitungen die übrigen homöopathischen Wirkstoffe wie auf einer Gleitschiene auf das betreffende Zielorgan hinzuleiten scheinen, wodurch eine verstärkte Wirkung zustandekommt.

12.6 Wann kommen höhere Potenzen (Injeele) und wann tiefere Potenzen (Injeele forte) zum Einsatz?

Die Einzelmittel-Injeele (einschließlich homöopathisierte Allopathika, Katalysatoren, Nosoden und Suis-Organpräparate) stehen manchmal in zwei Stärken, und zwar als Injeel und Injeel forte zur Verfügung.

Zu den Anwendungsmöglichkeiten dieser verschiedenen Stärken der Präparate ist Folgendes zu sagen: Wenn die individuelle Reaktionslage des Patienten nicht genau bekannt ist, empfiehlt es sich, zu Beginn der Behandlung die einfachen Injeele zu verabreichen, da hierdurch die vergleichsweise mildesten Reize gesetzt werden und heftige Erstreaktionen somit praktisch nicht zu befürchten sind. Bei chronischen Krankheiten ist es ohnehin ratsam, vorwiegend mit höheren Potenzen zu therapieren und nur bei nachweislich schlechtem Ansprechen auf tiefere Potenzstufen (Injeele forte bzw. Einzeltiefpotenzen) überzugehen. Bei sehr sensibel reagierenden Patienten können sich auch auf die normalen Injeele leichte Erstverschlimmerungen bemerkbar machen. In diesen Fällen sollte mit einer erneuten Arzneigabe so lange abgewartet werden, bis die Reaktionen abgeklungen sind. Bei akut auftretenden, heftigen Beschwerden können, sofern es sich nicht gerade um einen besonders sensibel reagierenden Patienten handelt, auch tiefere Potenzen (Injeele forte) gleich zu Beginn der Behandlung eingesetzt werden. Mit fortschreitender Besserung geht man dann zu den Injeelen über.

12.7 Wie werden die Injeele und Injeele forte appliziert?

Injeele, Injeele forte und Einzelpotenzen können sowohl intramuskulär, subkutan als auch intrakutan injiziert werden.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine intravenöse Injektion stets mit entsprechender Vorsicht und unter sorgfältiger Beobachtung des Patienten durchgeführt werden. Dies gilt besonders, wenn ein Mittel zum erstenmal appliziert wird, da eine allergische Reaktion auch bei den stark verdünnten Inhaltsstoffen der Homöopathika nie völlig ausgeschlossen werden kann. Die intravenöse Verabreichung eines Präparates kann bei akuten Beschwerden angezeigt sein, da durch diese Applikationsart mit dem vergleichsweise raschesten Wirkungseintritt zu rechnen ist. Im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen ließ sich für bestimmte Kombinationspräparate bereits zeigen, dass bei intravenöser Verabreichung besonders gute Therapieergebnisse festgestellt wurden. Es lagen hier bei i.v.-Applikation die therapeutischen Erfolgsquoten höher als bei i.m.-, s.c.- bzw. i.c.-Applikation des gleichen Präparates. Die subkutane Injektion zeigt, im Schmerzgebiet appliziert, oder wenn sie in einen Akupunkturpunkt verabreicht wird, vielfach sehr rasch in Erscheinung tretende Wirkungen, ansonsten ist sie mit der intramuskulären Injektion vergleichbar.

Die intrakutane Injektion ist bei Schmerzzuständen indiziert und zwar vor allem dann, wenn neurale Effekte erwünscht sind. Man setzt die Quaddeln segmental, neural, appliziert im Schmerzgebiet oder z.B. an den Ausgangsstellen der Interkostalnerven neben der Wirbelsäule links oder rechts entsprechend dem Segment, eventuell auch über den Wirbeln selbst. Es können hierbei sämtliche zur Behandlung des Krankheitsbildes indizierten Ampullenpräparate in einer Spritze gemischt und in mehreren großen Quaddeln entlang der Wirbelsäule (paravertebral) appliziert werden, vorzugsweise in Punkte des Blasenmeridians.

Von einigen Therapeuten werden die Ampullenpräparate mitunter auch zur oralen Einnahme verordnet. Dabei wird der Patient angewiesen, den Ampulleninhalt in einem Glas Wasser zu verdünnen und schluckweise zu trinken. Aufgrund dieses Verordnungsverhaltens mancher Therapeuten wird gelegentlich der Ausdruck „Trinkampullen“ gebraucht. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass besondere Trinkampullen, die sich von den üblichen Ampullen mit Injektionslösungen in der Form bzw. in der Handhabung unterscheiden, nicht zur Verfügung stehen.

12.8 Therapie bei besonderen Verlaufsformen

Gelegentlich kann es nach Verabreichung homöopathischer Arzneimittel zu einer leichten Erstverschlimmerung bzw. überschießenden Reaktion bzw. zu einer Heilkrise kommen, wie es ja auch aus der Balneologie (Badereaktion mit anfänglicher kurzfristiger Verschlimmerung der Beschwerden) bekannt ist. Diese Reaktion ist in der Regel als harmlos zu betrachten und klingt im Allgemeinen von selbst wieder ab. Es kann jedoch auch vorkommen, dass sich auf die Gabe homöopathischer Präparate ein neues Symptomenbild entwickelt, welches eine Umstellung der Medikation erforderlich macht. Manchmal ist in solchen Fällen die symptomatische Herausentwicklung eines typischen Arzneimittelbildes festzustellen. Es sollte dann das betreffende homöopathische Mittel als Injeel (gegebenenfalls als Injeel forte) verabreicht oder ein Kombinationspräparat gewählt werden, in welchem das betreffende Mittel als Einzelbestandteil enthalten ist.

Häufig ist im Rahmen der homöopathischen Behandlung ein verstärktes Ingangkommen von Ausscheidungsvorgängen zu beobachten. Dies kann sich z.B. in vermehrtem Abgang von Sekreten, gesteigerter Harnausscheidung usw. äußern. Solche Erscheinungen sind in der Regel als ein prognostisch günstiges Zeichen im Hinblick auf eine erfolgreiche Ausleitung krankheitsauslösender Stoffe (Homotoxine) zu werten. Auch wenn Ausscheidungsvorgänge einsetzen sollten, die in der Regel als pathologisch gewertet würden (z.B. Fluor albus, Aufbrechen von Fisteln o.ä.), kann dies dennoch ein Zeichen dafür sein, dass im Organismus Selbstheilungskräfte aktiviert wurden und der Körper über diese Ausscheidungswege bzw. über Ausweichphasen die für die Krankheit verantwortlichen Giftstoffe zu beseitigen versucht. Diese Ausweichphasen haben eine „Biologische Ventilfunktion“. Man sollte daher gründlich abwägen, ob eine Beeinflussung dieser Vorgänge durch unterdrückende Maßnahmen notwendig ist oder nicht. Das gleiche gilt auch für fieberhafte Reaktionen, die im Rahmen der homöopathischen Therapie gelegentlich auftreten können.

Sofern durch die bestehende Krankheit noch keine irreparablen Organschäden gesetzt wurden, lässt sich der Gesundheitszustand des Patienten durch eine richtig gewählte und ausreichend lange durchgeführte Therapie oft völlig wiederherstellen. Wieweit die Genesung bereits vorangeschritten ist, lässt sich häufig daran ablesen, welche Reaktionen auf die Verabreichung der indizierten Präparate noch zu beobachten sind. Deutliche Erstreaktionen nach Gabe der therapeutisch indizierten Präparate zeigen oft an, dass das bestehende Krankheitsbild noch einer längeren, intensiven Therapie bedarf; ist die Genesung dagegen schon weit fortgeschritten, so treten auch auf die forte-Zubereitungen der Injeele, Nosoden, Suis-Organpräparate usw. keine (oder höchstens rudimentäre) Reaktionen auf.

Bei irreversiblen degenerativen Veränderungen oder neoplastischen Entartungen von Organen oder Geweben ist auch durch eine homöopathische Stimulationstherapie keine endgültige Heilung mehr zu erwarten. Hier kann es aber dennoch sinnvoll sein, die entsprechend der Symptomatik indizierten Präparate zu verabreichen, weil dadurch Entgiftungssysteme des Organismus aktiviert und in die Lage versetzt werden, mit den aufgrund der Erkrankung anfallenden Giftstoffen (Homotoxinen) besser fertig zu werden. Auch hier macht sich die Ausleitung von Homotoxinen in Form von gesteigerten Ausscheidungsvorgängen bemerkbar. Parallel zum Einsetzen dieser Ausscheidungsvorgänge ist zumeist eine Besserung des Allgemeinbefindens des Patienten zu beobachten, was beides als ein Zeichen für ein gutes Ansprechen des Patienten auf die Präparate gewertet werden darf. Es empfiehlt sich daher, diejenigen Präparate, die eine günstige Wirkung erkennen ließen, über einen längeren Zeitraum zu verabreichen. Auch wenn dadurch keine Heilung des Grundleidens erzielt werden kann, so ist es doch häufig möglich, die den Organismus zusätzlich belastenden Krankheitsgifte weitestgehend auszuleiten und eine Verbesserung der Lebensqualität bei gleichzeitiger Verlangsamung des Krankheitsverlaufes zu erreichen.

13 Erstattungsfähigkeit von Heel-Präparaten in GKV und PKV

GKV

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) im Jahr 2004 wurden grundsätzlich nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen herausgenommen. Drei Ausnahmetatbestände wurden jedoch in das Gesetz (§ 34 SGB V) aufgenommen, bei denen eine Erstattung trotzdem möglich ist:

1. versicherte Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
2. versicherte Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
3. eine vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgelegte Liste von schwerwiegenden Erkrankungen, bei denen nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel als Therapiestandard gelten. Dabei ist der therapeutischen Vielfalt Rechnung zu tragen.

Die unter 3. genannte Liste wurde durch den G-BA in den Arzneimittelrichtlinien Abschnitt F Nr. 16.4 „Schwerwiegende Erkrankungen und Standardtherapeutika zu deren Behandlung sind…“ erstellt (Stand vom 02. Juni 2006):

NUR BEKANNTMACHUNGEN IM BUNDESANZEIGER SIND RECHTSVERBINDLICH

16.4.1

Abführmittel nur zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon, Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogene Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei phosphatbindender Medikation, bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminal-phase.

16.4.2

Acetylsalicylsäure (bis 300 mg/Dosiseinheit) als Thrombozyten-Aggregationshemmer in der Nachsorge von Herzinfarkt und Schlaganfall sowie nach arteriellen Eingriffen.

16.4.3

Acetylsalicylsäure und **Paracetamol** nur zur Behandlung schwerer und schwerster Schmerzen in Co-Medikation mit Opioiden.

16.4.4

Acidosetherapeutika nur zur Behandlung von dialysepflichtiger Nephropathie und chronischer Niereninsuffizienz sowie bei Neoblase.

16.4.5

Antihistaminika

- nur in Notfallsets zur Behandlung bei Bienen-, Wespen-, Hornissengift-Allergien
- nur zur Behandlung schwerer, rezidivierender Urticarien
- nur bei schwerwiegendem, anhaltendem Pruritus

16.4.6

Antimykotika nur zur Behandlung von Pilzinfektionen im Mund und Rachenraum

16.4.7

Antiseptika und **Gleitmittel** nur für Patienten mit Selbstkatheterisierung

16.4.8

Arzneistofffreie Injektions-/Infusions-, Träger und Elektrolytlösungen

16.4.9

Calciumverbindungen (mind. 300 mg Calcium-Ion/Dosiereinheit) und Vitamin D (freie oder fixe Kombination)

- nur zur Behandlung der manifesten Osteoporose
- nur zeitgleich zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer mindestens sechsmonatigen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 mg Prednisolonäquivalent bedürfen
- bei Bisphosphonat-Behandlung gemäß Angabe in der jeweiligen Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit

16.4.10

Calciumverbindungen als Monopräparate nur

- bei Pseudohypo- und Hypoparathyreodismus
- bei Bisphosphonat-Behandlung gemäß Angabe in der jeweiligen Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit

16.4.11

aufgehoben

16.4.12

Citrate nur zur Behandlung von Harnkonkrementen

16.4.13

E. coli Stamm Nissle 1917 nur zur Behandlung der Colitis ulcerosa in der Remissionsphase bei Unverträglichkeit von Mesalazin

16.4.14

Eisen-(II)-Verbindungen nur zur Behandlung von gesicherter Eisenmangelanämie

16.4.15

Flohsamenschalen nur zur unterstützenden Quellmittel-Behandlung bei Morbus Crohn, Kurzdarmsyndrom und HIV assoziierter Diarrhoen

16.4.16

Folsäure und **Folimate** nur bei Therapie mit Folsäureantagonisten sowie zur Palliativbehandlung des kolorektalen Karzinoms in Kombination mit Fluorouracil

16.4.17

Gingko-biloba-Blätterextrakt (Aceton-Wasser-Auszug, standardisiert) nur zur Behandlung der Demenz

16.4.18

Hypericum-perforatum-Extrakt (hydroalkoholischer Extrakt, mind. 300 mg pro Applikationsform) nur zur Behandlung mittelschwerer depressiver Episoden

16.4.19

Iodid nur zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen

16.4.20

Iod-Verbindungen nur zur Behandlung von Ulcera und Dekubitalgeschwüren

16.4.21

Kaliumverbindungen als Monopräparate nur zur Behandlung der Hypokaliaemie

16.4.22

Lactulose und **Lactitol** nur zur Senkung der enteralen Ammoniakresorption bei Leberversagen im Zusammenhang mit der hepatischen Enzephalopathie

16.4.23

Lösungen und **Emulsionen** zur parenteralen Ernährung einschließlich der notwendigen Vitamine und Spurenelemente

16.4.24

Magnesiumverbindungen, oral, nur bei angeborenen Magnesiumverlusterkrankungen

16.4.25

Magnesiumverbindungen, parenteral, nur zur Behandlung bei nachgewiesenem Magnesiummangel und zur Behandlung bei erhöhtem Eklampsierisiko

16.4.26

Metixenhydrochlorid nur zur Behandlung des Parkinson-Syndroms

16.4.27

Mistel-Präparate, parenteral, auf Mistellektin normiert, nur in der palliativen Therapie von malignen Tumoren zur Verbesserung der Lebensqualität

16.4.28

Niclosamid nur zur Behandlung von Bandwurmbefall

16.4.29

Nystatin nur zur Behandlung von Mykosen bei immunsupprimierten Patienten

16.4.30

Ornithinaspartat nur zur Behandlung des hepatischen (Prä-) Koma und der episodischen, hepatischen Enzephalopathie

16.4.31

Pankreasenzyme nur zur Behandlung chronischer, exokriner Pankreasinsuffizienz oder Mucoviszidose

16.4.32

Phosphatbinder nur zur Behandlung der Hyperphoshatämie bei chronischer Niereninsuffizienz und Dialyse

16.4.33

Phosphatverbindungen bei Hypophosphatämie, die durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann

16.4.34

Salicylsäurehaltige Zubereitungen in der Dermatotherapie als Teil der Behandlung der Psoriasis und Hyperkeratotischer Ekzeme

16.4.35

Synthetischer Speichel nur zur Behandlung krankheitsbedingter Mundtrockenheit bei onkologischen und Autoimmun-Erkrankungen

16.4.36

Synthetische Tränenflüssigkeit bei Autoimmun-Erkrankungen (Sjögren-Syndrom mit deutlichen Funktionsstörungen des Grades 2, Epidermolysis bullosa, occulärem Pemphigoid), Fehlen oder Schädigung der Tränendrüse, Fazialisparese oder bei Lagophthalmus

16.4.37

Vitamin K als Monopräparate nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem Vitaminmangel, der durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann

16.4.38

Wasserlösliche Vitamine auch in Kombinationen nur bei der Dialyse

16.4.39

Wasserlösliche Vitamine, Benfotiamin und Folsäure als Monopräparate nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem Vitaminmangel, der durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann (Folsäure: 5 mg/Dosiseinheit)

16.4.40

Zinkverbindungen als Monopräparat nur zur Behandlung der enteropathischen Akrodermatitis und durch Haemodialysebehandlung bedingten nachgewiesenen Zinkmangel sowie zur Hemmung der Kupferaufnahme bei Morbus Wilson

16.4.41

Arzneimittel zur sofortigen Anwendung

- **Antidote** bei akuten Vergiftungen
- **Lokalanästhetika** zur Injektion
- **Apothekenpflichtige nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel,** die im Rahmen der ärztlichen Behandlung zur sofortigen Anwendung in der Praxis verfügbar sein müssen, können verordnet werden, wenn entsprechende Vereinbarungen zwischen den Verbänden der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen getroffen werden

16.4.42

Topische Anästhetika und/oder **Antiseptika** nur zur Selbstbehandlung schwerwiegender generalisierter blasenbildender Hauterkrankungen (z.B. Epidermolysis bullosa, hereditaria; Pemphigus)

16.4.43

L-Methionin nur zur Vermeidung der Steinneubildung bei Phosphatsteinen bei neurogener Blasenlähmung, wenn Ernährungsempfehlungen und Blasenentleerungstraining erfolglos geblieben sind

16.4.44

Levocarnitin nur zur Behandlung bei endogenem Carnitinmangel

16.4.45

Butylscopolamin, parenteral, nur zur Behandlung in der Palliativmedizin

16.5

Für die in diesen Richtlinien im Abschnitt F aufgeführten Indikationsgebiete kann der Arzt bei schwerwiegenden Erkrankungen auch Arzneimittel der Anthroposophie und Homöopathie verordnen, sofern die Anwendung dieser Arzneimittel für diese Indikationsgebiete nach dem Erkenntnisstand als Therapiestandard in der jeweiligen Therapierichtung angezeigt ist. Der Arzt hat zur Begründung der Verordnung die zugrunde liegende Diagnose in der Patientendokumentation aufzuzeichnen.

16.6

Nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel, die begleitend zu einer medikamentösen Haupttherapie mit zugelassenen, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähigen Arzneimitteln eingesetzt werden (Begleitmedikation), sind verordnungsfähig, wenn das nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Fachinformation des Hauptarzneimittels als Begleitmedikation zwingend vorgeschrieben ist.

16.7

Nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel, die zur Behandlung der beim bestimmungsgemäßen Gebrauch eines zugelassenen, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähigen Arzneimittels auftretenden schädlichen unbeabsichtigten Reaktionen (unerwünschte Arzneimittelwirkungen; UAW) eingesetzt werden, sind verordnungsfähig, wenn die UAW schwerwiegend im Sinne der Nummer 16.2 sind.

16.8

Die Verordnung der Arzneimittel in den zugelassenen Fällen ist in der ärztlichen Dokumentation durch Angabe der entsprechenden Diagnose zu begründen.

16.9

…

16.10

Die Verpflichtung des Vertragsarztes zur wirtschaftlichen Verordnungsweise von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bleibt von diesen Regelungen unberührt. Der Vertragsarzt soll nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zu Lasten des Versicherten verordnen, wenn sie zur Behandlung einer Erkrankung medizinisch notwendig, zweckmäßig und ausreichend sind. In diesen Fällen kann die Verordnung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels unwirtschaftlich sein.

PKV

Der Leistungskatalog der privaten Krankenversicherungen basiert auf den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), die die Musterbedingungen des Verbandes der privaten Krankenversicherung und die Tarife umfasst.

Im Folgenden wird ein Auszug der wichtigsten Paragraphen der AVB wiedergegeben:

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

„… Versicherungsfall ist die medizinische notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen….“

§ 4 Umfang der Leistungspflicht

„… Arzneimittel …. müssen von den in Abs. 2 genannten Behandlern (redaktionelle Anmerkung: Behandler sind hier niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker) verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden …“

„… Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre…“

Rechtskräftige Urteile:

Gemäß den Urteilen des Bundesgerichtshofes (Aktenzeichen IV ZR 60/01 und 119/01) muss der Versicherungsnehmer (Patient)

„…darlegen und beweisen, dass die angewandten Methoden und Arzneimittel der alternativen Medizin sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben wie die der Schulmedizin. Seiner Darlegungspflicht kann er zunächst dadurch genügen, dass er eine Stellungnahme des behandelnden Arztes vorlegt. … Beweisen muss der Versicherungsnehmer im Streitfall nur …, dass nämlich die Heilbehandlung medizinisch notwendig war im Sinne von § 1 I (2) AVB…“

Gemäß dem Urteil des Bundesgerichtshofes (Aktenzeichen IV ZR 133/95) ist bei der Dokumentation der medizinischen Notwendigkeit folgendes zu beachten

„ …Bei der Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit einer Heilbehandlung können demgemäß auch solche medizinische Erkenntnisse berücksichtigt werden, die sich im Bereich der so genannten alternativen Medizin ergeben haben oder sich als das Ergebnis der Anwendung von so genannten „Außenseitermethoden“ darstellen … Von der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlung im Sinne der vorstehenden Ausführungen wird im Allgemeinen dann auszugehen sein, wenn eine Behandlungsmethode zur Verfügung steht und angewandt worden ist, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen, zu lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegenzuwirken (vgl. BGHZ 99, 228, 233 f.). Steht diese Eignung nach medizinischen Erkenntnissen fest, steht grundsätzlich auch die Eintrittspflicht des Versicherers fest…“

Empfehlungen

Hinsichtlich der Verordnung von homöopathischen Arzneimittel, insbesondere homöopathischen Injektabilita, müssen bei der Leistungsübernahme durch die private Krankenversicherung folgende Kriterien erfüllt werden:

1. Die Verordnung muss aufgrund einer medizinisch notwendigen Behandlung erfolgen.

2. Die medizinisch notwendige Behandlung muss dokumentiert und begründet werden.

3. Der Einsatz von homöopathischen Arzneimittel sollte sich aufgrund medizinischer Erkenntnisse in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben wie schulmedizinische Methoden.

Als medizinische Erkenntnisse kann man den publizierten therapeutischen Index der Internationalen Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie e.V. heranziehen. Diese Empfehlungen basieren auf jahrzehntelangen Erfahrungen von einer Vielzahl von Therapeuten im internationalen Raum, die sich in der Praxis Erfolg versprechend bewährt haben.

14 Einleitung zum Therapeutischen Index

Die antihomotoxische Therapie ist, wie die Homöotherapie, eine auf Arzneireizen basierende Stimulationstherapie. Die in den antihomotoxischen Präparaten enthaltenen homöopathischen Einzelbestandteile sind größtenteils aufgrund von Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen nach der Regel „Similia similibus curentur“ ausgewählt worden.

Mit den antihomotoxischen Präparaten ist eine Form der Therapie gegeben, mit der die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert und im Organismus abgelagerte Giftstoffe (Homotoxine) über die natürlichen Ausscheidungswege ausgeleitet werden können. Dadurch ist es häufig möglich, Funktionsschwächen von Organen zu regulieren, die Heilung akuter Erkrankungen zu beschleunigen und die Krankheitserscheinungen selbst bei chronischen und rezidivierenden Erkrankungen nachhaltig zu bessern.

Es sollte jedoch auch nicht gezögert werden, von den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Chemo-, Antibiotika- oder Substitutionstherapie Gebrauch zu machen, wenn die Selbstheilungskräfte des Organismus erschöpft sind, echte Gewebszerstörungen, bindegewebige Entartungen oder altersbedingte irreparable Prozesse vorliegen. Die antihomotoxischen Präparate sind dann allerdings eine sehr gute Ergänzung zu den oben genannten Behandlungsverfahren, um die letzte Möglichkeit des Organismus zur Eigenregulierung noch auszunutzen. Sofern fachärztliche Untersuchungen bzw. Kontrolluntersuchungen aufgrund des Krankheitsbildes angezeigt sind, müssen diese auch während der antihomotoxischen Behandlung regelmäßig durchgeführt werden.

Die im Therapeutischen Index unter den einzelnen Indikationen aufgeführten Präparate sollen Anregungen vermitteln, welche homöopathisch/antihomotoxischen Arzneimittel im konkreten Behandlungsfall sinnvoll eingesetzt werden können. Dabei ist jedoch zu betonen, dass für die Auswahl der individuell zu verordnenden Präparate oft die Kenntnis der klinischen Diagnose allein nicht ausreichend ist, sondern dass bei der Arzneiwahl auch andere Gesichtspunkte wie z.B. Schwere und Art der Symptome, Modalitäten, Besonderheiten des Krankheitsverlaufes sowie konstitutions-pathologische Gesichtspunkte und die jeweilige Reaktionslage des Patienten berücksichtigt werden müssen. Auch bioelektronische Arzneifindungsverfahren wie EAV, BFD, Vegatest usw. können dabei sehr hilfreich sein. Aufgrund der Vielschichtigkeit der meisten in der Praxis vorkommenden Krankheitsbilder ist häufig eine kombinierte Therapie erforderlich.

Die bei den einzelnen Diagnosen unter der Rubrik „Basistherapie“ aufgeführten Präparate stellen die Mittel der ersten Wahl für den jeweiligen Indikationsbereich dar und zwar stets unterteilt nach oraler und parenteraler Applikationsart, wobei bei sehr vielen Krankheitsbildern ausserdem noch auf die therapeutischen Möglichkeiten mittels einer lokalen und/oder Suppositorientherapie hingewiesen wird. Häufig führt die alleinige Verabreichung dieser Präparate bereits zum Ziel. Unter dem Oberbegriff „Symptomenbezogene Therapie“ werden verschiedene weitere therapeutische Möglichkeiten bzw. Alternativen aufgezeigt, wodurch zusätzliche Anregungen für die Gestaltung eines individuellen Therapieplanes vermittelt werden sollen. Des öfteren ist es auch erforderlich, dass aufgrund eines Wechsels der Symptome im Verlauf der Behandlung einzelne Präparate gegen andere ausgetauscht werden müssen.

Zusätzlich sind unter jeder Indikation noch weitere therapeutische Verfahren aufgeführt, die als begleitende Maßnahmen die antihomotoxische Behandlung sinnvoll unterstützen können. Erfahrungsgemäß lassen sich durch eine Kombination der antihomotoxischen Behandlungsmethode mit weiteren (z.B. physikalischen, diätetischen oder sonstigen) auf das Krankheitsbild abgestimmten Therapiemaßnahmen die besten Behandlungserfolge erzielen. Die bei den nachfolgenden Indikationen angegebenen Therapieschemata haben sich in der Praxis vielfach bewährt.

Weitere Anregungen zur Gestaltung eines individuellen Behandlungsplanes können dem Abschnitt „Allgemeine Regeln zum praktischen Vorgehen beim therapeutischen Einsatz der Präparate“ entnommen werden.

Die folgenden Therapievorschläge basieren auf den Empfehlungen der Ärzte der Internationalen Gesellschaft für Homotoxikologie e. V. und entbinden den einzelnen Therapeuten nicht davon, aufgrund eigener Anamnese und Untersuchungen ein eigenes, sorgfältig auf den jeweiligen Patienten abgestimmtes Therapiekonzept zu erstellen.

Die Antihomotoxische Therapie ist eine individuelle Therapie. Die Arzneimittel müssen nach den Krankheiten und den spezifischen Symptomen des Patienten gewählt werden. Neben dem Einsatz nach den offiziellen Anwendungsgebieten der Präparate spielen auch homöopathische Gesichtspunkte und individuelle Erfahrungen des jeweiligen Arztes eine Rolle.

Das Ansprechen auf die jeweilige Therapie kann - auch bei gleichen oder ähnlichen Krankheitserscheinungen - individuell oft recht unterschiedlich sein kann. Die Empfehlungen müssen deshalb dem einzelnen Patienten individuell angepasst werden.

15 Therapeutischer Index

Abszess

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Erysipel, Erysipeloid, Lyme-Borreliose (Erythema migrans, Lymphadenosis cutis benigna), Phlegmone, Neoplasma, Tbc („kalter" Abszess).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Vorzugsweise Injektionstherapie! Evtl. chirurgische Intervention, gezielte Antibiotikatherapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[Entzündungen und Verletzungen jeder Art]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [Entzündungen und Verletzungen jeder Art]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen und Verletzungen jeder Art]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [beginnende Abszedierung]
Hepar sulfuris [fördert Einschmelzung]
Staphisagria [bei chronischen/schleichenden Abszessen]
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleisch-, zucker- und kochsalzarme Kost, Reduktion der Gewürze
Physikalische Therapie: Je nach Stadium Wärme- oder Kälteanwendung; ggf. Saugglocke
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Umspritzung im Gesunden
Weitere Verfahren: Ozontherapie, Symbioselenkung bei chronisch rezidivierenden Abszessen

Abwehrschwäche

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache – Alter, Diabetes mellitus, Adipositas, Fehlernährung, chronische Stressbelastung, psychische Belastungen, Genussgifte, Umweltgifte, ionisierende Strahlen, „Anti-Mittel" wie Antipyretika, Chemotherapeutika, Kortisone, Immunsuppressiva, Folge von Infektionskrankheiten u.a. – abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Angin-Heel SD (Tabl.) [Angina tonsillaris; Tonsillarpfröpfe]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel, Karbunkel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte und zur Steigerung der körpereigenen Abwehr bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus; Neigung zur Infektanfälligkeit]
Pulsatilla compositum (Amp.) [Aktivierung der mesenchymalen Abwehr; Stimulierung der Abwehrsysteme]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ferrum phosphoricum forte [Fieber- u. Entzündungsmittel]
Ginseng [Schwächezustände]
Ipecacuanha [Übelkeit, Husten]
Lachesis S [Entzündung mit Sepsisneigung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ausreichende Vitamingaben, laktovegetabile Vollwerternährung
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Abhärtung, Sport, physikalische Therapie (z.B. Kneipp)
Allgemeintherapeutische Erfahrungen: Grippe-Cocktail: je 1 Ampulle Engystol, Gripp-Heel, Traumeel S i.m., s.c., i.v. (als Mischspritze)
Anmerkungen: **Engystol** besonders bei Virus-Infekten, **Echinacea compositum SN** besonders bei bakteriellen Infekten

Addison'sche Erkrankung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  In schweren Fällen wird man ohne Nebennierenhormone, speziell zur Überbrückung von Gefahrensituationen, nicht auskommen können. Alle Überlastungen, auch solche durch stark wirksame Therapeutika, sollten vermieden werden.
- **BASISTHERAPIE**
  Neben evtl. Hormontherapie

Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]

Parenterale Therapie:
China-Homaccord S
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Arsenicum album-Injeel
[Nephritis, Albuminurie, Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen, Verstimmungszustände]
Zwischenmedikation
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Reizzustände, petechiale Blutungen]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Symptomenbezogene Therapie
Galium-Heel N (Amp.) [Anregung der Entgiftung]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Besserung der Durchblutung und des Stoffwechsels]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Anregung der Entgiftung]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Anregung von Leber- und Nierenentgiftung]
Einzelmittel-Injeele
Arsenicum album S [Schwächemittel, Erschöpfung, Abmagerung]
Phosphorus S [Erschöpfung, Leberschäden (Parenchymmittel)]
Intermediäre Katalysatoren
Coenzyme compositum und **Ubichinon compositum**
[Regulierung der Fermentfunktionen]
Glyoxal compositum [bei Therapieresistenz]
Suis-Organpräparate-Injeele
Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
Ren suis [alle drei zusammen in öfteren Wiederholungen]

Adenoide Vegetationen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, juveniles Nasen-Rachen-Fibrom.

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus, Zerebralsklerose]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, z.B. auch bei Angina]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp., Nasentropfen)
[Sinusitiden, Rhinitiden, Tubenkatarrhe]
Naso-Heel SNT (Tropf.) [Rhinitis acuta und chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastöser lymphatisch/exsudativer Diathese; Drüsenaffektionen, „Hilusdrüsen-Kinder“]
Calcium phosphoricum [Konstitutions- und Schwächemittel]
Hydrastis [Schleimhautmittel; starke Absonderungen]
Sanguinaria [Schleimhautmittel für die oberen Luftwege]
Thuja S [Konstitutionsmittel; Antiproliferationsmittel]
Nosoden-Injeele:
Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Tonsilla suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: TLA, 3. Mandelpol
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Ozon

Adipositas

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung dieses multifaktoriellen Krankheitsbildes: u.a. exogene alimentäre Mastfettsucht, Bewegungsmangel, familiär-konstitutionelle Fettsucht sowie (Post)Pubertäts-Fettsucht und Maternitäts-Fettsucht (postpartale), endogene Fettsucht: cerebral, diencephal, dys- bzw. hypogenital, hypothyreotisch, klimakterisch, Diabetes mellitus.

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel forte NF (Tropf.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, ödematöse Schwellungen]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[zur Anregung der Nierenausscheidung]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der männlichen Organfunktionen, z.B. bei Dystrophia adiposo-genitalis]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus [Bindegewebsverschlackung mit Fettablagerung]
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel; pastös-lymphatische Pykniker]
Fucus vesiculosus [hypothyreotische Fettsucht]
Ignatia S [Depressionen, Melancholie, Folgen von Kummer: „Kummer-Speck“]
Lachesis S
[pastös-phlegmatische Konstitution mit ödematösen Zuständen, oft verbunden mit Obstipation und Hitzewallungen (Klimakterium)]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia.
Ernährung: Kalorienarme Diät
Physikalische Therapie: Bewegungstherapie, Sport, Hydrotherapie
Neuraltherapie: Tonsillen, Schilddrüse
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Psychotherapie, Gruppentherapie, Verhaltenstherapie

Adnexitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Zyste, Tumor, Appendizitis, Extrauteringravidität, Nephrolithiasis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist aszendierend, selten hämatogen bzw. lymphogen
  Cave: Akute Appendizitis!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Zustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch Adnexitis sowie Kolpitis, Fluor albus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen, Ödeme, Zystenbildung]
Lachesis S [bes. linksseitige Adnexaffektionen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia.
Physikalische Therapie: Wärmetherapie im chronischen Stadium, Kältetherapie bei (per)akuten Zuständen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Gynäkologischer Raum, Frankenhäuser-Raum mit
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: ggf. Psychotherapie

Akne

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen (u.a. Medikamente) und Arten der Akne; Ekzem, Follikulitis, Rosacea, Rhinophym.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Evtl. dermatologische Abklärung! Die Seborrhoe kann das Entstehen einer Akne begünstigen (Acne sebacea, Acné sébacée).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S
(Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Acne pustulosa und Acne conglobata]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [zur Langzeittherapie bei Narben und Keloiden (Aknekeloid, Acne conglobata)]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion, u.a. auch bei Dermatosen und Dermatitis]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [bei Leberschäden]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen, Pruritus]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der männlichen Organfunktionen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus [Seborrhoe; Akne vulgaris, Akne necroticans]
Ledum [Akne (conglobata), bes. an der Stirn]
Selenium [Acne conglobata]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel; chronische Hauterkrankungen]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus [Acne pustulosa und Acne conglobata],
Streptococcus haemolyticus
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis [Darmregulierung]
Cutis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Fluor-Zäpfchen S [Gesteigerte Absonderungen von Schleim und sonstigen Sekreten]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie mit Ozon
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Ernährung, weißmehlarme Kost, Reduktion von Zucker, Kaffee, Schokolade, Hühnereiweiß und sonstigen Allergenen
Physikalische Therapie: Lichttherapie (UVA)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Ganglion stellatum, subkutane Infiltration
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, EAP-Testung

Allergie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Allergieformen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]

Traumeel S (Salbe)
[Entzündungen] (nicht bei akuter allergischer Dermatitis)

Symptomenbezogene Therapie

Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Hirnfunktion]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Allergie sowie bei Akne vulgaris, Neurodermitis, Sklerodermie]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion, u.a. bei Dermatosen, Lupus erythematodes und Neurodermitis]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[exsudative/lymphatische Diathese]
Mucosa compositum (Amp.) [Schleimhauterkrankungen und -katarrhe verschiedener Art und Lokalisation]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel]

Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Medorrhinum

Homöopathisierte Allopathika Injeele:
Penicillin

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Histamin

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Mucosa nasalis suis

Fides:
Ureata (Salbe)

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie [desallergisierend,desensibilisierend, hyposensibilisierend]:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung:
Allergie-Diät-Schema mit Suchkost bzw. Eliminationsdiät

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, EAP-Testung

Alopezie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Iatrogene bzw. Medikamenten-Alopezie,
  Alopecia diffusa, Alopecia areata; endokrine Störungen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie

Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie

Cerebrum compositum NM (Amp.) [vegetative Steuerung; Haarausfall im Alter sowie bei Erschöpfungszuständen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der männlichen Drüsenfunktionen, z.B. bei Erschöpfungszuständen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Thallium sulfuricum [Alopecia areata und diffusa]
Thuja S [Konstitutionsmittel; bes. bei Neigung zur Chronizität sowie bei Fokaltoxikosen]

Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Placenta suis

Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]

Begleittherapie

Eigenbluttherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Mineralien- und vitaminreiche Kost

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Weitere Verfahren:
Symbioselenkung

Alzheimer Krankheit/ Senile Demenz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere degenerative Hirnerkrankungen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Behandlungsmöglichkeiten hängen entscheidend vom Behandlungsbeginn ab. Während im Früh- und Intermediärstadium die Aussichten durchaus erfolgversprechend sind, bleiben im Spätstadium alle Bemühungen erfolglos.

Basistherapie

Orale Therapie:

Adjuvant allgemein entgiftende Maßnahmen:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]

Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Coenzyme compositum Ampullen
Ubichinon compositum Ampullen
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Symptomenbezogene Therapie

Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Carbo compositum (Amp.)
[bei zerebralen Durchblutungsstörungen, auch nach Apoplexie]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.) [bei Erschöpfungszuständen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[zur Verbesserung der Konstitution bei Toxinbelastungen]
Nervoheel N (Tabl.)
[bei Erschöpfungszuständen mit nervösen Beschwerden]
Spigelon (Tabl., Tropf., Amp.)
[bei konstitutionellen Kopfschmerzen]

Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer aber auch psychischer Art]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen, Neurasthenie]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Kollapszuständen]
Vertigoheel (Tabl., Tropf., Amp.) [bei Schwindel]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele:
Ginseng [Schwächezustände]
Graphites [altersbedingte Erkrankungen]
Lachesis S [Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände]
Nosoden-Injeele:
Psorinum [Schwächezstände besonders nach schweren Krankheiten, Kopfschmerzen, Verstimmungszustände]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Geistige und körperliche Aktivierung
Lebensstilumstellung und Ernährungslenkung bilden die Basistherapie. Dazu kommt eine ausreichende Vitaminversorgung speziell mit B-Vitaminen. Kombinationspräparate mit Mineralien und Spurenelementen sind zu bevorzugen.

Amenorrhoe (sekundäre)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gravidität, Anorexie, Tumore
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung: neben organischen bzw. endokrinologischen auch nach psychischen Ursachen fahnden!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SNT (Tropf.)
[Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN
[Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Erschöpfungs- bzw. neurovegetative Amenorrhoe]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.)
[Adnexitis, Para-Endometritis, Dysmenorrhoe, Zwischenschmerz/Mittelschmerz, Vaginitis; klimakterische Neurosen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus
[Sexualschwäche, Neurasthenie, depressive Zustände]
Cimicifuga S [präklimakterische Amenorrhoe]
Graphites [Amenorrhoe bei plethorisch/phlegmatisch/pyknischer Konstitution mit Adipositas]
Pulsatilla S [Depressionen mit Zyklusstörungen (oft Menarche schon verspätet!)]
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum [träger Reaktionstyp]
Suis-Organpräparate Injeele:
Hypophysis suis, Ovarium suis
Fides:
Mulimen S (Tropf.), **Mulimen** (Tabl.), **Mulimen pro injectione**
[Parametropathia spastica, Menstruationsbeschwerden]
Begleittherapie
Ernährung: Diät speziell bei Adipositas bzw. bei Anorexie
Physikalische Therapie: Wärme, Moorbäder, Fango
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Ganglion (Ganglion cervicale uteri) und Frankenhäuser-Plexus (Plexus utero-vaginalis) sowie gynäkologischer Raum, Schilddrüse
Weitere Verfahren: Akupunktur, Psychotherapie

Amyotrophe Lateralsklerose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Multiple Sklerose.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nur adjuvante Therapie möglich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Hormeel SNT (Tropf.) [Harmonisierung hormoneller Regelkreise]
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Cerebrum compositum NM [Aktivierung der Hirnfunktionen]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.) [Verbesserung der Durchblutung]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Entgiftung über die Leber]
Testis compositum N Ampullen
[bei Männern als Zwischenmittel]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Grippe-Nosode
Katalysatoren-Injeele:
Histamin
Suis-Organpräparate-Injeele:
Glandula suprarenalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur

Anämie

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursachen abklären! Substitutionstherapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Ferrum-Homaccord (Tropf.) [Förderung der Eisenresorption]
Parenterale Therapie:
China-Homaccord S
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung der Fermentfunktionen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Verbesserung der Leberfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Verbesserung der Schleimhautfunktionen]
Tonico-Injeel (Amp.)
[geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Atmungsenzyme und Verbesserung der Sauerstoffutilisation]
Einzelmittel-Injeele: **Acidum fumaricum, Ferrum metallicum forte**
Katalysatoren-Injeele: **Natrium pyruvicum**
Suis-Organpräparate-Injeele:
Hepar suis, Medulla ossis suis, Sanguis suis, Splen suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Ernährungsumstellung

Angina pectoris

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Funktionelle Herzbeschwerden,
  Roemheld-Syndrom = Gastrokardialer Symptomenkomplex,
  HWS-Syndrom (vertebragene Angina pectoris), psychosomatische Herzalterationen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Stets exakte Differentialdiagnostik betr. KHK (= Koronare Herzkrankheit) inkl. Infarkt!

Basistherapie

Orale Therapie:

Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]

Parenterale Therapie:

Cralonin [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]

An-io-Injeel [Koronardurchblutungsstörungen, pectanginöse Beschwerden]

Symptomenbezogene Therapie

Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Grippe und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]

Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Hypotonie, Herzrhythmusstörungen]

Cactus compositum S (Tropf.)

Cactus compositum (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen]

Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]

Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Cor suis compositum N (Amp.) [Herzstiche mit Arrhythmie sowie bei Roemheld und Lungenemphysem]

Glonoin-Homaccord N Tropfen
[stenokardische Beschwerden mit Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion]

Melilotus-Homaccord N Tropfen, Melilotus-Homaccord (Amp.) [Stenokardie bei Hypertonikern, besonders Plethora, präapoplektische Zustände]

Strophanthus compositum N (Amp.)
[Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]

Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kollapszustände]

Einzelmittel-Injeele:

Arnica S [tonisierende Gefäß- und Herzwirkung]

Arsenicum album S [Herzschmerzen mit Angst und Unruhe]

Cactus [stenokardische Beschwerden mit Herzklopfen und Blutdrang zum Kopf]

Kalmia S [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]

Tabacum [Herzklopfen mit Zittern, Tachykardie und Todesangst]

Nosoden-Injeele:

Coxsackie-Virus-A_9
[Stenokardie mit Tachykardie, Tachyarrhythmie, Extrasystolie]

Coxsackie-Virus-B_4
[Herzstiche mit Extrasystolie, Arrhythmie, Tachykardie]

Grippe-Nosode, Psorinum
[Herzschmerzen mit Tachykardie und Arrhythmie]

Suis-Organpräparate Injeele:

Arteria suis, Cor suis

Cosmochema:

Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]

Strophanthus comp.-Herztabletten [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]

Fides:

Strophantab (Tabl.) [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]

Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]

Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]

Begleittherapie

Ernährung: Dauernde Ausschaltung von Risikofaktoren, cholesterin-/purinarme, schlackenreiche Kost

Physikalische Therapie: Training, „Koronarsport“

Neuraltherapie: Ganglion stellatum, Herzpunkte

Weitere Verfahren: Akupunktur, Autogenes Training und ggf. Psychotherapie, Chiropraktik bei HWS bedingten Herzstichen, Sauerstofftherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne), Ozontherapie, Oxyvenierungstherapie (nach H.S. Regelsberger)

Angina tonsillaris

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Diphtherie, Angina agranulocytotica (Schultz),
  Herp-Angina (Coxsackie-Virus A, bes. bei Kindern),
  Pfeiffer-Angina, Scharlach,
  Angina Plaut-Vincent (meist einseitig).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufige Folgekrankheiten:
  Glomerulonephritis, rheumatisches Fieber, Polyarthritis, Tonsillen als Fokus; evtl. Antibiotikabehandlung.

Basistherapie

Orale Therapie:

Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]

Angin-Heel SD (Tabl.) [Mandelentzündungen]

Parenterale Therapie:

Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]

Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Suppositorien:

Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]

Symptomenbezogene Therapie

Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]

Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Tonsillarhypertrophie, Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]

Echinacea compositum SN (Amp.) [Steigerung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Angina tonsillaris und bei Fokaltoxikosen]

Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Tonsillarhypertrophie, Tonsillitis chronica, Lymphatismus]

Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:

Baptisia S [Angina tonsillaris mit hohem Fieber]

Lachesis S [Pharyngolaryngitis mit düsterroten (peri)tonsillären Schwellungen]

Suis-Organpräparate Injeele:

Tonsilla suis [chronische Tonsillitis, Tonsillarhypertrophie]

Cosmochema:

Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)

Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]

Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Neuraltherapie:
Kieferwinkel, Gaumenbogen, 3. Mandelpol

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Halswickel

Angstzustände

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Siehe auch psychische Symptome.

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Traumeel S [Regeneration der Sulfidfermente]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Gehirnfunktionsmittel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Neurexan (Tropf., Tabl.)
[Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[Angst mit Vernichtungsgefühl, „wie Eis in den Adern"]
Arsenicum album S
[Ängste mit Unruhe und Verzweiflung sowie Erschöpfung]
Aurum [Melancholie]
Phosphorus S [furchtsame Schwäche, Angst vor Dunkelheit, Gewitter, große Erregbarkeit]
Katalysatoren-Injeele:
Acidum cis-aconiticum [Angst und Beklemmungszustände]
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cerebrum suis
Fides:
Noxom S (Tropf.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Noxotab (Tabl.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]

Anorexie (Appetitlosigkeit)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Diagnostische Abklärung!
- **BESONDERE HINWEISE:**
  An psychische Ursachen (Anorexia nervosa/mentalis, Pubertätsmagersucht) sowie an medikamentenbedingte Ursachen (PAS, INH u.a.) denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Suppositorien:
Vomitusheel S
[Anorexie verbunden mit Brechreiz/Erbrechen (Vomitus)]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Diarrheel SN (Tabl.)
[Diarrhoen akuter und chronischer Art; Gastroenteritis]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis; Cholezystitis; Cholelithiasis; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Leber- und Pankreasdysfunktionen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychische Erschöpfung; psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage (Anorexia senilis)]
Tonico-Injeel (Amp.) [physische Erschöpfungszustände]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium phosphoricum [Konstitutionsmittel, reduzierter Ernährungs- und Kräftezustand]
Hyoscyamus forte [Übererregbarkeit]
Ignatia S [vegetative Dystonie, Hysterie]
Pulsatilla S [Depressionen mit Weinerlichkeit]
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Ventriculus suis
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Begleittherapie
Ernährung: Vitamine, Mineralien, Substitutionstherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Psychotherapie

Anosmie (Geruchsverlust)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, Allergie, Hirnschädigungen, Polyposis, postinfektiöse sowie psychische = „funktionelle" Anosmie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Naso-Heel SNT (Tropf.)
[akute und chronische Rhinitis, auch mit Sinusitis]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr (postinfektiöse Anosmie!)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [bei Commotio cerebri]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Luffa operculata
[Rhinitismittel; bes. bei Rhinitis sicca/atrophicans]
Nosoden-Injeele und forte:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum DL-malicum
[Rhinitis vasomotorica, Rhinitis atrophicans, Sinusitis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia Physikalische Therapie: Inhalationen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Mandelpole
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sueristofftherapie, Ozontherapie

Aphthen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Behçet (chronische Virusinfektion), Leukoplakie, Soor; Infektionskrankheiten, z.B. Masern, Röteln, Mumps, Varizellen; Stomatitis aphthosa/herpetica (Herpes simplex)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache weitgehend unbekannt.
  Cave: Große Rezidivneigung; Präkanzerose (Leukoplakie); Zahnsanierung erforderlich

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Angin-Heel SD (Tabl.)
[Angina tonsillaris acuta und chronica; Tonsillarpfröpfe]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr, z.B. auch bei Stomatitis, Gingivitis, Angina tonsillaris und Fokaltoxikosen]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Gastroenteritis]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Mundschleimhautmittel; „Splitterschmerz"]
Kalium bichromicum [Mundschleimhautmittel; fadenziehende zähe Sekrete]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Stomatitiden]
Nosoden-Injeele:
Herpes simplex-Nosode, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Gingiva suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Mundspülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
EAP-Testung, Symbioselenkung, Pinselung mit Traumeel S Ampullen, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (mit Eigenblut)

Apoplexie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Enzephalomalazie, Massenblutung, Neoplasma, Trauma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung! (Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie bzw. zur Nachbehandlung sowie zur Prophylaxe).

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Melilotus-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck]
Parenterale Therapie:
Melilotus-Homaccord [Bluthochdruck]
Carbo compositum [Apoplex und Herzinfarkt]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [postapoplektische arteriosklerotische Gedächtnisschwäche bzw. Hirnleistungsschwäche]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Sickerblutungen, Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.)
[Herzschwäche, Arrhythmie, Angina pectoris, Hypertonie]
Cralonin Tropfen, **Cralonin** (Amp.)
[Herzstützung, bes. bei Altersherz]
Glonoin-Homaccord N Tropfen [pektanginöse Beschwerden verbunden mit Tachykardie und Herzklopfen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Hämatome, Steigerung der Herzkraft]
Belladonna S
[Plethora, hochroter Kopf, arterielle Hyperämie, Gefäß-Pulsieren]
Carbo vegetabilis [Kollapsneigung, Kreislaufversagen]
Vipera berus [Blutungsneigung, Sprachstörungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Ernährung: Risikofaktoren ausschalten
Physikalische Therapie: Massagen, Krankengymnastik, Training
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatumblockade (kontralateral)
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne), Ozon

Arteriosklerose

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Risikofaktoren: familiäre Belastung, Diabetes mellitus, Hypertonie, Hyperlipidämie

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Ginseng compositum N (Tropf.) [Schwächemittel, Geriatrikum]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
An-io-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.)
[pektanginöse Beschwerden, bes. bei Hypertonie]

Carbo compositum (Amp.)
[Apoplexie- und Myokardinfarkt-Prophylaxe]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [pektanginöse Beschwerden]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Zerebralsklerose mit den entsprechenden Symptomen wie Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung, Erregungszuständen, Depressionen u.a.]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.)
[arteriosklerotische, degenerative Herzaffektionen, Hypertonie]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.) [Altersherz]
Galium-Heel N (Amp.) [chronische degenerative Krankheiten]
Neuro-Injeel Ampullen [psychische Erschöpfungszustände und depressive Stimmungslage]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[arteriosklerotische zerebrale Leistungsschwäche]
Tonico-Injeel (Amp.)
[physische und psychische Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[arteriosklerotisch bedingter (Alters-)Schwindel]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Herz- und Gefäßtonisierung; Zerschlagenheitsgefühl; Apoplexiefolgen]

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis

Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]

Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Risikoarme Ernährung
Physikalische Therapie: Kneippkuren, Training
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatumblockade
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Arthritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Infektiöse Arthritis, Arthritis urica, „aktivierte“ Arthrose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung, Rheumaserologie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]

Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[neuralgische, stechende Schmerzen, Parästhesien]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[zur Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtisch-rheumatische Diathese]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[(peri-)arthritische Beschwerden, besonders bei Wetterfühligkeit mit Verschlimmerung vor und bei Nasswetter]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [Synovitis/Synovialitis]
Colchicum (forte S) [Muskel- u. Gelenkrheumatismus]
Formica rufa
[Umstimmungsmittel bei Allergien (Arthritis allergica!)]
Kalmia S [rote, heisse, geschwollene Gelenke]
Rhododendron [vor allem auch kleine Gelenke befallen; Schmerzen besonders in der Ruhe]
Rhus Tox S
[rheumatische Schmerzen mit Nasswetterverschlimmerung]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Musculus suis, Os suis

Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Nierentropfen
[Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]

Fides:
Restructa SN (Tabl.), **Restructa pro injectione S**
[Harnsaure Diathese, Gicht]
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Elektrotherapie, TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation – eine Elektroakupunkturanalgesie); je nach Stadium Kälte (Kryotherapie) bzw. Wärme
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Solidago comp. Heel (Amp.)
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Arthrose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arthritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung der Ursache(n) und des jeweiligen Stadiums der Arthrose: „stumme“ Arthrose, „dekompensierte“ bzw. „aktivierte“ Arthrose (nach Wagenhäuser bzw. nach P. Otte).

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Rheumatismusmittel, neuralgische Schmerzen]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[neurale Störfelder, bes. HWS-bedingte]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[zur Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[arthritische, neuralgische und vertebragene Beschwerden]
Osteoheel S (Tabl.) [Knochenschmerzen, Periostitis, Exostosen (reaktive osteophytäre Wucherungen!)]
Rheuma-Heel (Tabl.)
[(peri)arthritische Beschwerden („aktivierte" Arthrose!)]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Weichteilrheumatismus sowie Neuralgien und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [entzündlicher Rheumatismus, „aktivierte" Arthrose]
Rhus Tox S [Anlauf- bzw. Startschmerz: typisch bei Arthrose!]
Ruta [Bouchard-Arthrose]
Sticta [arthrotische Beschwerden, bes. der Kniegelenke]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
[bes. bei Arthrosen der kleinen Gelenke (incl. WS) und bei Finger-Polyarthrosen (Heberden, Bouchard, Rhizarthrose)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Os suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Fides:
Restructa SN (Tabl.), **Restructa pro injectione S**
[Harnsaure Diathese, Gicht]
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Kost, Gewichtsreduktion
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Wärme, Übungsbehandlung, Krankengymnastik

Asthma bronchiale

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Asthma cardiale, Allergie, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Beim akuten Asthmaanfall Kortikoide und Theophyllinderivate!

Basistherapie
Orale Therapie:
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Drosera-Homaccord (Tropf.)
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Husteel (Tropf.) [Hustenreiz bei Erkältung und Bronchitis]
3 mal täglich jeweils 15 Tropfen zusammen einnehmen
Parenterale Therapie:
Drosera-Homaccord
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Ignatia-Homaccord
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Symptomenbezogene Therapie
Bronchalis-Heel (Tabl.)
[Bronchitis, besonders chronischer Raucherkatarrh]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen: Masern-, Grippe-, Asthma!)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, bes. bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Kollapszustände, kalter Schweiß]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [schmerzhafter Reizhusten]
Carbo vegetabilis [Dyspnoe, Lufthunger, Kollapsneigung]
Sticta [Rhinitis, Reizhusten]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Coxsackie-Virus A_9, Coxsackie-Virus B_4, Grippe-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Trichinoyl, Hydrochinon
[Dyspnoe, Störungen der Sauerstoff-Utilisation]
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Mucosa nasalis suis, Pulmo suis, Splen suis
Fides:
Injectio antiasthmatica FIDES S [Bronchitis]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie mit **Echinacea compositum SN** (Amp.)
[allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenkarenz
Physikalische Therapie: Inhalationen, Atemgymnastik
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Störfeldsuche (Nasennebenhöhlen, sinubronchiales Syndrom), Ganglion stellatum
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Psychotherapie

Atherome

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Echte Atherome sind versprengte embryonale Talgdrüsenkeime, sog. falsche Atherome sind Talgretentionszysten. Differentialdiagnostisch sollten Atherome immer gegenüber Lipomen und vor allem gegenüber Metastasen maligner Tumoren abgegrenzt werden.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [zur lokalen Infiltration]
Lymphomyosot N [zur Matrixdrainage]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.) [bei infizierten Atheromen]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp., Salbe) [bei lokalen Entzündungen]
Einzelmittel-Injeele:
Baryum carbonicum, Conium S [bei Verhärtung von Atheromen, Drüsenschwellungen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis
Begleittherapie
Exzision
Salbenverbände
Eigenbluttherapie, z.B. mit **Echinacea compositum SN** [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten] und **Lymphomyosot N** [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Balanitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Formen, Ursachen (u.a. Soor, häufig bei Diabetes mellitus) und Schweregrade der Balanitis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung! Ggf. Partnerbehandlung. Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Abropernol N (Tabl.) [Hautkrankheiten mit Exsudation]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse, pustulöse, bullöse Symptome]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Entzündungen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Bereich der der ableitenden Harnwege]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Neigung zur Haut- und Schleimhauteiterungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [oberflächliche Haut- und Schleimhautulzerationen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Sitzbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Bandscheibenschaden

(Osteochondrosis intervertebralis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  U.a. Morbus Scheuermann, Osteoporose, Spondylolisthesis (Wirbelgleiten); Bechterew, Wirbel-Tbc, Wirbelmetastasen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.) [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Zeel comp. N (Tabl.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Zeel comp. N [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [HWS-bedingte Neuralgien; Zervikalmigräne, neurale Störfelder]
Circulo-Injeel N (Amp.) [parästhetische Neuralgien, besonders auch Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Osteochondrose, bes. der LWS mit Ischiasneuralgien]
Cruroheel S (Tabl.) [Ulcus cruris (Wurzelirritationssyndrom bei LWS-Osteochondrose!)]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Schulter-Arm-Syndrom bzw. bei Periarthritis humeroscapularis]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [HWS-Osteochondrose mit Neuralgien (Migraine cervicale]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [Neuralgien, bes. auch vertebragener Genese]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis; Exostosen: Osteophytenbildung, Randzacken, Spangen]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [Zervikalsyndrom mit Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Conium S [Alters- und Neuralgiemittel]
Hekla Lava [osteophytische Randzacken und Spangen]
Rhododendron [Knochen- und Bindegewebsmittel; Verschlimmerung vor Regenwetter und Gewitter]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Glandula parathyreoidea suis, Glandula suprarenalis suis, Glandula thyreoidea suis, Musculus suis, Os suis

Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie (lokale Quaddelungen paravertebral), chiropraktische und/oder balneologische bzw. physikalische Therapie

Bechterew'sche Erkrankung (Spondylitis ankylosans/ankylopoetica)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Immunologische und radiologische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.)
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden; Nasswetterverschlimmerung]
Testis compositum N Ampullen [Anregung der Organfunktionen bei Männern; Bechterew: Androtropie ca. 10:1!]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen incl. Spondylarthrosis]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S
[Muskel- und Gelenkbeschwerden; entzündlicher Rheumatismus]
Conium S
[Koordinationsstörungen der Glieder; zittrige Schwäche]
Hekla Lava [Exostosen; Kreuzschmerzen]
Phosphorus S [vornübergebeugte kyphotische Haltung]
Rhododendron [Gelenkmittel, bes. auch für kleine Gelenke (Spondylarthritis auch bei Reiter-Krankheit]
Rhus Tox S [rheumatische Beschwerden mit Nasswetterverschlimmerung sowie Verschlimmerung in Ruhe und „Startschmerz"]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Medulla ossis suis, Os suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Balneologie, TENS, Elektrotherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Quaddeltherapie paravertebral
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Ozontherapie, Sauerstofftherapie, HOT

Blepharitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenfachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Abwehrsteigerung bei entzündlichen Prozessen; bes. bei Blepharitis scrophulosa und Staphylokokken-Blepharitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit), Drüsenschwellungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch der Bindehaut des Auges]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse]
Kalmia S [Rötungen, Schwellungen, Schmerzen; Fokalherde]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Eiterungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Spülungen
Neuraltherapie: Ganglion ciliare
Weiter Verfahren: Akupunktur

Blutungsneigung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.) [Blutungen]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Reizzustände, petechiale Blutungen]

Parenterale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N [Blutungen]
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [venöse Stase; variköses Ekzem; thrombophlebitische Zustände]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Paeonia comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzema und Fissura ani; Hämorrhoiden]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Blutergüsse]
Crotalus [Blutungen aus Körperöffnungen]
Hamamelis [venöse Blutungen, Hämorrhoidalblutungen]

Brechreiz

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Vomitusheel (Tropf.) [Erbrechen und Brechreiz]
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Parenterale Therapie:
Colchicum compositum [Begleittherapie bei Krebserkrankungen]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.)
[Brechreiz bei Leber-Galle-Affektionen wie Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica, sonstige Leber(parenchym)schädigungen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[Übelkeit/Brechreiz (= Nausea) bei Kinetosen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreaserkrankungen und Oberbauchbeschwerden, z.B. gastrokardialer Symptomenkomplex]
Mucosa compositum (Amp.)
[Schleimhautmittel; bei gastroenteritischem Brechreiz]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Brechreiz – ggf. verbunden mit Meteorismus bei Nikotin-, Kaffee-, Alkoholabusus]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Übelkeit/Brechreiz (= Nausea) bei Kinetosen sowie Schwindelzuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Brechreiz/Erbrechen mit Unruhe]
Colchicum (forte S) [Übelkeit und Brechreiz schon beim Anblick bzw. Geruch von Speisen]
Ipecacuanha
[Husten mit Brechreiz und Erbrechen (das nicht erleichtert)]
Nux vomica S
[bes. morgendlicher Brechreiz; Diätfehler, Reizmittelmissbrauch]
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Weitere Verfahren: Ggf. Psychotherapie

Bronchiektasen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Emphysem
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Zu unterscheiden sind: Angeborene Bronchiektasen, oft in Verbindung mit einer zystischen Fibrose (Mukoviszidose) und erworbene Bronchiektasen, z.B. nach frühkindlichen Erkrankungen wie Masern, Pertussis sowie nach Tbc, Pneumonien und Abszessen (Fremdkörperaspiration).
  Bronchiektasen führen meist zu einer progredienten respiratorischen und kardialen Insuffizienz (Cor pulmonale)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronische Bronchitis, Emphysem]
Droperteel (Tabl.) [(spastische) Bronchitis]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Bronchiolitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Husteel (Tropf.) [spastische Bronchitis]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [bei eitrigen Prozessen]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[laryngealer Husten, petechiale Blutungen]
Tartephedreel N (Tropf.) [„absteigende“ Katarrhe der Atemwege mit asthmatischem Husten, der sich schwer löst]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenum jodatum
[Atemnot und Schleimbildung sowie Bronchitis putrida]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen]
Hyoscyamus forte
[Bronchiolenerschlaffung, grün-schleimiger Auswurf]
Ipecacuanha [Husten mit Brechreiz und Übelkeit]
Kalium carbonicum forte N
[Schwächemittel; Erkältungsanfälligkeit; Nachtschweisse]
Kreosotum [Bronchitis foetida]
Nosoden-Injeele:
Bacillinum humanum, Coxsackie-Virus A_9, Grippe-Nosode, , Sinusitis-Nosode [Sinubronchiales Syndrom]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Mucosa nasalis suis, Pulmo suis
Cosmochema:
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Fides:
Injectio antiasthmatica FIDES S [Bronchitis]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Bronchitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Asthma cardiale, Asthma bronchiale;
  (akute) tuberkulöse Bronchitis, Bronchialkarzinom, Bronchiektasen, (Broncho)Pneumonie, Lungenembolie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Akute Pneumonie, Neubildungen

Basistherapie
Orale Therapie:
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronische Bronchitis, Emphysem]
Droperteel (Tabl.) [(spastische) Bronchitis]
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte, bes. im Anfangsstadium (z.B. Grippe-Bronchitis)]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.) [Pertussis, asthmatoide Bronchitis mit Hustensalven, Bronchiolitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe-Bronchitis]
Husteel (Tropf.) [spastische Bronchitis; z.B. auch bei Erkältungskrankheiten, Pleuritis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hyoscyamus forte [Katarrhe der oberen Luftwege und Bronchien; trockener (nächtlicher) Kitzelhusten]
Ipecacuanha
[akute und subakute Bronchitis mit Übelkeit/Brechreiz]
Kreosotum [Bronchitis und Bronchiolitis (foetida)]
Natrium muriaticum
[chronische Rhinitis, Tracheitis und Bronchitis]
Phosphorus S [trockener Reizhusten; Blutungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Pulmo suis
Cosmochema:
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Fides:
Injectio antiasthmatica FIDES S [Bronchitis]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Abklopfen, Einreibungen, Atemtherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Lokale Thoraxpunkte, Stellatumblockade; Cubitalvene
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Bronchopneumonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Malignom, Embolie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Biotherapeutika-Antihomotoxika bei akuter Bronchopneumonie als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Aconitum-Homaccord (Tropf.) [grippale Infekte, Akutmittel]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen; zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Grippe]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Parenchymmittel; Blutungsneigung (petechiale Blutungen)]
Tartephedreel N (Tropf.)
[„absteigende" Katarrhe der Atemwege mit asthmatischem Husten, der sich nur schwer löst]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hyoscyamus forte [Katarrhe der oberen Luftwege und Bronchien; nächtlicher Reizhusten]
Phosphorus S [trockener Husten; Blutungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Einreibungen, Abklopfungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Stellatumblockade, Cubitalvene, Thoraxquaddel
Weitere Verfahren: Akupunktur

Bursitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumor, Abszess, akzessorischer Knochenkern, freie Gelenkkörper, Osteophyten, Apophysenabriss, PCP, Tbc, Gonorrhoe
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Erforderliche Abklärung der Ursache: Häufig chronische Reizzustände (Bursitis praepatellaris, Bursitis olecrani).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S (i.c. lokal bzw. intrabursal)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Osteophyten, Exostosen; Periostitis]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen]
Silicea [Chronizität von Reiz- und Entzündungszuständen]
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Umspritzung, direkte Infiltration, Fokussuche
Weitere Verfahren: OP, Punktion, Salbenverband; ggf. Kälte

Chalazion

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hordeolum (Gerstenkorn) = schmerzhaft

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische: Entzündungen im Bereich des äußeren Auges; Chronizität („Hordeolosis“)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Graphites [Lidrandentzündungen, Blepharo-Konjunktivitis]
Hepar sulfuris [Neigung zu Eiterungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Blepharo-Konjunktivitis]
Myristica sebifera forte
[akute und subakute Eiterungen, “homöopathisches Messer”]
Silicea [dünnflüssig-wässriger Eiter; Chronizität]
Staphisagria [Chalazion, Hordeolum; Blepharo-Konjunktivitis; Neigung zu Keloiden]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (nur bei Rezidiven!)
Auto-Sanguis-Stufentherapie (nur bei Rezidiven!):
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme],
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Weitere Verfahren: Physikalische Therapie; ggf. augenärztlicher operativer Eingriff

Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  z.B. Gallenblasen-Empyem, Steinverschluss mit Ikterus, akutes Abdomen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Operationsindikation beachten!

Basistherapie
Orale Therapie:
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Injeel-Chol [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[generelles Entzündungsmittel bei lokalisierten Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Diarrheel SN (Tabl.)
[akute und chronische Diarrhoe, Gastroenteritis]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie zur Leberfunktionsstörungen bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden; Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Magen-Darm-Leber-Mittel, bes. bei Diätfehlern und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee); Meteorismus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände (mit kaltem Schweiß)]
Vomitusheel (Tropf.) [bei Brechreiz, Erbrechen]
Einzelmittel-Injeele:
Cholesterinum [Lebererkrankungen]
Crotalus [Hämorrhagien und septische Prozesse]
Lycopodium S [Meteorismus, (Sub)Ikterus (gelbliche Hautfarbe)]
Taraxacum [Cholezystopathien]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Vesica fellea suis

Cosmochema:
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fettarme und blähungsarme Ernährung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Claudicatio intermittens

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arterielle Verschlusskrankheiten;
  Thromb(end)angiitis obliterans (Winiwarter-Buerger)
  [meist bei Männern im mittleren Lebensalter, starke Raucher], Dysbasia angiospastica (Raynaud) [Gynäkotropie 5:1].
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung notwendig!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen; bei Endangiitis obliterans/Endarteriitis obliterans = Thrombangiitis obliterans (= Winiwarter-Buerger) sind meist gleichzeitig oder bereits vorher auch die Venen betroffen]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörung]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Spascupreel (Tabl., Amp.), **Spascupreel S** (Supp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, z.B. auch Gefäßspasmen sowie bei Wadenkrämpfen; ferner Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäßwirkung]
Plumbum metallicum [Arteriosklerose; Gefäßspasmen]
Tabacum
[angiospastische Zustände (z.B. Raynaud); Parästhesien]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Placenta suis, Vena suis (evtl. als Mischspritze)
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Nikotinkarenz
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen, Krankengymnastik, Gehtraining
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Colitis, Crohn'sche Erkrankung

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Colitis ulcerosa, Colitis mucosa, Morbus Crohn (Enteritis regionalis), Darmdivertikel, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Podophyllum compositum (Tropf.)
[colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Diarrheel SN (Tabl.) [Diarrhoen, Gastroenteritis]
Parenterale Therapie:
Podophyllum compositum [colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Colitis mit Fistelbildung/Fisteleiterung]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Ignatia-Homaccord (Amp.) [depressive Verstimmungen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [generell bei Entzündungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Colitis ulcerosa!)]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Darmaffektionen, bes. nach Diätfehlern und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee); ferner Meteorismus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ignatia S [Depressionen; Darmspasmen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Salmonella typhi
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenfreie Kost
Physikalische Therapie: Einläufe
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (Darmbegasung), HOT; ggf. Psychotherapie

Commotio cerebri und postkommotionelle Beschwerden

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Contusio und Compressio cerebri, Schädelbasisfraktur
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Vertigoheel (Tropf., Tabl.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen, zerebrale Reizzustände]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Regenerationsmittel bei posttraumatischer Hirnleistungsschwäche (z.B. Gedächtnisschwäche, nervöse Erschöpfung, Depressionen; Erregungszustände)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[bei Ödemen (Hirnödem bei SHT = Schädelhirntraumen; Thixotropie bei Commotio cerebri!)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen, Kopfschmerzen]
Arnica S [bei Entzündungen und Folgen von Traumen]
Hypericum [Neuralgien und depressive Zustände nach Traumen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebrum suis, Vena suis
Weitere Verfahren: Bettruhe

Cushing-Syndrom

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Genaue Abklärung erforderlich.

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SNT (Tropf.)
[Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung der Fermentfunktionen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Testis compositum N Ampullen [bei Männern]
Traumeel S (Tabl.,Tropf., Amp.) [biologisches Antiphlogistikum]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Anregung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Darmspasmen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Diarrheel SN (Tabl.) [Antidiarrhoikum bei akuter und chronischer Diarrhoe sowie bei Gastroenteritis; Meteorismus]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis mit Kollapszuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Magnesium phosphoricum forte [Entkrampfungsmittel]
Nux vomica S [akute und chronische Gastrointestinalbeschwerden, bes. auch nach Diätfehlern und Reizmittelabusus]
Veratrum forte
[Brechdurchfall; Kollapszustände, kalter Schweiss]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Fides:
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]
Begleittherapie
Ernährung: Substitution von Mineralien
Physikalische Therapie: Wärme
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie; ggf. Psychotherapie

Dekubitus

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörung]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Traumeel S Ampullen (aufträufeln) [lokales Antiphlogistikum]
Echinacea compositum SN Ampullen (aufträufeln) [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen, Gefäßspasmen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen; bes. bei bakteriellen (Misch)Infektionen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, u.a. auch bei unklaren fieberhaften Infekten und Viruserkrankungen; Kachexie-Dekubitus]

Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[venöse Stase, variköses Ekzem; thrombophlebitische Zustände]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Eiterprozesse]
Lachesis S
[bei septischen Prozessen; bläulich-dunkelrote Verfärbung]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel]
Rhus Tox S
[verschiedene Hautaffektionen; Neigung zu Eiterungen]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum succinicum [schlecht heilende eiternde Wunden],
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus suis, Vena suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Ozontherapie (Saugglockenbegasung, Umspritzung), HOT

Demenz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Alzheimer
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Behandlungsmöglichkeiten hängen entscheidend vom Behandlungsbeginn ab. Während im Früh- und Intermediärstadium die Aussichten durchaus erfolgversprechend sind, bleiben im Spätstadium alle Bemühungen erfolglos.

Basistherapie
Orale Therapie:
Adjuvant allgemein entgiftende Maßnahmen:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Coenzyme compositum Ampullen
Ubichinon compositum Ampullen
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Symptomenbezogene Therapie
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Carbo compositum (Amp.) [bei zerebralen Durchblutungsstörungen, auch nach Apoplexie]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.) [zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.) [bei Erschöpfungszuständen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[zur Verbesserung der Konstitution bei Toxinbelastungen]
Nervoheel N (Tabl.)
[bei Erschöpfungszuständen mit nervösen Beschwerden]
Spigelon (Tabl., Tropf., Amp.)
[bei konstitutionellen Kopfschmerzen]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer aber auch psychischer Art]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen, Neurasthenie]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Kollapszuständen]
Vertigoheel (Tabl., Tropf., Amp.) [bei Schwindel]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele:
Ginseng [Schwächezustände]
Graphites [altersbedingte Erkrankungen]
Lachesis S [Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände]
Nosoden-Injeele:
Psorinum [Schwächezstände besonders nach schweren Krankheiten, Kopfschmerzen, Verstimmungszustände]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Geistige und körperliche Aktivierung
Lebensstilumstellung und Ernährungslenkung bilden die Basistherapie. Dazu kommt eine ausreichende Vitaminversorgung speziell mit B-Vitaminen. Kombinationspräparate mit Mineralien und Spurenelementen sind zu bevorzugen.

Depressionen, exogene

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Psychische Alterationen, endogene Depressionen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Suizidgefahr!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Ignatia-Homaccord
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[zerebrales Regenerationsmittel; insbesondere bei postenzephalitischen und arteriosklerotischen bzw. Altersdepressionen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen (somatogene Depressionen)]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer aber auch psychischer Art]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum phosphoricum S
[Neurasthenie, nervöse Erschöpfungszustände]
Aurum
Hypericum
[zerebralsklerotische und postkommotionelle Depressionen]
Fides:
Mulimen S (Tropf.), **Mulimen** (Tabl.), **Mulimen pro injectione**
[Parametropathia spastica, Menstruationsbeschwerden]
Noxom S (Tropf.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenfrei
Weitere Verfahren: Störfeldsuche, Neuraltherapie, Lichttherapie, Autogenes Training, Psychotherapie

Dermatosen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Verschiedene Ursachen, Formen und Stadien abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]

Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben – nicht bei hochakuten allergischen Hautaffektionen!]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse, pustulöse, bullöse Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.)
[Dermatosen bei Leber-Galle-Affektionen incl. Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen, bei toxischen Exanthemen und bei Dermatitis; ferner bei Neurodermitis]
Injeel-Chol (Amp.) [Dermatosen bei Leber-Galle-Affektionen wie Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden, Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus
Acidum formicicum [Ekzeme, Allergien]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [eitrige Prozesses]
Rhus Tox S [Entzündungen, Suppurationen]
Sulfur (forte) S
[bei allen mehr oder minder chronischen Hautveränderungen]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Medorrhinum, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin [Ekzeme, Allergien],
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N,
Hautfunktionstropfen N [Erkrankungen der Haut]
FideSan (Salbe) [Ekzeme, Dermatosen]
Fides:
Ureata (Salbe)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Lymphdrainage, Waschungen, UVA
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Cubitalvene (im Wechsel)
Weitere Verfahren: Allergietest, Fokussuche, Symbioselenkung

Diabetes mellitus (Altersdiabetes)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Diabetes juvenilis (insulinpflichtig)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Steroiddiabetes ausschließen, Spätfolgen beachten!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Matrixtherapie, perineurales Odem bei Polyneuropathie]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Hirnstoffwechselstörungen, Demenz]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Dermatomykosen u.a.: diabetische Hautaffektionen!]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme bei Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen]
Momordica compositum N (Amp.) [regulativer antihomotoxischer Effekt bei Störungen der Pankreasfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Natrium sulfuricum [Hepatopathie; Melancholie]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum [diabetische Durchblutungsstörungen];
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Pankreas suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Dem Kohlenhydratstoffwechsel angepasst; WBE (1 WBE = Weißbroteinheit entspricht 10 g Zucker) und Äquivalenttabellen berücksichtigen!
Physikalische Therapie: Bewegungstherapie, Gewichtsreduktion bei Übergewicht
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, HOT, schulmedizinische Maßnahmen

Diarrhoe

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Crohn, Colitis ulcerosa bzw. mucosa, Gastro-Entero-Colitis, Karzinom, Nahrungsmittelallergie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Beachte ggf. Diarrhoe bei einer meldepflichtigen Infektionskrankheit (u.a. Dysenterie, Paratyphus, Typhus abdominalis)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Diarrheel SN (Tabl.) [Diarrhoen, Gastroenteritis]
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Durchfälle bei Galle- und Leber-Affektionen (incl. Pfortaderstauung)]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gastroenteritis, Enterocolitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Diarrhoen bei chronischen Leber- und Pankreas-Affektionen bzw. bei akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern)]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[bei eitrigen bzw. entzündlichen Prozessen]
Momordica compositum N (Amp.)
[regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion: pankreatogene Diarrhoe]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Colitis ulcerosa!)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum phosphoricum S [Antidiarrhoikum, bes. bei schmerzlosen Durchfällen und Schwäche]
Aloe [bes. bei morgendlicher Diarrhoe und Stuhldrang bzw. bei Incontinentia ani]
Arsenicum album S [diffuse Diarrhoen, Abmagerung, Durst]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Diarrhoe mit Blut und Tenesmen]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis,
Ventriculus suis [Diarrhoe bei Achylia gastrica!]
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Fides:
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Ggf. Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution. Nach Abklingen der Symptome allergen- und glutenfreie Ernährung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot N (Tabl.) **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme],
Solidago comp. Heel (Amp.)
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (evtl. Darmbegasung), HOT

Distorsionen (Verstauchungen)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Fraktur, habituelle Distorsion/Luxation (Schlottergelenk)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung, Röntgendiagnostik!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [Lokal-Applikation!]
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N [Lokal-Applikation!]
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen mit Rötungen, Schwellungen]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Quetschungen, Hämatome]
Hamamelis [venöse Stauungen, Blutungsneigung]
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Initial Kälteanwendung; Reizstrom, Lymphdrainage, Krankengymnastik
Neuraltherapie: Quaddeltherapie
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie bei Morbus Sudeck; gemäß der Schwere Okklusivverband, Tape-Verbände, Zinkleim, Ruhigstellung

Divertikulitis / Divertikulose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Polypen, Neoplasma, Appendizitis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung; Alkoholverbot!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Diarrheel SN (Tabl.)
[akute und chronische Diarrhoe, Gastroenteritis]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie zur Anregung zur Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Podophyllum compositum (Tropf., Amp.)
[Dickdarmkatarrhe, z.B. Colitis ulcerosa et mucosa]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Diarrhoe mit Erschöpfung und Abmagerung]
Bryonia S [Wechsel zwischen Diarrhoe und Obstipation]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Diarrhoe mit Blutungen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Salmonella typhi
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Alkoholverbot, Flüssigkeitszufuhr, ballaststoff- bzw. schlackenreiche (aber nicht blähende) sowie generell fleischarme Kost, Stuhlregulation
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Physikalische Therapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Dysmenorrhoe

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Organische Ursachen: genitale Hypoplasie, Retroflexio uteri, Myome, Entzündungen, Endometriose;
  funktionelle Ursachen: hormonale und vegetative Störungen, Parametropathia spastica.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Hormeel SNT (Tropf.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Parenterale Therapie:
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen, Akroparästhesien]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützeden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Ignatia-Homaccord (Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [nervöse Verstimmungszustände],
Cimicifuga S [Krampfneigung],
Colocynthis S [Krämpfe mit stechenden Schmerzen],
Pulsatilla S [verspätete Menarche, verspätete Menses, Hypomenorrhoe],
Sepia [präklimakterische Dysmenorrhoe]
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis, Ovarium suis, Placenta suis, Uterus suis
Fides:
Mulimen S (Tropf.), **Mulimen** (Tabl.), **Mulimen pro injectione**
[Parametropathia spastica, Menstruationsbeschwerden]
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Ernährungsumstellung bei Obstipation und Flatulenz
Physikalische Therapie: Wärme
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Gynäkologischer Raum, Schilddrüse
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Fokussuche, manuelle Therapie; z.B. bimanuelle Massage der weiblichen Beckenorgane nach Thure-Brandt bei Adhäsionen, Uterus-, Scheidenprolaps; Entspannungstherapie, Entspannungstechniken

Dyspepsie

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Gallenkoliken, Cholangitis, Cholezystitis (biliäre Dyspepsie); Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen, Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Diarrheel SN (Tabl.)
[akute und chronische Diarrhoe, Gastroenteritis]
Hepeel N (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art, Leberschäden; meist verbunden mit Meteorismus und Appetitlosigkeit]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus sowie im Bereich der oberen und unteren Luftwege (Dyspepsie im Säuglingsalter bei Infekten derselben!) und der ableitenden Harnwege (Pyelitis-Dyspepsie im Säuglingsalter)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Schwächemittel bei Gastroenteritis; Verschlimmerung nach Nahrungsaufnahme]
Lycopodium S [reduzierte Verdauungsfunktion mit Meteorismus und Appetitlosigkeit]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Ventriculus suis
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme], **Hepar comp. Heel** (Amp.) [Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Diät

Ekzem

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ekzemformen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung; Mischinfektion? Mikrobielles Ekzem?

Basistherapie
Orale Therapie:
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [lichenifizierte Ekzeme]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.)
[intertriginöse Ekzeme; Hyperhidrosis; Hyperkeratosen sowie ferner Perniones, Erythema exsudativum multiforme et nodosum]
Aesculus-Heel (Tropf.) [variköse Ekzeme]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [pustulöse und bullöse Ekzeme mit ödematösen Schwellungen (urtikarielle)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Karbunkel, Furunkel sowie entzündliche Ekzeme]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[chronische, trockene Ekzeme]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [variköse Ekzeme]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen; ferner bei toxischen Exanthemen, bei Dermatosen, bei Neurodermitis sowie bei Erythematodes]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[vesikulöse Ekzeme; Pruritus sowie bei Herpes zoster]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Entzündungen mit Brennschmerz an Geweben]
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel: pastös-lymphatische Pykniker]
Cistus canadensis [juckende, trockene, rissige Hautaffektionen]
Natrium muriaticum
[chronische Hauterkrankungen u.a. auch Eczema flexuarum]
Rhus Tox S [brennende, juckende erysipeloide Ekzeme]
Sulfur (forte) S
[Reaktions- und Umstimmungsmittel bei chronischen Ekzemen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Psorinum, Staphylococcus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
FideSan (Salbe) [Ekzeme, Dermatosen]
Wund-Heilsalbe Cosmochema [Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Erfrierungen und Verbrennungen der Haut]
Fides:
Ureata (Salbe)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (bes. bei chronischen und rezidivierenden Ekzemen)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleisch-, fett-, salz- und gewürzarme sowie allergenfreie Kost; ggf. „Suchkost“
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Ekzema ani

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig bei Diabetes mellitus, Proktitis und (inneren) Hämorrhoiden sowie bei Leberschäden! Mykosen ausschließen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Hämorrhoiden, entzündliche Hautveränderung im Analbereich, Fissuren]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.)
[venöse Stase, Varizen, variköses Ekzem, Hämorrhoiden]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt: Analekzem bei Proktitis, Diarrhoe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Analekzeme bei Durchfallstörungen, Diarrhoen, z.B. bei Gastroenteritis, ggf. verbunden mit Stuhl-Inkontinenz]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel: pastös-lymphatische Pykniker]
Graphites [trockene Ekzeme und Rhagaden]
Thuja S [Analekzeme mit Rhagaden]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis

Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N [Erkrankungen der Haut]
FideSan (Salbe) [Ekzeme, Dermatosen]
Wund-Heilsalbe Cosmochema [Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Erfrierungen und Verbrennungen der Haut]
Fides:
Ureata (Salbe)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Sitzbäder, Analhygiene
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, ggf. Antimykotika

Emphysem (der Lungen)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Boeck, Morbus Hodgkin, Silikose, Mykosen, chronische Bronchitis, obstruktive Lungenventilationsstörungen, Tumor; physiologisch im Alter („Altersemphysem")
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Hauptsymptome: Atemnot, herabgesetzte Vitalkapazität. Chronische Bronchitis als häufigste Ursache. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Cor suis compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]
Ignatia-Homaccord [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen, Herzrhythmusstörungen, bes. bei Hypotonie]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [Bronchitis, besonders chronische Raucherkatarrhe]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Droperteel (Tabl.) [bei Stauungskatarrhen]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.) [asthmatoide Bronchitis]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der Leberzellfunktionen; auch bei Hypercholesterinämie]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Bereich der oberen und unteren Luftwege (chronische Bronchitis als häufige Ursache eines Lungenemphysems!)]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung]
Spascupreel (Tabl., Amp.), **Spascupreel S** (Supp.) [bei spastischem Emphysem]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ignatia S [Atemnot, Lufthunger, „Seufzer-Atmen"; depressive Verstimmung]
Sticta [Bronchitis (chronica) mit Reizhusten, bes. im Alter]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum DL-malicum [Myokardschwäche]
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Cor suis, Pulmo suis
Cosmochema:
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.) [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Kieselsäuretabletten N [Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Leber-Galletropfen [Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Fides:
Injectio antiasthmatica FIDES S [Bronchitis]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Abklopfung, Atemgymnastik, intensives Training
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Mukolytika

Endarteriitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Atherosklerose, Kollagenosen, Riesenzell-Arteriitis, Takayasu-Arteriitis (beim Aortenbogen-Syndrom)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist bei Männern im mittleren Lebensalter (20-40 J.) mit Nikotinabusus! Fokussuche!

Basistherapie
Orale Therapie:
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen (ggf. mit Akroparästhesien und Kältegefühl), angiospastische Zustände]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.) [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen, Hypotonie; Herzrhythmusstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.) [nicht nur bei Endarteriitis obliterans auch angezeigt bei Myokardschwäche, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Hypertonie sowie bei Neigung zum Emphysem und Lungenödem]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen, Folgen von Herzmuskelschädigungen, Altersherz, infektiös-toxische Myokardschwäche]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Cantharis [brennende Schmerzen]
Causticum S [brennende Schmerzen]
Lachesis S [bei Kapillarschädigungen und Thrombosen]

Tabacum [angiospastische Zustände; Kältegefühl, Gangrän-Tendenz; Parästhesien]
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum citricum
[kalte aber auch brennende Füße, Parästhesien]
Acidum DL-malicum
[kalte Hände und Füße mit livider Färbung]
Acidum succinicum
[bläuliche Hände und Beine; „bleierne Müdigkeit"]
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis, Vena suis
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Je nach Stadium Kälte oder Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Darmsanierung; Nikotinverbot; Vermeidung von Nässe und Kälte; reizlose Diät

Endometritis / Endometriose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chronische Adnexitis, Uterus myomatosus, Uteruskarzinom, Endometriosis uteri interna, Polyposis, Endometritis senilis (Östrogenmangel!), Status post abortum bzw. post partum (Streptokokken, Staphylokokken!)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen, Blutungsneigung]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch im gynäkologischen Bereich, z.B. bei Adnexitis und Kolpitis sowie Metritis/Parametritis]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Uteruskongestionen]
Crotalus [Blutungsneigung, bes. aus Körperöffnungen]
Hydrastis [Uterusblutungen]
Kreosotum [Blutungsneigung; Hypermenorrhoe; chronische Entzündungen; ätzender/übelriechender Fluor]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon
[hormonelle Dysfunktionen; Pruritus vulvae/vaginalis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis
Fides:
Mulimen S (Tropf.), **Mulimen** (Tabl.), **Mulimen pro injectione**
[Parametropathia spastica, Menstruationsbeschwerden]
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]
Begleittherapie
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Raum
Weitere Verfahren: Akupunktur

Enuresis nocturna

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Zystitis, Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!
  Organbefunde (u.a. Spina bifida) ausschließen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Plantago-Homaccord (Tropf.)
[Reizblase, Bettnässen, Inkontinenz]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Neurexan (Tropf., Tabl.)
[Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reizblase sowie 1. Stadium des Prostata-Adenoms]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Incontinentia urinae (et ani)]
Causticum S
[Incontinentia urinae (et ani) mit Harndrang beim Husten]
Kreosotum
[Harndrang und Enuresis nocturna (bes. in der 1. Nachthälfte)]
Ruta [Reizblase]
Tabacum [Harnträufeln, Blasenkrämpfe]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum suis, Hypothalamus suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Cosmochema:
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: 4-6 Quaddeln über Kreuzsteißbeingegend
Weitere Verfahren: Akupunktur; ggf. Psychotherapie

Epicondylitis

(humeri radialis = „Tennis-Arm" bzw. humeri ulnaris = „Golfer-Arm" bzw. „Werfer-Ellenbogen")

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tendopathie (Insertionstendopathie), Trauma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fokussuche; Rö-Kontrolle (HWS) angezeigt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S (lokale Applikation)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bes. bei HWS-Osteochondrose]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schulter-Arm-Syndrom]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat: nicht nur bei Epicondylitis, u.a. auch bei Tendovaginitis, Bursitis, Periarthritis humeroscapularis sowie bei Styloiditis]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hekla Lava [Exostosen, knöcherne Spornbildungen]
Staphisagria [Adynamie der Muskeln; Neigung zu Keloiden]
Symphytum [Hämatome, Periostitis]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon [Knochen-, Periost- und Knorpelschmerzen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Os suis
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fides:
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Restructa SN (Tabl.), **Restructa pro injectione S**
[Harnsaure Diathese, Gicht]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Je nach Stadium Kälte (hochentzündliche Reizzustände) bzw. Wärmeanwendungen, Massagen, Krankengymnastik
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: HWS-Quaddeln
Weitere Verfahren: Akupunktur, ggf. Störfeldersuche, manuelle Therapie, Epicondylitisbandage, Tape-Verband, Okklusivverband; ggf. Operation nach Hohmann.

Epididymitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gonorrhoe, Tbc, Lues, Hodentorsion, posttraumatisch
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemeine Immunstimulation v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (antiphlogistische Wirkung)
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr – auch bei fieberhaften Infekten]
Testis compositum N Ampullen
[Impotentia virilis, Ejaculatio praecox]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen, Blasentenesmen]
Spongia [Epididymitis (und Orchitis) mit Lymphdrüsenschwellung]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Testis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Je nach klinischem Bild lokale Kälte- oder Wärmeanwendung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Direkte Schmerzblockade in Nebenhoden
Weitere Verfahren:
Ozontherapie mit Eigenblut, Sauerstofftherapie, Suspensorium mit Traumeel S Salben-Verband

Epileptiforme Zustände

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Neben einer genauen Abklärung ist es oft erforderlich, dass eine zusätzliche schulmedizinische Therapie angewandt wird.

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Schwef-Heel (Tabl.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]

Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Hepeel N [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[versuchsweise als Zwischenmittel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Leberentgiftung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [zerebrale Fehlfunktionen, Kopfschmerzen]
Belladonna S
[zerebrale Reizzustände mit Krämpfen und Delirien]
Cuprum [Krämpfe der Muskulatur, epileptiforme Zustände]
Phosphorus S [furchtsame Schwäche, Angstzustände]
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cerebrum suis, Corpus pineale suis, Hepar suis, Hypothalamus suis
Begleittherapie
Schulmedizinische Therapie!
Mikrobiologische Therapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Epistaxis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Polyposis, Grippe und andere Infektionskrankheiten, Neoplasma, Trauma, Morbus Osler, Eisenmangel, Leukämie, Leberzirrhose, Urämie, Arteriosklerose, Hypertonie, Thrombozytopenie; ferner habituell (bes. bei Kindern) und intra menses (ggf. als „vikariierendes Nasenbluten“).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Behandlung

Basistherapie
Orale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.)
[bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N
[bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[venöse Stase, ggf. mit Blutungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Bereich der oberen und unteren Luftwege (Epistaxis bei Rhinitis sicca)]
Einzelmittel-Injeele:
Crotalus [Blutungen, bes. aus Körperöffnungen]
Lachesis S [Kapillarschädigungen, düsterrote Schwellungen]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Bindegewebsschwäche und exsudativer Diathese bzw. Lymphatismus]
Vipera berus
[Blutungsneigung und Blutungen, bes. aus Körperöffnungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Mucosa nasalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Kälte (über Stirn-Nacken-Region)
Weitere Verfahren:
Akupressur (Kleinfinger, d.h. Gummiring um Endglied des gleichseitigen Kleinfingers), Tamponade, Verödung

Erbrechen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Vomitus matutinus ist sehr häufig bei chronischer Pharyngitis, bei Ösophagitis und bei chronischer Gastritis – besonders bei „Säufer-Gastritis“ –, bei Pylorospasmus sowie bei Hyperemesis gravidarum.

Basistherapie
Orale Therapie:
Vomitusheel (Tropf.) [Erbrechen und Brechreiz]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.) [Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom (Singultus, Übelkeit und Emesis (Erbrechen) gehören zu den postprandialen Frühsymptomen beim Dumping!); Vomitus (matutinus)]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[Oberbauchsyndrom; Pankreopathie]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.)
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Gallenkoliken; Cholangitis; Cholezystitis, Vomitus biliosus); Stauungsikterus; Leberschädigungen (Parenchymschäden); Hepatitis acuta und chronica; als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen, Meteorismus]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern). Meteorismus; Pfortaderstauung]
Momordica compositum N (Amp.) [Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden; regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Gastroenteritis mit unstillbarem Erbrechen und Erschöpfung]
Colchicum (forte S)
[Magenschmerzen mit Erbrechen von Galle (Vomitus biliosus) und Schleim; das Erbrechen wird bereits durch den Geruch oder Anblick von Speisen ausgelöst]
Ipecacuanha [Brechreiz und Erbrechen verschiedener Ursachen; typisch: Erbrechen erleichtert nicht!]
Nux vomica S [Brechreiz bei Reizmittelabusus; insbes. bei Alkoholabusus („Säufer-Gastritis“ mit Vomitus matutinus)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergen- und reizstoffarme Ernährung
Physikalische Therapie: Feuchte Wärme
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung; psychische Führung bei psychogenem Vomitus hystericus

Erkältungsneigung

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.)
[allgemein zur Anregung des Abwehrsystems]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp., Nasentropfen)
[entzündungshemmende Wirkung]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Leberfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Aufbesserung der Schleimfunktionen]
Naso-Heel SNT (Tropf.)
[bei ersten Erscheinungen des Schnupfens]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Besserung der Nierenfunktion]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[entzündungshemmende Wirkung]
Einzelmittel-Injeele:
Cistus canadensis [jede Erkältung schlägt auf den Hals]
Kalium carbonicum forte N [eine Erkältung folgt der anderen]
Lycopodium S
[Venöse Stase, Hepatopathie, Anregung der Leberentgiftung]
Thuja S [empfindlich gegen Kälte und Feuchtigkeit]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Psorinum
Suis-Organpräparate-Injeele:
Mucosa nasalis suis
Cosmochema:
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Erschöpfungszustände

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung der Ursache: somatisch, z.B. verzögerte Rekonvaleszenz, Neoplasma; ferner bei Neurasthenie, Psychasthenie.

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.)
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Parenterale Therapie:
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Regenerationsmittel, nervöse Erschöpfung; Depressionen, Gedächtnisschwäche, Arteriosklerose, „Altersmittel"]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme, auch bei Neoplasien]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Leber-Krankheiten; Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht – u.a. bei Impotentia virilis und im Klimakterium virile]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Phosphorus S [Erschöpfung nach Infektionskrankheiten]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum suis, Colon suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
Fides:
China Homobion S (Tropf.) [Erschöpfungszustände]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Massagen, Bäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Störfelder
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, HOT, Fokussuche

Erysipel

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Akute Dermatitis, Erysipeloid (Schweinerotlauf)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Antibiotikatherapie! Sehr große Rezidiv-Neigung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen, pustulöse und bullöse Ekzeme: Erysipelas bullosum]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen und Ulcus cruris]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei allen entzündlichen Hautreaktionen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen (Erysipelas phlegmonosum)]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [akute Infektionen mit hohem Fieber]
Belladonna S [Rubor, Calor, Dolor, Tumor]
Cantharis
[brennende Schmerzen, hämorrhagische Entzündungen]
Lachesis S [Erysipel, septische Prozesse; bläulichrote Verfärbung (typisch bei Erysipeloid!), ödematöse Schwellungen]
Rhus Tox S [Erysipel mit flammender Röte]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Exantheme

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen), Umstimmungsmittel]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Entgiftung der Leber]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Entgiftung der Leber]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[Fermentregeneration bei Therapieschäden]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Homöopathisierte Allopathika-Injeele:
sind je nach der vorliegenden Therapieschädigung als Isopathika, besser jedoch im Sinne des Simile-Prinzips (Ähnlichkeits-Prinzip) einzusetzen
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Fazialisparese

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE**
zwischen zentraler (u.a. vaskuläre Hirnprozesse incl. Apoplexie, Neoplasma) und peripherer (Stirnrunzeln nicht möglich!) Fazialisparese stets erforderlich!
- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte sowie generell bei Erkältungen: nässe- und kältebedingte periphere Fazialisparese entzündlicher Genese!]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Regenerationsmittel bei Hirnaffektionen: vaskuläre ischämische Hirnprozesse bei zentraler Fazialisparese!]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen, gestörten Drüsenfunktionen, bei degenerativen Erkrankungen (zellulären Phasen)]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Gelsemium S [Paresen der Hirnnerven sowie peripherer Nerven]
Hypericum [Zerebralsklerose, Neuralgien]
Lachesis S [Paresen nach Infektionen]
Plumbum metallicum [Zerebralsklerose, Neuritiden]
Silicea [Konstitutionsmittel, u.a. Neigung zu Erkältungen]
Zincum metallicum [Paresen und Lidptosis]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Baryum oxalsuccinicum
[zerebrale Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen]
Glyoxal compositum [degenerative Erkrankungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum totalis suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Reizstrom, Krankengymnastik
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Ganglion stellatum, Ganglion sphenopalatinum, Mandelpol
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie mit kleiner Eigenblutbehandlung

Fersensporn (Hackensporn, Kalkaneussporn)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Unterer bzw. oberer/hinterer
(= Haglund-Exostose/Ferse) Fersensporn
- **BESONDERE HINWEISE:**
Fachärztliche Abklärung (Röntgen)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen, Verletzungsfolgen]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [bei Neigung zu Fisteleiterungen und entzündlichen Prozessen]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[erweichend auf Narbengewebe und Keloide – Langzeittherapie!]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Trauma- und Überlastungsmittel]
Asa foetida [Knochenschmerzen, Periostitis]
Graphites [Übergewicht (Adipositas) – (oft Ursache für untere Fersensporne!)]
Hekla Lava [generelles Exostosemittel]
Natrium sulfuricum [Nasswetterverschlimmerung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla ossis suis, Os suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Quaddel im Segment
Weitere Verfahren: Akupunktur; orthopädische Schuhe bzw. Maßeinlagen; Softpoint-Fersenkissen; ggf. Gewichtsreduktion, durchblutungsfördernde Maßnahmen

Fertilitätsstörungen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sterilität
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Testis compositum N Ampullen (beim männlichen Geschlecht)
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ginseng compositum N (Tropf.) [Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme; generell zur Revitalisierung]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[lymphatische Konstitution]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [Sexualschwäche; psychische Depressionen]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum DL-malicum [Erschöpfungszustände, Frigidität]
Acidum succinicum
[Erschöpfungszuständen, bleierne Müdigkeit; Frigidität]
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis (weibl.), **Hypophysis suis, Ovarium suis** (weibl.), **Prostata suis** (männl.), **Testis suis** (männl.), **Uterus suis** (weibl.)
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang, Prostata (beim Mann)

Fibromyalgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Leitsymptome sind vor allem lokale Verspannungsschmerzen sowie schmerzhafte Myogelosen und umschriebene schmerzhafte Verhärtungen der Muskulatur ohne klinische und serologische Entzündungszeichen. Zwei verschiedene Gewebestrukturen sind betroffen, zum einen der parenchymatische Verband der Muskelzellen und Skelettmuskulatur, zum anderen die kollagenen Fasern und Fibroblasten des Bindegewebes im Bereich von Sehnen und Knorpel.

Basistherapie
Orale Therapie:
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Traumeel S (Tabl., Tropf.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomoysot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Hinweis: Die Zumischung eines handelsüblichen Lokalanästhetikums ist möglich.
Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[allgemeine Erschöpfung und depressive Stimmungslage]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei vertebragenen Neuralgien und neuralen Störfeldern]
Circulo-Injeel N (Amp.) [bei peripheren Durchblutungsstörungen, Akroparästhesien]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien, besonders Ischias]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[bei Verschlechterung durch nasses und kaltes Wetter]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom und Epicondylitis]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei bindegewebigen Verhärtungen]
Lithiumeel comp. (Tabl.)
[bei Gicht und rheumatischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.) [zur Therapie auch der Schleimhäute von Gelenken und Sehnen]
Neuro-Injeel (Amp.) [bei psychosomatischen Beschwerden]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [stechende Schmerzen bei Bewegung]
Dulcamara S [Nass- und Kaltwetterverschlimmerung]
Formica rufa
[wandernde Schmerzen, schlimmer bei feuchter Kälte]
Ginseng [rheumatische Beschwerden mit neuralgischen Schmerzen und großer Steifigkeit]
Gnaphalium polycephalum
[Steifigkeit mit Gefühl als fehle die Gelenkschmiere]
Kalmia S [rasch wandernde lanzierende Schmerzen]
Petroleum
[schmerzhafte Steifigkeit, Schwäche, knackende Gelenke]
Rhododendron [Beschwerden bei Wetterwechsel]
Ruta [Wirbelsäulenbeschwerden, Zerschlagenheitsgefühl am ganzen Körper]
Sepia [lahm und steif, Spannung wie zu kurz]
Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Sinusitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Tonsillitis-Nosode**

Suis-Organpräparate-Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Musculus suis
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Restructa SN (Tabl.), **Restructa pro injectione S**
[Harnsaure Diathese, Gicht]
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Injectio antineuralgica S Fides
[Neuralgisch-arthritischer Formenkreis]
Begleittherapie
Allgemeine Ausleitungs- und Entgiftungstherapie:
Hepeel N (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen, Leberschäden] oder
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen] oder
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Katalysatorenpräparate:
Coenzyme compositum Ampullen, Ubichinon compositum Ampullen und **Zitronensäurezyklus-Heel** (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus), Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin-B-Komplex, Vitamin E und Magnesium
Physikalische Therapie
Sonstige Verfahren: Neuraltherapie, Akupunktur, manuelle Medizin, Psychotherapie

Fieber

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Insbesondere bei rezidivierenden Fieberschüben (= Symptom) stets Ursache – also die Krankheit – abklären! Unterstützende Maßnahmen!
  Fieber ist primär nicht als schlecht anzusehen, es ist ein Symptom, welches anzeigt, dass das Immunsystem arbeitet.

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl.) [grippale Infekte]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte; hierbei besonders beginnende Fieberzustände, Schüttelfröste]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Fieber mit zerebralen Reizzuständen]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen sowie besonders Fieber mit Rötungen und Schweißausbrüchen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Fieber mit Schwächezuständen und Erschöpfung]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. Neigung zur Infektanfälligkeit), Fieber bei „Drüsen-Kindern"]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [trockenes Fieber mit Schüttelfrost; beginnende Fieberzustände]
Belladonna S [Fieber mit heißem Schweiß]
Eupatorium perfoliatum [periodisches Fieber; Zerschlangenheitsgefühl, Muskel- und Knochenschmerzen]
Ferrum phosphoricum forte [Fieberzustände mit Erschöpfungszuständen und geringer Abwehrkraft]
Gelsemium S
[Fieber ohne Durst, Schüttelfröste, Zerschlagenheitsgefühl]
Lachesis S [septisches Fieber mit Delirien]
Cosmochema:
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Entfieberungsbäder, Einläufe

Fissura ani

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache [u.a. verhärteter Stuhl, proktogene Obstipation, Thrombophlebitis im Analkanal, Hämorrhoiden, Homosexualität] abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Hämorrhoiden, entzündliche Hautveränderung im Analbereich, Fissuren]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Viburcol N (Supp.)
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Hautaffektionen]
Galium-Heel N (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Entzündung und Einrisse an Körperöffnungen mit „Splitter-Schmerz" und Geschwürsbildung]
Graphites [rissige Haut, Ekzem, Chronizität; Adipositas]
Natrium muriaticum [Rhagaden – Nase, Mund, After]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; proktogene Obstipation, harter Stuhl]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ballaststoffreiche Kost
Physikalische Therapie: Sitzbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Stuhlregulierung

Fisteln

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Cave: Fistelkarzinom!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen, besonders eiternde Unterschenkelfisteln aber auch fistelnde Otitis media, Ulcus cruris]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Fisteleiterungen und bei Osteomyelitis (chronische Eiterungen aus Fistelgängen!)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [generell bei Eiterungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen]
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Fissura ani und Hämorrhoiden]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [innere Fisteln; Gewebedestruktion]
Silicea [Konstitutionsmittel; bes. auch bei chronischen Eiterungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ballaststoffreiche Kost, Darmsanierung bei Fisteln im Darmkanal (z.B. beim Morbus Crohn)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: **Lymphomyosot N** lokal in den Fistelgang
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (Fistelbegasung), Symbioselenkung, Umspritzung, chirurgische Intervention, physikalische Therapie

Fluor albus

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gonorrhoe, Lues, Mykosis (Soor), Trichomoniasis, Chlamydien, Polyposis, Tbc, Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache fachärztlich abklären;
  Partnerbehandlung („Ping-Pong-Infektion“).

Basistherapie
Orale Therapie:
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen: nicht nur bei Fluor (albus), u.a. auch bei Adnexitis und Kolpitis]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Carbo vegetabilis [Fluor albus bei Erschöpfungszuständen]
Kreosotum [Fluor, Pruritus vulvae]
Pulsatilla S [Fluor albus (mit Depression), bes. bei verspäteter Menstruation]
Sepia [wundmachender Fluor, bes. im (Prä)Klimakterium]
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis
Cosmochema:
Fluor-Zäpfchen S [Gesteigerte Absonderungen von Schleim und sonstigen Sekreten]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Sitzbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Frankenhäuser-Plexus, Schilddrüse, Plexus sacralis
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Darmsanierung; ggf. Psychotherapie (bei Fluor albus als psycho-reaktiv/vegetativem Symptom)

Foetor ex ore

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache – auch zahnärztlich! – abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Gastricumeel (Tabl.) [bei Gastritis acuta et chronica]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (Foetor hepaticus)]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [häufiges meteoristisches Aufstoßen bzw. Singultus]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Foetor ex ore bei Munderkrankungen (Gingivitis, Aphthen, Parulis, Stomatitis, Pulpitis, Peridontitis) mit Ptyalismus]
Nosoden-Injeele:
Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Pulpa dentis suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Mundspülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Mandelpol, Nebenhöhle
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie (ozonisiertes Wasser), Symbioselenkung, Zahnsanierung

Fokaltoxikosen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache eruieren!
  Allgemeine Hinweise: An einem devitalen Zahn sprossen mit dem sich bildenden Granulom vegetative Gefäßnerven, die mit dem zur Devitalisierung verwandten Homotoxin (Arsen und andere) in Berührung kommen, welcher Vorgang einem Imprägnationseffekt entspricht.
  Bei Narben haben die daraus resultierenden Durchblutungsstörungen ebenfalls imprägnative Auswirkungen im Gefolge.
  Die daraus sich ergebenden Störungen entsprechen der Fokaltoxikose (neuralpathologischen Reflexen im Sinne von Reilly, Speransky, Ricker).
  Die Entfernung eines solchen Herdes ist indiziert, z.B. Zahnextraktion.
  Da die Tonsillen infolge vielfacher retoxischer Behandlung von Anginen ebenfalls derartige Imprägnationsherde aufweisen können, kann die Exstirpation ebenfalls indiziert sein.
  Hier sind aber auch Möglichkeiten der Provokation von regressiven Vikariationen (Angina) gegeben, mittels derer derartige Imprägnationsphasen in der Tonsille zur Auflösung gebracht und ausgeheilt werden können.
  Diese regressiven Vikariationen sollte man in jedem Falle erzielen bzw. über eine solche abzuheilen versuchen mittels folgender Präparate:

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
An-io-Injeel (Amp.) [pektanginöse Beschwerden]
Barijodeel (Tabl.)
[Lymphatismus, u.a. auch chronische hyperplastische Anginen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien mit stechenden Schmerzen und Parästhesien]
Cralonin (Amp.) [infektiös-toxische Myokardschwäche, nervöse Herzstörungen, Herzstiche und Herzschmerzen sonstiger Art (pektanginöse Beschwerden]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch bei Viruserkrankungen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Migräne (Migraine cervicale) und Zervikalsyndrom sowie Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Suppurationen, u.a. auch im (peri-)tonsillären Gewebe, z.B. bei Anginen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [Weichteilrheumatismus; Neuralgien, arthritische und Bandscheibenbeschwerden]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien; pleuritische Schmerzen; ferner Herpes zoster]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Weichteilrheumatismus und Neuralgien sowie (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel]
Hypericum [Neuralgien und krampfartige Schmerzen]
Kalmia S [fokaltoxische Infektarthritis, fokaltoxischer Muskelrheumatismus, fokaltoxische Herzaffektionen (Endo-, Myo-, Perikarditis)]
Lachesis S [bei septischen Prozessen sowie bei Angina tonsillaris]
Phytolacca forte S
[fokaltoxischer Muskel- und Gelenkrheumatismus; Tonsillitis]
Staphisagria [bei rezidivierenden und schleichenden chronischen Infektionen sowie bei Zahnkaries und Parodontose]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions- und Reaktions- bzw. Umstimmungsmittel]
Thuja S [bei allen fokalbedingten mehr oder weniger chronischen Krankheiten]
Nosoden-Injeele:(Einsatz gemäß des Fokus)
Übersicht über „Fokalherd-Nosoden“:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode, Sinusitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans [Endocarditis lenta],
Tonsillitis-Nosode; ggf. Otitis media-Nosode,
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost.
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Darmsanierung, Symbioselenkung, physikalische Therapie, Lymphdrainagen

Frostbeulen (Perniones)

Basistherapie
Orale Therapie:
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme, pustulöse und bullöse Ekzeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Haut- und Uterhautaffektionen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum
[Hautschäden mit Geschwürsbildung; „Splitterschmerz“]
Pulsatilla S
[reißende Schmerzen in den Füßen; Neigung zu kalten sowie Folgen von durchnässten Füßen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N
[Periphere Durchblutungsstörungen]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen, Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen

Furunkulose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Metastasierende Abszesse in verschiedenen Organen, Morbus Hodgkin.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Erhöhte Disposition bei verschiedenen Krankheiten (meist staphylogen), z.B. Diabetes mellitus, Gicht, chronische Infektionskrankheiten, körperliche Abwehrschwäche, Immundefekte (AIDS).

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, z.B. Furunkeln sowie ferner u.a. bei Karbunkeln, Abszessen, Phlegmonen und Fokaltoxikosen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Karbunkel, Furunkel und zwar bes. bei beginnenden Furunkeln]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen; ggf. mit Blasenbildung]
Belladonna S [Rubor, Calor, Dolor, Tumor]
Hepar sulfuris [Eiterprozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S
[bei septischen Prozessen mit bläulichroten Schwellungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Furunkulose im akuten und chronischen Stadium]
Myristica sebifera forte [Furunkel, Abszesse; "homöopathisches Messer": beschleunigte Einschmelzung]
Silicea [Konstitutionsmittel; dünnflüssig-wässriger Eiter sowie zur Beendigung der Eiterung]
Staphisagria [Pyodermie und Furunkulose]
Nosoden-Injeele: **Staphylococcus**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Fluor-Zäpfchen S [Gesteigerte Absonderungen von Schleim und sonstigen Sekreten]
Wund-Heilsalbe Cosmochema [Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Erfrierungen und Verbrennungen der Haut]
Fides:
Ureata (Salbe)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Waschungen, UVA
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Umspritzung der Mandelpole
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (kleine Eigenblutbehandlung), Symbioselenkung, Stuhlregulierung

Fußschweiß

Basistherapie
Orale Therapie:
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Hautaffektionen, u.a. auch bei Mikrosporie, Interdigital- und sonstigen Dermatomykosen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.)
[zur Anregung der Abwehrmechanismen bei Dermatosen, besonders bei Pyodermien und juckenden Hautaffektionen]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung bei Fehlfunktionen derselben wie Fußschweiß und genereller Hyperhidrosis sowie bei Ekzemen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen, Pruritus: Entgiftungsmittel mit erweitertem Schwefeleffekt]
Einzelmittel-Injeele:
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; kalte sowie übelriechende Schweiße]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum,
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon
[starke Überempfindlichkeit gegenüber Wasser und Seife; Neigung zur Schrunden- und Rhagadenbildung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis, Ren suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Eichenrindenbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur (Nierenpunkte), Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Gangrän

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Trockene/feuchte Gangrän
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig bei Diabetes mellitus;
  adjuvante Therapie, evtl. chirurgische Intervention,
  Keimstatus (Anaerobier und Fäulnisbakterien bei feuchter Gangrän = „heißer Brand";
  Clostridium perfringens bei Gasgangrän [= Gasbrand]).

Basistherapie
Orale Therapie:
Arteria-Heel N (Tropf.)
[arterielle periphere Durchblutungsstörungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Ulcus cruris, Fisteleiterungen]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [septisches Fieber; feuchte übelriechende Gangrän („heißer Brand")]
Kreosotum [(diabetische) Gangrän mit Brennschmerz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen; düsterrote Entzündungen]
Stramonium [Gangrän mit Schmerzen und Unruhe]
Vipera berus [thrombophlebitische Gangrän]
Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum [diabetische Durchblutungsstörungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Placenta suis, Sympathicus suis, Vena suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Bäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie (Beutelbegasung), Unterspritzung, Gewebeaktivierung

Gastritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Malignomausschluss, Ulcus ventriculi, pylori et duodeni
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ausschluss einer „Medikamenten-Gastritis" (u.a. durch Salizylate, Phenylbutazon, Kortikosteriode, Zytostatika).
  Röntgen- Gastroskopie-Kontrollen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität sowie bei gleichzeitig vorliegender Duodenitis mit und ohne Ulkus]
Erigotheel (Amp.) [Hyperazidität und Supermobilität des Magens sowie bei Ulcus duodeni et ventriculi]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum
[akute Gastritis; Völlegefühl, Erbrechen (= Vomitus), Appetitlosigkeit, Widerwillen gegen alle Speisen; Verdrießlichkeit]
Argentum nitricum
[nervöse Gastritis (ohne und mit Ulcus ventriculi); abgemagerte, gealterte Patienten (Facies gastrica)]
Pulsatilla S [Gastritis mit Völlegefühl und Brechreiz sowie schlechtem pappigem Geschmack]
Intermediäre Katalysatoren: **Histamin** [Magen-(Darm-)Spasmen, bes. bei allergischer Gastritis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis [nasale Reflex-Gastritis],
Ventriculus suis
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Kohlenhydratreduktion, Magenschonkost; cave Alkoholabusus! Nikotinverbot!
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Wärmeanwendung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Plexus solaris, oberer Grenzstrang, Ganglion coeliacum
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, Autogenes Training

Gastroenteritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Alkoholabusus, Infektion, Dyspepsie, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa/mucosa, Allergie, Malassimilations-Syndrom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Keimprofil!

Basistherapie
Orale Therapie:
Diarrheel SN (Tabl.) [Diarrhoen, Gastroenteritis]
Veratrum-Homaccord (Tropf.)
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Veratrum-Homaccord
[Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Duodenoheel (Tabl.) [Duodenitis, Ulcus duodeni (Hyperazidität) sowie ferner Dyspepsie]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gastroenteritis sowie Enterocolitis]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen, Meteorismus]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Verdauungstrakt]
Podophyllum compositum (Tropf., Amp.)
[Katarrhe der Dickdarms, z.B. Colitis mucosa et ulcerosa]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Morgen-Diarrhoe, ggf. mit Stuhlinkontinenz]
Arsenicum album S [Brechdurchfall, Erschöpfung]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[schwere Durchfälle mit Blut und Tenesmen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Salmonella typhi
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Pankreas suis, Ventriculus suis

Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fasten, allergenfreie Ernährung
Physikalische Therapie: Wärmeanwendung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Plexus solaris, oberer Grenzstrang, Störfeldsuche
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Stuhluntersuchung, Darmsanierung

Gedächtnisschwäche

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Arteriosklerose (Zerebralsklerose), Traumata (Commotio, Contusio, Compressio cerebri, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen,
Morbus Alzheimer (vor allem Kurzzeitgedächtnis betroffen!)

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Selenium-Homaccord [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.)
[periphere arterielle Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [zur Herzstützung (Herzmuskelschädigungen, infektiöstoxische Myokardschwäche; Zustand nach Herzinfarkt, bes. beim Altersherz]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Schwindelsymptomatik, besonders arteriosklerotisch bedingte Schwindelzustände; verlangsamte Hirnstammfunktion („lange Leitung")]
Einzelmittel-Injeele:
Selenium [Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit]
Sulfur (forte) S [Konstitutions- und Stoffwechselmittel; reizbare, pessimistische, depressive Stimmungslage verbunden mit Gedächtnisschwäche]
Thuja S [Konstitutionsmittel mit Angriff am ZNS: schwerfälliges Denken, Schludrigkeit, schlechtes Erinnerungswermögen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Hepar suis, Ovarium suis, Testis suis
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum; ggf. in Störfelder
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, „Gehirnjogging"

Gehörgangsekzem

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Kontaktekzem, Neurodermitis atopica localisata, Otomykose, mikrobielles Ekzem, seborrhoisches Ekzematoid, Superinfektion (Staphylokokken)

- **BESONDERER HINWEIS:**

Basistherapie
Orale Therapie:
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[trockene, chronische Ekzeme]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [urtikarielle Ekzeme]
Adeps suillus
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei exsudativer Diathese]
Graphites [chronische, trockene Gehörgangsekzeme]
Kreosotum [Ekzem mit Juckreiz und Blutungsneigung]
Natrium muriaticum [ekzematöse und pustulöse Exantheme]
Silicea
[Konstitutions- und Bindegewebsmittel; Neigung zur Chronizität]
Sulfur (forte) S
[seborrhoische und trockene Ekzeme mit großem Juckreiz]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
FideSan (Salbe) [Ekzeme, Dermatosen]
Fides:
Ureata (Salbe)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Am Mastoid quaddeln
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung, Spülungen

Gehörgangsfurunkel

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Mastoiditis

- **BESONDERE HINWEISE:**
Cave: Diabetes mellitus; evtl. Antibiotikatherapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.)
[(nässende) Ekzeme, Hyperhidrosis, Hyperkeratose]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen; bullöse, pustulöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Phlegmonen, Abszessen sowie bei Otitis media oft mit Ohrenfluss (laufendes Ohr)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. Neigung zur Infektanfälligkeit)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel und Karbunkel]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Eiterprozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Furunkulose]
Myristica sebifera forte
[“homöopathisches Messer: beschleunigte Einschmelzung]
Staphisagria [trockene und nässende Dermatosen]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus, Streptococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Kost, Zuckerreduktion
Neuraltherapie: Quaddeln am Mastoid
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung

Gelenkerguss

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Hydrarthros: traumatisch sowie als Reizerguss bei „aktivierter Arthrose“ – P. Otte und bei Allergie
Hämarthros: traumatisch sowie bei Hämophilie („Blutergelenk“). Stets Ausschluss einer Gelenksinfektion sowie einer Tbc, Lues und Gonorrhoe und eines Neoplasmas sowie einer Gicht und einer Arthritis rheumatica bzw. einer Polyarthritis.

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ergussart abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung: Blutergüsse im Gelenk (= Hämarthros)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.),
Lymphomyosot N (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Infektanfälligkeit und zur Ödembildung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse Schwellungen: allergische (meist intermittierende) Gelenkergüsse (Hydrarthros bzw. Hydrops intermittens articulorum)]
Colchicum (forte S) [wandernde Gelenkbeschwerden mit Schwellungen; z.B. auch bei Gicht und Polyarthritis]
Crotalus [Gelenkblutungen (Hämarthros)]
Vipera berus [Blutungsneigung und Blutungen im Gelenk]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kälteanwendungen
Ausleitende Therapie:
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Neuraltherapie:
Störfelderbeseitigung, Quaddeltherapie am Kniegelenk
Weitere Verfahren: Schröpfen, Punktion

Gicht

- **BESONDERE HINWEISE:**
Stoffwechselabklärung!
Cave „Gicht-Niere“, Harnsäure-Nierensteine und „Gicht-Hypertonie“

Basistherapie
Orale Therapie:
Lithiumeel comp. (Tabl.) [Gicht und rheumatische Erkrankungen]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie der Leberzellfunktionen, auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; ferner Hypercholesterinämie (oft mit Gicht verbunden bei „Luxuskonsum“ sowie bei Adipositas]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[weichteilrheumatische und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat: Podagra, Gonagra, Chiragra; Arthritis/Tendovaginitis/Bursitis urica]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Neuralgien und Myalgien]
Bryonia S [entzündlich-rheumatische Erkrankungen]
Colchicum (forte S)
[wandernde Gelenkschmerzen; akuter Gichtanfall]

Intermediäre Katalysatoren:
Natrium pyruvicum
[langsam fortschreitende Gicht mit weissen Tophi],
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Os suis, Ren suis
Fides:
Restructa SN (Tabl.), **Restructa pro injectione S**
[Harnsaure Diathese, Gicht]
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Purinarme Kost, Alkoholeinschränkung, Gewichtsreduktion
Physikalische Therapie: Feucht-kalte Umschläge
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme],
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Aderlass
Neuraltherapie: Mandelpol, Gelenkquaddel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung

Gingivitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Iatrogen (Medikamenten-Gingivitis/Gingivahyperplasie), Gravidität, Leukämie, Agranulozytose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Zahnärztliche Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Magen-Darm-Lebermittel, bes. bei Genussmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Osteoheel S (Tabl.)
[Gingivitis mit Knochenschmerzen (Periostitis)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[Schleimhautentzündungen; „Splitterschmerz"]
Asa foetida
[Weichteilentzündungen; extreme Berührungsempfindlichkeit]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Gingivitis sowie Pulpitis und Parodontitis bzw. Parodontose]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Spülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Lokale Infiltration, Störfeldsuche
Weitere Verfahren: Zahnsanierung! Amalgam! Symbioselenkung

Glaskörpertrübung

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenärztliche Kontrolluntersuchungen sind bei allen Augenerkrankungen dringend anzuraten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Fermentregeneration]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [als Zwischenmittel]
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Anregung der Fermentregeneration]
Suis-Organpräparate-Injeele: **Corpus vitreum suis (forte)**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Glaukom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen und Arten;
  Migräne, Arteriitis temporalis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Notfallsituation! Augenärztliche Abklärung!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.) [Kollaps- und Schwächemittel]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Bluthochdruck, Tachycardie, pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Veratrum-Homaccord [Kollaps- und Schwächemittel]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Arteriosklerose und anderen geriatrischen Indikationen sowie bei vegetativer Dystonie: allgemeine Disposition für das primäre Glaukom sind höheres Alter, vegetative Labilität; Auslösung oft durch Stress]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen (Glaucoma chronicum!]

Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[migräneartige Kopfschmerzen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Oculoheel (Tabl.) [Blepharo-Konjunktivitis]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [Kopfschmerzmittel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [periodische Migräne; Schmerzen und Tränenfluss]
Kalmia S [Kopfschmerz über den Augen; Iritis-Mittel]

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus vitreum suis forte, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Oculus totalis suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Augenpunkte, Glabella, Ganglion ciliare

Globusgefühl

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Ösophagitis, Aortenaneurysma, psychische Ursache, funktionelle Schluckstörungen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]

Parenterale Therapie:
Ignatia-Homaccord
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische Beschwerden, Depression]

Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei vegetativer Dystonie sowie bei geriatrischen Indikationen]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gastricumeel (Tabl.)
[Magenkrankheiten (Gastritis acuta und chronica) sowie Sodbrennen und Meteorismus mit Klossgefühl]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Heiserkeit sowie Seitenstrangangina mit Globusgefühl]
Strumeel T (Tabl.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Strumeel forte NF (Tropf.) [bei Globusgefühl infolge Kropf]

Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [Fremdkörpergefühl im Hals, verbunden mit Magendruck, Dysphagie und Singultus]
Ignatia S [Globusgefühl mit Hysterie und/oder Depressionen]
Lachesis S [Erstickungsgefühl, Kitzel, Globusgefühl, bes. auch bei Tonsillitis]
Pulsatilla S [Hypochondrie und Weinerlichkeit]
Spongia [Räusperhusten bei Struma parenchymatosa]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Larynx suis forte, Sympathicus suis, Ventriculus suis

Fides:
Gelsemium Homobion S (Tropf.) [Kopfneuralgien, Migräne]

Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Ganglion stellatum, Thyreoidea-Quaddel
Weitere Verfahren: Psychotherapie

Glomerulonephritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chronische Pyelonephritis, nephrotisches Syndrom, sekundäre Nephrosklerose,
  Lupus erythematodes,
  Wegener-Klinger-Granulomatose (= fokale nekrotisierende Glomerulitis)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung (relativ häufig nach Streptokokkeninfekten – incl. Scharlach – als „Zweitkrankheit“)!
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]

Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]

Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände im Urogenitaltrakt]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. – nicht nur bei Glomerulonephritis – auch bei Pyelitis/Pyelonephritis, Zystitis/Zystopyelitis sowie bei Fokaltoxikosen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und zur Infektanfälligkeit; Tonsillarhypertrophie und Tonsillitis chronica (Tonsillen als Foki!)]
Plantago-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Enuresis nocturna, Incontinentia urinae, Reizblase]
Reneel NT (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung wie Zysto-Pyelo-Nephritis]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Nephritis mit fettiger Degeneration]
Cantharis [Nephritis, Zystitis mit Hämaturie und Albuminurie]
Lachesis S [bei septischen und hämorrhagischen Prozessen]
Phosphorus S [Nephritis mit Hämaturie und Zylindrurie]

Nosoden-Injeele:
Cystopyelonephritis-Nosode, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
(embolische Herdnephritis Löhlein),
Tonsillitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Eiweiß- und Flüssigkeitsbilanzierung
Neuraltherapie: Nierenpol, oberer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie; Fokussuche und -eliminierung

Glossitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Melkersson-Rosenthal-Syndrom (granulomatöse Glossitis),
  Möller-Hunter-Glossitis (bei perniziöser Anämie),
  Plummer-Vinson-Syndrom (Eisenmangelanämie, achylische Chloranämie), Diabetes mellitus, psychische Genese
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Anaphylaxie als Ursache! Ursache auch schlechte Zahnprothesen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.) [Kollaps- und Schwächemittel, Magen-Darmbeschwerden]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen (mit Rubor, Tumor, Calor, Dolor)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen): Glossitis bei Infektionskrankheiten]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen und zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. auch im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Glossitis dissecans mit tiefen Einrissen der Zungenoberfläche!)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Antigenfrei
Neuraltherapie: Mandelpol, Störfeldersuche
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Granulome (Zähne)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Die Extraktion beherdeter Zähne ist wegen der Gefahr der Ausprägung einer Fokaltoxikose unter besonderer Vorsicht durchzuführen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [bei Lymphatismus]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Narben und Neuralgien]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [zur Verbesserung der Leberentgiftung]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [bei rheumatischen Affektionen]
Rhododenroneel S (Tropf.) [bei Narben und Neuralgien]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele: **Tonsilla suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Ernährungsumstellung
Mikrobiologische Therapie
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie

Grippaler Infekt, Grippe (Influenza)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Cave: Mischinfektionen, bakterielle Superinfektionen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl.) [grippale Infekte]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Viburcol N (Supp.)
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Grippe und katarrhalische Infekte, bes. im Anfangsstadium mit Schüttelfrösten]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. auch Angina tonsillaris]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [Bronchitis, besonders chronischer Raucherkatarrh (trockener Reizhusten)]
Bryaconeel (Tabl.) [grippale Infekte, neuralgische Schmerzen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Grippe sowie Otitis media (Grippe-Otitis) und Poly)Sinusitis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. der Bindehaut des Auges (Grippe-Konjuktivitis]
Naso-Heel SNT (Tropf.) [Rhinitis und Polysinusitis]
Tartephedreel N (Tropf.) [„absteigende“ Katarrhe der oberen Luftwege: schneller Übergang einer Laryngitis in eine Bronchitis. Husten, der sich nur schwer löst]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [trockene Tracheo-Bronchitis mit Hustenreiz und Retrosternalschmerz; Kopfschmerzen]
Causticum S [Laryngo-Pharyngitis, Aphonie, Reizhusten; brennende Schmerzen]
Eupatorium perfoliatum [fieberhafte Infekte mit Glieder- und Retrosternalschmerz mit Wundheitsgefühl]
Ferrum phosphoricum forte [anfängliche Fieber- und Entzündungszustände; Patienten mit geringer Abwehrkraft]
Lachesis S [ödematöse blaurote livide Verfärbung, Blutungsneigung; Immunstimulans]
Phosphorus S
[fieberhafte (Broncho)Pneumonie, Blutungsneigung]
Rhus Tox S [grippale Infekte mit Neuralgien und Myalgien]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4,
Grippe-Nosode [nach überstandener Krankheit]
Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Cosmochema:
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.),
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Physikalische Therapie: Halswickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weiteres Vorgehen:
Rp.: Drosera-Homaccord Tropf.,
Husteel Tropf.,
Tartephedreel N Tropf. ana 30,0
M.D.S.: Hustentropfen, 3 mal tägl. 15 Tropfen

Hämatome

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Leukämie, Morbus Werlhof (thrombozytopenische Purpura) und andere hämorrhagische Diathesen
(z.B. Hämophilie = „Bluterkrankheit") bzw. Gerinnungsstörungen; Traumata
- **BESONDERE HINWEISE:**
Behandlung des Grundleidens!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.)
[bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cinnamomum-Homaccord N [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[venöse Stase; thrombophlebitische Zustände]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Stase]
Arnica S [Distorsionen, Luxationen, Frakturen, Quetschungen mit Hämatomen]
Crotalus [hämorrhagische Diathese]
Hamamelis [venöse Stase mit Stauungsdruck]
Phosphorus S [Blutungsneigung; hämorrhagische Diathese]
Vipera berus [Blutungsneigung und Blutungen]
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Arnica-Salbe Cosmochema [Myalgien nach Überlastung, Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamin K-reich
Physikalische Therapie: Kälte, Quarkanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Ggf. Punktion

Hämorrhoiden

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Analkarzinom, Rektumkarzinom, Proktitis, Analthrombose, Leberzirrhose

Basistherapie
Orale Therapie:
Paeonia comp.-Heel (Tabl.) [Hämorrhoiden, entzündliche Hautveränderung im Analbereich, Fissuren]
Podophyllum compositum (Tropf.)
[colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Podophyllum compositum
[colitische Reizzustände, Hämorrhoiden]
Lokale Therapie:
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [Varikosis bzw. venöse Stase, Hämorrhoiden (mit „Splittergefühl")]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[bei Neigung zur Blutungen, kapillare Sickerblutungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Gastroenteritis]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus
[Hämorrhoiden, Pfortaderstauung, chronische Obstipation]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis, Vena suis
Cosmochema:
Hämorrhoidal-Zäpfchen N [Beschwerden bei Hämorrhoiden]
Arnica-Salbe Cosmochema [Myalgien nach Überlastung, Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems]
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Cave: Gewürze, Ethanol!
Physikalische Therapie: Kälteanwendung
Weitere Verfahren: Stuhlregulierung; ggf. Operation

Harnwegsinfekt

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago comp. Heel [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Suppositorien:
Spascupreel S [Krampfzustände, Tenesmen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel (Zystitis, Zystopyelitis als hämatogene Infektion im Rahmen anderer entzündlicher Prozesse), Karbunkel]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie]
Plantago-Homaccord (Tropf.) [Reizblase, Incontinentia urinae, Enuresis nocturna]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizblase; im 1. Stadium des Prostataadenoms (sog. Prostatahypertrophie)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Nephritis; brennende Schmerzen]
Cantharis [Zystitis, Urethritis; Harndrang, Strangurie]
Hepar sulfuris [bei eitrigen Prozessen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Cystopyelonephritis-Nosode, Medorrhinum, Staphylococcus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Cosmochema:
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Fides:
Orthosiphonblätter - Indischer Nierentee FIDES
[Zur Durchspülung der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr; laktovegetabile gewürzarme Kost; ggf. „Schaukeldiät“
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Hashimoto-Thyreoiditis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Schilddrüsenfunktionsstörungen anderer Ursache wie Basedow-Krankheit, Schilddrüsenentzündung, Schilddrüsenadenome, Jodüberangebot, Überdosierung von Schilddrüsenhormonen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine chronisch-lymphozytäre Schilddrüsenentzündung in einer hypertrophen Form. Sie ist eine Autoimmunkrankheit. Die Ursachen liegen vermutlich in einem autosomal-dominanten Erbgang. Schilddrüsenerkrankungen aller Art treten in betroffenen Familien gehäuft auf. Es handelt sich um eine Autosensibilisierung gegen Thyreoglobulin. In 95 % der Fälle ist eine Manifestation bei Frauen im Alter von 40 bis 60 Jahren, bei 25 % der Kranken findet man gleichzeitig andere Autoimmunerkrankungen.
  Wie bei allen Autoimmunerkrankungen muss man mit den Gaben von immunstimulierenden Homöopathika außerordentlich vorsichtig, ja zurückhaltend sein. Alle schilddrüsenspezifischen Homöopathika haben einen stimulierenden Effekt.

Basistherapie
Orale Therapie:
Allgemein ausleitende Therapie mit
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]

Symptomenbezogene Therapie
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck, Tachycardie, pectanginöse Beschwerden]
Ignatia-Homaccord (Amp.) [bei Globusgefühl]
Nervoheel N (Tabl.) [bei nervösen Störungen, Unruhezuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Schilddrüsenerkrankungen, Entzündungen der oberen Luftwege]
Spongia [Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie Lymphdrüsen, Schilddrüse]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Staphyloccocus [Schädigung durch Staphylokokken-Gifte, z.B. Autoaggressionskrankheiten],
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
Suis-Organpräparate-Injeele:
Glandula lymphatica suis, Glandula thyreoidea suis

Begleittherapie
Die Heel-Therapie kann hier nur palliativ erfolgen, die Grundtherapie muss mit Kortison, Enzymen und evtl. immunsuppressiven Maßnahmen durchgeführt werden.
Enzympräparate und Antioxidantien

Hepatitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sarkoidose, malignes Lymphom, Brucellose, Listeriose, Toxoplasmose, Leptospirose, Lues;
  viral verursachte Hepatitiden
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären (u.a. auch Alkohol- und Drogen-Hepatitis)!
  Cave: Posthepatitische Leberzirrhose
  Trinkampullenmedikation!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Engystol (Tabl.) [Virushepatitis]
Parenterale Therapie:
Hepeel N [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Hepar comp. Heel
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]

Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.)
[akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen, Hepatitis acuta et chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden), Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Duodenoheel (Tabl.) [Duodenitis, Ulcus duodeni]
Engystol (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen); also besonders indiziert bei infektiöser bzw. viraler Hepatitis]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen (chronisch-persistierende Hepatitis!)]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta et chronica, Sodbrennen, Meteorismus]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern); Pfortaderstauung, Meteorismus]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Magen-Darm-Lebermittel, bes. nach Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee) und nach Diätfehlern; Meteorismus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Leberschäden mit Durchfall und Hinfälligkeit/Abmagerung]

Cynara scolymus [Leberentgiftung]
Lycopodium S
[Hepatopathie mit Pfortaderstauung und Meteorismus]
Phosphorus S [fettige Degeneration der Leber; Blutungsneigung]
Taraxacum [Hepatitis, Cholezystopathie mit dumpfem Leberschmerz, Meteorismus und Flatulenz]
Nosoden-Injeele (in Abhängigkeit von Ursache der Hepatitis) u.a.:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Herpes simplex-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Cystein [Leberaffektionen als Therapieschaden],
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Cave: Alkohol, Fett!
Physikalische Therapie: Leberwickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Vorderer Grenzstrang, oberer Grenzstrang, Plexus solaris
Weitere Verfahren: HOT (hämatigene Oxigenationstherapie) Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Herpes labialis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Infekte anderer Genese (z.B. Candida), allergische Ekzeme.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Herpesinfekte treten gehäuft nach grippalen Infekten auf und sind ein Zeichen gestörter Immunsysteme. Eine diagnostische Abklärung muss in jedem Fall erfolgen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S Salbe [zur lokalen Behandlung der Herpeskrusten]
Symptomenbezogene Therapie
Cutis compositum N (Amp.) [bei Beteiligungen der Haut]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[bei bakteriellen Superinfektionen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[zur Ausleitungstherapie der lymphatischen Systeme]
Einzelmittel-Injeele:
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Schleimhautentzündungen der Atemwege]
Mezereum S [juckende Hautreizungen und Hauteiterungen]
Rhus Tox [juckende Hautkrankheiten, fieberhafte Infektionskrankheiten, Nervenschmerzen]
Nosoden-Injeele:
Herpes simplex-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele:
Mucosa nasalis suis
Fides:
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie der chronischen Herpesinfekte:
1. Stufe Euphorbium comp. SN
2. Stufe Lymphomyosot N
3. Stufe Mucosa compositum
4. Stufe Herpes simplex-Nosode-Injeel

Vitamine
Antioxidantien
Euphorbium comp. Nasentropfen SN (Dosierspray) [virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]

Herpes zoster

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Zoster corneae (unbedingt augenärztliche Behandlung), Zoster-Meningoenzephalitis und Zoster-Myelitis;
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ranunculus-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Mezereum-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Parenterale Therapie:
Ranunculus-Homaccord [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
(auf die Bläschen aufsprühen) [antivirale Wirkung]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme (pustulöse bzw. bullöse Zosterbläschen!); zerebrale Reizzustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Dermatosen, u.a. auch Impetigo contagiosa]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Phlegmonen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [wunde und rissige Hautveränderungen; Blutungsneigung (Zoster haemorrhagicus)]
Apis S
[Schwellungen, Juckreiz, stechende brennende Schmerzen]
Argentum nitricum [Abmagerung; gealtertes Aussehen (Zoster im Senium!); „Splitterschmerz"; lanzinierende Schmerzen]
Cantharis [bullöse und pemphiginöse brennende Dermatitiden; bes. bei Zoster im Gesicht]
Formica rufa [generell: Umstimmungsmittel; speziell Neuralgien und Druckempfindlichkeit der Nervenaustrittstellen]
Hepar sulfuris [Phlegmone-Tendenz (Zoster phlegmonosus!)]
Hypericum [Neuralgien bei akutem Zoster und bei postherpetischen Neuralgien]
Mezereum (forte S) [vesikulöse herpetische Ekzeme; Schorfbildung und Abschuppung (Zoster necroticans/gangraenosus)]
Rhus Tox S [bullöse blasige Dermatitiden mit Brennen und Juckreiz; Neuralgien]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Medulla oblongata suis, Sympathicus suis
Fides:
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Vitaminreiche Ernährung
Akupunktur: Besonders bei postherpetischen Neuralgien
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Herzinsuffizienz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Schweregrade
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung, ob eine Herzglykosidbedürftigkeit besteht!
  Kardiologische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Parenterale Therapie:
Cralonin [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Cor suis compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]

Symptomenbezogene Therapie
An-io-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei ödematösen Zuständen]
Aurumheel N Tropfen
[bes. bei Hypotonie sowie bei Herzrhythmusstörungen und bei vegetativ-funktionellen Herz- und Kreislaufstörungen]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion; pektanginöse Beschwerden]
Melilotus-Homaccord N Tropfen, Melilotus-Homaccord (Amp.)
[bes. bei rotem Hochdruck (Plethora) sowie bei präapoplektischen Zuständen]
Strophanthus compositum N (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäßwirkung]
Aurum [hypertensive Stenokardien]
Cactus [Angina pectoris, Herzklopfen]
Carbo vegetabilis
[Herzangst, Kollapsneigung, Dyspnoe, „Emphysem-Herz"]
Coffea [Cor nervosum]
Crataegus [Präinsuffizienz, Altersherz]
Spongia [„Strumaherz"; Reizhusten]
Strophanthus [Cor nervosum, kardiale Angstzustände]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cor suis, Vena suis
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Strophanthus comp.-Herztabletten
[Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Strophantab (Tabl.) [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]

Begleittherapie
Ernährung: Diät, cholesterin- und fettarme Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, ggf. Neuraltherapie [vertebragene Angina pectoris], Sauerstofftherapie, Ozontherapie, dosiertes körperliches Training
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Herzneurose (Cor nervosum)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Angina pectoris (incl. vertebragene!), Herzinfarkt, larvierte Depression
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Organbefund ausschließen,
  Ausschluss einer Fokaltoxikose!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pectanginöse Beschwerden, auch vertebragener Ursache]
Parenterale Therapie:
An-io-Injeel
[Koronardurchblutungsstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Strophanthus compositum N
[koronare Durchblutungsstörung, Stärkung des Herzmuskels]

Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen
[vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen sowie Herzrhythmusstörungen, bes. bei Hypotonie]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [Altersherz; nervöse Herzstörungen wie Herzstiche und Herzschmerzen sonstiger Art, Folgen von Herzmuskelschädigungen, Koronardurchblutungsstörungen, Zustand nach Myokardinfarkt]
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität, Duodenitis, Ulcus duodeni, ggf. verbunden mit gastrokardialem Symptomenkomplex]
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Tachykardie, bes. bei Schilddrüsenüberfunktion, pektanginöse Beschwerden]
Ignatia-Homaccord (Amp.)
[Depressionen, hysterische Aphonie, paradoxe Symptome; ggf. verbunden mit Unruhe, Angst und Herzklopfen]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden, Neurosen im Klimakterium]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globusgefühl]
Einzelmittel-Injeele:
Coffea [Herzklopfen mit Schlaflosigkeit]
Strophanthus
[kardiale Angstzustände, „Herz schlägt bis zum Hals"]
Valeriana [Herzklopfen mit Globusgefühl]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Psorinum, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cor suis, Hypothalamus suis, Vena suis

Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Strophanthus comp.-Herztabletten [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.) [Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN [Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Strophantab (Tabl.) [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]

Begleittherapie
Neuraltherapie:
Quaddeltherapie präkordial bzw. paravertebral HWS
Weitere Verfahren: Sport, psychische Führung

Herzrhythmusstörungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Kardiologische Abklärung notwendig!
  Mineralhaushalt beachten!
  Fokalherde!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Parenterale Therapie:
Cactus compositum [koronare Durchblutungsstörung, Stärkung des Herzmuskels]
Cor suis compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]

Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei initialen Fieberzuständen]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.), **Chelidonium-Homaccord NT** (Tropf.) [Galle-Lebermittel, als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; deshalb ggf. auch indiziert bei infektiös-toxischer Myokardschwäche mit Rhythmusstörungen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden; ggf. mit gastrokardialem Symptomenkomplex]
Ignatia-Homaccord (Amp.) [Depressionszustände, besonders exogener Genese; hysterische Aphonie; paradoxe Symptome, ggf. verbunden mit Unruhe, Angst, Herzklopfen]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Strophanthus compositum N (Amp.) [Nachbehandlung nach Myokardinfarkt (hierbei oft Herzrhythmusstörungen!)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Herzklopfen, Unruhe, Angst]
Sepia [Konstitutionsmittel, bes. für das Klimakterium]
Tabacum [Gefäßkrämpfe und Herzklopfen mit Todesangst]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Suis-Organpräparate Injeele:
Cor suis, Glandula suprarenalis suis, Musculus suis, Sympathicus suis
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Strophanthus comp.-Herztabletten [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.) [Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN [Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Strophantab (Tabl.) [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]

Begleittherapie
Ernährung: Allergene ausschließen!
Weitere Verfahren: Akupunktur, Ozon

Hodgkin-/Non-Hodgkin-Lymphom

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nur als ergänzende Therapie. Regelmäßige fachärztliche Kontrolluntersuchungen zur Beurteilung des Therapieverlaufes sind unbedingt erforderlich.

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme]
Galium-Heel N (Amp.) [Umstimmungsmittel]
Glyoxal compositum (Amp.) [Zwischenmittel]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.) [Bindegewebsmittel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [lymphatische Stase, Anregung der Ausscheidungen]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Corpus pineale suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Splen suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Bei etwa erforderlicher zytostatischer und/oder strahlentherapeutischer Behandlung empfiehlt sich ein Leberschutz mit Hepeel N, Chelidonium-Homaccord N, Injeel-Chol und Hepar comp. Heel sowie Hepar suis-Injeel.

Hordeolum (Gerstenkorn)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chalazion (Hagelkorn) = schmerzlos!

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische: Entzündungen im Bereich des äußeren Auges; Chronizität („Hordeolosis“)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Graphites
[Hordeolum, Lidrandentzündungen, Blepharo-Konjunktivitis]
Hepar sulfuris [Neigung zu Eiterungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Blepharo-Konjunktivitis]
Myristica sebifera forte
[akute und subakute Eiterungen, “homöopathisches Messer”]
Silicea [dünnflüssig-wässriger Eiter; Chronizität]
Staphisagria [Chalazion, Hordeolum; Blepharo-Konjunktivitis; Neigung zu Keloiden]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Oculus totalis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie: Nur bei Rezidiven!
Auto-Sanguis-Stufentherapie (nur bei Rezidiven!):
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitaminreiche Kost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]),
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Weitere Verfahren: Physikalische Therapie; ggf. augenärztlicher operativer Eingriff

Hyperemesis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Allergie, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Organbefund ausschließen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Vomitusheel (Tropf.) [Erbrechen und Brechreiz]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Anacardium-Homaccord (Tropf.) [Dumping-Syndrum, Duodenalerkrankungen, Übelkeit und Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Hyperemesis bei Gallen- und Leber-Affektionen wie Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken, Stauungsikterus, Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden)]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[Hyperemesis bei Kinetosen/Reisekrankheiten]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gastricumeel (Tabl.)
[bei Magenbeschwerden (Gastritis acuta et chronica mit und ohne Ulkus), Sodbrennen, Meteorismus]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art, Leberschäden – oft verbunden mit Appetitlosigkeit und Meteorismus]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Lebermittel; Hyperemesis, bes. nach verdorbenen Speisen und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Hyperemesis bei Kinetosen/Reisekrankheiten sowie auch bei sonstigen Schwindelzuständen – insbesonders arteriosklerotisch bedingten]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[Brechdurchfall, Erschöpfung, Unruhe, Angst]
Colchicum (forte S) [Erbrechen von Galle und Schleim]
Ipecacuanha [Husten mit Erbrechen und Übelkeit; Erbrechen erleichtert nicht!]
Kreosotum
[Schwangerschaftserbrechen (Hyperemesis gravidarum)]
Tabacum [gastrokardialer Symptomenkomplex, Singultus]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Duodenum suis, Hepar suis, Sanguis suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie: (Nicht bei Gravidität!)
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie:
Plexus solaris, Cubitalvene (i.v.), abdominaler Grenzstrang; ggf. Psychotherapie

Hyperhidrosis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.) [Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Hyperhidrosis bei Ekzemen, Intertrigo sowie bei exsudativer Diathese]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen sowie Schweißausbrüche bei Fieber]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Hauterkrankungen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.) [funktionelle Störungen des weiblichen Zyklus; bes. bei Achselschweiß]
Klimakt-Heel T (Tabl.)
[klimakterische Schweißausbrüche mit Hitzewallungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus]

Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Hyperhidrosis verbunden mit Heiserkeit]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung (Ableitung auf die Niere!) – auch bei Fußschweiß indiziert]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Hyperhidrosis mit Pyodermien]
Jaborandi [abnorme Schweißausbrüche, bes. nachts]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[übelriechende, klebrige, gelbliche Nachtschweiße]
Sepia [Hitze und starkes Schwitzen im Klimakterium]
Sulfur (forte) S [Konstitutions- und Stoffwechselmittel; kalter Fußschweiß, übelriechender Achselschweiß]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis, Ren suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Flüssigkeitsausgleich
Physikalische Therapie: Eichenrindenbäder, Sauna
Weitere Verfahren: Akupunktur, Autogenes Training

Hyperkinetisches Syndrom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verhaltensstörungen anderer Genese. Petit-mal-Epilepsien. Unruhezustände anderer Genese.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Als hyperkinetisches Syndrom wird ein Symptomenkomplex bezeichnet, der durch folgende Erscheinungen gekennzeichnet ist: Unruhe, Umtriebigkeit bis Rastlosigkeit, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmangel, Sozialintegrationsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, phasenweise destruktives Verhalten. Die Ursache der Störung ist unbekannt, obwohl eine Reihe von Fakten angeschuldigt werden. Dazu gehören phosphathaltige Nahrungsmittel, raffinierte Kohlenhydrate, Reizüberflutung durch übersteigerten Fernseh- und Videokonsum, Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Lokale Therapie:
Viburcol N (Supp.) [Unruhezustände mit und ohne Fieber]

Symptomenbezogene Therapie
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Kopfschmerzen]
Neurexan (Tropf., Tabl.)
[Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Spascupreel S (Supp.) [bei Spasmen im Magen-Darm-Bereich und auch der quergestreiften Muskulatur]
Einzelmittel-Injeele:
Hyoscyamus forte
[Unruhe und Erregungszustände, Schlafstörungen]
Rhus Tox S [Angst, Unruhe und Verstimmungszustände]
Valeriana [Schlafstörungen mit Unruhe, nervöse Störungen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [bei leicht zornigen, eifersüchtigen, hinterlistigen, ängstlichen, feigen Kindern], **Psorinum** [bei rechenschwachen, zu Lügen und läppischem Verhalten neigenden Kindern]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cerebellum suis, Cerebrum totalis suis

Begleittherapie
Vermeidung raffinierter Kohlenhydrate und Einstellung auf eine konservenfreie Vollwertkost
Vermeidung von Reizüberflutungen
Weitere Verfahren: Entspannende Verfahren, psychotherapeutische Lenkung
Sportliche Aktivitäten
Konstitutionstherapie: Zincum valerianicum, Bromum, Opium und auch mit Calcium phosphoricum
Mikrobiologische Diagnostik und Therapie

Hypertonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Formen und Schweregrade der Hypertonie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären (essentiell, renal, endokrin)! Risikofaktoren beachten!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika ggf. als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Bluthochdruck, Tachycardie, präcordialer Druck]
Melilotus-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck]
Parenterale Therapie:
Melilotus-Homaccord [Bluthochdruck]
Rauwolfia compositum [Bluthochdruck]

Symptomenbezogene Therapie
Cactus compositum (Amp.)
Cactus compositum S (Tropf.) [Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[arteriosklerotische periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [zur Herzstützung, bes. beim Altersherz]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[pektanginöse Beschwerden, Tachykardie, besonders bei Hyperthyreose: hier (meist) nur systolischer RR erhöht]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; Hypercholesterinämie]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung; indiziert besonders bei Nierenhochdruck]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[bei zerebralsklerotischem Schwindel]
Einzelmittel-Injeele:
Viscum album
[essentielle Hypertonie und generell bei Arteriosklerose]
Nosoden-Injeele:
Psorinum, Staphylococcus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Acidum fumaricum, Acidum DL-malicum
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cor suis, Hepar suis, Ren suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Salzarme Kost, Gewichtskontrolle; ggf. Reduktionskost
Neuraltherapie: Störfelder, Ganglion stellatum, Ganglion caroticum
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Aderlass

Hypophyseninsuffizienz

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nach den Vorstellungen der Homotoxikologie kann eine Hypophyseninsuffizienz durch früher „retoxisch" behandelte Infektionen entstanden sein. Diese früheren Infektionen sind unbedingt zu berücksichtigen, da die dabei abgetöteten Erreger einen Hinweis auf die erforderlichen Nosoden ergeben.

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Hormeel SNT (Tropf.)
[Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Ignatia-Homaccord
[psychosomatische Beschwerden, Depression]
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Symptomenbezogene Therapie
Testis compositum N Ampullen [bei Männern]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.) [Regeneration der Sulfidfermente]
Nosoden-Injeele:
siehe unter „Besondere Hinweise"
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Acidum fumaricum, Acidum DL-malicum, Acidum succinicum, Baryum oxalsuccinicum, Natrium pyruvicum
Suis-Organpräparate-Injeele: Hypophysis suis
Begleittherapie
evtl. Konstitutionsbehandlung
Mikrobiologische Therapie

Hypothyreose (latente)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Formen der Hypothyreose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!
  Bei Frauen an Hashimoto Strumitis lymphomatosa denken!
  Hormonsubstitution!

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel forte NF (Tropf.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [teigige blasse ödematöse Schwellungen]
Fucus vesiculosus [Jodmangelkropf; Adipositas]
Graphites [Adipositas; psychische und stoffwechselmäßige Verlangsamung (herabgesetzter Grundumsatz!)]
Spongia
[Struma colloides et parenchymatosa mit Räusperzwang]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula thyreoidea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Schilddrüse und Schilddrüsenpole

Hypotonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  HVL- bzw. Nebennierenrindeninsuffizienz,
  kardiovaskuläre Hypotonie,
  infektiös-toxische Hypotonie, Hypovolämie, orthostatische Dysregulation

Basistherapie
Orale Therapie:
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Parenterale Therapie:
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris comp.-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.)
[Hypotonie als Folge von Herzschwäche]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.)
[bei Herzschwäche, z.B. Folgen von Herzmuskelschädigungen, infektiös-toxische Myokardschwäche, Angina pectoris, Zustand nach Myokardinfarkt]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neigung zu Kollapszuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Herz- und Gefäßwirkung]
Tabacum [Hypotonie mit Schwindelzuständen]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen und sonstige balneologische Verfahren
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sport

Impetigo contagiosa

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Dermatosen bei Infektionskrankheiten (Masern, Röteln, Varizellen), Erythema exsudativum multiforme, akutes Ekzem, Erysipeloid
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Dermatologische Abklärung! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber, u.a. auch bei Hautkrankheiten]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Disposition zu einer Vielzahl von Schleimhaut- und Hautkrankheiten]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: Lymphatismus, exsudative Diathese, Neigung zu (eitrigen) Hautaffektionen]
Hepar sulfuris [bei Suppurationen und Pyodermien]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Dermatitis und Dermatosen]
Nosoden-Injeele:
Bacillinum humanum, Staphylococcus [Impetigo Bockhart]
Streptococcus haemolyticus [Impetigo Tilbury-Fox]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Sonnenbäder
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, HOT, Symbioselenkung, evtl. Antibiotika

Impotenz

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Organische Störungen unbedingt vorher ausschließen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SNT (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Testis compositum N Ampullen [Libido- und Potenzstörung, allgemeine Schwächezustände]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Tonico-Injeel (Amp.) [Erschöpfungszustände]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Phosphorus S [Parenchymmittel, große Erregbarkeit und Nervenschwäche]
Ginseng [Erschöpfungszustände]
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen], **Acidum fumaricum, Acidum α-ketoglutaricum, Acidum DL-malicum, Acidum succinicum, Natrium oxalaceticum** [jeweils als Zwischenmittel]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Testis suis
Begleittherapie
Psychotherapie oftmals sinnvoll.
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Induratio penis plastica

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Oftmals ist eine operative Korrektur erforderlich.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Testis compositum N Ampullen [Libido- und Potenzstörung, allgemeine Schwächezustände]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.) [Verbesserung der Durchblutung]
Engystol (Tabl., Amp.) [Umstimmungsmittel]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Anregung der Leberentgiftung]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [allgemeines Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum, Tonsillitis-Nosode
Katalysatoren-Injeele: **Acidum DL-malicum**
Suis-Organpräparate-Injeele: **Funiculus umbilicalis suis, Testis suis**
Begleittherapie
Mikrobiologische Therapie
Weitere Verfahren:
Oftmals sind Packungen aus einer Mischung von Traumeel S Salbe (Entzündungen) und Heilerde wirksam.

Inkontinenz

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumorleiden abklären.

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Plantago-Homaccord (Tropf.) [Reizblase, Bettnässen, Inkontinenz]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Sabal-Homaccord (Tropf.) [Prostataadenom, Reizblase]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S [Reizblase, Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [altersbedingte Inkontinenz, Altersdemenz]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [zentrale Steuerung]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schmerzen bei Durchnässung und feuchtem Wetter]
Husteel (Tropf.) [Urinabgang beim Husten]
Mucosa compositum (Amp.) [Schleimhautmittel]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Prostataadenom, Harnwegsentzündungen]
Tonico-Injeel (Amp.) [Erschöpfungszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Causticum S [Blasenschwäche, unwillkürlicher Harnabgang beim Husten, Harnwegsentzündung mit Erschöpfung]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Ren suis, Vesica urinaria suis

Insektenstich

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Notfall (Kortikoidmedikation)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot N [Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. entzündliche (Calor, Rubor) Schwellungen (Tumor) mit Schmerzen (Dolor)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Hautaffektionen, u.a. bei Quincke'schem Ödem]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Abszessen und Phlegmonen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten]
Schwef-Heel (Tropf.)
[verschiedene, bes. juckende Dermatosen sowie Pyodermien]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [urtikarielle Dermatosen, Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[Ödeme und Weichteilschwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [ödematöse, blasse Schwellungen mit stechenden, brennenden Schmerzen]
Lachesis S [Infektion mit septischen Symptomen (dunkelrote Verfärbung); Kapillarschädigung]
Ledum [Insektenstiche]
Urtica [juckende urtikarielle Dermatosen]
Vincetoxicum [Gefäß- und Sympathikuswirkung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Kalte Umschläge
Neuraltherapie: Procain-Unterspritzung

Interkostalneuralgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Trauma; Pleuritis, Zoster, Periostitis; Neoplasma, insbesondere Pancoast-Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ranunculus-Homaccord (Tropf.)
[Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Ranunculus-Homaccord [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien (mit stechenden Schmerzen)]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Spascupreel (Tabl., Amp.), **Spascupreel S** (Supp.)
[Neuralgien der Zwischenrippennerven mit reflektorischer Muskelspastizität (muskulärer Hartspann, Myogelosen)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben sowie posttraumatische und postoperative Ödeme und Weichteilschwellungen (postoperative Interkostalneuralgien nach Thorakotomie bzw. Thorakozentese bzw. Pleurapunktion)]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [Neuralgien sowie Neuritiden mit lanzinierenden Schmerzen; schmerzhafte Rippenknorpel]
Bryonia S [heftige Stiche und berstende Schmerzen beim Atmen und Sprechen]
Nosoden-Injeele:
Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Musculus suis, Os suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Neuraltherapie:
Segment und Wurzel, Quaddelbehandlung im Bereich des Thorax und der Interkostalnerven; ggf. Störfeldbehebung
Weitere Verfahren: Fokussuche

Intertrigo

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Candidamykosen, Diabetes mellitus, Windeldermatitis = Intertrigo ammoniakalis (bes. bei Dyspepsie-Stühlen)

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Abropernol N (Tabl.)
[Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Natrium-Homaccord (Tropf.)
[Skrofulose, chronische Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord [bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lokale Therapie:
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Ekzemen, Allergie sowie bei Dermatomykosen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[Stimulation des weiblichen Inkretoriums: adipöse Frauen mit Intertrigo (bes. auch submammär)]
Schwef-Heel (Tropf.)
[zur Anregung der Abwehrmechanismen bei verschiedenen Dermatosen sowie bei Pruritus]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[juckende und brennende ekzematöse Veränderungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Kreosotum
[ekzematöse Veränderungen mit Brennen und heftigem Juckreiz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[verschiedene Schweregrade von Dermatosen; insbesondere solche mit ätzenden, scharfen und eitrigen Sekreten (Erythema glutaeale vesiculosum bzw. pustulosum)]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele: **Psorinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Basische Kost; Reduktionskost bei Adipositas
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Iritis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenfachärztliche Kontrollen sind bei Iritis und Verdacht auf Iritis unbedingt anzuraten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia
[Bindegewebs- und Gelenkerkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Colchicum [bei rheumatischer Iritis]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Glandula suprarenalis suis [bei chronisch rezidivierenden Fällen],
Oculus totalis suis [bei chronisch rezidivierenden Fällen]

Ischialgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Myalgie, Myopathie,lumbosakrales Wurzelreiz-Syndrom bzw. Lumbago, Kompressions-Syndrom,
  Tumor (im Bereich der Cauda equina bzw. im Becken)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Neurologische Abklärung! Cave: Bandscheibenprolaps!

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe) [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien rheumatischer Genese]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[wetterbedingte Verschlimmerung der Neuralgien]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.) [Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat (Osteochondrosis lumbalis!) sowie postoperative und posttraumatische Ödeme und Weichteilschwellungen (traumatisches Ischiassyndrom!]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Gnaphalium polycephalum [Lumbo-Ischialgie bzw. Lumbago-Ischias-Syndrom = Ischialgie + muskulärer Hartspann + vegetative Symptome (Ödeme, vasomotorische Störungen) sowie ferner Taubheitsgefühl, Parästhesien und Stiche]
Rhus Tox S [Lumbago; Ischias-Neuralgien und -Neuritiden; typisch: Verschlimmerung durch Nässe und Kälte sowie durch Ruhe, Besserung bei Bewegung, jedoch Anlauf- bzw. Startschmerz!]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Injectio antineuralgica S Fides
[Neuralgisch-arthritischer Formenkreis]
Begleittherapie
Ernährung: Gewichtsreduktion, falls übergewichtig
Physikalische Therapie: Fangopackungen, Stangerbäder
Neuraltherapie: Triggerpunkte, Störfeldsuche (Zähne, Tonsillen), Mandelpol, Quaddeltherapie über dem Kreuzbein
Weitere Verfahren: Chirotherapie, Krankengymnastik

Kardiospasmus

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung, besonders Tumor-Ausschluss (Ösophagus- bzw. Kardia-Karzinom)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, z.B. auch beim gastrokardialen Symptomenkomplex]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni – verbunden mit Supersekretion und Hypermobilität des Magens]
Einzelmittel-Injeele:
Cuprum [Krampfzustände glattmuskulärer Hohlorgane]
Magnesium phosphoricum forte [Krämpfe in den glattmuskulären Hohlorganen, z.B. auch bei diffusen Ösophagusspasmen]
Nosoden-Injeele: **Bacterium coli**
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula parathyreoidea suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Lokale Wärmeanwendungen
Neuraltherapie: Plexus solaris, oberer Grenzstrang
Weitere Verfahren:
Akupunktur, ggf. Sprengung mit Starck' Dilatator oder pneumatische Dehnung sowie Kardio-Myotomie (nach Heller)

Karies

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Zahnärztliche Abklärung, Begleittherapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Zahnschmerz – bes. nachts – sowie mit Verschlimmerung durch Essen und kalte Getränke]

Calcium fluoratum [bei Zahnkaries zur Schmelzhärtung; Parodontose, Parodontitis]
Kreosotum [Zahnkaries mit schwarzfleckigen Zähnen, stinkenden Absonderungen und brennenden Zahnschmerzen]
Silicea [Konstitutionsmittel; Zahnkaries, empfindliche Zahnhälse; Anregung der Schmelzbildung]
Staphisagria [bei Schmerzen in kariösen (schwarzen) Zähnen]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Gingiva suis, Pulpa dentis suis
Begleittherapie
Ernährung: Mineralstoffe, Vitamine, zuckerfreie Ernährung (keine Mono- und Disaccharide)
Physikalische Therapie: Mundhygiene
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Katarakt

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie! Augenärztliche Abklärung betr. Art und Ursache! An medikamentenbedingten Katarakt sowie an Cataracta diabetica denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei vegetativer Dystonie sowie bei Arteriosklerose und bei sonstigen geriatrischen Indikationen (Alters-Katarakt)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (u.a. auch bei Therapieschäden)]
Oculoheel (Tabl.) [entzündliche Reizzustände des vorderen Augenabschnitts wie Konjunktivitis, Blepharitis und Dakryozystitis (besonders chronische Formen)]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht: (vorzeitiger) Altersstar bei Männern]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel; Chronizität]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Homöopathisierte Allopathika Injeele
bei entsprechender Anamnese
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus vitreum suis forte, Oculus totalis suis
Begleittherapie
Ernährung: Kochsalz-Einschränkung
Neuraltherapie: Augenpunkte, Ganglion ciliare, Fokalherde
Weitere Verfahren: Operation; gegebenenfalls Zahnsanierung

Keloide

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Oft hormonell, altersmäßig oder familiär („fibroplastische Diathese“) bzw. rassisch (bei dunkelhäutigen Personen relativ häufig und oft multipel = Keloidose!) bedingt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Bindegewebsindurationen]
Conium S [bei allen Verhärtungen]
Graphites
[erweichende Wirkung auf Narbengewebe; korpulente Typen]
Silicea [Bindegewebsmittel; Überempfindlichkeit gegenüber Berührung]
Staphisagria
[Keloide, bes. nach Operationen und Schnittverletzungen sowie nach Verbrennungen; Keloide als Fokus]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Umspritzung bzw. Unterspritzung der Keloide (u.a. auch mit Traumeel S Ampullen)

Keratitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenärztliche Kontrollen sind bei Keratitis unbedingt anzuraten.

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[eitrige und entzündliche Erkrankungen (oberflächliche Formen)]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Phlyktaenen], **Argentum nitricum** [heftige Rötung und Schwellung], **Conium S** [Lichtscheu],
Kalium bichromicum [ulzeröse Entzündungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie

Klimakterische Beschwerden

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Gynäkologische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Klimakt-Heel T (Tabl.) [Klimakterische Beschwerden]
Hormeel SNT (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächemittel]

Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Osteochondrose, besonders HWS, neurale Störfelder; vertebragene Neuralgien; besonders auch Zervikalmigräne]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ginseng compositum N (Tropf.)
[Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme; ggf. Revitalisierungsmittel]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Tachykardie und Extrasystolie sowie pektanginöse Beschwerden, bes. auch infolge von Schilddrüsenüberfunktion]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.) [klimakterische Neurosen; Vaginitis, Dysmenorrhoe, Zwischenschmerz]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht (z.B. auch bei Impotentia virilis): Klimakterium virile]
Tonico-Injeel (Amp.) [physische und psychische Erschöpfung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; ggf. Globusgefühl]

Einzelmittel-Injeele:
Cimicifuga S
[Klimakterium mit Depressionen; „klimakterische Migräne“]
Lachesis S [Klimakterium mit Brennschmerz und üblem Geruch sowie Hitzewallungen]
Sanguinaria [Hitzewallungen, „fliegende Hitze“]
Sepia
[klimakterische, reizbare, launische Frauen; venöse Stauungen]

Suis-Organpräparate Injeele: **Hypophysis suis, Ovarium suis, Placenta suis, Testis suis** [Klimakterium virile]

Fides:
Mulimen S (Tropf.), **Mulimen** (Tabl.), **Mulimen pro injectione**
[Parametropathia spastica, Menstruationsbeschwerden]
Noxom S (Tropf.), **Noxotab** (Tabl.)
[Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Moorbäder
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Plexus, gynäkologischer Raum
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, HOT, ggf. Psychotherapie

Koliken

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Abdominelle Erkrankungen, Entzündungen (Magen, Darm, Gallensystem, ableitende Harnwege) bzw. Tumoren; psychische Symptomatik
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege, also bei Nieren- und Gallenkoliken]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Gallenkoliken]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Erigotheel (Amp.) [Koliken bei Magen/Duodenum-Affektionen (mit und ohne Ulkus)]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberschäden sowie Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art wie cholangitische und cholezystitische Reizzustände ohne und mit Steinbildung]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus sowie im Bereich der ableitenden Harnwege]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Koliken, bes. nach Diätfehlern und Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee); ggf. verbunden mit Meteorismus]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Magen-Darm-Koliken bei Gastroenteritis mit Kollapszuständen und kaltem Schweiß]

Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Gallenkoliken]
Cantharis
[brennende Schmerzen im Bereich der Harnwege mit Strangurie]
Colocynthis S
[Magen-Darm-Koliken mit stechenden Schmerzen]
Magnesium phosphoricum
[Krämpfe glattmuskulärer Hohlorgane]

Nosoden-Injeele: (abhängig von Ursache der Koliken!):
Calculi bili, Salmonella typhi

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele organspezifisch, z.B.:
Colon suis, Duodenum suis, Pylon suis, Ureter suis, Urethra suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis

Cosmochema:
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Nierentropfen
[Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]

Fides:
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]

Begleittherapie
Ernährung: Schonkost
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie: Schröpfen, Aderlass
Neuraltherapie: Grenzstrang, Plexus solaris, Segment-Behandlung
Weitere Verfahren: Akupunktur

Kolpitis (syn. Vaginitis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Kolpitis senilis (bzw. vetularum), Karzinomausschluss
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Mikrobiologisches Profil (u.a. Trichomonas, Candida, Chlamydien, Gonorrhoe)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lilium compositum Heel (Tropf.) [Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]

Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [exsudative Diathese, Lymphatismus, u.a. auch Fluor albus, bes. bei kleinen Mädchen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Neurosen sowie ferner (post)klimakterische Kolpitis (Kolpitis senilis)]

Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei Pruritus vulvae und Vulvitis (bullosa)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[chronische Schleimhautentzündungen, u.a.Zervizitis]
Kalium bichromicum [Kolpitis und Vulvitis ulcerosa]
Kreosotum [ätzender übelriechender Fluor; Pruritus vulvae]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis, Ovarium suis, Urethra suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Plexus, gynäkologischer Raum
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Konjunktivitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Dakryozystitis, Keratitis, Iritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Augenärztliche Ursachen-Abklärung und Kontrolluntersuchungen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen): virale Konjunktivitis – Keratokonjuktivitis epidemica = Schwimmbadkonjunktivitis; Masern-Konjunktivitis]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[akute und chronische Entzündungen/Eiterungen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch der Bindehaut des Auges]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Ödeme der Bindehaut, Chemosis]
Belladonna S [Rötungen, Schwellungen]
Euphrasia [Lichtscheu, Tränenfluss, Chemosis]
Graphites [chronische Entzündungen des äusseren Auges]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele: **Oculus totalis suis**
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Eichenrindenabkochungen (Cortex quercus)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Konzentrationsstörungen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Arteriosklerose (Zerebralsklerose), Traumata (Commotio, Contusio, Compressio cerebri, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen, Morbus Alzheimer (vor allem Kurzzeitgedächtnis betroffen!)

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus, Zerebralsklerose]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Selenium-Homaccord [Leistungsschwäche, insbesonders cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.)
[periphere arterielle Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.) [zur Herzstützung (Herzmuskelschädigungen, infektiös-toxische Myokardschwäche; Zustand nach Herzinfarkt, bes. beim Altersherz]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Schwindelsymptomatik, besonders arteriosklerotisch bedingte Schwindelzustände; verlangsamte Hirnstammfunktion („lange Leitung")]
Einzelmittel-Injeele:
Selenium [Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit]
Sulfur (forte) S [Konstitutions- und Stoffwechselmittel; reizbare, pessimistische, depressive Stimmungslage verbunden mit Gedächtnisschwäche]
Thuja S [Konstitutionsmittel mit Angriff am ZNS: schwerfälliges Denken, Schludrigkeit, schlechtes Erinnerungswermögen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Hepar suis, Ovarium suis, Testis suis
Fides:
Noxom S (Tropf.), **Noxotab** (Tabl.)
[Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum; ggf. in Störfelder
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, „Gehirnjogging"

Kopfschmerzen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumor, Infektion, vertebragene Ursache, Trauma, Glaukom, Migräne, Hypertonie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung der Ursache! An Fokalherde sowie an „Analgetika-Kopfschmerz" denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Parenterale Therapie:
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Kopfschmerzen bei grippalen Infekten und Fieber]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Regenerationsmittel bei postkommotionellen und geriatrischen Kopfschmerzen]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Kopfschmerzen bei Leber-Galle-Leiden wie Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigung (Parenchymschäden), Stauungsikterus sowie Cholangitis und Cholezystitis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien sowie Kopfschmerzmittel bei Migraine cervicale]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen: Leberkopfschmerzmittel]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden: Leberkopfschmerzmittel]
Melilotus-Homaccord N Tropfen, Melilotus-Homaccord (Amp.) [Kopfschmerzen bei präapoplektischen Zuständen sowie bei Hypertonie bzw. Plethora]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kopfschmerzen nach Reizmittelabusus (Nikotin, Alkohol, Kaffee)]
Rauwolfia compositum (Amp.) [Hypertoniker-Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Kopfschmerzen bei zerebralen Reizzuständen; hochroter Kopf]
Bryonia S [berstende Kopfschmerzen]
Cimicifuga S [heftige Kopfschmerzen, als ob Schädel zerspringt]
Ignatia S [Migräne, spastische Kopfschmerzen]
Iris [„Sonntagsmigräne"]
Thuja S [Nagelkopfschmerz; Kopfschmerzen bei Fokaltoxikosen]

Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Acidum succinicum [anämische Kopfschmerzen]

Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Antigenarme Ernährung; cave: Käse, Schokolade, Rotwein!
Physikalische Therapie:
TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum, Fokalherde
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, HOT, Reflexzonen-Massage, Lymphdrainage, Krankengymnastik, Psychotherapie

Kraurosis vulvae

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Leukoplakie, Leukokeratose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Prädilektionsalter: Klimakterium und Senium.
  Cave: Präkanzerose! Abklärung notwendig!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Mezereum-Homaccord (Tropf.) [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]

Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr, u.a. bei Fluor albus und Kolpitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, u.a. auch bei Pruritus vulvae]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[chronische trockene Haut- und Schleimhautaffektionen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Beschwerden, u.a. auch (post)klimakterische Kraurosis vulvae]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. auch Neigung zu Infektanfälligkeit)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse (Kraurosis vulvae [synonym: Lichen sclerosus et atrophicans vulvae] ist ein typischer degenerativer atrophischsklerosierender Schrumpfungsprozess!) an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel; Erkrankungen der Schleimhäute und Drüsen; Pruritus]
Kreosotum [Brennen und Jucken der Labien]
Sepia
[„Klimakterium-Mittel"; übelriechende Schweiße am Genitale]
Staphisagria [Pruritus vulvae]
Sulfur (forte) S [Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel; Brennen und Jucken der Haut und Schleimhaut]

Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis, Ovarium suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Krebserkrankungen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Selbstverständlich muss eine intensive Diagnostik zur genauen Diagnosestellung erfolgen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Die antihomotoxische Therapie ist bei Krebserkrankungen als adjuvante Methode zu sehen. Erste Priorität haben die allgemein anerkannten onkologischen Standards.
  Die nachfolgenden Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise zu einer antihomotoxischen Standardtherapie geben. In jedem Fall ist es sinnvoll, ein auf den Patienten individuell abgestimmtes Behandlungsprogramm zusammenzustellen. Wir empfehlen in diesem Fall eine Kontaktaufnahme mit den Ärzten der Therapie-Hotline: (0 72 21) 5 01-1 11.
  Auf folgende Grundprinzipien der Therapie möchten wir hinweisen:
  1. Ausschaltung der weiteren Homotoxinzufuhr (Vollwerternährung, Alkohol- und Nikotinverbot).
  2. Vorsichtige Reiztherapie mit rückführenden und bindegewebsentschlackenden Präparaten.
  3. Anregung der blockierten Fermentfunktionen und Aufbesserung der Atmungsfermente.
  4. Anregung der Depolymerisation.
  5. Regulation entzündlicher Prozesse.
  6. Zur Stimulation der körpereigenen Abwehr.

Basistherapie
Orale Therapie:
Ausleitungs- und Entgiftungstherapie:
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Hepar comp. Heel
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]

Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Coenzyme compositum Ampullen [Biokatalysatorenpräparat zur Anregung des Zellstoffwechsels, bei Therapieblockaden und chronischen Erkrankungen]
Ubichinon compositum Ampullen [Biokatalysatorenpräparat zur Anregung des Zellstoffwechsels, bei Therapieblockaden und chronischen Erkrankungen]
Glyoxal compositum (seltene Gaben) [Biokatalysatorenpräparat zur Anregung des Zellstoffwechsels, bei chronischen Erkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [bei Bronchialkarzinomen]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[bei Pankreas- und Colonkarzinomen]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Bronchialkarzinomen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei: Fieber und Entzündungen, (Pocken-) Impf-Enzephalitis, Grippe, Angina, Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen, Fokaltoxikosen, Gingivitis, Stomatitis, Sinusitis, Gastroenteritis, Enterocolitis, Zystitis, Pyelitis, Kolpitis, Glomerulonephritis, Fisteleiterungen, Osteomyelitis, Otitis media, chronischem Hirnabszess, Meningitis, Milzbrand, Karbunkel, Mononukleose, Hautkrankheiten, Mastitis]
Engystol (Tabl., Amp.)
[Erkältungskrankheiten und grippale Infekte]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
Euphorbium comp. Nasentropfen SN (Dosierspray)
[bei chronisch viralen Erkrankungen]
Galium-Heel N (Amp.) [Zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[zur Behandlung der Schleimhäute allgemein]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Blasen- und Prostataerkrankungen]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp., Salbe)
[zur lokalen Therapie der chemotherapieinduzierten Mucositis]
Dosierung: bis zu 5 Amp./Tag oral]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Colonkarzinomen]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Carcinoma coli, Carcinoma mammae, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Myoma uteri, Ovarialcyste

Suis-Organpräparate-Injeele:
der vom Karzinom betroffenen Organe

Begleittherapie
Karzinompatienten benötigen regelmäßig und hochdosierte Behandlungen mit den Biokatalysatoren Coenzyme compositum Ampullen und Ubichinon compositum Ampullen, 1 bis 2 wöchentlich, initial auch häufiger bzw. Gabe der Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus (Zitronensäurezyklus-Heel), auch als Infusion mit allen 10 Ampullen 1 bis 2 mal wöchentlich.
Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin C hochdosiert, Selen, Vitamin E, Vitamin A oder β-Carotin, Spurenelemente
Enzymtherapie, z.B. mit Wobe-Mugos
Thymustherapie, Misteltherapie
Bei den Karzinompatienten ist eine bioelektronische Diagnostik und Therapie mit den ausgetesteten Präparaten zu empfehlen.

Laryngitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Krupp, Pseudokrupp, Karzinom, Tbc,
  Laryngitis subglottica, Glottisödem,
  Reinke-Ödem (= subepitheliales, oft allergisches, meist beiderseitiges Ödem der Stimmbänder), bes. bei Rauchern und Rednern.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Laryngitis acuta (viral oder bakteriell) meist schmerzhaft;
  Laryngitis chronica (SMOG, Tabakrauch, trockene Luft) meist schmerzlos! Cave: Larynxkarzinom!
  HNO-ärztliche Abklärung erforderlich!

Basistherapie
Orale Therapie:
Phosphor-Homaccord (Tropf.) [Heiserkeit, Laryngitis, Pharyngitis, Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]

Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte im Anfangsstadium]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme einschl. Glottisödeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen, z.B. auch Rötung und Schwellung des Kehlkopfes]
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronischer Raucherhusten oft verbunden mit Kehlkopfkatarrh und Tracheitis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen (besonders indiziert bei bakteriellen Laryngitiden)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen: besonders indiziert bei viralen Laryngitiden)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen: bes. bei Laryngitis chronica indiziert!]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Laryngitis bei Grippe und grippalen Infekten sowie bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten]
Husteel (Tropf.) [bei heftigem Reizhusten; z.B. bei Erkältungskrankheiten; laryngealer Husten]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus – d.h. Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Bereich der oberen (und unteren) Luftwege]
Tartephedreel N (Tropf.) [„absteigende" Katarrhe der Atemwege; d.h. schneller Übergang einer Laryngitis in eine Bronchitis]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [chronische Laryngitis und chronische Heiserkeit mit „Splitterschmerz"]
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel; schmerzlose Heiserkeit]
Phosphorus S [schmerzhafte Heiserkeit]
Spongia
[Räusperzwang; bellender, trockener kruppartiger Husten]

Nosoden-Injeele:
Tonsillitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Larynx suis (forte)
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Spülungen, Gurgeln
Neuraltherapie: Nervus maxillaris, Ganglion sphenopalatinum
Weitere Verfahren: Akupunktur, ggf. Rede- und Singverbot

Lebererkrankungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung der Ursache und Art!
  (Tropf.)-Präparate enthalten Alkohol, entsprechende Präparate sind bei Leberschäden besser als Trinkampullen einzusetzen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]

Parenterale Therapie:
Hepeel N [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Hepar comp. Heel
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Symptomenbezogene Therapie
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[Oberbauch-Syndrom; Pankreopathie]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.)
[Hepatitis acuta et chronica, Leberschädigung (Parenchymschäden); ggf. mit Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen, gestörten Drüsenfunktionen, bei degenerativen Erkrankungen (zellulären Phasen)]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern); Meteorismus, Pfortaderstauung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [fettige Degeneration der Leber; Schwäche, Abmagerung, Hinfälligkeit, Durchfälle]
Chelidonium [Leber-Galle-Mittel; acholische Stühle]
Cynara scolymus [Leberentgiftungsmittel; Anregung der Diurese]
Lycopodium S
[chronische Hepatopathie, Trommelbauch (Meteorismus)]
Natrium sulfuricum
[chronische Hepatopathie, Meteorismus, hepatogene Durchfälle]
Phosphorus S [Hepatitis und sonstige Leberparenchymschäden mit Leberschwellung]
Taraxacum [Hepatopathie mit und ohne Ikterus; Anorexie, Flatulenz, Pfortaderstauung]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Cystein [besonders bei Therapieschäden]
Histamin [bei allergischen Erkrankungen sowie bei Gastritis und Duodenitis mit und ohne Ulkus (hepatogene Ulzera!)]
Hydrochinon [bei toxischen Belastungen des Leberparenchyms]
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis
Cosmochema:
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Ernährungstherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Leberzirrhose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tuberkulose, Bauchfellkarzinose, Stauungszirrhose (Cirrhose cardiaque; chronische Rechtsherzinsuffizienz, Einflussstauungen)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufigste Ursachen: Alkoholabusus, Medikamentenabusus, posthepatitisch, biliär (Cholestase).
  Tropfen-Präparate enthalten Alkohol. Diese Präparate sind bei Leberschäden besser in Form der Trinkampullen-Medikation einzusetzen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Parenterale Therapie:
Hepeel N [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Injeel-Chol [akute und chronische Erkrankungen der Gallenwege, Stauungen]
Symptomenbezogene Therapie
Ceanothus-Homaccord (Tropf.) [beim Oberbauchsyndrom sowie ferner bei Pankreopathien (Milzschwellungen)]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden); Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Stoffwechselverbesserung; chronische Leberaffektionen mit Stauungssymptomen wie Pfortaderstauung]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.) [petechiale Blutungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel; Übelkeit, Pruritus]
Arsenicum album S [Kachexie, Unruhe, Pruritus]
Chelidonium
[Leber- und Gallenblasen-Affektionen; graufarbige Kittstühle]
Cynara scolymus [Leberentgiftung]
Natrium sulfuricum [Leber- und Galle-Mittel]
Nux vomica S [Magen-Darm-Leber-Mittel]
Phosphorus S [Leberschäden (Parenchymmittel)]
Taraxacum [Hepatopathien mit und ohne Ikterus; Meteorismus, Flatulenz; Pfortaderstauungen]
Nosoden-Injeele:
Salmonella typhi
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (forte)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Eiweißbilanzierte Ernährung, Alkoholkarenz, Fettreduktion

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Oberer Grenzstrang, rechter Rippenbogen, Plexus solaris
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, HOT, Ammoniakbinder (bei portokavaler Enzephalopathie)

Leukämie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen, Verlaufsformen und Arten von Leukämie.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung! Kontrolluntersuchungen! Biotherapeutika-Antihomotoxika als adjuvante Therapie.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Drüsenschwellungen, Infektanfälligkeit]
Hepeel N (Tabl.) [Anregung der Leberentgiftung]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Drüsenschwellungen, Infektanfälligkeit]
Hepar comp. Heel [Anregung der Leberentgiftung]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders auch bei Viruserkrankungen (virusinduzierte Leukämien; onkogene Viren)]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Lachesis S [gestörte Leukozytenabwehr, Blutungsneigung]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosode, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum succinicum, Cystein, Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Splen suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Onkologische Behandlung

Lichen ruber planus

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Parenterale Therapie:
Hepeel N [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Cutis compositum N (Amp.) [Hautfunktionstherapeutikum bei Therapieresistenz oder schleppendem Verlauf]
Engystol (Tabl., Amp.) [Umstimmungsmittel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Zwischenmittel], **Sulfur S** [Zwischenmittel]
Katalysatoren-Injeele:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) [Verbesserung der Fermentfunktionen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Ernährungsumstellung
Mikrobiologische Therapie
Körperpflege!
Weitere Verfahren: Heilerdeumschläge

Lichtdermatosen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Bei jeder Lichtdermatose ist eine eingehende Arzneimittelanamnese erforderlich (photoallergische bzw. phototoxische Reaktionen!).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis und Dermatosen sowie bei Allergie und Quincke'schem Ödem, und zwar nach Abklingen der akuten Erscheinungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie zur Anregung der Leberzellfunktionen, u.a. auch bei Dermatitis, Dermatosen, Neurodermitis, Lupus erythematodes sowie auch bei toxischen Exanthemen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [verschiedene Dermatosen; Pruritus]
Apis S [ödematöse und urtikarielle Schwellungen; auch bei Sonnenbrand]
Belladonna S [erysipeloide Dermatosen]
Cantharis
[bullöse und pemphiginöse Dermatitis mit Brennschmerz]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: UVA/UVB dosiert
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Lumbago („Hexenschuss“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Bandscheibenprolaps und sonstige LWS-Affektionen bzw. Osteopathien (Instabilitas intervertebralis), intraabdominelle Erkrankungen bzw. Tumoren, Entzündung
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Sorgfältige diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord [Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen, Akroparästhesien]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung – und zwar Verschlimmerung vor und bei Nasswetter]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Lumbago und Ischialgie]
Aesculus [Beschwerden in der Kreuzbein-Region (Lumbosakralschmerzen); Parästhesien]
Calcium fluoratum [Lumbago bei exostotischen LWS-Veränderungen; Startschmerz = Anlaufschmerz]
Gnaphalium polycephalum [Lumbo-Ischialgie mit Parästhesien, Taubheitsgefühl und Stichen]
Ledum [Lumbago mit schmerzhaften Muskelverspannungen]
Rhus Tox S [Ischiasneuralgien und Lumbago; typisch: Startschmerz = Anlaufschmerz!]
Suis-Organpräparate Injeele: **Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Musculus suis, Os suis**
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Ner-fluid FIDES S [zur Unterstützung der Hautdurchblutung]
Begleittherapie
Ernährung:
Purinarme Kost; bei Adipositas Gewichtsreduktion
Physikalische Therapie: Stangerbäder, Fangopackungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: LWS-Quaddeln, unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Manuelle Therapie, Krankengymnastik

Lupus erythematodes

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lymphomyosot N [Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Erytheme, Hyperkeratosen sowie Rhagaden und Hyperhidrosis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen, u.a. indiziert bei toxischen Exanthemen sowie bei Lupus erythematodes]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (lupoide Hepatitis]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aurum [lupöse Veränderungen]
Lachesis S
[Entzündungen mit düsterroter bzw. blauroter Verfärbung]
Silicea [Bindegewebsmittel]
Nosoden-Injeele:
Bacillinum humanum, Bacterium coli, Medorrhinum, Salmonella typhi
Homöopathisierte Allopathika Injeele
bei medikamenteninduziertem Lupus erythematodes (Anamnese!): **Penicillin**
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, HOT, Symbioselenkung

Lymphangitis, Lymphadenitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungszustände sowie pustulöse und bullöse Ekzeme]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. bei Abszessen, Phlegmonen und Furunkeln]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenum jodatum [skrofulöse Drüsenschwellungen]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: pastös-lymphatische Pykniker, exsudative Diathese]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen]
Phytolacca S forte [bei Entzündungen und Entzündungsneigung, bes. auch peritonsillät]
Lachesis S [bei Neigung zu septischen Prozessen; bläulichrote Schwellungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Glandula lymphatica suis
Cosmochema:
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Lymphatismus

= Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe („Drüsenschwellungen"), Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit (exsudative Diathese)

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, lymphatische Diathese]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei (geistigen) Entwicklungsstörungen der Kinder]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, z.B. bei Angina tonsillaris, Furunkulose, Abszessen, Phlegmonen]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp., Nasentropfen) [Rhinitis und Sinusitis; Sinubronchiales Syndrom; ggf. mit Hilusdrüsenschwellungen sowie ferner Tubenkatarrhe des Ohres; ggf. Mittelohrhydrops]
Hepeel N (Tropf., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen, u.a. auch bei Pyodermien sowie juckenden Ekzemen und anderen Dermatosen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenum jodatum [skrofulöse Drüsenschwellungen]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus und exsudativer Diathese (bes. im Kindesalter)]
Calcium fluoratum [bei Drüsenschwellungen mit Indurationen/Verhärtungen]
Calcium phosphoricum [skrofulöse „Hilusdrüsenkinder"]
Dulcamara S [„Nasswettermittel", „hydrogenoide Konstitution" (Grauvogl)]
Natrium muriaticum [chronische Drüsenaffektionen]
Sulfur (forte) S [Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Otitis media-Nosode, Polypus nasalis, Salmonella typhi, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Glandula lymphatica suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie, abhärtende Maßnahmen bei der stets vorhandenen großen Infektanfälligkeit

Lymphödem

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Primäres und sekundäres Lymphödem, lymphostatisches Ödem (Insuffizienz der Lymphgefäße) oder lymphodynamisches Ödem (Erhöhung der lymphpflichtigen Last), sekundäres Ödem nach Erysipel, nach Exstirpation oder Bestrahlung von Lymphknoten bei Tumorerkrankungen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Eine besondere pathogenetische Bedeutung kommt den im Bereich der Endstrombahn filtrierten Eiweißstoffen zu, die ausschließlich auf dem Lymphwege abtransportiert werden können. Sie verhindern eine einfache Resorption und Ausschwemmung der Ödemflüssigkeit und induzieren möglicherweise eine interstitielle Fibrose. Unbehandelt kann das Lymphödem deshalb zu einer fortschreitenden Zunahme und Verhärtung des Ödems führen. Der Einsatz von Diuretika ausschließlich ist aus diesem Grunde nicht zu empfehlen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [bei exsudativer Diathese]
Circulo-Injeel N (Amp.) [bei peripheren Durchblutungsstörungen]
Cutis compositum N (Amp.) [bei ödembedingten Dermatitiden, Dermatosen, Elephantiasis]
Echinacea compositum SN (Amp.) [bei Entzündungen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [zur Unterstützung der Leberentgiftung]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.) [bei postoperativen und posttraumatischen Ödemen und Weichteilschwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus
Calcium phosphoricum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus]
Cistus canadensis [Entzündung der Lymphdrüsen]
Hepar sulfuris [Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute, zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung]

Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Lymphdrüsenentzündungen]
Silicea [chronische Entzündungen der Lymphdrüsen]
Spongia [Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie Lymphdrüsen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Therapie der Wahl ist die mechanische Entstauung (komplexe mechanische Entstauungstherapie nach Prof. Földi, therapeutische Lymphdrainage nach Asdong und Bartezko)
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen und Bewegung
evtl. kurzfristige entwässernde Therapie mit Brennesseltee oder Spargelpräparaten

Masern

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Ausschluss anderer mit Exanthemen einhergehenden Infektionskrankheiten.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Asthma, Katarrh]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel [grippale Infekte]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium) oft verbunden mit Unruhe, Husten; ferner Fieber vor Ausbruch des Exanthems]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungen; zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen mit den Symptomen Rubor, Calor, Dolor, Tumor]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Bronchiolitis und spastische/asthmatoide Bronchitis]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Otitis media, (Mittelohrentzündung relativ häufig bei Masern!) sowie bei Enzephalitis]
Oculoheel (Tabl.) [Konjunktivitis, Blepharitis, Lichtscheu]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Fieberzustände mit hochrotem Gesicht und heißen dampfenden Schweißen; Neigung zu deliranten Zuständen]
Bryonia S
[Kopfschmerzen, Reizhusten, pleuritische Symptomatik]
Pulsatilla S [Konjunktivitis, Blepharitis, Rhinitis, Otitis media]
Zincum metallicum [zerebrale Reizzustände, Unruhe]
Zincum valerianicum [motorische Unruhe, Nervosität]
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Heiße Bäder; cave kalte Wadenwickel (und andere fiebersenkende Maßnahmen) vor Ausbruch des Exanthems: Gefahr von „nach innen geschlagenen Masern“!

Mastitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!
  Ggf. Antibiotika und chirurgischer Eingriff

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Bryaconeel (Tabl.) [neuralgiforme Schmerzen]
Cruroheel S (Tabl.)
[Fisteleiterungen (häufig bei Mastitis phlegmonosa]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Drüsenschwellungen, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S
[Wöchnerinnen-Mastitis, bes. als Folge von Milchstauung]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen, Phlegmone-Tendenz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[eitrige, ätzende scharfe Absonderungen]
Phytolacca S forte [bei subakuten und chronischen Entzündungen; “Brust schwer wie Stein (Milchstauung)]
Silicea [Konstitutionsmittel; dünnflüssiger wässriger Eiter; Neigung zur Chronizität]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Quark-Umschläge
Neuraltherapie: Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Lymphdrainage

Mastopathie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Mastodynie, Zysten, Neoplasma (Mammakarzinom), Hormonstörungen (z.B. prämenstruell und beim männlichen Geschlecht als Pubertätsmakromastie bzw. als Gynäkomastie)

Basistherapie
Orale Therapie:
Cimicifuga-Homaccord (Tropf.)
[Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Parenterale Therapie:
Cimicifuga-Homaccord
[Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [ödematöse Schwellungen]
Bryaconeel (Tabl.) [stechende neuralgische Schmerzen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]

Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Interkostalneuralgien]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht; deshalb u.a. indiziert bei Pubertätsmakromastie bzw. bei Gynäkomastie (Ursache: Überwiegen von Östrogenen gegenüber der Testosteron-Konzentration!)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [bei Schwellungen]
Bryonia S [heftige Stiche beim Atmen]
Cimicifuga S [Hypophysenunterfunktion; „Frauenmittel"; prämenstruelle Verschlimmerung]
Conium S [Verhärtungen und Knoten („hart wie Stein")]
Hydrastis [Drüsenmittel; Mammaverhärtungen]
Lachesis S [bei ödematösen Prozessen sowie im Klimakterium]
Phytolacca S forte [bei Milchstauung (Brust schwer wie Stein) sowie bei Brustknoten]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Hypophysis suis, Mamma suis, Ovarium suis, Placenta suis, Testis suis [beim männl. Geschlecht]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Gynäkologischer Raum, Frankenhäuser-Ganglien, Cubitalvene im Wechsel, zirkulär um die Brustdrüse

Menièrescher Symptomenkomplex

- **BESONDERE HINWEISE:**
HNO-ärztliche und neurologische Abklärung!
Ausschluss eines Kleinhirnbrückenwinkel-Tumors bzw. eines Akustikusneurinoms!

Basistherapie
Orale Therapie:
Vertigoheel (Tropf., Tabl.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Parenterale Therapie:
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei arteriosklerotischen und postkommotionellen zerebralen Durchblutungsstörungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung (endolymphatischer Hydrops bzw. Labyrinthhydrops beim Menière) und zur Infektanfälligkeit]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Hydrops des Labyrinthes]
Conium S [Schwindel, insbesondere Drehschwindel]
Gelsemium S [Schwindel, Benommenheit, Sehstörungen]
Tabacum [angiospastische Zustände, Nausea, Herzangst und Ohrensausen]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Os petrosum suis forte

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie:
Ganglion stellatum; **Vertigoheel** und **Lymphomyosot N** beiderseits am Mastoid
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Symbioselenkung, manuelle Therapie; Vermeidung von Nikotin, Kaffee, Alkohol

Menorrhagie, Metrorrhagie

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung; insbesondere Neoplasma-Ausschluss!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf.) [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Parenterale Therapie:
Cinnamomum-Homaccord N [bei Blutungen (kapillare Sickerblutungen) und Blutungsneigung]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen, u.a. auch bei Endometritis mit Gebärmutterblutungen]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Menorrhagien und Metrorrhagien bes. bei venöser Stase]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis = Oophoritis und Salpingitis), Endometritis und Para-Myometritis sowie Kolpitis]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S
[hellrote Gebärmutterblutungen bei Metritis und Parametritis]
Crotalus [bes. auch klimakterische Uterusblutungen]
Hamamelis [Menorrhagien; Dysmenorrhoe]
Hydrastis [Menorrhagien und Metrorrhagien, bes. auch Myomblutungen]
Ipecacuanha [hellrote Uterusblutungen]
Vipera berus [Blutungen aus Körperöffnungen]
Nosoden-Injeele:
Myoma uteri, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung

Meteorismus

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.) [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Erigotheel [Ulcus ventriculi et duodeni]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Duodenoheel (Tabl.) [Blähsucht bei Hyperazidität sowie bei Duodenitis ohne und mit Ulkus]

Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden: Blähsucht bei Hepatitis und anderen Lebererkrankungen incl. Cirrhosis hepatis]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehrsysteme beim Oberbauchsyndrom, besonders bei chronischen Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern), – oft verbunden mit Meteorismus (Blähbauch) – sowie bei Pfortaderstauung = portale Hypertension (häufig bei Cirrhosis hepatis]
Momordica compositum N (Amp.) [Affektionen der Bauchspeicheldrüse verbunden mit Oberbauchbeschwerden]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis und Kollapszustände]
Ypsiloheel N (Tabl.) [Meteorismus bei vegetativer Dystonie, ggf. verbunden mit Globusgefühl]

Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [Blähbauch und gastrokardialer Symptomenkomplex verbunden mit Globusgefühl und Singultus; meist nächtliche Verschlimmerung]
Carbo vegetabilis [bei schwerstem Meteorismus mit Kollapszuständen und Dyspnoe]
Chamomilla [Dyspepsie mit Meteorismus]
Lycopodium S [Hepatopathie mit Obstipation und Meteorismus]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli

Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis

Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Koliktropfen N
[Krampfneigung und Krampfzustände im Magen-Darmbereich]

Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Wärme, Kolonmassagen

Metritis, Parametritis

- **HINWEIS:**
  Adjuvante Theapie, evtl. Schwangerschaftsdiagnostik.

Basistherapie

Orale Therapie:
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Spascupreel (Tabl.) [bei Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, u.a. auch des Uterus; deshalb auch indiziert bei Parametropathia spastica = Pelvic congestion]

Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei ödematösen Schwellungen (ggf. verbunden mit stechenden, brennenden Schmerzen)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei allen lokalisierten Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.) [funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums; deshalb indiziert bei hormonellen Dysfunktionen, z.B. auch bei Dysmenorrhoe]
Spascupreel (Amp.) **Spascupreel S** (Supp.) [bei Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, u.a. auch des Uterus; deshalb auch indiziert bei Parametropathia spastica = Pelvic congestion]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [schmerzhaftes Ziehen im Unterleib – auch bei Zwischenschmerz]
Cuprum [Dysmenorrhoe bei (Para)Metritis]
Lachesis S
[bei Metritis, Salpingitis, Oophoritis mit Dysmenorrhoe]
Sepia [Entzündungen des Uterus (mit Senkungsbeschwerden) und der Adnexe]
Thuja S [Metritis polyposa, Fluor albus, Dysmenorrhoe]

Nosoden-Injeele:
Psorinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Ovarium suis, Uterus suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, physikalische Therapie

Migräne

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen (u.a. Fokaltoxikosen), Arten und Verlaufsformen der Migräne incl. Migraine rouge (Horton-Syndrom = Histamin-Kopfschmerz bzw. „Männer-Migräne“).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung erforderlich!

Basistherapie

Orale Therapie:
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Cervicalmigräne, Gefäßkopfschmerz]

Parenterale Therapie:
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord [Cervicalmigräne, Gefäßkopfschmerz]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen (verbunden mit Hyperämie: Migraine rouge!)]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Cholangitis, Cholezystitis, Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen; deshalb indiziert bei digestiver Migräne]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [Osteochondrose, -besonders der HWS: Migraine cervicale, Hinterhauptschmerz]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom sowie Zervikalmigräne mit Hinterhauptschmerzen und Ausstrahlung zu den Augen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, chronische Hepatitiden, Leberfunktionsstörungen: Migräne bei Gallen- und Leberaffektionen]

Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Genussmittel (Nikotin, Alkohol, Kaffee)- bzw. digestive Migräne]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[Schwindel verschiedener Genese]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel; bei „allergischer Migräne"]
Belladonna S [bei zerebralen Reizzuständen]
Bryonia S [berstende Kopfschmerzen]
Cimicifuga S [„klimakterische" Migräne]
Coffea [Schlaflosigkeit, „nervöse" Migräne]
Gelsemium S [Schmerzen im Hinterkopf und Auge]
Iris [„Sonntagsmigräne" mit anhaltendem, massiven, sauren Erbrechen]
Natrium muriaticum [chronische klopfende Kopfschmerzen und Migräne; neurasthenische Typen]
Sanguinaria [„klimakterische" Migräne]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Schwäche- und Erschöpfungszuständen sowie Depressionen]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosode, Medorrhinum, Salmonella typhi, Sinusitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (hohe Potenzen) [bei Migraine rouge]
Serotonin [bei Migraine rouge]
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Discus intervertebralis suis, Hepar suis, Ovarium suis, Vena suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatum, Mandelpol, Zähne
Weitere Verfahren: Akupunktur, Fokalherdsuche, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Milchschorf (Crusta lactea)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Der Milchschorf ist eine frühkindliche Manifestation bzw. Lokalisation einer Neurodermitis atopica.

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Traumeel S (Salbe) (lokale Entzündungen)
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.)
[Ekzeme, Hyperhidrosis, Intertrigo, Hyperkeratosen]
Calcoheel (Tabl.) [exsudative Diathese, Lymphatismus]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Drüsenschwellungen]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzeme und Dermatosen. Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel; exsudative Diathese, pastös-lymphatische Kinder; Kopfschweiße]
Graphites [Hautschuppen, trockene Ekzeme, Adipositas]
Silicea [Konstitutionsmittel: exsudative und skrofulöse Kinder]
Nosoden-Injeele:
Psorinum, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Ernährung: Allergenfreie Kost (insbesondere keine Kuhmilch!)
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Mononukleose, infektiöse

(Monozyten-Angina/Pfeiffer-Drüsenfieber)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Angina tonsillaris, Angina Plaut-Vincent, Diphtherie, Leukämie, Tbc, Lymphom, Arzneimittelallergie

- **BESONDERE HINWEISE:**
Serologische Abklärung!
EBV (Epstein-Barr-Virus)-Antikörper!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Angin-Heel SD (Tabl.) [Angina tonsillaris, Tonsillarpfröpfe]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ödematöse Schwellungszustände, zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen (z.B. Angina tonsillaris): Rubor-, Tumor-, Calor-, Dolor-Symptome]
Bryaconeel (Tabl.) [Fieber, rheumatische Neuralgien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber (febrile Verlaufsform häufig bei Kindern!) und Entzündungen, u.a. auch bei Angina tonsillaris (anginöse Verlaufsform [Monozyten-Angina] häufig bei Erwachsenen), Mononukleose und meningitischen Reizzuständen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen („Pfeiffer-Hepatitis") sowie bei toxischen Exanthemen (exanthematische Zustände bei Mononucleosis infectiosa nicht allzu selten!); zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden: „Pfeiffer-Hepatitis"]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Baptisia S [akute Infektionen mit Zerschlagenheitsgefühl und Benommenheit]
Belladonna S [zerebrale und meningeale Reizzustände („Pfeiffer-Meningitis")]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [akute und chronische Entzündungen des gesamten lymphatischen Apparates]
Vincetoxicum [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Viruserkrankungen sowie Lymphadenitis]
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula lymphatica suis, Hepar suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: 3. Mandelpol

Multiple Sklerose (Sclerosis multiplex)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen; MS als fragliche Virusinfektion [Slow virus])]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen; MS als fragliche Virusinfektion [Slow virus])]
Euphorbium comp. SN [Virusbelastungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[neuralgische Schmerzen bei MS!]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Anregung von Entgiftungsmechanismus]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Solidago comp. Heel [Anregung der Nierenausscheidung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege), Spastizität der quergestreiften Muskulatur (muskulärer Hartspann, Myogelosen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel; neuralgische Schmerzen]
Argentum nitricum
[Unruhe, Schwindel, Tremor, lanzinierende Schmerzen]
Causticum S
[Lähmung von Blase und Mastdarm sowie der Gesichtsnerven]
Gelsemium S [Paresen peripherer Nerven incl. der Augenmuskeln, Sprachstörungen]
Plumbum metallicum [Paresen, Muskelatrophie]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Cortison
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Nervus opticus suis, Sanguis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Diät nach Evers
Elektroakupunktur nach Voll zur Testung.

Mumps

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave Komplikationen: u.a. Orchitis sowie Pankreatitis.
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Pulsatilla compositum
[Aktivierung der mesenchymalen Funktionen]
Symptomenbezogene Therapie
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. bei Stomatitis (Mumps-Stomatitis!) und Glomerulonephritis (Mumps-Nephritis)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [bei Suppurationen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Rhododendron
[Orchitis, Epididymitis; Hydrozele; rheumatoide und polyneuritische Beschwerden]
Suis-Organpräparate Injeele:
Pankreas suis, Testis suis
Begleittherapie
Neuraltherapie:
Segmenttherapie, Störfeldsuche

Muskelrheumatismus (extraartikulärer Rheumatismus)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ausschluss einer Fokaltoxikose

Basistherapie
Orale Therapie:
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie (fokusbedingter Weichteilrheumatismus?)]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtisch-rheumatische Beschwerden]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [entzündlicher Weichteilrheumatismus mit Neuralgien und Neuritiden]
Bryonia S [entzündlicher Muskel- und Gelenkrheumatismus]
Colchicum (forte S) [Gelenk- und Muskelrheumatismus mit Herzbeteiligung (Peri-, Myo-, Endokarditis)]
Colocynthis S [stechende Schmerzen mit Taubheitsgefühl und Parästhesien]
Conium S [verschiedene Muskelbeschwerden, wie Muskelkrämpfe und Muskelschwäche sowie Muskelverhärtungen]
Cuprum [Krämpfe in den Muskeln mit Muskelrigidität]
Curare [Lähmungen und Schwächezustände der Muskulatur, bes. nach Überanstrengungen]
Dulcamara S [Muskel- und Gelenkrheumatismus als Folge von Erkältungen bzw. mit Nasswetterverschlimmerung]
Kalium carbonicum forte N [Muskelschwäche sowie Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern mit Hyperhidrosis]
Rhododendron [Muskelrheumatismus mit reißenden Schmerzen und motorischer Unruhe]
Rhus Tox S [diffuse rheumatische Schmerzen in Bändern, Sehnen, Muskelansätzen und Muskeln]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Placenta suis
Cosmochema:
Rheumatabletten N,
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Iontophorese
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung

Mykosen

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Ekzeme, superinfizierte Ekzeme.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Bei Mykosen muss in allererster Linie das Terrain behandelt werden, da der Organismus an den Stellen des Pilzbefalls jene Sekretionsprodukte liefert, die den Pilzen ein günstiges Wachstum ermöglichen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Hepeel N [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [ekzematöse Veränderungen]
Cruroheel S (Tabl.) [bei Pilzflechten an den Füßen]
Cutis compositum N (Amp.) [zur Konstitutionstherapie]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[Regeneration der Sulfidfermente]
Einzelmittel-Injeele:
Natrium muriaticum [Rhagaden, Nageltrichophytie]
Petroleum [nässende Ekzeme],
Sulfur S [Konstitutionsmittel]
Nosoden-Injeele:
Nagelmykose-Nosode
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Ernährungsumstellung
Mikrobiologische Therapie
Körperpflege!
Weitere Verfahren: Heilerdeumschläge

Myoma uteri

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasien: Uteruskarzinom (gehäuft auftretend bei Uterusmyomen), Uterussarkom (maligne Entartung eines Myoms)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Fachärztliche Abklärung, Kontrolluntersuchungen; ggf. OP-Indikation beachten!

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel forte NF (Tropf.)
[Anregung der Schilddrüsenfunktion]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus, u.a. auch Dysmenorrhoe; cave: verstärkte Blutungsneigung!]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis = Oophoritis, Salpingitis), Para-Myo-Endometritis, Kolpitis]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [ziehende Schmerzen im Unterleib, ödematöse Schwellungszustände]
Conium S [bei allen Verhärtungen (steinharte Myomknoten)]

Hydrastis [bei Uterusblutungen (Menorrhagien, Metrorrhagien sind häufig bei Uterus myomatosus)]
Ipecacuanha [hellrote, gussweise Gebärmutterblutungen]
Kreosotum [Menorrhagie, Metrorrhagie mit stinkendem Fluor]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions-, Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Myoma uteri
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Placenta suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Gynäkologischer Raum, Frankenhäuser-Raum

Neuralgien / Neuritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Neuropathien (z.B. Polyneuropathia diabetica sive alcoholica), Vitaminmangelzustände, para- und postinfektiöse Neuralgien, paraneoplastisches Syndrom, Fokaltoxikose

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien (bes. HWS-bedingte) sowie sonstige neurale Störfelder]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie; Tonsillen als Fokus]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schulter-Arm-Syndrom mit abstrahlenden Neuralgien in die Arme]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kopfneuralgien; Migraine cervicale bzw. Zervikalmigräne und Zervikalsyndrom sowie Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien; Zosterneurlagien; pleuritische Schmerzen (Interkostalneuralgien sind relativ häufig bei Zoster sowie bei Pleuritis]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[Kopfschmerzen und Kopfneuralgien]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [bes. Trigeminusneuralgie und Ischias]
Bryonia S
[stechende Schmerzen bei Muskel- und Gelenkrheumatismus sowie bei Neuralgien im Trigeminus- und im Interkostalgebiet]
Rhododendron
[Trigeminusneuralgie; Verschlimmerung vor Wetterwechsel]
Rhus Tox S [Neuritiden und Neuralgien (incl. Ischias sowie interkostal); „Nasswettermittel"]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Kieferostitis-Nosode, Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N,
Neuralgietropfen CM [Schmerzen, Nervenschmerzen]
Rheumatabletten N [Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Fides:
Injectio antineuralgica S Fides
[Neuralgisch-arthritischer Formenkreis]
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamin B-reiche Kost
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Neuraltherapie: Fokalherde, Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie, manuelle Therapie

Neurodermitis

Basistherapie
Orale Therapie:
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Hepar comp. Heel
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, z.B. bei exsudativer Diathese, Lymphatismus]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Hepatitis acuta und chronica; Stauungsikterus; Leberschädigungen (Parenchymschäden)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit: cave bakterielle Sekundärinfektionen [Pyodermien] bei Neurodermitis!); Drüsenschwellungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen; Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [lichenifizierte Dermatosen und Ekzeme]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus bzw. exsudativer Diathese, Milchschorf]
Formica rufa [Hautjucken, urtikarielle allergische Exantheme; Umstimmungsmittel]
Graphites [trockene, rissige Haut; Seborrhoe; Adipositas]

Natrium muriaticum [ekzematöse und pustulöse Exantheme, Rhagaden, Eczema flexuarum (= neurodermitische Hauptlokalisation im Schulkindesalter!)]
Rhus Tox S [pustulöse und bullöse Hautausschläge mit Brennen und Jucken; Ruhe verschlimmert!]
Sulfur (forte) S
[Konstitutions- und Reaktionsmittel zur Umstimmung]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N,
Hautfunktionstropfen N [Erkrankungen der Haut]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
FideSan (Salbe) [Ekzeme, Dermatosen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: „Suchkost“, allergenfreie Kost
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie, EAP-Testung

Neurosen

(siehe psychische Symptome)

Obstipation

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Neoplasma-Ausschluss! Cave: Laxantien-Abusus!

Basistherapie
Orale Therapie:
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Spascupreel S
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Erigotheel (Amp.)
[Verstopfung bei Ulcus ventriculi et duodeni]
Gastricumeel (Tabl.)
[Obstipation bei Gastritis acuta et chronica ohne und mit Ulkus, oft kombiniert mit Sodbrennen sowie mit Meteorismus und gastrokardialem Symptomenkomplex]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen (z.B. Cholangitis, Cholezystitis) sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.)
[Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden – oft verbunden mit Meteorismus, Appetitlosigkeit]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; chronische Hepatitiden; Leberfunktionsstörungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus (z.B. Colitis]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Meteorismus, Pfortaderstauung mit Darmträgheit]
Graphites [Konstitutionstyp: „träge, gefräßig, verstopft“ (herabgesetzter Grundumsatz); meist atonische Obstipation]
Hydrastis [Meteorismus, atonische Obstipation]
Lycopodium S [Leberleiden mit Meteorismus und Obstipation]
Nux vomica S [spastische Obstipation]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Flatulenz und proktogener Obstipation mit harten Stuhlknollen]
Taraxacum [Hepatopathie mit hartnäckiger Obstipation; oft im Wechsel mit Diarrhoe]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Bacterium coli, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Schlacken- und ballaststoffreiche Kost bei vorwiegend atonischer Obstipation; gut gleitende Kost (Apfelmus, Leinsamensuppe, Butter, Sahne, Eigelb, Olivenöl) bei vorwiegend spastischer Obstipation
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Ödeme (allergische)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Iatrogen, Medikamentenallergie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Anaphylaxie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Aktivierung der mesenchymalen Funktionen]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. auch bei entzündlichen Ödemen mit Calor, Rubor, Tumor, Dolor]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Aktivierung der mesenchymalen Funktionen]
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei Allergien, bes. bei Asthma bronchiale, Urtikaria und Heufieber]
Apis S [Ödeme – auch der Augenlider (Lichtscheu, Chemosis) – mit Hitze, Rötung und Brennen]
Urtica [urtikarielle Exantheme]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (höhere Potenzen!),
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Ren suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N,
Hautfunktionstropfen N [Erkrankungen der Haut]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Antigenfreie Ernährung
Ausleitende Therapie: Aderlass
Neuraltherapie: Mandelpol, Störfeldsuche
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung, Lymphdrainage

Ödeme (kardiale)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sekundärer Hyperaldosteronismus,
  Linksherzinsuffizienz (Lungenödem, Cor pulmonale), Rechtsherzinsuffizienz (periphere Ödeme incl. Aszites), kardiale Leberzirrhose bei Rechtsherzinsuffizienz (Cirrhose cardiaque), Leberzirrhose bei Lebererkrankungen, Pfortaderstauung
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Renale Ödeme, venöse Ödeme. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Cralonin Tropfen [Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen, pectanginöse Beschwerden]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Cor suis compositum N [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]
Symptomenbezogene Therapie
An-io-Injeel (Amp.) [pektanginöse Beschwerden, Herzmuskelschwäche, Koronardurchblutungsstörungen]
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Herzrhythmusstörungen, Hypotonie]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung; Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis: Tonsillen ggf. als Foki für infektiös-toxische Herzmuskelschwäche mit konsekutiven kardialen Ödemen]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung (= Diuretikum); nephrogene Hypertonie]
Strophanthus compositum N (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Carbo vegetabilis [Lungenödem bei Herzmuskelschwäche mit Dyspnoe; nächtliche Verschlimmerung]
Jaborandi [Lungenödem mit schaumigem Auswurf; Herzklopfen, Tachykardie, Herzangst]
Kalium carbonicum forte N [Herzmuskelschwäche mit Ödemneigung, bes. auch der Oberlider]
Strophanthus [Herz-Kreislauf-Dekompensation, Tachykardie]
Nosoden-Injeele: **Streptococcus haemolyticus**
Suis-Organpräparate Injeele: **Arteria suis, Cor suis**
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Strophanthus comp.-Herztabletten
[Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Bei Übergewicht Gewichtsreduktion; stets NaCl-arme Kost, Safttage, Obsttage, Apfelreistage, Kartoffeltage
Neuraltherapie: Herzpunkte
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie; ggf. Bewegungstraining

Ödeme (renale)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache (Fokalherde!) abklären! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reiz- und Entzündungszustände ohne und mit Konkremente (Nephrolithiasis und Gicht: „Gichtniere“ [Uratnephropathie]) im Bereich des Urogenitaltraktes]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.) [konsekutive Myokardschwäche bei Nierenödemen, Hypertonie, Neigung zu Lungenödem]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen (hepatische Ödeme nach Einwirkung hepatotoxischer Substanzen bzw. Hepatonephritis bzw. hepatorenales Syndrom [Heyd] = „Schockniere“ bei schweren Leberstörungen; hepatogene Ödeme, bes. bei Cirrhosis hepatis]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit sowie Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis: Tonsillen ggf. als Foki für Glomerulonephritis mit konsekutiven renalen Ödemen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [teigige blasse Ödeme auch der Augenlider]
Solidago virgaurea [Nephritis/Nephrosen mit hydropischen Zuständen und Albuminurie]
Nosoden-Injeele:
Cystopyelonephritis-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Pyelon suis, Ren suis, Ventriculus suis
Cosmochema:
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Flüssigkeitsbeschränkung, NaCl-arm; stets Eiweißbilanzierung
Physikalische Therapie: Lymphdrainage
Neuraltherapie:
Grenzstrang, paravertebrale Quaddelbehandlung

Ösophagitis / Refluxösophagitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hiatushernie, Neoplasma im Kardiabereich, Postgastrektomiesyndrom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung durch Gastroösophagoskopie! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Nux vomica-Homaccord (Tropf.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Parenterale Therapie:
Erigotheel [Ulcus ventriculi et duodeni]
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität; Duodenitis, Ulcus duodeni]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gastroenteritis sowie bei Enterocolitis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Schleimhautentzündungen mit Geschwürsneigung (Ösophagitis erosiva bzw. ulcerosa); „Splitterschmerz"]
Belladonna S [entzündliche Prozesse; Singultus]
Iris [brennende Schmerzen, Sodbrennen, saures Erbrechen]
Suis-Organpräparate Injeele: **Duodenum suis, Mucosa nasalis suis, Ventriculus suis**
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung

Orchitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Tumor, Tbc, Syphilis, Parotitis epidemica (Mumps), Hodentorsion, Epididymitis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Hodentorsion = Notfallsituation!

Basistherapie
Orale Therapie:
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen, z.B. metastatische Virus-Orchitis [Parotitis epidemica])]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen, z.B. auch bei Impotentia virilis und Ejaculatio praecox]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Pulsatilla S [Epididymitis und Orchitis]
Spongia
[unspezifische Orchitis und Epididymitis mit Drüsenschwellungen]
Thuja S [Konstitutionsmittel; proliferative Prozesse, Chronizität; Abwehrsteigerung]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Acidum fumaricum [entzündliche Erkrankungen der männlichen (und weiblichen) Genitalorgane]
Suis-Organpräparate Injeele:
Testis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Hochlagerung, Suspensorium

Orthostase-Syndrom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  HVL- bzw. Nebennierenrindeninsuffizienz, kardiovaskuläre Hypotonie, infektiös-toxische Hypotonie, Hypovolämie, orthostatische Dysregulation

Basistherapie
Orale Therapie:
Aurumheel N Tropfen [Herzangst, Kreislaufregulationsstörung]
Parenterale Therapie:
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.)
[Hypotonie als Folge von Herzschwäche]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.)
[bei Herzschwäche, z.B. Folgen von Herzmuskelschädigungen, infektiös-toxische Myokardschwäche, Angina pectoris, Zustand nach Myokardinfarkt]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neigung zu Kollapszuständen]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Herz- und Gefäßwirkung]
Tabacum [Hypotonie mit Schwindelzuständen]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen und sonstige balneologische Verfahren
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Sport

Osteochondrose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Bandscheibendegeneration, Bandscheibenprolaps, Lumboischialgien.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Da es im Rahmen der Bandscheibendegeneration auch einmal zu einem akuten Discusprolaps kommen kann, sollte bei jedem akut aufgetretenem Schmerz sorgfältig nach motorischen oder sensiblen Ausfällen gesucht und in jedem Zweifelsfall eine entsprechende Spezialuntersuchung veranlasst werden, da in diesen Fällen oft nur eine Operation eine irreparable Nervenschädigung verhindern kann.

Basistherapie
Orale Therapie:
China-Homaccord S (Tropf.)
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf.)
[Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]

Osteoheel S (Tabl.)
[Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Parenterale Therapie:
China-Homaccord S
[zur Behandlung von Erschöpfungs- und Schwächezuständen]
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Cimicifuga-Homaccord
[Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Symptomenbezogene Therapie
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen im Nacken und in den Schultern]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Beschwerden im Bereich der Brustwirbelsäule, Interkostalneuralgien]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.) [zur Entkrampfung der Muskulatur]
Traumeel S (Tabl., Tropf., Amp.)
[LWS-Beschwerden, entzündliche Begleiterscheinungen]
Einzelmittel-Injeele:
Rhododendron [bei Wetterempfindlichkeit]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus
[Gefühl von Vibrieren in der Wirbelsäule beim Liegen und Aufstampfen mit den Füßen]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Glandula suprarenalis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Krankengymnastik, Massagen (evtl. mit Traumeel S Salbe) (Entzündungen, Verletzungsfolgen)
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Schröpfkopfmassagen, Kneippsche Therapie
Mikrobiologische Therapie
Eigenbluttherapie inkl. Auto-Sanguis-Stufentherapie

Osteoporose

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Osteomalazie und andere Osteopathien sowie Karzinommetastasen und Bandscheibenerkrankungen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Calcoheel (Tabl.)
[Kalkstoffwechselstörungen, lymphatische Diathese]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Parenterale Therapie:
Testis compositum N Ampullen (bei Männern
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Interkostalneuralgien; pleuritische Schmerzen]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel mit Wirkung auf die Knochen: Tendenz zu Rachitis, Osteoporose, Osteomalazie]
Calcium fluoratum [ossale Veränderungen – z.B. auch Exostosen – an der Wirbelsäule und an anderen Knochen]
Calcium phosphoricum
[Konstitutionsmittel („weiche Knochen"); Knochenschmerzen]
Hekla Lava [nekrotische Knochenprozesse; Exostosen]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Cortison [bei allen Knochenentkalkungen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Hepar suis, Medulla ossis suis, Os suis, Ovarium suis, Testis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Milch- und Käseprodukte
Physikalische Therapie: Bewegungstherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT

Otitis externa

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist bakteriell, mykotisch oder viral bedingt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) (eitrige und entzündliche Erkrankungen)
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Hyperhidrosis, Hyperkeratosen]
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, bei Abszessen und Phlegmonen sowie bei Otitis media und bei Hautkrankheiten sowie Osteomyelitis (Osteomyelitis des Schläfenbeins ist Komplikation bei Otitis externa!)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S
[äußerliche und innerliche Entzündungen incl. Furunkulosen]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Phlegmone-Tendenz (Otitis externa diffusa mit Perichondritis!)]

Silicea [Konstitutionsmittel bei Neigung zur Chronizität bei Otitis externa (und media)]
Thuja S [chronische proliferative Hautaffektionen]
Nosoden-Injeele:
Adeps suillus, Otitis media-Nosode, Sinusitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Zuckerfreie Ernährung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Quaddeltherapie am Mastoid
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Otitis media, akute

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ggf. adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fistelbildung]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Angina und Grippe sowie bei Otitis media]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe (Grippe-Otitis) und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastös-lymphatischen Pyknikern]
Chamomilla [Otitis media, bes. bei neuropsychopathischen Kindern mit Schmerzüberempfindlichkeit]
Ferrum phosphoricum forte
[bei beginnender akuter Otitis media]
Pulsatilla S [akute und chronische Otitis media; pulsierende stechende Schmerzen]
Thuja S [Neigung zur Chronizität]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Otitis media-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Physikalische Therapie:
Wärme lokal
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Quaddeltherapie am Mastoid
Weitere Verfahren: Symbioselenkung
Traumeel S Ampullen-Lösung in den Gehörgang instillieren (Entzündungshemmung)

Otitis media, chronische

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Cholesteatom, Mastoiditis, akute Otitis media, Seromukotympanon, Mittelohr-Tbc

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterung]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Einzelmittel-Injeele:
Ferrum phosphoricum forte
[akute Exazerbation einer chronischen Mittelohrentzündung]
Pulsatilla S [akute und chronische Otitiden]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Neigung zur Chronizität einer Otitis media (und externa)]
Thuja S [chronische – proliferative – Folgezustände von Eiterungen und Infektionen]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Otitis media-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenkarenz
Physikalische Therapie: Rotlicht
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Störfeldsuche, Zähne, Mandeln, Nebenhöhlen
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, HOT, Symbioselenkung, Fokussanierung;
Traumeel S Ampullen-Lösung ins Ohr instillieren [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Ozaena

(Rhinitis atrophicans cum foetore; „Stinknase“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Rhinosklerom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ggf. adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Naso-Heel SNT (Tropf.)
[chronische und akute Rhinitis mit und ohne Sinusitis]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen: die Ozaena ist (meist) die Folge einer Autoinfektion auf geschädigter Schleimhaut verbunden mit Abwehrschwäche]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [stinkende Sekrete]
Kalium bichromicum [Rhinitis chronica et ulcerosa; dick-zähe und fadenziehende Absonderungen]
Luffa operculata [Rhinitis atrophicans; Kopfschmerzen]
Silicea [Konstitutionsmittel, bes. bei genuiner bzw. primärer Ozaena (Gynäkotropie!) indiziert; generell: reaktionsträge schmierende, ätzende und stinkende Absonderungen; ggf. Geruchsüberempfindlichkeit]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen und Spülungen
Neuraltherapie: Mandeln, Ganglion sphenopalatinum
Weitere Verfahren: Symbioselenkung; ggf. Operation (Reduktionsplastik)

Panaritium

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Panaritium parunguale (= Paronychie!),
  Panaritium (sub)cutaneum, subunguale, periostale, ossale, articulare, tendinosum; Hohlhandphlegmone, Schwielenabszess
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Osteomyelitis, Fistelbildung, Mykosis!
  Stets Ruhigstellung; ggf. chirurgische Intervention!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [bei Fisteleiterungen]
Echinacea compositum SN
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen, Fisteleiterungen sowie bei Hautkrankheiten und Osteomyelitis]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [Hautentzündungen, Geschwulstbildung, osteomyelitische Prozesse; Blutungsneigung; „Splitterschmerz“]
Arnica S [generelles Entzündungsmittel; Verschlimmerung durch Bewegung und Erschütterung]
Graphites [chronisches Panaritium incl. chronische Paronychie]
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse; Phlegmone-Tendenz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[bes. bei beginnenden Eiterungen]
Silicea
[dünnflüssig-wässriger Eiter sowie zur Beendigung der Eiterung]
Staphisagria
[schlecht abklingende Eiterungen; Neigung zu Keloiden]
Sulfur (forte) S [Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]

Pankreatitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Bei akuter Pankreatitis: Mesenterialer Gefäßverschluss, Enteritis, Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, Ulkus-Perforation, Herzinfarkt (Hinterwand), Milzinfarkt, Volvulus, Obturationsileus, rupturiertes Aortenaneurysma, Bleikolik, Trauma.
  Bei chronischer Pankreatitis: Pankreaskarzinom, zystische Fibrose (Mukoviszidose).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Bei (per)akuter Pankreatitis fehlt oft Bauchdeckenspannung!
  Adjuvante Therapie! Trinkampullenmedikation!

Basistherapie
Orale Therapie:
Leptandra compositum (Tropf.)
[Oberbauchsyndrom, Leber- und Pankreaserkrankungen]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[Oberbauchsyndrom, Pankreaserkrankungen]
Parenterale Therapie:
Momordica compositum N [Oberbauchsyndrom, Entzündungen und Funktionsstörungen des Pankreas]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Cholangitis, Cholezystitis, Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica, Leberschädigungen (Parenchymschäden), Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen; Meteorismus]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden]

Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Carbo vegetabilis [Meteorismus, Flatulenz sowie Dyspepsie, Foetor ex ore; Speisenunverträglichkeit (Unverträglichkeit von Fett und Milch sowie von Alkohol); Kollapsneigung]
Nosoden-Injeele: **Salmonella typhi**
Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Pankreas suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Initial Nahrungskarenz (ggf. parenterale Ernährung); nach Abklingen des (per)akuten Stadiums stets fettarm, Vermeidung/Reduzierung von Kaffee und Tee; Cave: Alkohol!
Neuraltherapie: Oberer Grenzstrang beiderseits, Plexus solaris
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, ggf. Fermentsubstitution

Papillome (der Blase)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung! Rezidivneigung; ggf. Tendenz zur malignen Entartung!

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Plantago-Homaccord (Tropf.)
[Enuresis nocturna; Incontinentia urinae; Reizblase]
Reneel NT (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizblase]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei akuten und chronischen Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis, Zystopyelitis, Enuresis nocturna, sowie bei Incontinentia urinae, 1. Stadium des Prostata-Adenoms, Harnröhrenstrikturen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Cantharis [Zystitis mit starkem Harndrang und brennenden Schmerzen sowie Hämaturie]
Causticum S [Lähmungen der Blase, schmerzhafte brennende Blasenschwäche]
Crotalus [Hämaturie]
Hydrastis [Schleimhautentzündungen mit gelblich-fadenziehenden Absonderungen und Blutungsneigung]
Thuja S [bei allen proliferativen Prozessen wie Papillomen, Polypen, Epitheliomen]
Vipera berus [Hämaturie, Harninkontinenz]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Cystopyelonephritis-Nosode, Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus pineale suis, Funiculus umbilicalis suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung (wie bei Zystitis/Zystopyelitis):
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr; laktovegetabile gewürzarme Kost; ggf. „Schaukeldiät“
Weitere Verfahren: Neuraltherapie

Paresen

- **BESONDERE HINWEISE:**
Neurologische und ätiologische Abklärung: spastische = zentrale Lähmung bzw. schlaffe = periphere Lähmung. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Arteriosklerose, nach Commotio cerebri, bei Neuralgien sowie bei amyotrophischer Lateralsklerose, multipler Sklerose und Parkinsonscher Schüttellähmung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Causticum S [Fazialisparese, Lähmungen der Stimmbänder, der Schlingmuskel und Augenlider sowie von Blase und Mastdarm; Schwäche mit Unsicherheit beim Gehen]
Colocynthis S [Ischiasneuralgien; stechende Schmerzen mit spastischen Zuckungszuständen]
Conium S [aufsteigende Lähmungen, Ataxie]
Crotalus [halbseitige Lähmungen mit Schmerzzuständen]
Curare [schlaffe Lähmungen der Muskulatur]
Gelsemium S [Ptosis der Augenlider, Augenmuskellähmungen; (postdiphtherische) Paresen der peripheren Nerven]
Plumbum metallicum
[Paresen mit Muskelatrophie und Abmagerung]
Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon [poliomyelitische Lähmungen],
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus) *hieraus bes. indiziert:*
Acidum succinicum, Acidum DL-malicum, Acidum α-ketoglutaricum [postapoplektische Paresen],
Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Hepar suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Sympathicus suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Elektrotherapie, Krankengymnastik
Weitere Verfahren: Akupunktur

Parkinson'sche Erkrankung (Paralysis agitans)

- **DIFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere degenerative Erkrankungen des zentralen Nervensystems, postenzyphalitische, toxische oder medikamenteninduzierte Parkinsonoide, Tremor unterschiedlicher Genese.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig findet sich eine Trias von Tremor (nicht obligat), muskulärer Rigidität oder Erhöhung des extrapyramidalen Tonus und Akinesie. Charakteristisch sind rhythmische Bewegungen und primäre Bewegungsautomatismen, sog. Zahnradphänomen. Erste Zeichen sind oft Mimikstarre (Maskengesicht), seltener Lidschlag, das Gangbild zeigt kleine Schritte, die Füße schleifen, Rumpf und Kopf werden nach vorne gebeugt, die Arme sind angewinkelt und anliegend, jede Änderung der Richtung und Geschwindigkeit dauert lange. Man findet vegetative Symptome wie Salbengesicht, vermehrter Speichelfluss, vermehrte Schweißbildung. Oft bestehen wirbelsäulenabhängige und muskuläre Schmerzzustände.
  Die Antihomotoxische Therapie ist als adjuvante Therapie aufzufassen.

Basistherapie

Parenterale Therapie:

Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]

Suppositorien:

Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie

Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien verschiedener Lokalisation incl. neuralgische Kopfschmerzen]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur (muskulärer Hartspann), Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben; Commotio cerebri: posttraumatischer Parkinson]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Schwindel bei zerebralsklerotischem und posttraumatischem Parkinson]

Einzelmittel-Injeele:

Belladonna S [zerebrale Reizzustände]
Cantharis [Strangurie mit brennenden Schmerzen]
Phosphorus S
[Neurasthenie, Kopfschmerzen, erschwertes Denken]
Thuja S [migräneartige (Nagel)Kopfschmerzen, Sprachstörungen, insbesondere Wortfindungsstörungen; „Salben-Gesicht"]
Zincum metallicum
[zerebrale Reizzustände, Muskelzuckungen, Muskelkrämpfe]

Intermediäre Katalysatoren:

Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele: **Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis**

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Weitere Verfahren: Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, physikalische Therapie, Krankengymnastik

Parodontose / Parodontitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Relativ häufig bei Diabetes mellitus, bei Glomerulonephritis sowie beim Myxödem und bei der Akromegalie. Die Parodontose kann ein Fokalherd sein. Bei Entzündungsneigung – z.B. bei Abwehrschwäche – häufig Aufpfropfung einer Parodontitis auf einer Parodontose! Zahnärztliche Verlaufskontrolle!

Basistherapie

Orale Therapie:

Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Parenterale Therapie:

Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Lokale Therapie:

Traumeel S (Salbe) (Entzündungen)
Traumeel S Ampullen zur lokalen Pinselung

Symptomenbezogene Therapie

Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, z.B. bei exsudativer Diathese, Skrofulose, Lymphatismus]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Gingivitis und Stomatitis sowie bei Fokaltoxikosen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen; Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:

Asa foetida [stinkende Sekrete]
Calcium fluoratum [Knochenkaries, Knochenfisteln; Periostitis; Bindegewebsschwäche]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[akute und chronische Entzündungen; Gingivitis, Pulpitis, Peridontitis; vermehrter Speichelfluss (bes. nachts); Foetor ex ore]
Silicea [Bindegewebsmittel, dystrophische Zustände (Parodontose = Paradontopathia dystrophica!)]

Nosoden-Injeele:

Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:

Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis

Cosmochema:

Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Ernährung: Vollwertkost, Rohkost

Physikalische Therapie: Mundduschen, Zahnfleischmassagen

Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Zahnsteinentfernung; ggf. Entfernung von Amalgamfüllungen!

Paronychie

(= Panaritium parunguale; „Umlauf“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  acute: meist Staphylokokkeninfektion!
  chronische: Nagelmykosen (Candida; oft bei Akrozyanose!), luetischer Primäraffekt!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Dermatitis, Dermatosen sowie bei Dermatomykosen einschl. Interdigitalmykosen]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen und Fisteleiterungen sowie bei Hautkrankheiten und Osteomyelitis]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische; zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Asa foetida [chronische Paronychie; stinkende Absonderungen]
Graphites
[chronische Paronychie; reaktionsträge rissige trockene Haut]
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S
[bei Neigung zu septischen Prozessen; düsterrote Verfärbung]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[akute und chronische Entzündungen]
Natrium muriaticum [Nageltrichophytie]
Silicea
[Konstitutionsmittel bei akuten und chronischen Eiterungen]
Sulfur (forte) S [Konstitutionsmittel bei chronischen Krankheiten sowie Reaktions- und Umstimmungsmittel]
Nosoden-Injeele: **Nagelmykose-Nosode, Staphylococcus**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Parulis

(meist von einer Parodontitis ausgehender Zahnfleischabszess an der Zahnwurzel; „dicke Backe“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Karzinom
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Abszessen, Fisteleiterungen, Phlegmonen, Gingivitis sowie bei Stomatitis und Osteomyelitis]
Osteoheel S (Tabl.) [Exostosen und Periostitis]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [bei Eiterprozessen mit Phlegmone-Tendenz]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Entzündungen des gesamten lymphatischen Apparates incl. Pulpitis, Parodontitis, Stomatitis, Gingivitis; Foetor ex ore, Speichelfluss (Ptyalismus)]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Bindegewebsschwäche; Neigung zu Chronizität und Drüsenschwellungen]
Staphisagria [Parodontose, Zahnkaries; Gesichtsneuralgien]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Pulpa dentis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Spülungen
Neuraltherapie: Mandelpol
Weitere Verfahren: Zahnärztliche Behandlung, Operation

Periarthritis humeroscapularis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Duplay-Schultersteife, Impingement-Syndrom, zervikale Degenerationen, Bandscheibenschäden und Neuralgien.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Paravertebral lässt sich im Bereich der unteren Halswirbelsäule bis zum thorakalen Übergang eine vermehrte Muskelspannung auch mit Gelosen feststellen. Im Bereich des 4. Halswirbelkörpers kann ein erhöhter Sympathikotonus zu der Periarthritis beitragen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Parenterale Therapie:
Zeel comp. N [Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]

Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Zeel comp. N (Salbe)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[insbesondere bei Nasswetterverschlimmerung]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [alle Formen von Schulter-Arm-Syndromen, besonders rechtsseitig]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus, periarthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [akuter und chronischer Rheumatismus]
Hypericum
[Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems]
Rhododendron [Rheumatismus, Nervenschmerzen, insbesondere nach Überlastung]
Rhus Tox S [rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln]
Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode**
Suis-Organpräparate-Injeele: **Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus suis, Os suis**
Cosmochema:
Rheumatabletten N [Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises],
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Lokale Kältetherapie, Reizstrombehandlungen, Ultraschalltherapie, Stoßwellentherapie bei Verkalkungen
Manuelle Medizin
Weitere Verfahren:
Neuraltherapeutische Infiltrationen, Magnetfeldtherapie
Gabe von Antioxidantien, insbesondere Vitamin E
Enzymtherapie evtl. operative Behandlung notwendig

Periostitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Osteoid-Osteom, Lues, Aktinomykosen, Tbc, Marie-Bamberger-Syndrom (= Periostitis bei verschiedenen überwiegend intrathorakalen Grundleiden), Periostitis (post)traumatica (haemorrhagica bzw. purulenta)
- **BESONDERE HINWEISE:**
Auch an periostitische Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule (hyperostotische Spondylose!) denken!

Basistherapie
Orale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[Verletzungen wie Prellungen und Knochenbrüche sowie posttraumatische Ödeme und Weichteilschwellungen; entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat (Styloiditis, Epicondylitis)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S
[posttraumatische Periostitis mit Zerschlagenheitsgefühl]
Asa foetida [stechende Knochenschmerzen (ggf. Knochenkaries) mit periostitischer Berührungsüberempfindlichkeit]
Eupatorium perfoliatum
[„Beinheil"; Knochenschmerzen, bes. der Schienbeine]
Hekla Lava [Exostosen (Periostitis hyperplastica)]
Kalium bichromicum [Periostitis mit Kälteverschlimmerung]
Kalmia S [rheumatische und neuralgische Schmerzen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Periostitis mit nächtlicher Verschlimmerung]
Rhus Tox S [Verschlimmerung bei feuchtkaltem Wetter, nach Durchnässung sowie in der Ruhe („erethische Unruhe"); Startschmerzen bzw. Anlaufschmerzen]
Silicea [Bindegewebsmittel]
Symphytum [„Arnica der Knochen", Periostschädigungen]
Suis-Organpräparate Injeele: **Funiculus umbilicalis suis, Os suis**
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Ggf. Kälteanwendungen
Weitere Verfahren: Neuraltherapie

Pertussis

(Keuchhusten; whooping cough)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Hilustuberkulose, Laryngospasmus, Pseudokrupp, aspirierter Fremdkörper, Mukoviszidose, Parapertussis
- **BESONDERE HINWEISE:**
Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Drosera-Homaccord (Tropf.)
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Droperteel (Tabl.) [(spastische) Bronchitis]
Parenterale Therapie:
Drosera-Homaccord
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung (Augenhämatome bei Pertussis!)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]

Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Husteel (Tropf.) [Husten, z.B. bei Erkältungskrankheiten, spastischer Bronchitis, Pleuritis]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege und der Bindehaut des Auges]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane]
Tartephedreel N (Tropf.)
[Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, Asthma bronchiale; Husten, der sich nur schwer löst; langwieriger Husten skrofulöser Kinder. Bronchialkatarrhe, Kehlkopfkatarrhe verschiedener Art; gewisse Formen von Keuchhusten; das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt]
Einzelmittel-Injeele:
Coccus cacti [Hustenanfälle mit Kurzatmigkeit und zähem/strähnigem/glasigem Schleim]
Hyoscyamus forte [trockener Kitzelhusten beim Hinlegen und nachts; Delirien (Pertussis-Encephalitis)]
Ipecacuanha [pertussisartige Zustände mit Erstickungssymptomen und feuchten Rasselgeräuschen; Übelkeit und Erbrechen; Chemosis]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis [Pertussis-Bronchiektasen]
Cerebrum totalis suis [„Pertussis-Gehirn"]
Pulmo suis [Pertussis-Bronchiektasen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Atemtherapie
Neuraltherapie: Thorax-Quaddel, Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Akupunktur, evtl. Antibiotika

Phantomschmerzen

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei vegetativer Dystonie sowie bei Depressionen, Arteriosklerose, Neuralgien und nervöser Erschöpfung]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [neurale Störfelder]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Nervoheel N (Tabl.) [psychosomatische Leiden]
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [posttraumatische Zustände]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Hauptmittel bei traumatischen Affektionen inkl. posttraumatischen Schmerzzuständen]
Chamomilla [tiefe reißende Schmerzen; nervöse Überempfindlichkeit, Unruhezustände]
Hypericum [Folgen von Nervenquetschungen und posttraumatische Neuralgien: „Arnica der Nerven"]
Rhododendron [Parästhesien und reißende Schmerzen (schlimmer in Ruhe); Wetterfühligkeit, Nasswetterverschlimmerung]
Suis-Organpräparate Injeele:
Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Elektrotherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Pharyngitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
Stets Abklärung! Pharyngitis acuta (Viren, Bakterien), Pharyngitis chronica (Klima-Anlagen, Mundatmung), Pharyngitis simplex bzw. Pharyngitis hyperplastica (= granulosa = lymphatica) bzw. Pharyngitis sicca (= atrophicans) [Raucher, Staubinhalationen]. Da der Pharynx der gemeinsame Teil des Luft- und Speisewegs darstellt, sind für Pharyngitiden oft Polysinusitiden und Rhinitiden mit behinderter Nasenatmung – Rhinopharyngitis, ggf. verbunden mit Angina retronasalis (z.B. bei Rachenmandelhypertrophie mit Mundatmung; [morgendliche] Schleim- und Eiterstraße an der hinteren Rachenwand!) verantwortlich zu machen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Heiserkeit, Pharyngitis, Reizzustände, petechiale Blutungen]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Phosphor-Homaccord [Reizzustände, petechiale Blutungen]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein; Ohrtubenkatarrh, Mittelohrhydrops]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.)
[Grippe und grippale Infekte und zur Steigerung der körpereigenen Abwehr bei sonstigen fieberhaften Infektionskrankheiten]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus, im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Tartephedreel N (Tropf.) [das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Causticum S [Schleimhautentzündungen des Rachens (und Kehlkopfes); Empfindung „wie rohes Fleisch"]
Lachesis S [Erstickungsgefühl – bläulichrote ödematöse Schwellungen! – mit Kitzel und Wundheit im Hals]
Phosphorus S [Blutungsneigung; brennende Schmerzen und Heiserkeit bis zur Aphonie]
Phytolacca S (forte) [dunkelrote Entzündungserscheinungen der Tonsillen und des Rachenraumes]

Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus**
Suis-Organpräparate Injeele: **Larynx suis (forte), Mucosa nasalis suis, Tonsilla suis**
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Spülungen, Inhalationen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Mandelpol
Weitere Verfahren: Ggf. Zahnsanierung

Phlebitis

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [Varizen, venöse Stase, variköses Ekzem, Hämorrhoiden (Hämorrhoidalthrombose; ggf. septische Thrombophlebitis der Pfortader!)]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatitis und Dermatosen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Drüsenschwellungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Durchblutungsstörungen, Varizen]
Apis S [entzündliche Ödeme incl. Phlegmasia alba dolens (Becken- und Oberschenkelvenenthrombose)]
Belladonna S [Rubor-Calor-Dolor-Tumor-Symptome]
Hamamelis [venöse Stase, Varizen mit ausgeprägter Thrombophlebitis-Tendenz, Ulcus cruris varicosum]
Lachesis S [ödematöse blau-rote entzündliche Schwellungen]
Pulsatilla S [Venostasen]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; entzündliche Prozesse]
Vipera berus [Thrombophlebitis; Schweregefühl in den Beinen; Ulcus cruris]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Vena suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kompressionsverbände; Quarkwickel
Ausleitende Therapie: Blutegel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Phlegmone

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Erysipel, Erysipeloid, Lyme-Borreliose (Erythema migrans, Lymphadenosis cutis benigna;
  Dermatosen, Abszess
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S
[entzündliche Hautaffektionen, Neigung zu Chronizität]
Baptisia S [septisches Fieber]
Belladonna S [Rubor-Tumor-Dolor-Calor-Symptomatik]
Echinacea [septische Prozesse mit Neigung zu Lymphangitis und Lymphadenitis]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Phlegmone-Tendenz]
Lachesis S [bei septischen Prozessen mit ödematösen lividen Schwellungen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[bei akuten, bes. im Beginn, und chronischen Entzündungen]
Myristica sebifera forte [fördert Einschmelzung bei Abszessen, Phlegmonen; "homöopathisches Messer"]
Rhus Tox S [Erysipel, Furunkel, Karbunkel mit Phlegmone-Tendenz und dunkler Röte]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Bindegewebsschwäche und Reaktionsträgheit]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Am Rande der Phlegmone im Gesunden quaddeln
Weitere Verfahren: Chirurgische Intervention

Phobien

(siehe psychische Symptome)

Pityriasis versicolor

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Allergisches Kontaktekzem, Mykosen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Eine Hyperhidrosis fördert die Entstehung der Kleienpilzflechte (Malassezia rubra bzw. furfur), die stets eine Tendenz zur Rezidivierung zeigt! Fachärztliche Abklärung!

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N
[Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [generelles Umstimmungsmittel, auch bei Hautjucken und bei urtikariellen Exanthemen]
Acidum nitricum
[bei Dermatosen; insbesondere bei rissiger, wunder Haut]
Graphites [unreine, trockene, rissige, schuppige, seborrhoische Haut; Adipositas-Neigung]
Silicea [Konstitutionsmittel bei Dystrophie, Lymphatismus, exsudativer Diathese und überempfindlicher Haut]
Nosoden-Injeele: **Bacillinum humanum, Bacterium coli**
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Plethora

„Rotblütigkeit" = Vermehrung der Gesamtblutmenge = Plethora sanguinea = Plethora vera

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Polyzythämie (Plethora polycythaemica),
  Hypertonie („roter Hochdruck")

Basistherapie
Orale Therapie:
Melilotus-Homaccord N Tropfen [Bluthochdruck]
Parenterale Therapie:
Melilotus-Homaccord [Bluthochdruck]
Symptomenbezogene Therapie
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Koronardurchblutungsstörungen, nach Myokardinfarkt, bei Myokardschwäche sowie bei Angina pectoris, Emphysem, Herzrhythmusstörungen, gastrokardialem Symptomenkomplex, Hypertonie und Endarteriitis obliterans]
Glonoin-Homaccord N Tropfen (Amp.)
[bei pektanginösen Beschwerden und Tachykardie, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen; Hypercholesterinämie]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus (ggf. verbunden mit Abdominal-Plethora); Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der männlichen Organfunktionen, u.a. auch bei Erschöpfungszuständen sowie bei Diabetes mellitus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.) [Schwindel verschiedener Genese (besonders arteriosklerotisch bedingter)]
Einzelmittel-Injeele:
Adeps suillus
Aurum [gestaute Pykniker mit Plethora, „Weintrinker-Facies"; Präapoplexie; Angst und Depressionen]
Cholesterinum
Lachesis S [allgemeine Neigung zur Thrombose und Embolie; Hitzewallungen]
Sanguinaria [Kongestionen zum Kopf (rotes Gesicht), Kopfschmerzen]
Sulfur (forte) S [Hepatopathie mit Pfortaderstauung; Verlangen nach frischer Luft; Chronizität]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Colon suis, Cor suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Strophanthus comp.-Herztabletten
[Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Strophantab (Tabl.) [Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ggf. Gewichtsreduktion
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme], Aderlass
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Störfeldsuche

Pleuritis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene Ursachen (u.a. Pneumonie, Lungeninfarkt, Herzinsuffizienz, rheumatische Polyserositis, Tbc, Lungen- und Pleuratumoren, Bornholmer Krankheit [Pleurodynie]) und Formen (u.a. Pleuritis sicca, adhaesiva, transsudativa, serosa, exsudativa, purulenta, haemorrhagica, carcinomatosa) der Rippenfellentzündung.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Abklärung! Pleurapunktion!

Basistherapie

Orale Therapie:

Bryaconeel (Tabl.) [akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Ranunculus-Homaccord (Tropf.) [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]

Parenterale Therapie:

Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Ranunculus-Homaccord [Herpes zoster, Intercostalneuralgien]

Symptomenbezogene Therapie

Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Husteel (Tropf.) [Husten, z.B. bei Erkältungskrankheiten, spastischer Bronchitis, Pleuritis (pleuritischer Reizhusten!)]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Heiserkeit; Laryngitis; Pharyngitis; petechiale Blutungen]
Tartephedreel N (Tropf.) [das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt, u.a. auch bei Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, Asthma bronchiale sowie bei Husten, der sich nur schwer löst]

Einzelmittel-Injeele:

Apis S [Pleuritis exsudativa/serosa; stechende und brennende Schmerzen; Atemnot]
Arsenicum jodatum
[Resorptionsmittel bei Pneumonie und Pleuritis]
Bryonia S [Entzündungen der serösen Häute (Polyserositis), u.a. heftige Stiche beim Atmen und Sprechen, schmerzhafter Reizhusten (oft bei Pleuritis sicca!)]
Cantharis [Pleuritis (und Perikarditis); hämorrhagische Entzündungszustände]
Kalium carbonicum forte N [harter trockener Husten, Neigung zu Ödemen; Nachtschweiße; „Schwächemittel"]
Phosphorus S [fieberhafte Bronchopneumonie oder Pneumonie; Blutungsneigung]

Nosoden-Injeele:

Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:

Pulmo suis, Ren suis

Begleittherapie

Auto-Sanguis-Stufentherapie:

Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Physikalische Therapie:

Kneippsche Anwendungen, Atemtherapie

Ausleitende Therapie:

Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Neuraltherapie:

Lungenfeld, Thorax-Quaddeln, Cubitalvene im Wechsel

Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie

Pneumonie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Nicht infektiöse Pneumonien (z.B. physikalisch-chemische Ursachen, eosinophiles Lungeninfiltrat [Allergie]), infektiöse Pneumonien: nicht bakterielle = „atypische Pneumonien" (z.B. Viren, Mykoplasmen, Chlamydien), bakterielle = „klassische Pneumonien" (z.B. Pneumo- oder Staphylokokken) sowie ferner Nosokomialininfektionen (z.B. Bacterium proteus), sekundäre Pneumonien (als Folge von anderen pulmonalen Erkrankungen)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave „absteigende Katarrhe der Atemwege": Beginn mit Schnupfen und schnellen Übergang in Tracheitis – Bronchitis – Bronchopneumonie – Pneumonie. Sehr häufig beim Säugling und im Senium! Stets Ausschluss eines Malignoms sowie einer Tbc und von AIDS (Pneumocystitis carinii)! Adjuvante Therapie!

Basistherapie

Orale Therapie:

Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Phosphor-Homaccord (Tropf.)
[Reizzustände, petechiale Blutungen]

Parenterale Therapie:

Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie

Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Hypotonie; Herzrhythmusstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Tartephedreel N (Tropf.)
[das Präparat ist bei allen katarrhalischen Affektionen der Luftwege angezeigt, u.a. bei Kehlkopfkatarrhen sowie bei Bronchitis, besonders solche asthmatischen Charakters, bei Asthma bronchiale und generell bei Husten, der sich nur schwer löst]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.) [Kollapszustände]

Einzelmittel-Injeele:

Aconitum S [anfängliche akute Fieberzustände mit Schüttelfrösten und Tachykardie]
Arsenum jodatum
[Resorptionsmittel bei Pneumonie und Pleuritis]
Adeps suillus
Bryonia S [Pneumonie mit hartem trockenem Husten, Pleuritis]
Carbo vegetabilis [hochgradige Atemnot (Dyspnoe, Orthopnoe); kachektisch geschwächte Menschen]
Kalium carbonicum forte N [Affektionen des Atemtraktes mit Luftnot, Ödemneigung (Lungenödem); „Schwächemittel"]
Phosphorus S [Parenchymmittel; Bronchopneumonie, lobäre Pneumonie; Blutungsneigung]
Vincetoxicum (enth. in Engystol)
[Wanderpneumonie, fehlende kritische Entfieberung (beides häufig bei Virus-Pneumonien!)]

Nosoden-Injeele:

Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Salmonella typhi, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus

Suis-Organpräparate Injeele:

Funiculus umbilicalis suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen, Wickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Lungenfeld, Cubitalvene im Wechsel
Weitere Verfahren: Antibiotika

Polyarthritis, akute

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Para- und postinfektiöse Arthritiden,
  Spondylitis ankylosans (Bechterew) und andere Spondylarthritiden („Wirbelsäulen-Rheumatismus")
  Morbus Reiter, Morbus Behçet,
  Löfgren-Syndrom (akute Form der Boeck-Krankheit),
  Lupus erythematodes, Gicht (Arthritis urica)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
An-io-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom; Epicondylitis]
Galium-Heel N (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel, bes. bei subakuten (bis chronischen) Arthritiden]
Bryonia S [akute Polyarthritis (Synovitis) mit heißen schmerzhaften Gelenken; Bewegung verschlimmert]
Colchicum (forte S) [wandernde Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen wechselnd zwischen rot und blass; Verschlimmerung durch Nässe und Kälte; Herzbeteiligung (Endokarditis): Herzklopfen, Herzstiche, Tachykardie bei kleinem weichem Puls]
Dulcamara S („Nasswettermittel")
Kalmia S [fokale Infektarthritis]
Rhododendron [besonders kleine Gelenke befallen sowie generell rheumatische Schmerzen an Muskel-, Binde- und Knochengewebe]
Rhus Tox S [akuter und subakuter Gelenkrheumatismus]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Psorinum, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Glandula suprarenalis suis, Medulla ossis suis
Cosmochema:
Rheumatabletten N [Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Ner-fluid FIDES S [zur Unterstützung der Hautdurchblutung]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Ggf. Kälte- oder Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme], Aderlass
Neuraltherapie: Störfeld, Gelenkumspritzung
Weitere Verfahren: Störfeldsuche

Polyarthritis, (primär) chronische

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Infektarthritis.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Es handelt sich um eine häufig in Schüben chronisch verlaufende entzündliche Gelenkerkrankung unbekannter Ätiologie mit Erkrankungsgipfel meist im mittleren Lebensalter (35 bis 50 Jahre). Der Beginn ist oft schleichend und gekennzeichnet durch Schwellung und Bewegungseinschränkungen einer oder mehrerer Metacarpophalangeal- und/oder Interphalangealgelenke bzw. Schmerzen eines großen Gelenkes. Häufige Allgemeinsymptome sind Adynamie, Anorexie, Myalgie, hypochrome Anämie. Extraartikuläre Symptome sind Muskelatrophien, Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen, periphere Gefäßverschlüsse durch obliterative Vaskulopathie. Man unterscheidet klinisch vier Phasen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Zeel comp. N (Tabl.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei ödematösen Schwellungen]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtig-rheumatische Diathese]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[bei ödematösen Schwellungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[weichteilrheumatische und arthritische Beschwerden]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[weichteilrheumatische und periarthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S
[Entzündungen der Gelenke, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten]
Colchicum (forte S)
[akute und chronische Gicht, akuter Gelenkrheumatismus]
Dulcamara S
[Entzündungen der Gelenke ausgelöst durch Kälte und Nässe]

Ledum [Gicht und Gelenkrheumatismus]
Rhus Tox S [rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Folgen von Verletzung und Überanstrengung]
Silicea [Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke]
Viscum album [Verschleißkrankheiten der Gelenke]
Nosoden-Injeele: **Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Sinusitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, Tonsillitis-Nosode**
Suis-Organpräparate-Injeele: **Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus suis, Os suis**
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Arthrifid S (Tropf.)
[Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Ner-fluid FIDES S
[zur Unterstützung der Hautdurchblutung]

Begleittherapie
Weitere Verfahren: Neuraltherapeutische Injektionen, homöosiniatrische Behandlungen
Ausleitungstherapie mit:
Hepar comp. Heel [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Leberkrankheiten],
Solidago comp. Heel [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten],
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz],
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Gabe der Biokatalysatorenpräparate **Coenzyme compositum Ampullen** und **Ubichinon compositum Ampullen**
Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin E
Enzympräparate
Mikrobiologische Diagnostik und Therapie
Physikalische Therapie: Kältetherapie

Polyneuropathie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neuritis, Neuralgien, Guillain-Barré-Syndrom (= akute Polyradikulitis u.a. bei/nach verschiedenen Infektionskrankheiten, bei immunologischen Erkrankungen, nach Applikation von artfremden Eiweiß [Impfungen], bei Fokalherden).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Relativ häufig bei Diabetes mellitus, Alkoholikern, Arteriosklerose, rheumatoider Arthritis, Periarteriitis nodosa, Intoxikation mit Quecksilber (Amalgam), Arsen, Blei und Thallium.

Basistherapie
Orale Therapie:
Bryaconeel (Tabl.)
[akuter und chronischer Rheumatismus, Neuralgien]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]

Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Neuralgien und Arteriosklerose und bei sonstigen geriatrischen Indikationen (arteriosklerotische „geriatrische" Polyneuropathie)]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei verschiedenen Neuritiden und Neuropathien]
Aconitum S [Parästhesien]
Colocynthis S
[neuralgische stechende Schmerzen, Parästhesien]
Gelsemium S [Paresen peripherer Nerven, Muskelschwäche]
Phosphorus S [brennende Schmerzen; Schwäche mit Gliederzittern (Tremor alcoholicus)]
Rhus Tox S [Neuritiden und Neuralgien, bes. nach Überanstrengung; erethische Unruhe; Gliederschmerzen]
Thuja S [Impf-Polyneuropathie und Neuritiden/Neuropathien nach Infektionen sowie bei Fokalherden]
Nosoden-Injeele: **Grippe-Nosode**
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Hypophysis suis, Medulla spinalis suis, Medulla oblongata suis, Musculus suis, Placenta suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Fides:
Ner-fluid FIDES S [zur Unterstützung der Hautdurchblutung]
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Bewegungstherapie und sonstige Physiotherapien
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Polyposis coli

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, Peutz-Jeghers-Syndrom (= Polyposis intestinalis (Magen, Darm) – Entartungsrisiko relativ gering! – + Lentiginose der Haut und Schleimhäute), Gardner-Syndrom (= hereditäre Adenomatosis mit Atheromen + Rektum/Colonpolyposis; zu 85% maligne Entartung!), Polyposis familiaris (= Adenomatosis coli = eine obligate Präkanzerose).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Bei allen Polypen besteht stets eine Tendenz zur malignen Entartung! Abklärung!

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Schleimhautaffektionen mit Neigung zu Ulzerationen und Polypenbildung]
Graphites [Neigung zu Adipositas, chronische (besonders atonische) Obstipation]
Hydrastis [Blutungsneigung, Schleimhautaffektionen; Verdacht auf maligne Entartung; Kräfteverfall]
Thuja S [bei allen proliferativen Prozessen, wie Papillomen,

Papillomatosis, Polypen und Polyposis]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Suis-Organpräparate Injeele: **Colon suis, Duodenum suis, Ventriculus suis**
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung; evtl. Operation

Proktitis, Periproktitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Gonorrhoe, Tbc, Lymphogranulomatosis inguinalis (= Lymphopathia venerea), Prokto-Sigmoiditis (= Komplikation bei Thrombophlebitis eines inneren Hämorrhoidalknotens)

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Proktitis ulcerosa!)]
Paeonia comp.-Heel (Tabl.)
[Hämorrhoiden, Fissura und Ekzema ani]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Aloe [Incontinentia ani; Pfortaderstauung, Abdominal-Plethora]
Colocynthis S [stechende Schmerzen, Durchfall mit Tenesmen]
Hepar sulfuris [eitrige Prozesse mit Phlegmone-Tendenz]
Nux vomica S [spastische Obstipation; Hämorrhoiden; Verschlimmerung durch Kaffee, Alkohol, Nikotin]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Hepar suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Störfeld

Prostataadenom (Prostatahypertrophie)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Prostatakarzinom (hart, ggf. höckerig), Prostatitis (Konsistenz weich und ungleichmäßig, schmerzhafte Druckpunkte), Prostataabszess (palpatorische Fluktuation, sehr schmerzhaft)
- **BESONDERE HINWEISE:**
Vorsorgeuntersuchungen! Rektale Kontrollen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Sabal-Homaccord (Tropf.) [Prostataadenom, Reizblase]
Parenterale Therapie:
Sabal-Homaccord [Prostataadenom, Reizblase]
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes ohne und mit Konkrementen (Prostatasteine!)]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen, u.a. bei Ejaculatio praecox, Impotentia virilis sowie bei Enuresis nocturna und Erschöpfungszuständen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Conium S [bei Verhärtungen; Strangurie; Geriatrikum]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Prostata suis, Testis suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Injektion an die Prostata
Weitere Verfahren: Cave: Alkohol; evtl. Operation

Prostatitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Epidydimitis, Harnwegsinfekt

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Sabal-Homaccord (Tropf.) [Prostataadenom, Reizblase]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Sabal-Homaccord [Prostataadenom, Reizblase]
Suppositorien:
Spascupreel S
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cruroheel S (Tabl.)
[Fisteleiterungen]
Reneel NT (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harnwege mit und

ohne Steinbildung]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen, u.a. bei Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis, Zystopyelitis, Prostata-Adenom (1. Stadium), Enuresis nocturna sowie Harnröhrenstrikturen und Incontinentia urinae]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Cantharis [Prostatitis mit starkem Harndrang und brennenden Schmerzen sowie Hämaturie und Albuminurie]
Ignatia S [Polychrest mit vielen psychischen Beziehungen: „Kongestionsprostatitis" (Posner) sowie „Prostatopathie" (Alken); ggf. verbunden mit Prostatorrhoe]
Nosoden-Injeele:
Cystopyelonephritis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Prostata suis, Testis suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Neuraltherapie: Injektion an die Prostata
Weitere Verfahren: Evtl. Antibiotika

Pruritus

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären, u.a. auch Pruritus bei Dermatosen, Allergie, Neurodermitis sowie bei Diabetes mellitus und im Klimakterium; ferner als Pruritus senilis, leucaemicus, hepaticus und renalis sowie als „Pruritus sine materia" (neurasthenisch bzw. psychogen) von differentialdiagnostischem und differentialtherapeutischem Interesse!

Basistherapie
Orale Therapie:
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzeme, Juckreiz, Entzündungen der Haut]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Perniones, Intertrigo, Ekzeme, Hyperhidrosis sowie ferner Hyperkeratosen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a auch bei Dermatitis, Dermatosen, Allergie, Sklerodermie sowie bei Dermatomykosen, Interdigitalmykosen, Mikrosporie, Quincke'schem Ödem, Neurodermitis, Crusta lactea (= Milchschorf)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Hepar comp. Heel (Amp.) [bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfuktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatitis, Dermatosen und bei Neurodermitis]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei allergischen und urtikariellen Hautaffektionen sowie bei exsudativer Diathese]
Antimonium crudum
[juckende Ekzeme mit Hyperkeratosen und Rhagaden]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei Lymphatismus bzw. exsudativer Diathese]
Formica rufa
[Umstimmungsmittel bei allergischen Hautaffektionen]
Ignatia S [Pruritus als Folge von bzw. mit psychischer Belastung sowie bei vegetativer Dystonie („Pruritus sine materia")]
Rhus Tox S [verschiedene Dermatitiden mit Brennen und Juckreiz; große Rezidivneigung]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel bei chronischen trockenen Ekzemen mit starkem, bes. nächtlichem, Juckreiz]
Zincum metallicum
[unterdrückte Exantheme mit nächtlichen Unruhezuständen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (Hochpotenzen!)
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Mucosa suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, physikalische Therapie

Pseudokrupp

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Echter Krupp bei Diphtherie, „Grippekrupp", Laryngitis, Bronchitis, akute subglottische Einengung, Epiglottitis, Pertussis, Asthma bronchiale/cardiale
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: evtl. akuter lebensbedrohlicher Notfall (Laryngotracheobronchitis maligna)! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aconitum-Homaccord (Tropf.) [grippale Infekte, Akutmittel]
Drosera-Homaccord (Tropf.)
[asthmatoide Bronchitis, Pertussis, Atemnot]
Parenterale Therapie:
Aconitum-Homaccord [grippale Infekte, Akutmittel]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; zerebrale Reizzustände]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Husteel (Tropf.)
[Husten, z.B. bei Erkältungskrankheiten, spastischer Bronchitis]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)

[Laryngitis, Pharyngitis, Heiserkeit, petechiale Blutungen]
Tartephedreel N (Tropf.) [Kehlkopfkatarrhe verschiedener Art, gewisse Formen von Keuchhusten]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris [Entzündungsneigung sowie Krupphusten durch kalte und trockene Luft]
Ignatia S [„Seufzer-Atmen"; kann nicht durchatmen; vegetative Dystonie: spastischer – nicht infektiöser – Pseudokrupp]
Spongia [Krupphusten; nächtliche asthmatische Zustände mit Heiserkeit (Laryngitis) und trockenem, hartem bellendem Husten]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Atemgymnastik
Neuraltherapie: Thorax-Quaddeln
Weitere Verfahren: Ggf. Psychotherapie

Psoriasis

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Entzündungen, Eiterungen, Allergien]
Parenterale Therapie:
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Dermatosen]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Galium-Heel N (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch bei Dermatosen indiziert]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Schwef-Heel (Tropf.)
[Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen beim männlichen Geschlecht]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat, z.B. Arthrosen der Hüft-, Knie- und kleinen Gelenke (Psoriasis-Arthropathie!)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum
[Umstimmungsmittel bei Hautjucken; urtikarielle Exantheme]
Arsenicum album S [Dermatosen und Dermatitiden mit Schuppen, Jucken und Brennschmerz]
Thuja S [Nagelpsoriasis: weiche, spröde, rissige, verkrüppelte, leicht brüchige Nägel]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Lichttherapie (z.B. UVA)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, Darmsanierung

Psychische Symptome

(psychosomatische Affektionen und Alterationen bzw. psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände).

Einige der wichtigsten Biotherapeutika-Antihomotoxika werden hier alphabetisch mit Hauptindikationen aufgeführt.

Orale Therapie:
Aletris comp.-Heel (Tabl.) [Erschöpfungs- und Schwächezustände; Basistherapeutikum bei Osteochondrose]
China-Homaccord S (Tropf.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.)
[Zervikalsyndrom); Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neurexan (Tropf., Tabl.)
[Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände]
Selenium-Homaccord (Tropf.) [Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globus hystericus]
Parenterale Therapie:
Cerebrum compositum NM
[Anregung der Abwehrsysteme bei Depressionen, Arteriosklerose, nach Commotio cerebri sowie bei Neuralgien; ferner bei Erregungszuständen sowie bei nervöser Erschöpfung und Gedächtnisschwäche und bei sonstigen geriatrischen Indikationen sowie bei vegetativer Dystonie]
China-Homaccord S [Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Gelsemium-Homaccord
[Zervikalsyndrom; Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Hepar comp. Heel [Anregung der Leberzellfunktionen, u.a. auch bei Hypercholesterinämie]
Ignatia-Homaccord
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Selenium-Homaccord
[Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen bei Männern, u.a. auch bei Erschöpfungszuständen sowie bei Ejaculatio praecox und Impotentia virilis]
Tonico-Injeel
[Erschöpfungszustände physischer, aber auch psychischer Art;

geistige Entwicklungsstörungen der Kinder]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Zustände von akuter Todesangst; psychotische Erscheinungen als Folge von Schreck und Ärger]
Agnus castus
[Neurasthenie, Depressionen mit Todesgedanken, Hypochondrie]
Antimonium crudum
[Verdrießlichkeit, traurig-melancholische Verstimmung]
Argentum nitricum [Melancholie; Zwangsneurosen, z.B. Platzangst (Agoraphobie)]
Arsenicum album S [Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, Unruhe, Angst; nächtliche Exazerbation aller Beschwerden]
Aurum [Basistherapeutikum bei Melancholie, Lebensüberdruss und Depressionen; religiöse Manie; innere Hast und Unruhe; Wutanfälle]
Belladonna S [Wahnvorstellungen, Halluzinationen]
Coffea [Überempfindlichkeit; Schlaflosigkeit; psychotische Erscheinungen als Folge plötzlicher Freude]
Colocynthis S [allgemeine Reizbarkeit; psychotische Erscheinungen als Folge von Ärger oder Wut]
Gelsemium S [Angst vor der Zukunft; „Zitter-Mittel"; Zerschlagenheitsgefühl; Kopfschmerzen]
Hyoscyamus forte [fixe Ideen, Wahnvorstellungen; Vergiftungsfurcht; Eifersucht; Zwangsweinen; ferner delirante Zustände mit Benommenheit, bes. auch im Alter!]
Ignatia S [Neigung zum Weinen; Pavor nocturnus]
Natrium muriaticum [psychotische Erscheinungen als Folge von Kränkungen; Gereiztheit]
Nux vomica S [Morgenverschlimmerung; Durchschlafstörungen; Zornausbrüche, die hinterher nicht leid tun, sondern Mittel zum Zweck sind]
Phosphorus S
[Angst, stets etwas oder alles falsch gemacht zu haben]
Pulsatilla S [Abendverschlimmerung; Zuspruch bessert; wechselnde, sprunghafte Beschwerden ohne organischen Befund (= kontradiktorische Symptome); prämenstruelle Verschlechterung; ängstliche depressive Patientinnen]
Sepia [Morgen- und Abendverschlimmerung; Depressionen und Erschöpfung, Müdigkeit und allgemeine Unlust; „Klimakterium-Mittel"]
Staphisagria
[Reizbarkeit, Ärgerlichkeit, Überempfindlichkeit; psychotische Erscheinungen als Folge verbissener Kränkung (auch beruflicher Art), Zornausbrüche aus Pessimismus (sinnlos aufbrausend)]
Stramonium [geschwätziges Delirium, Angst, Halluzinationen, Erregungszustände; Hydrophobie; Furcht vor Vergiftungen]
Sulfur (forte) S [Größenwahn; religiöse Manie; Einschlaf- und Durchschlafstörungen („Katzenschlaf"); Zornausbrüche, die hinterher leid tun]
Valeriana [neurasthenische und hysterische Zustände; Unruhe und Schlaflosigkeit]
Veratrum forte
[psychotische und delirante Zustände; Gewalttätigkeit]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [pessimistische Grundstimmung]
Psorinum [depressive Verstimmung, Hoffnungslosigkeit, Melancholie, Traurigkeit, Angst- und Furchtzustände infolge chronischen Kummers]
Intermediäre Katalysatoren:
Coenzyme compositum Ampullen [Fermentfunktionen]
Ubichinon compositum Ampullen [Fermentfunktionen]
Fides:
Noxom S (Tropf.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Noxotab (Tabl.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]

Pyelitis, Pyelonephritis

Basistherapie
Orale Therapie:
Reneel NT (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände mit und ohne Konkremente im Bereich des Urogenitaltraktes]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen; nicht nur indiziert bei Pyelitis und Zystitis/Zystopyelitis sondern auch bei Glomerulonephritis und Fokaltoxikosen]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Furunkel, Karbunkel und sonstige Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [kaum löschbarer Durst; Albuminurie, Zylindrurie; nephrogene Ödeme; Periodizität]
Baptisia S [septische Prozesse mit septischem Fieber (u.a. Schüttelfröste) und Benommenheit]
Cantharis [Nephritis, Pyelitis, Zystitis mit Albuminurie, Hämaturie (bes. bei akuten Stadien)]
Hepar sulfuris [bei eitrigen Prozessen; speziell auch bei Scharlach-Nephritis]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Neigung zur Chronizität und pyelonephritischer Schrumpfniere]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Cystopyelonephritis-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Vesica urinaria suis
Cosmochema:
Nierentropfen
[Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Wärmeanwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme], Teekuren (harntreibende Tees)
Neuraltherapie: Oberer Grenzstrang
Weitere Verfahren: Evtl. Antibiotika

Pylorospasmus

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Beim Erwachsenen neurogen oder allergisch bedingt sowie mechanisch (= Stenose) durch Neoplasma oder Ulcus ([prae]pyloricum bzw. duodeni).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Hypertrophe Pylorusstenosen der Säuglinge (meist männliches Geschlecht)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Duodenoheel (Tabl.)
[Entzündungen und Reizzustände des Duodenums]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Cholangitis, Cholezystitis; Gallenkoliken, Hepatitis acuta und chronica; Leberschädigungen (Parenchymschäden); Stauungsikterus]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[zur Langzeittherapie bei Narben]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Einzelmittel-Injeele:
Chamomilla [bei neuro- bzw. psychopathischen Kindern]
Cuprum [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane]
Magnesium phosphoricum [Krämpfe und Koliken in den Hohlorganen (besonders im Kindesalter)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Duodenum suis, Ventriculus suis
Begleittherapie
Neuraltherapie: Oberer Grenzstrang, Plexus solaris
Weitere Verfahren: Akupunktur; evtl. Operation

Rachenmandelhypertrophie („Rachenpolypen“)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Leukoplakie, Karzinom, Papillom, Fibrom

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Calcoheel (Tabl.) [Kalkstoffwechselstörungen, lymphatische Diathese]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Entwicklungsstörungen der Kinder und bei Legasthenie sowie bei Gedächtnisschwäche und Erregungszuständen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Tonsillarhypertrophie; Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Sinusitis sowie bei Grippe, Otitis media und Fokaltoxikosen]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein, Ohrtubenkatarrh, Mittelohrhydrops]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Naso-Heel SNT (Tropf.) [Rhinitis acuta und chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei pastösem Habitus und Lymphdrüsenschwellungen]
Calcium phosphoricum [neurasthenische hagere unterentwickelte Kinder mit Lymphatismus]
Hepar sulfuris [bei Eiterungen mit Neigung zur Abszedierung]
Thuja S [chronische proliferative Prozesse; Verschlimmerung durch Nässe und Kälte]
Nosoden-Injeele:
Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula lymphatica suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Neuraltherapie: 3. Mandelpol

Reisekrankheiten (Kinetosen)

Basistherapie
Orale Therapie:
Cocculus-Homaccord (Tropf.) [Kinetosen]
Suppositorien:
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[bei Schwäche- und Erschöpfungszuständen]
Vomitusheel (Tropf.)
[Erbrechen und Brechreiz verschiedener Genese]
Einzelmittel-Injeele:
Conium S [Schwindel bei jeder Lageveränderung, bes. Drehschwindel; zittrige Schwäche]
Tabacum [migräneartige Kopfschmerzen; Todesangst; Übelkeit, Brechreiz, Schwäche und Kollapsneigung (Hypotonie bei Kinetosen!); Besserung in frischer Luft und nach Erbrechen]
Viscum album
[Kongestionen mit (meist plötzlichen) Schwindelanfällen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebellum suis
Begleittherapie
Neuraltherapie:
Mastoid beiderseits, beide Cubitalvenen im Wechsel
Weitere Verfahren: Akupunktur

Reitersches Syndrom

= Trias: Arthritis, Urethritis, Konjunktivitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  U.a. Polyarthritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Androtropie: bevorzugt 2.-4. Lebensjahrzehnt!
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Mezereum-Homaccord [Herpes zoster, Ekzeme, Juckreiz]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme (bei Reiter gelegentlich auch pustulöse Exantheme!)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)

[lokalisierte Entzündungen]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reiz- und Entzündungszustände im Bereich des Urogenitaltraktes]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der ableitenden Harnwege („Reiter-Urethritis"; ggf. auch „Reiter-Zystitis/Zystopyelitis"), im Verdauungstrakt („Reiter-Enteritis bzw. -Colitis") sowie im Bereich der Bindehaut des Auges („Reiter-Konjunktivitis")]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Weichteilrheumatismus und arthritische Beschwerden]
Oculoheel (Tabl.) [Konjunktivitis, Blepharitis, Dakryozystitis]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei akuten und chronischen Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis/Zystopyelitis, Harnröhrenstrikturen, Incontinentia urinae; generell zur Anregung der Nierenausscheidung bei Fehlfunktionen wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S [bei ödematösen Schwellungszuständen der Gelenke, der Schleimhäute incl. der Bindehaut]
Arnica S [Myalgien und sonstige rheumatische Affektionen mit Zerschlagenheitsschmerzen]
Bryonia S [Entzündungen der serösen Häute (Synovitis/ Synovialitis) sowie generell bei Muskel- und Gelenkrheumatismus]
Euphrasia
[Blepharo-Konjunktivitis, Chemosis, iritische Reizzustände]
Kalmia S [rote, heiße, geschwollene Gelenke; iritische Reizzustände (Iridozyklitis bei Reiter' Konjunktivitis!)]
Ledum
[rheumatische Entzündungen der Gelenke (meist) ohne Fieber]
Rhus Tox S
[akute und subakute Arthritiden und Konjunktivitiden]

Nosoden-Injeele:
Bacillinum humanum, Bacterium coli, Medorrhinum, Psorinum, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Colon suis, Hepar suis, Musculus suis, Oculus totalis suis, Os suis, Ren suis, Urethra suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung, physikalische Therapie

Reizblase

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildungen]
Parenterale Therapie:
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Solidago comp. Heel [Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Suppositorien:
Spascupreel S [Krampfzustände, Tenesmen]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel (Zystitis, Zystopyelitis als hämatogene Infektion im Rahmen anderer entzündlicher Prozesse), Karbunkel]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie]
Plantago-Homaccord (Tropf.)
[Reizblase, Incontinentia urinae, Enuresis nocturna]
Sabal-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizblase; im 1. Stadium des Prostataadenoms (sog. Prostatahypertrophie)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Nephritis; brennende Schmerzen]
Cantharis [Zystitis, Urethritis; Harndrang, Strangurie]
Hepar sulfuris [bei eitrigen Prozessen]

Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Cystopyelonephritis-Nosode, Medorrhinum, Staphylococcus

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Fides:
Orthosiphonblätter - Indischer Nierentee FIDES [Zur Durchspülung der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ausreichende Flüssigkeitszufuhr; laktovegetabile gewürzarme Kost; ggf. „Schaukeldiät"
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie

Restless legs (Wittmaack-Ekbom-Syndrom)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache weitgehend unbekannt! Gynäkotropie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Einzelmittel-Injeele:
Gnaphalium polycephalum
[Taubheitsgefühl und Ameisenlaufen (Parästhesien) bis zu den Zehen, oft verbunden mit Waden- und Fußkrämpfen]
Rhus Tox S [große Unruhe in den Beinen mit Bewegungsdrang; alles wird in Ruhe schlimmer]
Valeriana
[nächtliche Unruhezustände mit Bewegungsdrang und Insomnie]
Zincum valerianicum [Muskelzuckungen und Muskelkrämpfe, bes. auch „Autofahrerbeine“]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Medulla spinalis suis, Musculus suis, Vena suis
Begleittherapie
Neuraltherapie: Unterer Grenzstrang

Rhagaden

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Eisenmangelanämie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Besonders häufig am Übergang von der Schleimhaut in die Haut bzw. in der Umgebung natürlicher Körperöffnungen: Lippen, Mundwinkel, Anus sowie ferner am Lidwinkel und in Gelenkbeugen!

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Graphites-Homaccord
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. bei Hautkrankheiten (Rhagaden entzündlicher Genese!) sowie bei Osteomyelitis und Fisteleiterungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [Suppurationen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt und der Bindehaut]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum
[Rhagaden am Übergang zwischen Haut und Schleimhaut (Mund, Nase, After, Harnröhre, Vulva) mit „Splitterschmerz“]
Calcium fluoratum
[hyperkeratotische Veränderungen; spröde und rissige Haut, herabgesetzte Elastizität der Haut und des Bindegewebes]
Cistus canadensis [harte Haut (Hyperkeratosen) mit Finger- und Hohlhandrhagaden (leicht blutend)]
Graphites
[trockene, rissige Haut; Einrisse, bes. an Körperöffnungen]
Natrium muriaticum
[rissige Mundwinkel, Lippenrhagaden, Nasenrhagaden]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis, Placenta suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Symbioselenkung; ggf. Eisentherapie

Rhinitis, akute und chronische

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Rhinitis vasomotorica, Ozaena

Basistherapie
Orale Therapie:
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Naso-Heel SNT (Tropf.)
[chronische und akute Rhinitis mit und ohne Sinusitis]
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Sinusitis, bei Angina, Grippe und Otitis media]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [bei Grippe und grippalen Infekten]
Luffeel comp. (Tabl.) [bei allergischer Komponente]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (= Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Tonsillarhypertrophie incl. Rachenmandelhypertrophie und chronische Tonsillitis; Drüsenschwellungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Natrium-Homaccord (Tropf.)
[chronische Schleimhautkatarrhe; Skrofulose]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [trockene Schleimhäute, ätzende, brennende Nasensekrete]
Eupatorium perfoliatum [„Grippe-Schnupfen“]
Kalium bichromicum [chronische Rhinitiden mit zähen, strähnigen Absonderungen; Neigung zu Ulzerationen]
Luffa operculata [Rhinitis atrophicans mit Kopfschmerzen]
Natrium muriaticum [chronische Rhinitiden mit Nasenbluten und Geruchsstörungen]
Pulsatilla S [(chronische) Rhinitis mit dicken gelblich-grünen, nicht ätzenden Schleimabsonderungen]
Sanguinaria [Katarrhe der oberen Luftwege mit „absteigender“ Tendenz, Übergang in Tracheitis, Bronchitis]

Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Grippe-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
Inhalationen, Kurzwellen

Rhinopathia vasomotorica

Basistherapie
Orale Therapie:
Naso-Heel SNT (Tropf.)
[chronische und akute Rhinitis mit und ohne Sinusitis]
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Luffeel comp. Heuschnupfenspray
[bei allergischer Komponente]
Parenterale Therapie:
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[asthmatoide Bronchitis sowie Bronchiolitis und Pertussis; vasomotorische Rhinitiden mit konsekutiven spastischen Bronchitiden (Heuschnupfen, Heufieber, Heuasthma)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Luffeel comp. (Tabl.) [bei allergischer Komponente]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen; Tonsillarhypertrophie und chronische Tonsillitis]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, u.a. auch im Bereich der oberen und unteren Luftwege und der Bindehaut des Auges]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Kalium bichromicum [Neigung zur Chronizität]
Luffa operculata [allergische (Heuschnupfen) und vasomotorische Rhinitis mit Kopfschmerzen]
Natrium muriaticum
[Rhinitis vasomotorica (Heuschnupfen, Heufieber)]
Sanguinaria
[Katarrhe der oberen Luftwege mit „absteigender" Tendenz]
Vincetoxicum [Gefäß- und Sympathikuswirkung]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Polypus nasalis-Nosode, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren: **Histamin** (Hochpotenzen!)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Mucosa nasalis suis, Tonsilla suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenarme Kost
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung; Desensibilisierung

Rhinophym („Pfundnase", „Knollennase")

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma, Rhinosklerom (Klebsiella pneumoniae- bzw. Klebsiella rhinoscleromatis-Infektion!)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Betr. Talgdrüsenhypertrophie
  Androtropie! Oft kombiniert mit Akne rosacea. Evtl. Operation.

Basistherapie
Orale Therapie:
Cruroheel S (Tabl.)
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatosen sowie bei Sklerodermie, Erythematodes sowie bei Akne und Ekthyma]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; bei Hypercholesterinämie, Erythematodes sowie bei Dermatosen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Testis compositum N Ampullen
[Anregung der Organfunktionen bei Dystrophia adiposo-genitalis (Männer), Ejaculatio praecox, Impotentia virilis sowie bei Erschöpfungszuständen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Thuja S [bei allen proliferativen Prozessen]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleischarme Kost, Alkoholverbot
Weitere Verfahren: Akupunktur, Symbioselenkung

Roemheld-Syndrom (Gastro-kardialer Symptomenkomplex)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache der pathologischen Gasansammlung (= Meteorismu) im Magen (Aerophagie?) bzw. im Darm (Flatulenz) abklären!
  Je nach Grundleiden abdominelle Symptome!
  Sehr häufig Ulkus-, Leber-, Galle- und Pankreasbeschwerden!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pectanginöse Beschwerden, auch vertebragener Ursache]
Ceanothus-Homaccord
[Oberbauchsyndrom, Pankreaserkrankungen]
Parenterale Therapie:
Cor suis compositum N (Tropf.) [degenerative Herzmuskelerkrankung, Koronardurchblutungsstörung, Rhythmusstörung]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
An-io-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden]
Cactus compositum S (Tropf.), **Cactus compositum** (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen, Herzstiche und Herzschmerzen, nervöse Herzstörungen sowie Angina pectoris und Altersherz]
Diarrheel SN (Tabl.)
[akute und chronische Diarrhoe; Gastroenteritis oft mit folgenden Symptomen verbunden: Tympanie, Meteorismus, Dyspepsie]
Duodenoheel (Tabl.) [Hyperazidität, Duodenitis, Ulcus duodeni]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi/duodeni]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis, Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden]
Leptandra compositum (Tropf., Amp.)
[Oberbauchsyndrom bei Leber- und bei Pankreasaffektionen chronischer Art sowie auch bei akuten Schüben (z.B. nach Diätfehlern), Meteorismus]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreaserkrankungen und Oberbauchbeschwerden, Pankreatitis sowie Störungen der Pankreasfunktion]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Podophyllum compositum (Tropf., Amp.)
[gastrokardialer Symptomenkomplex bei Colitis]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [Magenspätschmerz und Nüchternschmerz]
Asa foetida [Gastritis mit Blähungskoliken]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel: pastöse Lymphatiker]
Lycopodium S [Leberleiden mit „Trommelbauch"]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Schleimhautmittel für Gastrointestinaltrakt]
Natrium sulfuricum
[Blähungskoliken und morgendliche Durchfälle]
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin [allergische Gastritis mit Magen-Darm-Spasmen]
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährungstherapie: Vermeidung blähender Speisen und kohlensäurehaltiger Getränke
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Herz, Xiphoid (Schwertfortsatz des Brustbeins), Magenpunkte, oberer Grenzstrang, Quaddelbehandlung: Thorax, kleine Wirbelgelenke
Weitere Verfahren: Physikalische Therapie

Röteln (Rubeolae, „German Measles")

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Scharlach, Masern
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Schwangerschaft: Rötelnembryopathie (Gregg-Syndrom) sowie Rötelfetopathie (geistige und körperliche Retardierung im Kindesalter!). Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme („Rubeola morbillosa"); zerebrale Reizzustände]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch bei Viruserkrankungen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [zu Beginn der Fieberphase; Schüttelfröste]
Belladonna S
[Rötungen und Schwellungen mit Fieber und Unruhezuständen]
Ferrum phosphoricum forte
[initiale Fieber- und Entzündungszustände]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Bäder

Rosacea

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hepeel N (Tabl.) [Leberfunktionsstörungen, Leberschäden]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N
[Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Hepar comp. Heel
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]

Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[akute Entzündungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Verbesserung der Fermentfunktionen]
Cruroheel S (Tabl.) [eitrige Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen), Umstimmungsmittel]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[ekzematöse Veränderungen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Leberentgiftung]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[bei Patientinnen interponieren]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[bei Patientinnen interponieren]
Testis compositum N Ampullen
[Verbesserung der hormonellen Funktionen bei Männern]
Ubichinon compositum Ampullen [Verbesserung der Sauerstoffutilisation und der zellulären Fermentfunktionen]
Nosoden-Injeele:
Psorinum-Injeel [Umstimmungsmittel]
Staphylococcus [Hauteiterungen]
Katalysatoren-Injeele:
Acidum DL-malicum [katalytische Wirkung]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie
Heilerdeauflagen
Mikrobiologische Therapie
Ernährungsumstellung

Samenstrangneuralgien (Neuralgia spermatica bzw. testicularis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Gonorrhoe, Lues, benigne und maligne Tumoren (Sarkom, Metastasen von Hodentumoren), Folgen von Hodentorsionen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus, Arthritiden, wetterbedingte Verschlimmerung]
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Testis compositum N Ampullen
[Libido- und Potenzstörung, allgemeine Schwächezustände]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (auch im Bereich der ableitenden Harnwege; Neuralgia spermatica/testicularis auch bei Steinkolik – nicht allzu selten!)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [antineuralgische Wirkung]
Arsenicum album S [Neuritiden und Neuralgien mit Unruhe und brennenden Schmerzen]
Berberis vulgaris [Samenstrangneuralgien bei Uretersteinabgang]
Magnesium phosphoricum forte
[Neuralgien mit krampfhaften Schmerzen]
Rhododendron [Hoden- und Nebenhodenschmerzen]
Zincum valerianicum [nervöse Störungen (Insomnia nervosa) und neuralgische Beschwerden]
Nosoden-Injeele: **Medorrhinum**
Suis-Organpräparate Injeele:
Testis suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Ggf. Suspensorium, örtliche Wärme
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Scharlach

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Angina tonsillaris, Ausschluss anderer exanthematischer Infektionskrankheiten wie Masern, Röteln, Ringelröteln (Erythema infectiosum acutum), Exanthema subitum (Roseola infantum).
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Begleit- und Folgeerkrankungen wie Otitis media, Myokarditis, Nephritis, rheumatoide Gelenkerkrankungen. Antibiotikatherapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Angin-Heel SD (Tabl.)
[Tonsillarpfröpfe; Angina tonsillaris (Scharlach-Angina!)]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[Sickerblutungen; Blutungsneigung (Scharlach-Purpura, Scharlach-Nephritis und embolische Herdnephritis!)]
Cralonin Tropfen , Cralonin (Amp.)
[infektiös-toxische Myokardschäden bzw. Folgen von Herzmuskelschädigungen (Scharlach-Myokarditis!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders auch bei unklaren fieberhaften Infekten]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[initiale akute Fieberzustände mit Schüttelfrösten]
Apis S
[ödematöse Zustände; Scharlach-Nephritis; Scharlach-Angina]
Baptisia S [akute Infektionen mit hohem Fieber und Somnolenz bzw. Delirien sowie Sepsis-Tendenz]
Belladonna S [lokalisierte Entzündungen (Scharlach-Angina!) mit Rubor-, Tumor-, Calor-, Dolor-Symptomatik]
Colchicum (forte S) [rheumatoide „springende“ bzw. „wandernde“ Gelenkbeschwerden (Scharlach-Rheumatoide!); Endokarditis/Myokarditis, Scharlach-Nephritis mit Ödemen]
Ferrum phosphoricum forte [Sofortmittel bei Fieber- und Entzündungszuständen incl. Otitis media]
Lachesis S [bei septischen Prozessen mit Kapillarschädigung (Scharlach-Purpura)]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[entzündliche Prozesse, wie Angina tonsillaris, Otitis media, aber auch Nephritis und Albuminurie]
Stramonium [Erregungszustände, Delirien, Fieberkrämpfe, heiße Schweiße (ohne Erleichterung!) bei Infektionskrankheiten]
Nosoden-Injeele nach überstandener Krankheit bzw. zur Nachbehandlung:
Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Homöopathisierte Allopathika Injeele: **Penicillin**
Suis-Organpräparate Injeele:
Cor suis, Cutis suis, Hepar suis, Ren suis, Tonsilla suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Evtl. kalte Halswickel
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung bei Rezidividen bzw. Rückfällen

Schlafstörungen (Insomnie)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache und Art (Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen) abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Nervoheel N (Tabl.)
[nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Neurexan (Tropf., Tabl.)
[Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände]
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Suppositorien:
Viburcol N [bei Kindern]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Erregungszuständen sowie bei vegetativer Dystonie, bei Depressionen und Arteriosklerose und bei sonstigen geriatrischen Indikationen („Greisenschlaf" = Durchschlafstörungen mit vorzeitigem Erwachen) sowie nach Commotio cerebri]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien, besonders Ischias]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen (z.B. Cholangitis, Cholezystitis) sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatosen und Neurodermitis (besonders nächtlicher quälender Pruritus!)]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Amp.) [Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische und Bandscheibenbeschwerden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss; Meteorismus]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie; Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele
Chamomilla [nächtliche Unruhe- und Erregungszustände, bes. bei Erethismus im Kindesalter sowie bei Agrypnia laeta]
Coffea [Insomnie (Einschlafstörungen) infolge hellwacher Gedanken; fehlendes Schlafbedürfnis]
Hyoscyamus forte [delirante (bes. nächtliche) Ruhelosigkeit mit Verwirrungszuständen]
Nux vomica S [Durchschlafstörungen mit nächtlichem Erwachen ca. zwischen 3 und 7 Uhr (physiologische nächtliche Säureflut)]
Rhododendron [Insomnie bei motorischer Unruhe]
Sulfur (forte) S [Einschlafstörungen sowie Durchschlafstörungen („Katzenschlaf") mit Erwachen zwischen 3 und 4 Uhr nachts]
Valeriana [Schlaflosigkeit als Folge von Aufregungen, Überarbeitung und Stress; ggf. verbunden mit Kopfschmerzen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [nachts schlaflos, morgens müde]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Ovarium suis, Pankreas suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis
Fides:
Noxom S (Tropf.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Noxotab (Tabl.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Baldrianbäder
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Schmerzen

Ein gegen Schmerzen jeder Art allgemein wirksames Biotherapeutikum existiert nicht, da Schmerzen der Ausdruck dessen sind, dass (je nach Art des Schmerzes) wechselnd bzw. verschiedene Homotoxine an verschiedenen neuralen Rezeptoren im Sinne der Imprägnationsphasen zur Auswirkung kommen. Durch Darreichung von Analgetika wird die Homotoxinlage nicht verbessert, im Gegenteil meist im Sinne zusätzlicher Retoxineffekte bzw. einer Imprägnationswirkung verschlechtert; d.h. nicht kausal beeinflusst.
Mit Darreichung des Syndrom-gemäß indizierten Biotherapeutikums wird die der Entstehung des Schmerzes zugrunde liegende Homotoxinlage beeinflusst (kurativer Effekt).
Jedes Antihomotoxikum-Biotherapeutikum kann damit indirekt als Schmerzmittel wirken. Häufig indiziert sind die im folgenden kurz charakterisierten Präparate (alphabetisch aufgelistet).
Hierbei sollten diese Mittel bei oraler Applikation initial – etwa über 2 Stunden – stoßtherapeutisch eingesetzt werden, also etwa alle 15 Minuten jeweils 8-10 Tropfen bzw. 1 Tablette als ED.
Bei parenteraler Medikation empfiehlt es sich, bei Schmerzzuständen 2-3 mal täglich als ED jeweils 1 Ampulle zu applizieren.

Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen bei lokalisierten Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel, Karbunkel]
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Schmerzen bei Reiz- und Entzündungszuständen (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pektanginöse Beschwerden, auch vertebragener Genese]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Schmerzen bei Gallenkoliken sowie bei Cholangitis, Cholezystitis]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias, Osteochondrose, besonders der LWS]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.)
[Herzschmerzen und Herzstiche]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Duodenoheel (Tabl.) [Schmerzen bei Hyperazidität sowie bei Duodenitis und Ulcus duodeni]
Gastricumeel (Tabl.) [Magenschmerzen bei Gastritis acuta und chronica sowie bei Sodbrennen und Meteorismus]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation, Zervikalsyndrom, Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schmerzen bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich sowie bei Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Ranunculus-Homaccord (Tropf., Amp.) [Interkostalneuralgien und pleuritische Schmerzen sowie Herpes zoster]
Reneel NT (Tabl.)
[entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege); Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]

Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [Schmerzüberempfindlichkeit; neuralgiforme und fieberbedingte Schmerzen]
Apis S [stechende brennende Schmerzen]
Arsenicum album S [brennende Schmerzen mit Kältegefühl]
Asa foetida [Knochenschmerzen]
Aurum [Knochenschmerzen]
Belladonna S [diffuse und entzündungsbedingte Schmerzen mit Pulsieren und Klopfen]
Bryonia S [stechende Schmerzen]
Cantharis [brennende Schmerzen, bes. in der Blase und in den Ovarien]
Carbo vegetabilis [brennende Schmerzen]
Chamomilla [Schmerzüberempfindlichkeit; erethische Unruhe]
Chelidonium [Schmerzen im Leber-Gallenbereich]
Coffea [Schmerzüberempfindlichkeit; Ruhelosigkeit; Insomnie]
Colocynthis S [krampfhafte Schmerzen]
Cuprum [krampfhafte Schmerzen]
Eupatorium perfoliatum [Knochenschmerzen]
Ferrum metallicum
[klopfende rheumatische Schmerzen; bes. links lokalisiert]
Ferrum phosphoricum forte [Schmerzen bei Fieber und Entzündungszuständen; bes. rechts lokalisiert]
Gelsemium S [heftige Kopfneuralgien]
Glonoin [Herzschmerzen sowie klopfende bzw. pulsierende Kopfschmerzen]
Kalmia S [Herz- und Gelenkschmerzen]
Ledum [Schmerzen in den Gelenken]
Magnesium phosphoricum
[krampfhafte Schmerzen; incl. Kopfschmerzen]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[Knochenschmerzen]
Phosphorus S [brennende Schmerzen]
Pulsatilla S [wandernde Schmerzen]
Rhus Tox S
[diffuse rheumatische Gelenk- und Muskelschmerzen]
Silicea [Knochenschmerzen]
Sulfur (forte) S [brennende Schmerzen]
Symphytum [Periost- und Knochenschmerzen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum [Schmerzen mit brennender Hitze an Händen und Fußsohlen]

Schwindel

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!
  Differentialdiagnostisch sind hauptsächlich folgende Schwindelzustände zu unterscheiden, wobei auch Überschneidungen der einzelnen Ursachen beim „Leitsymptom Schwindel" vorkommen: otogener, okulärer, vertebragener bzw. zervikaler, zirkulatorischer (= diffuser Hirnschwindel), neurogener, psychogener Schwindel sowie anoxämischer Schwindel, Schwindel bei Durchblutungsstörungen und Schwindel bei Intoxikationen

Basistherapie
Orale Therapie:
Vertigoheel (Tropf., Tabl.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Parenterale Therapie:
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [Arteriosklerose, besonders Zerebralsklerose]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Arteriosklerose und nach Commotio cerebri sowie bei Neuralgien und Depressionen, bei vegetativer Dystonie sowie bei multipler Sklerose und Parkinsonscher Schüttellähmung, bei Gedächtnisschwäche und nervöser Erschöpfung]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Cocculus-Homaccord (Tropf.)
[Kinetosen, Erschöpfungszustände nach Überarbeitung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.)
[Myokardschwäche, Altersherz]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom; Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS)]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen und Schwindel]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Conium S [zerebraler (Alters)Schwindel; Schwindel bei Lageveränderung, Drehschwindel]
Tabacum [heftige Schwindelzustände mit Übelkeit und Schwächegefühl sowie kalten Schweißen]
Viscum album [zerebrale Kongestionen (Hypertonie) mit Schwindelanfällen und Kopfschmerzen]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum totalis suis, Cor suis, Os petrosum suis forte
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Fides:
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen, Herzbeschwerden]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Zervikalsyndrombehandlung bei vertebragenem Schwindel
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie; manuelle Therapie bei vertebragenem Schwindel

Seborrhoe

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Sowohl die Seborrhoea oleosa (ölige Hautbeschaffenheit) als auch die Seborrhoea sicca/squamosa (kleienförmige fettige Schuppung) fördern das Entstehen einer Akne vulgaris/conglobata/rosacea

Basistherapie
Orale Therapie:
Schwef-Heel (Tropf.)
[Pyodermien, juckende Ekzeme, Dermatosen, Abwehrsteigerung]
Graphites-Homaccord (Tropf.)
[bindegewebige Verhärtung, Narben, Keloide, Ekzeme]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Intertrigo, Ekzeme, Hyperhidrosis]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Seborrhoe bei „Salbengesicht" beim Morbus Parkinson]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Dermatitis, Dermatosen, Allergie, Impetigo contagiosa, Akne vulgaris, sowie bei Dermatomykosen, Neurodermitis und Crusta lactea, bei Sklerodermie und Erythematodes und bei Haarausfall (Alopezie: Seborrhoea capitis = Alopecia sicca bzw. pityroides = Haarausfall mit kleienförmiger Schuppung!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Hypercholesterinämie sowie bei Dermatosen und Neurodermitis]

Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[nässende seborrhoische Ekzeme (Seborrhoea oleosa) bei Lymphatismus bzw. bei exsudativer Diathese]
Graphites
[Seborrhoe mit Hautschuppen (= Seborrhoea sicca bzw. squamosa) und Haarausfall; Neigung zur Fettsucht und Obstipation]
Hepar sulfuris [bei Neigung zu eitrigen Prozessen]
Selenium
[Beziehungsmittel zu Hautfunktionen (Akne) und Haarausfall]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel bei seborrhoischen (trockenen) Ekzemen (= Seborrhoea sicca bzw. squamosa)]
Nosoden-Injeele:
Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Hepar suis
Cosmochema:
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Vermeidung stark gesalzener und gewürzter sowie geräucherter/gepökelter und fetthaltiger Speisen
Physikalische Therapie: UVA-Bestrahlung, Hydrotherapie
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Singultus („Schluckauf“)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache [keinesfalls „ösophagusspezifisch“, sondern auch durch lokale Krankheitsprozesse oder operative Eingriffe hervorgerufene Kontraktionen des Zwerchfells aber auch intrathorakaler bzw. intraabdominaler Organe; ferner zentralnervöse Ursachen (Enzephalitis, Schädel-Hirn-Traumen) sowie rein psychogen] abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.)
[Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom (d.h. Erbrechen, Brechreiz bzw. Vomitus, Singultus)]
Cardiacum-Heel T (Tabl.)
[funktionelle pektanginöse Beschwerden]
Duodenoheel (Tabl.)
[Hyperazidität sowie Duodenitis und Ulcus duodeni]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen; Meteorismus]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; zur Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus sowie im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[Völlegefühl, Aufstoßen bessert; „Splitterschmerz“]
Colocynthis S [Koliken mit stechenden Schmerzen; der Patient muss sich einkrümmen]
Hyoscyamus forte [Zusammenschnürungsgefühl im Schlund; erschwertes Schlucken mit Singultus]
Ignatia S [Gefühl eines Klumpen im Hals und im Ösophagus mit unerschöpflichem Singultus sowie „Seufzer-Atmen“ (kann nicht durchatmen)]
Ipecacuanha [Gastroptose, Übelkeit, Brechreiz und Vomitus]
Magnesium phosphoricum
[Koliken mit Luftaufstoßen und Brechwürgen]
Nux vomica S [spastische Gastritiden incl. Gastritis alcoholica]
Suis-Organpräparate Injeele:
Ventriculus suis
Begleittherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie (in Reflexzonen)

Sinusitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Sinusthrombose, Orbitalphlegmone, Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Häufig, bes. bei Kindern, auch als Sinubronchiales Syndrom auftretend: Rhinitis, Rachenmandelhypertrophie, Tonsillarhypertrophie, adenoide Vegetationen, Lymphangitis und Lymphadenitis, Lymphatismus, Tracheitis, Bronchitis, Bronchiektasen. Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Euphorbium comp. SN (Tropf.)
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Euphorbium comp. SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr, u.a. auch bei Grippe und Otitis media sowie bei Sinusitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]

Mucosa compositum (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation]
Naso-Heel SNT (Tropf.) [Rhinitis acuta et chronica mit und ohne Nasennebenhöhlenbeteiligung]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Hepar sulfuris
[eitrige Nasennebenhöhlenaffektionen; Phlegmone-Tendenz]
Hydrastis [dicke, zähe, strähnige fadenziehende Sekrete]
Kalium bichromicum [chronische Nasenaffektionen und Sinusitis mit zähen strähnigen Absonderungen]
Luffa operculata [allergische und vasomotorische Rhinitis und Sinusitis mit (Stirn)Kopfschmerzen]
Rhododendron [Wetterverschlimmerung]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Grippe-Nosode, Otitis media-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Mucosa nasalis suis, Tonsilla suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Rotlicht
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Bergsmann-Punkte, Glabella
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Ozontherapie, Fokussuche (Polysinusitis als Fokus!), Punktion bzw. Operation, Symbioselenkung

Sjögren-Syndrom (Dakryo-Sialo-Adenopathia atrophicans)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Chronische Polyarthritis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  ferner: Xerostomie, Parotisaffektionen, Gelenkbeteiligung (in 2/3 der Fälle chronische Polyarthritis)

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Oculoheel (Tabl.) [akute und chronische Entzündungen des Auges und der Bindehäute]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen].
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ekzeme, besonders trockene, chronische (Xerodermie); zur Langzeittherapie bei Keloiden]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen (häufig chronische Cholezystopathie beim Sjögren-Syndrom) sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Beschwerden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[vesikulöse Ekzeme, Pruritus; Herpes zoster]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S [Trockenheit der Schleimhäute incl. Xerostomie]
Bryonia S
[bitterer Mundgeschmack; Gelenkaffektionen (Synovitis)]
Causticum S [Trockenheit der Augen (Xerophthalmie) und Lichtscheu („Sandgefühl")]
Graphites [Blepharo-Konjunktivitis; chronische Polyarthritis]
Natrium muriaticum [trockene Zunge; Foetor ex ore; Geruchs- und Geschmacksstörungen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosoden, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Medulla oblongata suis, Mucosa nasalis suis, Oculus totalis suis, Tonsilla suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vollwertkost
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, physikalische Therapie, augenfachärztliche Untersuchung und Kontrollen

Sklerodermie

(zirkumskripte [lilac ring!] und diffuse/progressive = progressive systemische Sklerose = Autoagressionskrankheit!)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Andere Kollagenosen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Graphites-Homaccord (Tropf.) [Ekzeme, besonders trockene, chronische; zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Graphites-Homaccord [Ekzeme, besonders trockene, chronische; zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; zur unterstützenden medikamentösen Behandlung der Sterilität; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Rhagaden an Haut- und Schleimhautübergängen, z.B. am Mundwinkel; hyperkeratotische Hautveränderungen („hornige Verdickung")]
Causticum S [Polychrest: brennende Schmerzen, Schwäche und Zittern, Wundheitsgefühl (wie „rohes Fleisch")]
Conium S [bei allen Verhärtungen und Indurationen]
Graphites [bei allen Verhärtungen und Indurationen]
Thuja S [Konstitutionsmittel, bes. bei Krankheiten mit Neigung zu indurativen/proliferativen Prozessen; ferner verkrüppelte leicht abbrechende Nägel, verschiedene Hautaffektionen und Beschwerden rheumatischer Art (Gelenkschmerzen bei diffuser/progressiver Sklerodermie!)]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis, Placenta suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Fleisch- und allergenarme Kost
Weitere Verfahren: Neuraltherapie, physikalische Therapie

Sodbrennen (Pyrosis)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache abklären (meist verursacht durch peptischen Mageninhalt bei „Ulkus-Krankheit")

Basistherapie
Orale Therapie:
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Nux vomica-Homaccord [Funktionsstörungen im Magen-Darmbereich, Übelkeit, Brechreiz]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.) [Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom; Vomitus (matutinus)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Ceanothus-Homaccord (Tropf.)
[Oberbauchsyndrom; Pankreopathie]
Duodenoheel (Tabl.) [Duodenitis; Ulcus duodeni; Hyperazidität]
Erigotheel (Amp.) [Ulcus ventriculi et duodeni]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus]
Einzelmittel-Injeele:
Antimonium crudum [Gastritis (acuta) mit Dyspepsie und Völlegefühl; Alkoholunverträglichkeit; kalkweiß belegte Zunge; gereizter, mürrischer „Magenmensch"]
Argentum nitricum [Gastritis und andere Schleimhautaffektionen mit und ohne Ulkus; vorzeitig gealterte abgemagerte Typen!]
Arsenicum album S [brennende Magenschmerzen; Periodizität]
Carbo vegetabilis [Dyspepsie, Flatulenz, Magenbrennen; Alkoholunverträglichkeit; gastrokardialer Symptomenkomplex]
Iris [Sodbrennen (Gastritis hyperacida) und Speichelfluss; Übelkeit, saures Erbrechen]
Nux vomica S [Gastritis mit Sodbrennen – besonders als Folge von Alkohol-, Kaffee- und Nikotinabusus]
Pulsatilla S [schleimig-eitrige Gastritiden]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Ventriculus suis
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Leber-Galletropfen
[Unterstützende Behandlung bei Leber- und Galleerkrankungen]
Begleittherapie
Ernährung: Basische Kost, laktovegetabile Vollwertkost, mehrere kleine Mahlzeiten
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Sonnenbrand

(Erythema solare, Dermatitis solaris), Sonnenstich (Insolation)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Cave: Schocksymptomatik! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Cutis compositum N (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Allergie, Dermatosen sowie Quincke'schem Ödem]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien verschiedener Lokalisation]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Tachykardie; pektanginöse Beschwerden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss (ggf. alles verbunden mit Übelkeit und Brechreiz/Erbrechen (= Vomitus)]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.)
[konstitutionelle Kopfschmerzen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [meningeale Reizzustände; ödematöse Schwellungen]
Arnica S
[tonisierende Gefäßwirkung; generell bei Entzündungen]
Belladonna S [Hirnhyperämie; Fieber]
Causticum S [brennende Schmerzen, „wie rohes Fleisch"]
Veratrum (forte)
[Kreislaufschwäche, Kollapszustände; Hautjucken]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Begleittherapie
Ernährung: Flüssigkeitszufuhr
Physikalische Therapie: Kalte Kompressen, kühle Bäder

Soor (Candida, Moniliasis)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Leukoplakie, Mischinfektionen
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Pilzkultur! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Abropernol N (Tabl.) [Ekzeme, Perniones, Intertrigo]
Parenterale Therapie:
Cutis compositum N [Basismittel bei allen allergischen, entzündlichen und degenerativen Hauterkrankungen]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Stomatitis, Gastroenteritis, Enterocolitis (Soor im Bereich des Verdauungstraktes!), Zystitis, Pyelitis, Kolpitis, Fluor albus (Candidosis urogenitalis!) sowie bei Hautkrankheiten]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.)
[Adnexitis, Endometritis, Parametritis, Dysmenorrhoe]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S) [Schleimhautentzündungen der Mundhöhle (Stomatitis, Gingivitis) und des Magen-Darm-Kanals mit Foetor ex ore bei Soormykosen]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Tonsillitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Gingiva suis, Mucosa nasalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Laktovegetabile Vollwertkost, hefearm; gegebenenfalls Antipilz-Diät nach Dr.med. Rieth und Dr.rer.nat. R. Hauss
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Ozontherapie, Symbioselenkung

Staublunge (Silikose)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Morbus Boeck, Stauungslunge, Lymphangiosis carcinomatosa, Ornithose, Adenomatose
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache der Staublunge eruieren! Benigne (z.B. Eisenstaublunge) und maligne (z.B. Silikose, Asbestose – progressive fibrotische Veränderungen) Verlaufsformen differenzieren!
  Ggf. Berufskrankheit! Adjuvante Therapie!
  Herzstützung: Rechtsherzinsuffizienz infolge pulmonaler Hypertonie (Cor pulmonale).

Basistherapie
Orale Therapie:
Bronchalis-Heel (Tabl.) [chronische Bronchitis, Emphysem]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Graphites-Homaccord (Tropf.) [bindegewebige Verhärtung]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen]
Droperteel (Tabl.) [Bronchitis verschiedener Genese, besonders auch als Adjuvans bei Stauungsbronchitis]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Bronchiolitis; asthmatoide Bronchitis]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Bryonia S [Lungenaffektionen; pleuritische Reizerscheinungen]
Conium S [Indurationen und Verhärtungen]
Echinacea [Fieber und Beteiligung des Lymphapparates (Lymphangitis, Lymphadenitis)]
Graphites [narbige Veränderungen]
Phosphorus S [Parenchymmittel bei (broncho)pneumonischen Zuständen; Blutungsneigung]
Silicea [Bindegewebsmittel, Neigung zu Chronizität, dystrophische Zustände, Hilusdrüsenschwellungen]
Nosoden-Injeele:
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Funiculus umbilicalis suis, Pulmo suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Atmungstherapie, Inhalationen
Neuraltherapie: Lungenfeld
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, HOT

Strahlenkater, Strahlenschäden

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris comp.-Heel (Tabl.)
[Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. bei vegetativer Dystonie, bei nervöser Erschöpfung und bei sonstigen geriatrischen Indikationen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Dermatosen und Allergie sowie bei Elephantiasis, Quincke'schem Ödem und Haarausfall]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Glomerulonephritis, Enterocolitis]

Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatosen und toxischen Exanthemen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus (u.a. Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.) [Ekzeme und Dermatosen; Pruritus]
Tonico-Injeel (Amp.)
[Erschöpfungszustände physischer, aber auch psychischer Art]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Zerschlagenheitsgefühl; Muskelkater]
Arsenicum album S
[Schwäche, Abmagerung; unlöschbarer Durst; Angst; Unruhe]
Bryonia S [Muskelbeschwerden; großer Durst]
Causticum S
[Muskelschmerzen; brennende Schmerzen (wie „rohes Fleisch")]

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
cAMP

Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis, Glandula thyreoidea suis, Hepar suis, Ren suis, Splen suis

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamine, Vollwertkost, Mineralien, Spurenelemente
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie

Stress

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache(n) eruieren, behandeln bzw. eliminieren!
  Symptomatische Behandlung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Neurexan (Tropf., Tabl.)
[Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände]

Parenterale Therapie:
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]

Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen; Hypotonie; Herzrhythmusstörungen]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei vegetativer Dystonie, bei Depressionen, nervöser Erschöpfung, Gedächtnisschwäche und nach Commotio cerebri sowie auch bei Erregungszuständen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Pulsatilla compositum (Amp.) [Aktivierung der mesenchymalen Abwehr; Stimulierung der Abwehrsysteme, speziell der Bindegewebsfunktion; zur Wirkungssteigerung biologischer Injektionspräparate sowie zur Therapie von zellulären Phasen und zur Reaktivierung geschädigter Abwehrsysteme, auch postoperativ]
Strophanthus compositum N (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens, zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis, Kollapszustände]
Ypsiloheel N (Tabl.) [vegetative Dystonie, Globus hystericus]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Folgen von Überanstrengungen; Zerschlagenheitsschmerz, Muskelschmerzen]
Ignatia S [„Seufzer-Atmen" (kann nicht durchatmen); Verschlimmerung durch körperliche und geistige Überanstrengung sowie durch Kummer, Aufregung, Schreck und Furcht]
Sulfur (forte) S [Reaktionsmittel bei allen chronischen Krankheitszuständen; Reizbarkeit]
Veratrum forte [depressive und manische Psychosen; Neigung zu Gewalttätigkeiten; Angst und Kreislaufschwäche]

Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Psorinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis

Fides:
Noxom S (Tropf.), **Noxotab** (Tabl.)
[Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Toxinarme Kost, Einschränkung von Reiz- und Genussmitteln
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Mineralsubstitution, Stressabbau, Autogenes Training

Struma

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Karzinom (Struma maligna; Metastasen)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Hormonelle (hypothyreot, euthyreot, hyperthyreot) und morphologische (diffus, knotig, zystisch; Hashimoto Strumitis lymphomatosa) Abklärung! Evtl. Hormonsubstitution!
  Anmerkung: Die individuelle Jodempfindlichkeit bei Kropfträgern ist sehr unterschiedlich! Im allgemeinen besteht im Norden der Bundesrepublik eine größere Jodempfindlichkeit als im Süden!

Basistherapie
Orale Therapie:
Strumeel T (Tabl.) [Anregung der Schilddrüsenfunktion]
[1 Tablette enthält 9,3 µg Jod]
Strumeel forte NF (Tropf.) [10 Tropfen enthalten 70 µg Jod]

Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]

Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Anregung der Abwehrsysteme, u.a. bei Depressionen und nervöser Erschöpfung sowie bei Erregungszuständen und vegetativer Dystonie sowie bei Gedächtnisschwäche und bei sonstigen geriatrischen Indikationen („Alters-Hypothyreose")]

Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr]
Glonoin-Homaccord N Tropfen [Tachykardie, Schilddrüsenüberfunktion; pektanginöse Beschwerden]
Ignatia-Homaccord (Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Ypsiloheel N (Tabl.)
[vegetative Dystonie, Globus hystericus]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Drüsenverhärtungen; Riedel' eisenharte Struma durch Verschwielung bei chronischer Thyreoiditis]
Conium S [steinharte Knoten]
Fucus vesiculosus [Jodmangelkropf;, Adipositas]
Ignatia S [Polychrest mit vielen psychischen Beziehungen (vegetative Dystonie, Globus hystericus u.a.)]
Spongia [Struma colloides et parenchymatosa; „Strumaherz"; strumabedingter Räusperzwang]
Nosoden-Injeele:
Struma nodosa
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Strumige Faktoren in Wirsingkohl, Weißklee, Raps und anderen thiozyanathaltigen Gemüsen beachten!
Ggf. jodreiche Ernährung.
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Sudeck'sche Erkrankung

- **BESONDERE HINWEISE:**
Anamnestisch (meist) Traumen (bes. Frakturen), aber auch Folge von Entzündungen, Nervenschädigungen und Operationen.

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, z.B. Fersensporn]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Brennen, Stechen; ödematöse Zustände]
Arnica S [Folgen von Verletzungen jeder Art, wie Distorsionen, Kontusionen, Hämatomen, Frakturen]
Arsenicum album S [Haut juckend und brennend]
Calcium phosphoricum [Gliederschmerzen und Knochenschmerzen, bes. bei Wetterwechsel]
Dulcamara S [„Nasswettermittel"]
Natrium sulfuricum
[Nasswetterverschlimmerung; Gelenkknacken; Dyshidrosis]
Phosphorus S [Knochenatrophie, Knochennekrosen; brennende Schmerzen, Hitzegefühl]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cutis suis, Glandula parathyreoidea suis, Medulla ossis suis, Musculus suis, Os suis, Sympathicus suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Laktovegetabile Kost
Physikalische Therapie: Mobilisation, Krankengymnastik
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Tachykardie, paroxysmale

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ursache (u.a. vegetative Dysregulation, Herzinfarkt, Herzfehler, Myokarditis, Herzinsuffizienz (Überlastung der Vorhöfe), Basedow, Digitalis-Intoxikation, postinfektiöse und fokal-toxische Myokardschwäche, alternierendes Sick-Sinus-Syndrom) und Art (supraventrikulär, ventrikulär) abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [funktionelle pectanginöse Beschwerden, auch vertebragener Ursache]
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[Bluthochdruck, Tachycardie, pectanginöse Beschwerden]
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
An-io-Injeel
[Koronardurchblutungsstörungrn, pectanginöse Beschwerden]
Symptomenbezogene Therapie
Aurumheel N Tropfen [Herzrhythmusstörungen bei Hypotonie; vegetativ-funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris (Tonsillen ggf. als Streuherd)]
Cactus compositum S (Tropf.),
Cactus compositum (Amp.) [Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden, Angina pectoris]
Cralonin Tropfen
Cralonin (Amp.) [nervöse Herzstörungen; Herzstiche; infektiös-toxische Herzmuskelschwäche; Altersherz sowie Zustand nach Myokardinfarkt]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen, paroxysmale Tachykardie z.B. bei Coxsackie-Virus-Infektionen!)]
Gastricumeel (Tabl.)
[Gastritis acuta und chronica; Sodbrennen; Meteorismus]
Gelsemium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Zervikalsyndrom; Migraine cervicale, Osteochondrose der HWS
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]

Nervoheel N (Tabl.)
[psychosomatische Leiden; klimakterische Neurosen]
Neuro-Injeel Ampullen
[psychosomatische und psychosomatisch überlagerte Krankheitszustände, u.a. auch depressive Stimmungslage]
Strophanthus compositum N (Amp.) [antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens; zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[Tachykardie mit Angstzuständen und Vernichtungsgefühl]
Kalium carbonicum forte N
[Herzmuskelschäden und Ödemneigung mit Arrhythmie]
Rhododendron
[Herzklopfen; Verschlimmerung vor Wetterwechsel]
Tabacum [Herzklopfen mit Tachykardie; Übelkeit, Blässe, Todesangst, kalter Schweiß]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
Suis-Organpräparate Injeele:
Cor suis
Cosmochema:
Herztropfen N [Kreislaufstörungen, Altersherz, Herzmuskelschwäche und –schäden]
Strophanthus comp.-Herztabletten
[Nervöse Herzbeschwerden wie Herzstiche und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend]
Fides:
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Tendovaginitis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Karpaltunnel-Syndrom (bei Sehnenscheidenentzündung der Beuger des Unterarms), Epicondylitis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ausschluss einer spezifischen Genese: Tbc, Gonorrhoe, Syphilis.

Basistherapie
Orale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien; neurale Störfelder]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Graphites-Homaccord (Tropf., Amp.)
[zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden (Tendovaginitis hypertrophicans/stenosans/crepitans!)]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, Weichteilrheumatismus (Tendovaginitis oft als Weichteilrheumatismus auftretend, bei Kindern oft mit schmerzhaften Knötchen in Flexoren- und Extensorensehnen = Rheumatismus nodosus infantum!) und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei verschiedenen Tendinitiden/Tendovaginitiden]
Apis S [ödematöse Schwellungen mit stechenden Schmerzen]
Arnica S
[Verschlimmerung durch jede Bewegung und Erschütterung]
Asa foetida [stechende Knochenschmerzen; Periostitis]
Bryonia S [entzündliche weichteilrheumatische Affektionen]
Rhus Tox S
[diffuse rheumatische Schmerzen an Bändern, Muskeln, Muskelansätzen und Sehnen; Nasswetterverschlimmerung]
Ruta [Überlastungsschäden im Bereich der Handgelenke incl. Ganglion!]
Symphytum [Affektionen der Sehnen, Bänder und des Periosts]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Ruhigstellung, Vermeidung von Überlastungen, Lymphdrainage, Reizstrom
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie

Tetaniforme Zustände

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Hyperventilationssyndrom = normokalzämische Tetanie; normokalzämisch ist auch die „Magentetanie“ (durch häufiges Erbrechen) und die Magnesiummangeltetanie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Kalziumstoffwechsel beachten (Hypokalzämie z.B. bei Hypoparathyreoidismus und bei chronischer Niereninsuffizienz [Hyperphosphatämie!]). Psychogene Ursache!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Valerianaheel (Tropf.)
[Unruhezustände, Neurasthenie, Schlafstörung]
Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Ignatia-Homaccord (Amp.)
[Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Belladonna S
[Fieberkrämpfe; zerebrale Erregungs- und Reizzustände]
Calcium carbonicum
[Krampfdiathese; Verschlimmerung bei körperlichen und geistigen Anstrengungen]
Ignatia S [Polychrest mit psychischer Beziehung: u.a. „Seufzer-Atmen“ mit Lufthunger (DaCosta-Syndrom)]
Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula parathyreoidea suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Milchprodukte
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie;
psychische Führung bei Hyperventilationstetanie (oft bei Konflikt- und Belastungssituationen)

Therapieschäden

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (ohne und mit Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Cholangitis; Cholezystitis; Gallenkoliken, Stauungsikterus; Leberschädigungen (Parenchymschäden), Hepatitis acuta und chronica; als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen, z.B. toxischen Exanthemen und Dermatosen sowie bei Erythematodes (u.a. auch Medikamenten-indizierter LE!); Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Injeel-Chol (Amp.)
[Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Pulsatilla compositum (Amp.)
[Aktivierung der mesenchymalen Abwehr; Stimulierung der Abwehrsysteme, speziell der Bindegewebsfunktion; zur Wirkungssteigerung biologischer Injektionspräparate sowie zur Therapie von zellulären Phasen; Reaktivierung geschädigter Abwehrsysteme, auch postoperativ]
Schwef-Heel (Tropf.) [zur Anregung der Abwehrmechanismen; Pyodermien, Dermatosen, besonders juckende Ekzeme]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei: akuten und chronischen Erkrankungen der Nieren und Harnwege wie Zystitis/Zystopyelitis, Nephrolithiasis, Glomerulonephritis sowie bei Hydronephrose, Nephrose, Nephrosklerose und Hypertonie; Anregung der Nierenausscheidung bei sonstigen Fehlfunktionen wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Berberis vulgaris [bei toxischer Überlastung der Ausscheidungsorgane Niere, Leber, Haut sowie der Nebenniere (Erschöpfungszustände, Halonierung der Augen)]
Nux vomica S [Therapieschäden im Verdauungstrakt]
Solidago virgaurea [Nierenschäden; diuretische Wirkung]
Homöopathisierte Allopathika Injeele:
Deren Auswahl ist abhängig zu machen von einer gezielten Anamnese oder/und den entsprechenden Medikamententestungen
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Cystein
Suis-Organpräparate Injeele:
Abhängig zu machen von speziellem Organbefall bei Therapieschäden; generell
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Ren suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Toxinarme Kost, Fasten
Weitere Verfahren: Symbioselenkung, Lymphdrainage

Thrombophlebitis (= Varikothrombose)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Phlebothrombose (= „tiefe Varikothrombose“ = Thrombosierung der Venenlichtung ohne wesentliche entzündliche Wandveränderungen; initial: meist „stumm“ und größte Emboliegefahr!)

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tabl., Tropf.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [Varizen, venöse Stase, variköses Ekzem, Hämorrhoiden (Hämorrhoidalthrombose; ggf. septische Thrombophlebitis der Pfortader!)]
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Circulo-Injeel N (Amp.)
[periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.)
[bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen; u.a. auch indiziert bei Dermatitis und Dermatosen]

Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Drüsenschwellungen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Durchblutungsstörungen, Varizen]
Apis S [entzündliche Ödeme incl. Phlegmasia alba dolens (Becken- und Oberschenkelvenenthrombose)]
Belladonna S [Rubor-Calor-Dolor-Tumor-Symptome]
Hamamelis [venöse Stase, Varizen mit ausgeprägter Thrombophlebitis-Tendenz, Ulcus cruris varicosum]
Lachesis S [ödematöse blau-rote entzündliche Schwellungen]
Pulsatilla S [Venostasen]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel; entzündliche Prozesse]
Vipera berus
[Thrombophlebitis; Schweregefühl in den Beinen; Ulcus cruris]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Vena suis
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N
[Periphere Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Kompressionsverbände; Quarkwickel
Ausleitende Therapie: Blutegel
Weitere Verfahren: Akupunktur, Sauerstofftherapie

Tic nerveux

- **BESONDERE HINWEISE:**
Differentialdiagnostische Abklärung: u.a. psychogen (bei Konversions- bzw. Konfliktneurosen),
als extrapyramidales = striäres Syndrom (z.B. Tourette-Syndrom = Tic impulsif bei Myoklonie);
ferner bei Chorea minor (= Chorea rheumatica), als Tic douloureux bei Trigeminusneuralgie

Basistherapie
Orale Therapie:
Colocynthis-Homaccord (Tropf.)
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.)
[Kopfschmerzen, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Colocynthis-Homaccord
[Ischialgie, Osteochondrose, Neuralgien]
Gelsemium-Homaccord
[Kopfschmerzen, Neuralgien]
Symptomenbezogene Therapie
Cerebrum compositum NM (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei Neuralgien, Depressionen, nach Commotio cerebri, bei Arteriosklerose, Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung sowie bei sonstigen geriatrischen Indikationen („Alters-Tic") und bei Erregungszuständen sowie ferner bei multipler Sklerose und Parkinsonscher Schüttellähmung]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spastizität der quergestreiften Muskulatur]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Nosoden-Injeele:
Streptococcus haemolyticus
Begleittherapie
Ernährung: Vitamine, Mineralstoffe
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Autogenes Training

Tinnitus aurium

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Ohrgeräusche treten meist nicht als eigenständiges Krankheitsbild auf, sondern sind in der Regel ein Symptom für eine zugrundeliegende Störung. Als Ursachen kommen u.a. Reizung und Entzündung des Labyrinthes, Zerebralaffektionen, Intoxikationen und kardiovaskuläre Erkrankungen in Frage.

- **BESONDERE HINWEISE:**
Vielfach scheint Tinnitus ein kortikal-zerebrales Übererregbarkeitsphänomen zu sein.
Eine eingehende HNO-ärztliche und neurologische Abklärung sollte nach Möglichkeit vor Beginn der Behandlung durchgeführt werden.

Basistherapie
Orale Therapie:
Vertigoheel (Tabl., Tropf.)
[Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Osteoheel S (Tabl.) [Periostitis, Exostosen, Otosklerose]
Parenterale Therapie:
Vertigoheel [Schwindelsymptome verschiedener Genese]
Cerebrum compositum NM [Gehirnfunktionsmittel]
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Symptomenbezogene Therapie
Glonoin-Homaccord N Tropfen
[bei pulssynchronen Ohrgeräuschen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der Leberentgiftung, Störungen des Gallenflusses]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[zur Drainage der Kopflymphe]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[bei toxischen Belastungen]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]
Valerianaheel (Tropf.) [für psychisch labile Patienten]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten]
Cimicifuga S
[nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände]
Tabacum [Beschwerden bei Blutdruckabfall, Verbesserung der Durchblutung allgemein]
Begleittherapie
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Psychotherapie, autogenes Training
Physikalische Geräuschverdeckung durch sog. Tinnitus-Masker, Retraining-Behandlung
Manuelle Therapie
Gabe von Antioxidantien

Tonsillarhypertrophie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
Neoplasma

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.)
[Kalt- und Nasswetterverschlimmerung, Tonsillarhypertrophie]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Lokale Therapie:
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[virale Erkrankungen, akute und chronische Sinusitis, Rhinitis]
Symptomenbezogene Therapie
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]

Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Angina und Fokaltoxikosen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein bzw. Polysinusitis); Mittelohrhydrops, Ohrtubenkatarrh]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Calcium carbonicum
[Konstitutionsmittel bei pastös-lymphatischen Pyknikern]
Calcium phosphoricum
[unterentwickelte magere Kinder mit Lymphatismus incl. „Hilusdrüsen-Kinder"]
Dulcamara S
[„Nasswettermittel"; auch bei rheumatischen Beschwerden]
Hepar sulfuris
[bei Neigung zu Eiterungen (wiederholte akute Anginen!)]
Lachesis S [bei ödematösen dunkelroten Schwellungszuständen und Neigung zu septischen Prozessen]
Silicea [Konstitutions- und Bindegewebsmittel]
Thuja S [Konstitutionsmittel bei allen proliferativen Vorgängen]

Nosoden-Injeele:
Bacillinum humanum, Grippe-Nosode, Polypus nasalis, Sinusitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula lymphatica suis, Tonsilla suis

Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Wenig Milchprodukte
Weitere Verfahren: Neuraltherapie, Symbioselenkung

Torticollis (Caput obstipum)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Meist muskulär bzw. rheumatisch.
  Ausschluss einer otogenen, okulären sowie striären (Torsionsdystonie mit Krämpfen!) Ursache!

Basistherapie
Orale Therapie:
Spascupreel (Tabl.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]

Parenterale Therapie:
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]

Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.)
[Basistherapeutikum bei Osteochondrose sowie ferner Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Tonsillarhypertrophie (ggf. auch Grisel-Syndrom); Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.) [Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Torticollis mit Muskel- und Zerschlagenheitsschmerz; Verschlimmerung durch Bewegung und Erschütterung]
Bryonia S [akut-entzündlicher Schiefhals]
Cimicifuga S [blitzartig einschießende Schmerzen; arthralgisch-myalgisch-neuralgischer Symptomenkomplex]
Colchicum (forte S) [„rheumatoider" Schiefhals]
Colocynthis S [stechende Schmerzen; Parästhesien; Verschlimmerung durch Bewegung, Ärger und Schreck]
Ferrum metallicum
[Schulter-Arm-Syndrom (links) mit rheumatoiden Schmerzen]
Ferrum phosphoricum forte
[Schulter-Arm-Syndrom (rechts) mit rheumatoiden Schmerzen]
Magnesium phosphoricum
[Torticollis spasticus vor allem beim Schlucken]
Rhododendron [Muskelbeschwerden; Neuralgien]
Rhus Tox S [Torticollis mit Nackensteifigkeit; Verschlimmerung in Ruhe („erethische Unruhezustände"); Anlaufschmerz („Startschmerz"), dann Besserung bei Bewegung]

Suis-Organpräparate Injeele:
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Sympathicus suis

Fides:
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Chirotherapie, physikalische Therapie

Tracheitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären! Meist als Laryngo-Tracheo-Bronchitis auftretend

Basistherapie
Orale Therapie:
Tartephedreel N (Tropf.) [Bronchitis, Katarrh, Atemnot]
Belladonna-Homaccord (Tropf.)
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]

Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord
[lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]

Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]

Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[grippale und katarrhalische Infekte (bes. im Anfangsstadium)]
Droperteel (Tabl.)
[Bronchitis verschiedener Genese, besonders auch als Adjuvans bei Stauungsbronchitis, Pertussis]
Drosera-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Pertussis; Bronchiolitis; asthmatoide Bronchitis]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.)
[chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein); Mittelohrhydrops, Ohrtubenkatarrh]
Gripp-Heel (Tabl., Amp.) [Grippe und grippale Infekte]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der oberen und unteren Luftwege]
Phosphor-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Heiserkeit, Laryngitis, Pharyngitis, petechiale Blutungen]

Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [bei Entzündungen der Luftwege]
Bryonia S [trockener Husten mit Stichen]
Causticum S
[absteigender Reizhusten mit brennendem Wundheitsgefühl]
Coccus cacti [Krampfhusten mit zähem, strähnigem Schleim]
Dulcamara S [Tracheitis mit Heiserkeit und Verschleimung]
Hepar sulfuris [bei Krupphusten mit wenig Auswurf]
Hyoscyamus forte [trockener Kitzelhusten bei Pharyngo-Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis (bes. nachts mit Unruhezuständen, Besserung beim Aufsitzen)]
Sanguinaria [Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis mit Krampfhusten]
Spongia [Heiserkeit mit bellendem trockenem Husten (Tracheitis sicca)]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode, Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Bronchus suis, Larynx suis forte
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fides:
Injectio antiasthmatica FIDES S [Bronchitis]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Inhalationen, Gurgeln, Wärme

Trigeminusneuralgie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Migräne, Arteriitis temporalis
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären, u.a. Diabetes mellitus, Polysinusitis), postherpetisch, Intoxikation, Zahnerkrankungen, Fokaltoxikosen

Basistherapie
Orale Therapie:
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Parenterale Therapie:
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Bryaconeel (Tabl.) [Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Cholangitis, Cholezystitis, Stauungsikterus, Leberschädigungen (Parenchymschäden), Hepatitis acuta und chronica]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Trigeminusneuralgien durch Herpes zoster incl. postherpetische Neuralgien des 5. Hirnnerven]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[Neuralgien, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S
[Trigeminusneuralgie (anästhesierender Aconitin-Effekt!)]
Argentum nitricum
[neuralgische Kopfschmerzen mit Magenbeschwerden]
Bryonia S [heftige berstende Kopfschmerzen (bes. bei rechtsseitiger Lokalisation einer Trigeminusneuralgie) mit Reizhusten]
Cimicifuga S [heftige Kopfschmerzen (als wolle der Schädel zerspringen), bes. auch bei klimakterischen Frauen]
Colocynthis S [stechende Schmerzen, Parästhesien, Taubheitsgefühl; Periodizität]
Ferrum phosphoricum forte
[migräneartige Schmerzzustände; Periodizität]
Gelsemium S [Kopfneuralgien (Okzipital- und Trigeminusneuralgien) mit Benommenheit und Schwindel]
Gnaphalium polycephalum [Neuralgien mit stechenden Schmerzen und Parästhesien]
Kalium bichromicum
[periodische Schmerzen über der Nasenwurzel und über den Augen mit Flimmerskotom (= Migräne-Symptom)]
Silicea [bes. bei linksseitiger Lokalisation]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Sinusitis-Nosode
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis, Pulpa dentis suis, Sympathicus suis
Begleittherapie
Physikalische Therapie:
TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.),
Mercurius (Amp.) bei Amalgambelastung
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie; Fokussuche, ggf. Herdsanierung

Ulcus cruris

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache meist eine Varikosis bzw. Thrombophlebitis
  Stets Ausschluss eines Ulcus cruris arteriosum, z.B. bei Diabetes mellitus, bei Endarteriitis obliterans, bei Periarteriitis nodosa, bei Perniones sowie bei Hypertonie = Ulcus cruris hypertonicum Martorell

Basistherapie
Orale Therapie:
Cruroheel S (Tabl.) [Ulcus cruris]
Hamamelis-Homaccord (Tropf.)
[venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Lokale Therapie:
Hamamelis-Salbe-Heel S
[Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Aesculus-Heel (Tropf.) [venöse Stase, Varizen; variköses Ekzem]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Abszessen, Phlegmonen, Furunkeln und Fisteleiterungen sowie bei Osteomyelitis und bei Hautkrankheiten]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[vesikulöse Ekzeme, Pruritus; Herpes zoster]
Rhododendroneel SN (Tropf.)
[wetterbedingte Verschlimmerung]
Solidago comp. Heel (Amp.)
[Anregung der Nierenausscheidung bei Fehlfunktionen der Nieren wie Hyperhidrosis, Fußschweiß, Ekzemen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:
Calcium fluoratum [Ulcera cruris mit indurierten Rändern (Ulcus callosum), die sich bis zum Periost ausbreiten]
Carbo vegetabilis [Ulcus cruris varicosum, venöse Stase, schlechte Heilungstendenz]
Hamamelis [venöse Stasen, (Thrombo)Phlebitis, Ulcus cruris mit venösen Blutungen]
Kalium bichromicum [ausgestanzte tieffressende Ulzera]
Lachesis S [bei Neigung zu septischen Prozessen; düsterrote Entzündungszustände]
Lycopodium S [venöse Stase in den Beinvenen und Ulcus cruris bei Leberleiden]
Silicea [Bindegewebsmittel bei akuten und chronischen Eiterungen mit schlechter Heilungstendenz]
Vipera berus [Thrombophlebitis; lochartige Ulzera; Schweregefühl in den Beinen]
Nosoden-Injeele:
Staphylococcus
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele: **Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Placenta suis, Vena suis**
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fides:
Ureata (Salbe)
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Toxinarme Kost, Stoffwechselförderung
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Symbioselenkung, Kompressionsverbände (z.B. Zinkleim)

Ulcus duodeni et ventriculi

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Neoplasma
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave Blutungen sowie Penetration und Perforation!
  Diagnostische Abklärung! „Medikamenten-Ulkus“ (Cortison, Phenylbutazon, Salizylate u.a.) ausschließen!
  Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Duodenoheel (Tabl.)
[Entzündungen und Reizzustände des Duodenums]
Gastricumeel (Tabl.) [akute und chronische Gastritis]
Parenterale Therapie:
Erigotheel [Ulcus ventriculi et duodeni]
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Anacardium-Homaccord (Tropf.)
[Duodenal-Syndrom; Ulcus duodeni; Dumping-Syndrom (Vorkommen nach allen Formen der Magenoperationen [Billroth I und II, Gastrojejunostomie] mit u.a. folgenden Symptomen: Tachykardie, Blässe, Schweiß, Übelkeit, Singultus, Vomitus], gegenregulatorische Hypoglykämie), Vomitus (matutinus)]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen als Ursache (hepatogenes Ulcus ventriculi/duodeni!) oder Folge sonstiger Erkrankungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (hepatogenes Ulkus!)]
Momordica compositum N (Amp.)
[Pankreas-Erkrankungen und Oberbauchbeschwerden; regulativer antihomotoxischer Effekt bei Pankreatitis und Störungen der Pankreasfunktion]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.) [Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[abgemagerte, melancholische, nervöse Ulkus-Patienten]
Arsenicum album S [Brennschmerzen im Gastrointestinaltrakt; Periodizität; Unruhe, Angst, Verzweiflung]
Graphites [kallöses Ulkus, Ulkusvernarbungen; chronische (atonische) Obstipation]
Ipecacuanha
[Übelkeit und Brechwürgen; Blutungsneigung bei Ulkus]
Kalium bichromicum
[Entzündungen der Schleimhäute mit Geschwürsbildung]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Gastritis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis, Hepar suis, Ventriculus suis
Cosmochema:
Magen-Darmtropfen N [Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fides:
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Reizstoffarme Kost; Einschränkung von konzentriertem Alkohol, Nikotinverbot
Physikalische Therapie: Leichte Wärme
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie, Symbioselenkung

Urethritis, unspezifische

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung: u.a. Chlamydien, Mykoplasmen, Trichomonas, Candida, postgonorrhoisch;
  ferner auch beim Reiterschen Syndrom sowie bei Diabetes mellitus und bei Allergien

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Cantharis compositum S
[Entzündungen der Harnorgane, Reizblase]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes]

Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Zystitis, Pyelitis sowie bei Kolpitis (bei weiblicher Urethritis non specifica häufig auch als Vulvovaginitis klinisch in Erscheinung tretend!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen; Urethritis herpetica!)]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der ableitenden Harnwege]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege mit und ohne Steinbildung]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehrmechanismen bei akuten und chronischen Erkrankungen der Harnwege wie Zystitis/Zystopyelitis, Enuresis nocturna, Prostata-Adenom (1. Stadium) sowie bei Incontinentia urinae und Harnröhrenstrikturen]

Einzelmittel-Injeele:
Cantharis
[Zystitis und Urethritis mit Blasentenesmen, Harnzwang und Brennen in der Urethra nach der Miktion]
Mercurius solubilis Hahnemanni (forte S)
[chronische Schleimhautentzündungen (ätzende, scharfe, eitrige Absonderungen)]
Pulsatilla S [Schleimhautkatarrhe mit gelblich-grünlichen dickflüssigen Absonderungen]
Sepia [bei chronischen Schleimhauterkrankungen]
Solidago virgaurea
[Dysurie, Strangurie; dunkler, schleimig-blutiger Urin]
Thuja S
[bei chronischen Zystitiden und Urethritiden mit Proliferationen (Urethritis fibroplastica mit hyperplastischen polypösen/papillomatösen Schleimhautveränderungen!); Verschlimmerung bei Nässe und Kälte]

Nosoden-Injeele:
Medorrhinum

Suis-Organpräparate Injeele:
Funiculus umbilicalis suis, Ren suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Cosmochema:
Nierentropfen
[Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Fides:
Orthosiphonblätter - Indischer Nierentee FIDES
[Zur Durchspülung der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß]
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Cave: Ethanol, scharf gewürzte Speisen, kalte CO_2-haltige Getränke
Physikalische Therapie: Wärme
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Urolithiasis

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Glomerulonephritis, Nephritis urica („Gichtniere" = Uratnephropathie)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Nephrolithiasis (Harnsäure-Steine!) bei ca. 10-20% aller Gichtpatienten

Basistherapie
Orale Therapie:
Berberis-Homaccord (Tropf.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]

Parenterale Therapie:
Berberis-Homaccord [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]
Solidago comp. Heel
[Förderung von Sekretion und Entgiftungsfunktion bei akuten und chronischen Nierenkrankheiten]

Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]

Symptomenbezogene Therapie
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.) [kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung, also bei Hämaturie]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Bereich der ableitenden Harnwege]
Reneel NT (Tabl.) [entzündliche Erkrankungen im Bereich der ableitenden Harnwege – ohne und mit Konkrementbildung]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Kollapszustände (mit kaltem Schweiß)]

Einzelmittel-Injeele:
Arsenicum album S [Albuminurie, Zylindrurie]
Berberis vulgaris [uratische Diathese mit Nephrolithiasis, Uratsteine bzw. Ziegelmehlsediment (Heminatriumurat)]
Solidago virgaurea [diuretisches bzw. regulierendes Nierenmittel, Dysurie, Strangurie, Albuminurie]
Veratrum forte
[„homöopathisches Analeptikum" bei Kollapszuständen]

Nosoden-Injeele:
Cystopyelonephritis-Nosode

Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:
Glandula parathyreoidea suis, Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Cosmochema:
Nierentropfen [Unterstützende Behandlung bei Nierenschwäche]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]

Fides:
Orthosiphonblätter - Indischer Nierentee FIDES
[Zur Durchspülung der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß]
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]

Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung) mit **Lymphomyosot N**
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Ist abhängig zu machen von der Zusammensetzung des Steines und vom Harn-pH!
Anmerkung: bei eiweiß- und fettarmer, aber wasserreicher Kohlenhydratkost sind Nierensteine selten!
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Oberer Grenzstrang, Quaddelung paravertebral

Urtikaria

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären, u.a. Allergie sowie „Medikamenten-Urikaria" (Azetylsalizylsäure u.a.), „Kosmetika-Urtikaria", „Licht-Urtikaria" und „Kälte-Urtikaria" (= Urtikaria e frigore). Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Sulfur comp.-Heel (Tabl.)
[Entzündungen, Eiterungen, Allergien]

Parenterale Therapie:
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Symptomenbezogene Therapie
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.) [lokalisierte Entzündungen]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Dermatitis, Dermatomykosen, Impetigo contagiosa sowie bei Quincke'schem Ödem]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (intestinogene Urtikaria!)]
Solidago comp. Heel (Amp.) [Anregung der Nierenausscheidung bei Hyperhidrosis, Fußschweiß und Ekzemen]
Schwef-Heel (Tropf.) [Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien; zur Anregung der Abwehrmechanismen]
Einzelmittel-Injeele:
Acidum formicicum [Umstimmungsmittel bei Allergien]
Apis S [bei blassen ödematösen Schwellungen]
Calcium carbonicum [Konstitutionsmittel bei pastös-lymphatischen Pyknikern]
Formica rufa [Umstimmungsmittel bei allergischen Reaktionslagen]
Urtica [urtikarielle juckende Dermatosen]
Intermediäre Katalysatoren:
Histamin (Hochpotenzen!) [allergische Erkrankungen der Haut]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung:
Fleisch- und toxinarme Kost
Physikalische Therapie:
Kalte Umschläge
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme],
Berberis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Reizungen und Entzündungen im Urogenitaltrakt und in den Gallenwegen]

Vaginitis / Vulvovaginitis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Mikrobiologisches Profil
  (u.a. Trichomonas, Candida, Chlamydien, Gonorrhoe)!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lilium compositum Heel (Tropf.) [Entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Metro-Adnex-Injeel [Adnexitis, Dysmenorrhoe, Mittelschmerz]
Symptomenbezogene Therapie
Calcoheel (Tabl.) [exsudative Diathese, Lymphatismus, u.a. auch Fluor albus, bes. bei kleinen Mädchen]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.) [funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des weiblichen Inkretoriums]
Klimakt-Heel T (Tabl.) [klimakterische Neurosen sowie ferner (post)klimakterische Kolpitis (Kolpitis senilis)]
Mezereum-Homaccord (Tropf., Amp.) [bei Pruritus vulvae und Vulvitis (bullosa)]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum [chronische Schleimhautentzündungen, u.a. Zervizitis]
Kalium bichromicum [Kolpitis und Vulvitis ulcerosa]
Kreosotum [ätzender übelriechender Fluor; Pruritus vulvae]
Nosoden-Injeele:
Bacterium coli, Medorrhinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Corpus luteum suis, Ovarium suis, Urethra suis, Uterus suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fluor-Zäpfchen S [Gesteigerte Absonderungen von Schleim und sonstigen Sekreten]
Fides:
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Neuraltherapie: Frankenhäuser-Plexus, gynäkologischer Raum
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Varikosis

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Operationsindikation abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Hamamelis-Homaccord (Tropf.) [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Aesculus-Heel (Tropf.) [Varicen]
Parenterale Therapie:
Hamamelis-Homaccord [venöse Stase, Ekzem, Thrombophlebitis]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cruroheel S (Tabl.) [Fisteleiterungen; Ulcus cruris]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [venöse (variköse) Durchblutungsstörungen; Parästhesien]
Apis S [ödematöse Entzündungs- und Schwellungszustände mit Stechen und Brennschmerz; Wärme verschlimmert]
Hamamelis [Venenstau, venöse Blutungen; Neigung zu Thrombophlebitis und Ulcus cruris varicosum]
Lachesis S [Varikosis mit Neigung zu Ödemen und Thrombophlebitis]
Pulsatilla S [Krampfaderbeschwerden, Anschwellung der Unterschenkel; schlimmer in der Wärme]
Sepia [Venostase in den Becken- und Beinvenen mit Varikosistendenz; Wärme verschlimmert; „Klimakterium-Mittel"]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Vena suis
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]

Begleittherapie
Ernährung: Gewichtskontrolle
Physikalische Therapie: Kompressionsverbände, Quarkwickel, Kneippsche Anwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Sauerstofftherapie, Training

Varizellen (Windpocken)

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Verschiedene andere mit Hautaffektionen einhergehende Infektionskrankheiten sowie Strophulus infantum (= Nahrungsmittelallergie bzw. als „Zahnpocken" auftretend)
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave Embryopathia und Fetopathia varicellosa!

Basistherapie
Orale Therapie:
Belladonna-Homaccord (Tropf.) [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Apis-Homaccord (Tropf.) [Ödeme, Ekzeme]
Parenterale Therapie:
Belladonna-Homaccord [lokalisierte Entzündungen, Furunkel, Karbunkel]
Apis-Homaccord [Ödeme, Ekzeme]
Suppositorien:
Viburcol N [Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Hautaffektionen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Stomatitis (auch Schleimhautbläschen im Mund bei Varizellen!) und Otitis media (Mittelohrentzündung bei Varizellen!) sowie bei Abszessen, Phlegmonen (häufige Sekundärinfektionen bei Windpocken!)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus (Neigung zur Überentwicklung der lymphatischen Organe, Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit); Drüsenschwellungen]
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.) [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fieber-Zäpfchen N [Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Fides:
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]

Vegetative Dysregulation

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache (u.a. auch Fokalherde) eruieren und behandeln!

Basistherapie
Orale Therapie:
Ypsiloheel N (Tabl.) [Globusgefühl, vegetative Dystonie]
Nervoheel N (Tabl.) [nervöse Beschwerden, Erschöpfungszustände]
Parenterale Therapie:
Neuro-Injeel Ampullen [psychosomatische Beschwerden, Depression]
Tonico-Injeel [geistige und körperliche Erschöpfungszustände]
Symptomenbezogene Therapie
Aletris comp.-Heel (Tabl.) [Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Cerebrum compositum NM (Amp.) [zerebrales Regenerationsmittel – besonders für geriatrische Patienten und postkommotionelle Zustände]
China-Homaccord S (Tropf., Amp.) [Erschöpfungs- und Schwächezustände]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art, Leberschäden]
Ignatia-Homaccord (Amp.) [Depressionszustände, besonders exogener Genese; paradoxe Symptome; hysterische Aphonie sowie ferner wechselnde Stimmungslage]
Injeel-Chol (Amp.) [Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis. Leberfunktionsstörungen, chronische Hepatitiden]
Testis compositum N Ampullen [Stimulationsmittel für die männlichen Sexualdrüsen, u.a. auch angezeigt bei Impotentia virilis und bei Erschöpfungszuständen]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Valerianaheel (Tropf.) [Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Einzelmittel-Injeele:
Ignatia S [Weinerlichkeit; nervöser Husten, „Seufzer-Atmen"; Globusgefühl; Stimmungslabilität]
Veratrum forte [Erregungszustände, Gewalttätigkeiten]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel (Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Cerebrum totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Sympathicus suis
Fides:
Noxom S (Tropf.), **Noxotab** (Tabl.) [Schlaflosigkeit, nervöse Störungen]
Mulimen S (Tropf.), **Mulimen** (Tabl.), **Mulimen pro injectione** [Parametropathia spastica, Menstruationsbeschwerden]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Gymnastik, Massagen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Schilddrüse, gynäkologischer Raum, Cubitalvene (im Wechsel)
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, intensives Biofeedback, Fokussuche (Amalgam), Psychotherapie

Verbrennungen (Grad I-II)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Cave: Schocksituationen! Adjuvante Therapie!

Basistherapie
Orale Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Parenterale Therapie:
Lymphomyosot N [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Lokale Therapie:
Calendula-Salbe-Heel S [Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]

Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Dermatosen]
Echinacea compositum SN (Amp.) [Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [urtikarielle und entzündliche Ödeme mit Brennen, Stechen, Juckreiz]
Ferrum phosphoricum forte
[Fieber- und Entzündungszustände im Anfangsstadium]
Thuja S [Infektionen mit Haut- und Schleimhautveränderungen]
Nosoden-Injeele (nicht im akuten Stadium verabreichen, sondern nach überstandener Krankheit!):
Herpes zoster-Nosode, Vaccininum
Suis-Organpräparate Injeele: **Cutis suis**
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Hautfunktionstabletten N,
Hautfunktionstropfen N [Erkrankungen der Haut]

Verletzungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Art der Verletzung genauestens abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Traumeel S (Salbe)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Cinnamomum-Homaccord N (Tropf., Amp.)
[kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit; Drüsenschwellungen]
Einzelmittel-Injeele:
Apis S [Schwellungen verschiedener Art mit stechenden und brennenden Schmerzen]
Arnica S [Verletzungen jeder Art, z.B. Quetschungen, Kontusionen, Luxationen, Distorsionen, Hämatome; zur Unterstützung der Frakturbehandlung]
Calcium phosphoricum
[Förderung der Kallusbildung bei Knochenbrüchen]
Cimicifuga S
[stechende neuralgische sowie Muskelschmerzen]
Hypericum [Nervenquetschungen und -verletzungen sowie Nervenschmerzen bei und nach Verletzungen]
Ledum
[Ekchymosen mit dunkelblauen Flecken durch Quetschungen]
Ruta [Periostblutungen]
Symphytum [Förderung der Kallusbildung bei Knochenbrüchen; Periostreizungen]
Veratrum (forte) [Kollapsneigung, kalter Schweiß]
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Hautfunktionstabletten N, Hautfunktionstropfen N
[Erkrankungen der Haut]
Begleittherapie
Physikalische Therapie: Kälteanwendungen, Ruhe

Viruserkrankungen

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ggf. als Begleittherapie

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Gripp-Heel (Tabl.) [grippale Infekte]
Mercurius-Heel S (Tabl.) [eitrige und entzündliche Erkrankungen]
Euphorbium comp. SN (Tropf.) [antiviraler Effekt]
Parenterale Therapie:
Echinacea compositum SN [allgemein zur Anregung des Abwehrsystems, v.a. bei rezidivierenden bakteriellen Infekten]
Engystol [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr (auch Viruserkrankungen)]
Suppositorien:
Viburcol N
[Unruhe- und Krampfzustände mit und ohne Fieber, Infekte]
Symptomenbezogene Therapie
Aconitum-Homaccord (Tropf., Amp.) [grippale und katarrhalische Infekte (besonders im Anfangsstadium)]
Belladonna-Homaccord (Tropf., Amp.)
[lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris (Virus-Anginen wie Herpangina; Angina monocytotica]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Euphorbium comp. SN (Tropf., Amp.) [chronische Sinusitiden (Kieferhöhle, Stirnhöhle, Siebbein, Keilbein)]
Euphorbium comp. Nasentropfen SN
[chronische Sinusitiden, zur unterstützenden Behandlung bei Ozaena; Rhinitis verschiedener – u.a. auch viraler! – Genese]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden (Virus-Hepatitiden!)]
Naso-Heel SNT (Tropf.)
[Rhinitis acuta et chronica mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [initiale akute Fieberzustände]
Arsenicum album S [Erschöpfungszustände mit Angst; kalte Schweiße, Blässe, Zyanose]
Baptisia S [hohes septisches Fieber, Benommenheit]
Belladonna S [zerebrale Reizzustände; ggf. mit heißen dampfenden Schweißen]
Echinacea [Steigerung der körpereigenen Abwehr]
Ferrum phosphoricum forte [fieberhafte Initialzustände]
Vincetoxicum [bei allen viral bedingten Krankheiten]
Nosoden-Injeele:
Coxsackie-Virus-A_9, Coxsackie-Virus-B_4, Grippe-Nosode.
Diese und weitere Virusnosodenzubereitungen, z.B. **Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode.**
Ferner: **Psorinum** (Reaktionsmangel, verzögerte Rekonvaleszenz, Chronifizierung einer akuten Krankheit),

Intermediäre Katalysatoren:
Para-Benzochinon, Glyoxal compositum
Suis-Organpräparate Injeele: Je nach Organbefall
Cosmochema:
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fides:
Secerna pro injectione S [Entzündungen; Gürtelrose (Herpes zoster), Nervenschmerzen. Bauchkoliken]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Toxinarme, vitaminreiche Kost
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.) [Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Vitiligo

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Pigmentverschiebungen anderer Ursachen (toxische Reaktionen), Ekzeme und Verletzungsfolgen.
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Durch Degeneration der Melanozyten bedingte Depigmentierung von Hautarealen, seltener auch die Schleimhäute und den behaarten Kopf betreffend. Ursächlich wird eine Autoimmunerkrankung diskutiert. In einem Drittel der Fälle liegt eine familiäre Disposition vor. Eine Vitiligo ist überdurchschnittlich bei Krankheiten mit Vitamin-B12-Resorptionsstörungen zu beobachten, es wird aber auch über eine Häufung von Alopecia areata, Diabetes mellitus, Hepatosen und Schilddrüsenstörungen bei Vitiligo berichtet. Eine wirksame Therapie der Vitiligo ist bisher nicht bekannt. Der Patient sollte Sonnenexposition möglichst meiden, um die Pigmentierung der gesunden Haut zu verhindern. Kosmetisch kann man die Vitiligoherde überdecken (Camouflage) oder die Hornschicht anfärben, z.B. mit Viticolor).

Basistherapie
Orale Therapie (adjuvant):
Hormeel SNT (Tropf.) [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Hormeel SN [Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Symptomenbezogene Therapie
Einzelmittel-Injeele:
Sepia [chronische Hauterkrankungen]
Silicea [Bindegewebserkrankungen allgemein]
Suis-Organpräparate-Injeele:
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis
Begleittherapie
Antioxidantien, vor allen Dingen Vitamin C, Vitamin E und β-Carotin, Vitamin B_{12}

Wadenkrämpfe

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Ursache abklären!

Basistherapie
Orale Therapie:
Veratrum-Homaccord (Tropf.) [Gastroenteritis (Wasser- und Elektrolytverluste mit konsekutiven Wadenkrämpfen); Kollapszustände (Wadenkrämpfe als Folge lokaler Zirkulationsstörungen]
Spascupreel (Tabl.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Spascupreel [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Hamamelis-Salbe-Heel S [Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen]
Spascupreel S (Supp.) [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.) [Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Hamamelis-Homaccord (Tropf., Amp.) [venöse Stase; variköses Ekzem (Varizen oft Krampi auslösend); thrombophlebitische Zustände]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [wetterbedingte Verschlimmerung]
Veratrum-Homaccord (Amp.) [Gastroenteritis (Wasser- und Elektrolytverluste mit konsekutiven Wadenkrämpfen); Kollapszustände (Wadenkrämpfe als Folge lokaler Zirkulationsstörungen]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Aesculus [Permeabilitätsstörungen der Gefäßendothelien; venöse Stase; Parästhesien]
Colocynthis S [stechende Schmerzen, Taubheitsgefühl]
Conium S [arteriosklerotische Gefäßveränderungen mit Hypoxie sowie Muskelkrämpfen und Paresen; Verschlimmerung durch Kälte und nachts]
Gnaphalium polycephalum [Parästhesien und Taubheitsgefühl mit stechenden Schmerzen, bes. in den Unterschenkeln]
Rhododendron [Verschlimmerung in der Ruhe und nachts: Crampi nocturni]
Veratrum forte [nächtliche Muskelkrämpfe; Verschlimmerung bei Bettwärme und in der Ruhe]
Zincum valerianicum [Muskelzuckungen und Muskelkrämpfe; motorische Unruhe der Beine; Restless legs]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Musculus suis, Placenta suis, Vena suis
Fides:
Spasmofides S (Tropf.) [Spasmen]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Mineralstoffhaushalt beachten (Wadenkrämpfe z.B. auch bei Hypokalzämie)
Physikalische Therapie: Kneippsche Anwendungen
Weitere Verfahren: Akupunktur, Neuraltherapie
Hinweis: Vermeidung von Nässe und Kälte sowie von körperlichen Überanstrengungen.
Hypoxie begünstigt Wadenkrämpfe!

Warzen

Basistherapie
Orale Therapie:
Engystol (Tabl.) [Virusinfekte]
Parenterale Therapie:
Thuja-Injeel [Warzenbildungen]
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Abropernol N (Tabl.) [Hyperkeratosen]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme bei einer Vielzahl von Hautaffektionen, u.a. auch bei Naevi und bei Kondylomen (Condylomata acuminata = Feig- oder Feuchtwarzen, eine terrainbedingte Variante der Verrucae vulgares bei fast ausschließlich genito-analer Lokalisation)]
Engystol (Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, auch bei Viruserkrankungen: „Warzen-Virus“ (Common-wart-Virus) = Papilloma-Virus (HPV = humanes Papillom-Virus) mit Untergruppen]
Hepar comp. Heel (Amp.) [Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]

Einzelmittel-Injeele:
Acidum nitricum [bes. bei warzigen Veränderungen an Übergängen von Haut zu Schleimhäuten; „Splitterschmerz"; Neigung zu Blutungen]
Antimonium crudum [Hyperkeratosen, Warzen, Rhagaden]
Causticum S [Warzen, bes. im Gesicht und an den Fingern]
Natrium muriaticum
[Lokalisation besonders auf den Handflächen]
Thuja S
[Konstitutionsmittel bei allen proliferativen Veränderungen]
Vincetoxicum [generell bei Virusaffektionen]
Nosoden-Injeele:
Medorrhinum, Psorinum
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Ätzen, ggf. chirurgische Intervention

Weichteilrheumatismus (extraartikulärer Rheumatismus)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Ausschluss einer Fokaltoxikose

Basistherapie
Orale Therapie:
Rheuma-Heel (Tabl.) [Basismittel bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Traumeel S (Tropf., Tabl.) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Bryaconeel (Tabl.)
[Neuralgien, auch rheumatischer Genese; grippale Infekte]
Circulo-Injeel N (Amp.) [periphere Durchblutungsstörungen]
Coenzyme compositum Ampullen [Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Dulcamara-Homaccord (Tropf.) [Nasswetterverschlimmerung aller Beschwerden; Tonsillarhypertrophie (fokusbedingter Weichteilrheumatismus?)]
Lithiumeel comp. (Tabl.) [gichtisch-rheumatische Beschwerden]
Rhododendroneel SN (Tropf.) [Neuralgien, Weichteilrheumatismus und (peri)arthritische Beschwerden, besonders bei wetterbedingter Verschlimmerung]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spasmen der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen [Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Aconitum S [entzündlicher Weichteilrheumatismus mit Neuralgien und Neuritiden]
Bryonia S [entzündlicher Muskel- und Gelenkrheumatismus]
Colchicum (forte S) [Gelenk- und Muskelrheumatismus mit Herzbeteiligung (Peri-, Myo-, Endokarditis)]
Colocynthis S
[stechende Schmerzen mit Taubheitsgefühl und Parästhesien]
Conium S [verschiedene Muskelbeschwerden, wie Muskelkrämpfe und Muskelschwäche sowie Muskelverhärtungen]
Cuprum [Krämpfe in den Muskeln mit Muskelrigidität]
Curare [Lähmungen und Schwächezustände der Muskulatur, bes. nach Überanstrengungen]
Dulcamara S [Muskel- und Gelenkrheumatismus als Folge von Erkältungen bzw. mit Nasswetterverschlimmerung]
Kalium carbonicum forte N
[Muskelschwäche sowie Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern mit Hyperhidrosis]
Rhododendron [Muskelrheumatismus mit reißenden Schmerzen und motorischer Unruhe]
Rhus Tox S [diffuse rheumatische Schmerzen in Bändern, Sehnen, Muskelansätzen und Muskeln]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Placenta suis
Cosmochema:
Rheumatabletten N
[Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises]
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Entzündungstropfen N [Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Fides:
Arthrifid S (Tropf.) [Gelenkrheumatismus, Gelenkentzündungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Physikalische Therapie: Iontophorese
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Symbioselenkung

Wundbehandlung

- **BESONDERE HINWEISE:**
Desinfektion, Abgrenzung; ggf. Wundausschneidung (nach Friedrich); Schutzimpfung (Starrkrampf).

Basistherapie
Orale Therapie:
Traumeel S (Tropf., Tabl.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Parenterale Therapie:
Traumeel S [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Lokale Therapie:
Arnica-Salbe-Heel S [Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems, Entzündungen]
Calendula-Salbe-Heel S
[Hauteiterungen, schlecht heilende Wunden, Verletzungen]
Kamillen-Salbe-Heel S [Entzündungen]
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Ödeme; pustulöse und bullöse Ekzeme; zerebrale Reizzustände]
Cutis compositum N (Amp.) [Anregung der Abwehrsysteme, u.a. auch bei Allergie, Dermatosen, Impetigo contagiosa]
Echinacea compositum SN (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Fieber und Entzündungen, u.a. auch bei Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen und Fisteleiterungen]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Drüsenschwellungen; Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit (posttraumatische Lymphödeme und sonstige ödematöse Schwellungszustände]

Einzelmittel-Injeele:
Apis S
[bei Schwellungen mit stechenden Schmerzen; Stichwunden]
Arnica S [Quetschungen, Kontusionen, Hämatome; Distorsionen; Anregung der Wundheilung]
Hamamelis [Wunden mit starker Blutungsneigung]
Hypericum [Wunden – insbes. Stichverletzungen – mit konsekutiven Nervenschmerzen]
Ledum [nach Bienen- und Wespenstichen]
Ruta [Folgen von Traumen, insbes. von Quetschungen, Kontusionen, Distorsionen; gefäßabdichtend]
Staphisagria [Schnittwunden, Neigung zu Keloiden]
Symphytum [Stumpfbeschwerden, Hämatome]
Suis-Organpräparate Injeele:
Cutis suis
Cosmochema:
Entzündungstropfen N
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei entzündlichen Prozessen verschiedener Art]
Kieselsäuretabletten N
[Funktionsverbesserung des Bindegewebes]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Physikalische Therapie: Ruhigstellung

Wurmerkrankungen, rezidivierende

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Adjuvante Therapie!
  Biotherapeutika-Antihomotoxika aus symptomatischer Sicht bzw. zur Milieuänderung/Terrainumstimmung!

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Mucosa compositum [Basismittel bei allen akuten und chronischen Schleimhauterkrankungen]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Vomitusheel S [Erbrechen und Brechreiz]
Symptomenbezogene Therapie
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Nux vomica-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus; Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss]
Valerianaheel (Tropf.)
[Sedativum bei Unruhezuständen; Neurasthenie]
Veratrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Gastroenteritis; Kollapszustände]
Einzelmittel-Injeele:
Natrium sulfuricum [hepatogene Diarrhoe; bitterer Geschmack]
Suis-Organpräparate Injeele:
Colon suis, Duodenum suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Zerebrale Ischämie

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Apoplexie
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung notwendig!

Basistherapie
Orale Therapie:
Aesculus-Heel (Tropf.) [Durchblutungsförderung]
Arteria-Heel N (Tropf.) [periphere Durchblutungsstörung]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Neigung zur Ödembildung und Infektanfälligkeit]
Spascupreel (Tabl., Amp.), **Spascupreel S** (Supp.) [Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane, z.B. auch Gefäßspasmen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [tonisierende Gefäßwirkung]
Plumbum metallicum [Arteriosklerose; Gefäßspasmen]
Tabacum [angiospastische Zustände]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Placenta suis, Vena suis (evtl. als Mischspritze)
Cosmochema:
Blutgefäßtropfen N [Periphere Durchblutungsstörungen]
Fides:
Coronar-Homocent S (Tropf.)
[Gefäßerkrankungen. Herzbeschwerden]
Coronar-Homocent pro injectione SN
[Unterstützende Behandlung bei Durchblutungsstörungen]
Begleittherapie
Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Nikotinkarenz
Physikalische Therapie:
Kneippsche Anwendungen, Krankengymnastik
Weitere Verfahren:
Symbioselenkung, Akupunktur, Neuraltherapie, Sauerstofftherapie, Ozontherapie, HOT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Zerebralsklerose

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Risikofaktoren: familiäre Belastung,
  Diabetes mellitus,
  Hypertonie, Hyperlipidämie

Basistherapie
Orale Therapie:
Barijodeel (Tabl.) [Lymphatismus, Zerebralsklerose]
Ginseng compositum N (Tropf.) [Schwächemittel, Geriatrikum]
Parenterale Therapie:
Circulo-Injeel N [zentrale und periphere Durchblutungsstörung]
Symptomenbezogene Therapie
An-io-Injeel (Amp.)
[Koronardurchblutungsstörungen; pektanginöse Beschwerden]
Cactus compositum (Amp.), **Cactus compositum S** (Tropf.),
[pektanginöse Beschwerden, bes. bei Hypertonie]
Carbo compositum (Amp.)
[Apoplexie- und Myokardinfarkt-Prophylaxe]
Cardiacum-Heel T (Tabl.) [pektanginöse Beschwerden]
Cerebrum compositum NM (Amp.)
[Zerebralsklerose mit den entsprechenden Symptomen wie Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung, Erregungszuständen, Depressionen u.a.]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Cor suis compositum N (Amp.)
[arteriosklerotische, degenerative Herzaffektionen, Hypertonie]
Cralonin Tropfen, Cralonin (Amp.) [Herzinsuffizienz]
Galium-Heel N (Amp.) [chronische degenerative Krankheiten]
Neuro-Injeel Ampullen [psychische Erschöpfungszustände und depressive Stimmungslage]
Selenium-Homaccord (Tropf., Amp.)
[arteriosklerotische zerebrale Leistungsschwäche]
Tonico-Injeel (Amp.)
[physische und psychische Erschöpfungszustände]

Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Vertigoheel (Tropf., Tabl., Amp.)
[arteriosklerotisch bedingter (Alters-)Schwindel]
Einzelmittel-Injeele:
Arnica S [Herz- und Gefäßtonisierung; Zerschlagenheitsgefühl; Apoplexiefolgen]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis
Begleittherapie
Eigenbluttherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate sowie 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Risikoarme Ernährung
Physikalische Therapie: Kneippkuren, Training
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie: Dornenkranz, Stellatumblockade
Weitere Verfahren:
Sauerstofftherapie, Ozontherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (O_2MT nach M. v. Ardenne)

Zervikalmigräne (Migraine cervicale)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Spigelon (Tropf., Tabl.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Parenterale Therapie:
Gelsemium-Homaccord [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Spigelon [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Cimicifuga-Homaccord (Tropf., Amp.) [Osteochondrose, besonders HWS; vertebragene Neuralgien; neurale Störfelder]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Discus compositum N mit Kalmia (Tropf., Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Neuralgo-Rheum-Injeel (Amp.)
[Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden]
Spascupreel (Tabl., Amp.) [Spastizität der quergestreiften Muskulatur (Myogelosen, muskulärer Hartspann)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Zeel comp. N (Tabl., Amp.)
[Basismittel bei allen degenerativen Gelenkerkrankungen]
Einzelmittel-Injeele:
Calcium phosphoricum [Schwächemittel für unterentwickelte Kinder mit Haltungsfehlern; Schulkopfschmerzen]
Cimicifuga S
[HWS-Syndrom: blitzartige schießende Schmerzen, vom Nacken bis über den Kopf in die Nasenflügel ausstrahlend]
Gelsemium S [Migräne (ggf. mit Benommenheit und Schwindel); Okzipitalneuralgien]
Sepia [Erschöpfungszustände und Haltungsschwäche mit migräneartigen Zuständen; „Klimakterium-Mittel"]
Suis-Organpräparate Injeele:
Arteria suis, Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis, Os suis, Vena suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.),
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Allergenfreie Kost
Physikalische Therapie: Strecken, Massage, Krankengymnastik
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Neuraltherapie, Autogenes Training, Haltungskorrektur nach Alexander

Zervikalsyndrom

- **DIFFERENTIALDIAGNOSE:**
  Migraine cervicale, vertebragene Angina pectoris, Schulter-Arm-Syndrom, Periarthritis humeroscapularis, Osteochondrose, Discusprolaps, Gefäßerkrankungen, Tumor
- **BESONDERE HINWEISE:**
  Sorgfältige Abklärung!

Basistherapie
Orale Therapie:
Gelsemium-Homaccord (Tropf.) [Kopfschmerzen, Neuralgien]
Cimicifuga-Homaccord (Tropf.)
[Osteochondrose (HWS), Neuralgien, neurale Störfelder]
Parenterale Therapie:
Discus compositum N mit Kalmia (Amp.)
[Gelenk- und Bindegewebserkrankungen]
Neuralgo-Rheum-Injeel
[Weichteilrheumatismus, Neuralgien, Arthritiden]
Lokale Therapie; Suppositorien:
Traumeel S (Salbe) [entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Spascupreel S (Supp.)
[Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
China-Homaccord S (Tropf., Amp.) [Basistherapeutikum bei Osteochondrose; Schwäche- und Erschöpfungszustände]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Colocynthis-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Neuralgien; Osteochondrose]
Ferrum-Homaccord (Tropf., Amp.)
[Schulter-Arm-Syndrom; Epicondylitis]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen sowie bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Spigelon (Tropf., Tabl., Amp.) [konstitutionelle Kopfschmerzen]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Cimicifuga S [bei Erschöpfung]
Ferrum phosphoricum forte
[Nacken- bzw. Schulterbeschwerden]
Nosoden-Injeele:
Grippe-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla spinalis suis, Musculus suis
Cosmochema:
Neuralgietabletten N, Neuralgietropfen CM
[Schmerzen, Nervenschmerzen]
Bryonia Cosmoplex N (Tropf.)
Bryonia compositum Cosmoplex (Tabl.)
[Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten]

Begleittherapie
Ernährung: Gewichtsreduktion bei Übergewicht
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Neuraltherapie:
Triggerpunkte, Ganglion stellatum, HWS-Quaddel
Weitere Verfahren:
Akupunktur, Autogenes Training, manuelle Therapie (Chiropraktik), TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)

Zungenbrennen (Glossodynie)

- **BESONDERE HINWEISE:**
Diagnostische Abklärung! U.a. Plummer-Vinson-Syndrom = hypochrome bzw. sideropenische Anämie, perniziöse Anämie (Möller-Hunter-Glossitis), Diabetes mellitus, Sjögren-Syndrom; psychogen! Zahnsanierung, Mundbatterie!

Basistherapie
Parenterale Therapie:
Galium-Heel N [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Symptomenbezogene Therapie
Chelidonium-Homaccord N (Amp.),
Chelidonium-Homaccord NT (Tropf.) [Gallenkoliken; Cholangitis; Cholezystitis; Leberschädigungen (Parenchymschäden), Hepatitis acuta und chronica; Stauungsikterus]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Engystol (Tabl., Amp.) [zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei Grippe und unklaren fieberhaften Infekten (auch Viruserkrankungen]
Glyoxal compositum (Amp.)
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Hepar comp. Heel (Amp.)
[Anregung der entgiftenden Leberfunktion bei akuten und chronischen Leber-Galle-Affektionen, z.B. Cholangitis, Cholezystitis, aber auch bei toxisch bedingten Leberfunktionsstörungen; Anregung der Leberzellfunktionen]
Hepeel N (Tabl., Amp.) [Leberfunktionsstörungen primärer und sekundärer Art; Leberschäden]
Hormeel SNT (Tropf.), **Hormeel SN** (Amp.)
[funktionelle Störungen im weiblichen Zyklus; regulierende Wirkung auf die Funktion des Inkretoriums]
Injeel-Chol (Amp.)
[Cholangitis, Cholezystitis, Cholelithiasis; Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden]
Mercurius-Heel S (Tabl.)
[Suppurationen, z.B. auch im (peri-)tonsillären Gewebe]
Mucosa compositum (Amp.)
[Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt ohne und mit Ulkus (Glossitis dissecans bzw. Lingua dissecata mit tiefen Einrissen der Zungenoberfläche)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Argentum nitricum
[Zungenbrennen bei Neurasthenie sowie ferner bei Gastritis und sonstigen chronischen Schleimhautkatarrhen sowie bei Dyspepsie]
Cantharis
[Zungenbrennen bei katarrhalischen Rachenaffektionen]
Causticum S [generell bei allen Brennschmerzen]
Sulfur (forte) S [Zungenbrennen und Zungenjucken]
Nosoden-Injeele:
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode
Suis-Organpräparate Injeele:
Hepar suis

Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Ernährung: Vitamine, Vermeidung scharf gewürzter Speisen
Physikalische Therapie: Spülungen
Ausleitende Therapie:
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf., Amp.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]
Weitere Verfahren: Symbioselenkung

Zwischenschmerz (Mittel- bzw. Intermenstrualschmerz)

Basistherapie
Orale Therapie:
Hormeel SNT (Tropf.)
[Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Parenterale Therapie:
Hormeel SN
[Harmonisierung der hormonellen Regelkreise, Zyklusstörungen]
Suppositorien:
Spascupreel S [Spasmen der Hohlorgane und der Muskulatur]
Symptomenbezogene Therapie
Apis-Homaccord (Tropf., Amp.) [Ödeme]
Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Lilium compositum Heel (Tropf.)
[entzündliche Prozesse der weiblichen Geschlechtsorgane, z.B. Adnexitis (Ovariitis, Salpingitis), Para-Myo-Endometritis, Kolpitis]
Metro-Adnex-Injeel (Amp.)
[außer Mittelschmerz = Zwischen-schmerz ferner noch Adnexitis, Para-Endometritis, Dysmenorrhoe sowie Vaginitis (= Kolpitis) und klimakterische Neurosen]
Spascupreel (Tabl., Amp.)
[Spasmen glattmuskulärer Hohlorgane (Magen, Darm, Gallenblase, Uterus, ableitende Harnwege)]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]
Einzelmittel-Injeele:
Agnus castus [katarrhalische Schleimhautaffektionen; schmerzloser Fluor albus; ggf. Spotting = Ovulationsblutung bei/mit Zwischenschmerz (schmerzhaftes Ziehen im Unterleib)]
Apis S [entzündliche ödematöse Reizzustände: Bauchfellreizung durch Plazten der Follikel]
Cimicifuga S [Dysmenorrhoe mit Krampfschmerzen]
Lachesis S [Eierstocksschmerzen (Ovarialgien); Dysmenorrhoe; Blutungsneigung; depressive Kranke]
Pulsatilla S
[besonders „Menarche-Mittel"; Wirkung auf Uterus und Adnexe]
Sepia [besonders „Klimakterium-Mittel"; u.a. auch präklimakterische Senkungsbeschwerden der Beckenorgane mit wehenartigen Schmerzen]
Intermediäre Katalysatoren:
Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)
Suis-Organpräparate Injeele:
Hypothalamus suis, Ovarium suis, Uterus suis
Begleittherapie
Auto-Sanguis-Stufentherapie:
Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia
Akupunktur, Neuraltherapie

Zysten (verschiedene Formen und Lokalisationen)

- **BESONDERE HINWEISE:**
  Diagnostische Abklärung!

Basistherapie

Orale Therapie:

Apis-Homaccord (Tropf.)
[allgemeines Zystenmittel, Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot (Tabl.), **Lymphomyosot N** (Tropf.)
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Parenterale Therapie:

Apis-Homaccord
[allgemeines Zystenmittel, Ödeme, Ekzeme]
Lymphomyosot N
[Lymphatismus, Infektanfälligkeit, Drüsenschwellungen, Ödeme]

Symptomenbezogene Therapie

Coenzyme compositum Ampullen
[Anregung blockierter Fermentsysteme bei degenerativen Erkrankungen sowie bei Fermentfehlfunktionen (zelluläre Phasen)]
Galium-Heel N (Amp.)
[zur Aktivierung der unspezifischen Abwehr, besonders bei chronischen Erkrankungen]
Traumeel S (Tropf., Tabl., Amp.)
[entzündliche und mit Entzündungen verbundene Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben]
Ubichinon compositum Ampullen
[Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen)]

Einzelmittel-Injeele:

Apis S [ödematöse Schwellungen und Schmerzen]

Nosoden-Injeele:

Bacterium coli, Medorrhinum, Ovarialcyste, Staphylococcus, Streptococcus

Intermediäre Katalysatoren:

Zitronensäurezyklus-Heel
(Sammelpackung der Katalysatoren des Zitronensäurezyklus)

Suis-Organpräparate Injeele:

Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Mamma suis, Ovarium suis, Vesica urinaria suis

Begleittherapie

Eigenbluttherapie (zur Umstimmung)

Auto-Sanguis-Stufentherapie:

Verwendet werden die parenteralen Basis-Präparate und 2-3 der symptomenbezogenen Parenteralia

Weitere Verfahren:

Ggf. Punktion (nicht bei Echinokokkuszysten!), Operation

CM

-Heel

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Postfach 10 03 49, 76484 Baden-Baden
Telefon 0 72 21/5 01-00, Fax 0 72 21/5 01-2 80
www.heel.de

Fachinformation

für Therapeuten

und Apotheker

Die Fachinformationen zu den Arzneimitteln wurden freundlicherweise von der Firma Heel, Biologische Heilmittel GmbH, Baden-Baden zur Verfügung gestellt.

Inhalt

Fachinformation für Therapeuten und Apotheker

Heel-Kombinationspräparate

1 Kombinatlonspräparate 177

Heel-Einzelmittel

2 Heel-homöopathische Einzelmittel
(in potenzenaccordenund Einzelpotenzen) 237

Cosmochema-Präparate

3 Präparateübersicht 321

Fides-Präparate

4 Präparateübersicht 333

Einzelbestandteile

5 Von Heel, Cosmochema, Fides in Kombinationspräparaten 341

Haltbarkeit der Präparate und PZN

6 Haltbarkeit der Präparate 348

7 Pharma-Zentral-Nummern von Heel, Cosmochema, Fides 349

1 Heel-Kombinationspräparate

Abropernol® N

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045534.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Artemisia abrotanum Trit. D4, Pulsatilla pratensis Trit. D4, Calcium fluoratum Trit. D12 jeweils 60 mg; Petroleum rectificatum Trit. D6, Agaricus (HAB 34) Trit. D5 (HAB, Vorschrift 3a), Acidum nitricum Trit. D8, Hamamelis virginiana Trit. D4 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündliche und ekzematöse Hauterkrankungen.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Schwangerschaft; nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern und in der Stillzeit.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Einnahme dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette einnehmen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Abrotanum (Eberraute)
Chronische Entzündungen. Hauterkrankungen.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Schlafstörungen. Nervöse Störungen.
Petroleum rectificatum (Steinöl)
Verschiedene Hautkrankheiten.
Agaricus (Fliegenpilz)
Erregungszustände. Folgen von Drogen- und Medikamentenmissbrauch.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Gut- und bösartige Gewebewucherungen.
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.

Aconitum-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522669.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION Reg.-Nr.: 2522859.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 18 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum napellus Dil. D2, Aconitum napellus Dil. D10, Aconitum napellus Dil. D30, Aconitum napellus Dil. D200, Eucalyptus globulus Dil. D10, Eucalyptus globulus Dil. D30 jeweils 0,04 g; Cephaelis ipecacuanha Dil. D10, Cephaelis ipecacuanha Dil. D30, Cephaelis ipecacuanha Dil. D200 jeweils 0,02 g; Eucalyptus globulus Dil. D2 0,04 g; Cephaelis ipecacuanha Dil. D2 0,02 g.
Die Bestandteile 1-9 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum napellus Dil. D4, Aconitum napellus Dil. D10, Aconitum napellus Dil. D30, Aconitum napellus Dil. D200, Eucalyptus globulus Dil. D4, Eucalyptus globulus Dil. D10, Eucalyptus globulus Dil. D30 jeweils 4,4 mg; Cephaelis ipecacuanha Dil. D4, Cephaelis ipecacuanha Dil. D10, Cephaelis ipecacuanha Dil. D30, Cephaelis ipecacuanha Dil. D200 jeweils 2,2 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Eucalyptus (Fieberbaum)
Entzündung der Luftwege, der Nieren, der ableitenden Harnwege.
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung. Kreislaufstörungen.

Aesculus-Heel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG** Zul.-Nr.: 6045563.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 11,3 ml; 1 ml = 29 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Aesculus hippocastanum Dil. D2 10 g.
Anwendungsgebiete: Das Anwendungsgebiet entspricht dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten; Hämorrhoiden.
Hinweis: Das Arzneimittel dient der unterstützenden Behandlung von Erkrankungen der Beinvenen. Es ersetzt nicht vom Arzt verordnete Maßnahmen, wie z. B. die Kompressionstherapie.
Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert. Blut im Stuhl bzw. aus dem Darm-After-Bereich bedürfen der Abklärung durch einen Arzt. Bei Weiterbestehen der Symptome über mehr als 6-8 Wochen sowie bei Verschlimmerung

der Symptome und/oder Auftreten von unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Enthält 70 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden.

Aletris comp.-Heel®

• **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 2522442.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aletris farinosa Trit. D4; Anamirta cocculus Trit. D4; Chamaelirium luteum Trit. D4 jeweils 45 mg; Acidum picrinicum Trit. D6 15 mg; Chininum arsenicosum Trit. D6 15 mg; Sepia officinalis Trit. D6 60 mg; Natrium chloratum Trit. D6 30 mg; Kalium carbonicum Trit. D4 45 mg. Die Bestandteile 1 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph.Eur.).
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Chininüberempfindlichkeit.
Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Aletris comp.-Heel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aletris farinosa (Sternwurzel)
Gynäkologische Erkrankungen mit Erschöpfung („China des weiblichen Genitale"). Magen- und Verdauungsschwäche (Durchfall wechselnd mit Obstipation).
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Chronische Entzündung der Atemwege, des Rippenfells. Herzerkrankungen. Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems. Allgemeine Schwäche. Menstruationsstörungen. Erkrankungen in der Schwangerschaft.
Cocculus (Kockelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel)
Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Acidum picrinicum (Pikrinsäure)
Geistige und nervöse Erschöpfungszustände. Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Chininum arsenicosum (Chininarsenit)
Schwächezustände. Blutarmut. Nervenschmerzen.
Sepia (Tintenfisch)
Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (bes. im Klimakterium).
Natrium chloratum (Natrium muriaticum)
Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände (bes. Verschlossenheit, mürrisches Wesen). Erkrankungen des Stützgewebes.

Anacardium-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG** Reg.-Nr.: 2522668.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 18 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anacardium Dil. D6, Anacardium Dil. D10, Anacardium Dil. D30, Anacardium Dil. D200 jeweils 0,04 g; Jodum Dil. D30, Jodum Dil. D200, Jodum Dil. D1000, Ipecacuanha Dil. D4, Ipecacuanha Dil. D10, Ipecacuanha Dil. D30, Ipecacuanha Dil. D200 jeweils 0,03 g. Gemeinsame Potenzierung über eine Stufe.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Anacardium/Semecarpus anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Verstimmungszustände.
Jodum (Jod)
Schilddrüsenüberfunktion (d.h. Abmagerung trotz guten Appetits; Heißhunger, Besserung nach dem Essen [typisch für Duodenitis und Ulcus duodeni!])
Ipecacuanha/Cephaelis ipecacuanha (Brechwurzel)
Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung.

Angin-Heel® SD

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046203.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum bicyanatum Trit. D8, Phytolacca americana Trit. D4, Apis mellifica Trit. D4, Arnica montana Trit. D4 jeweils 30 mg; Hepar sulfuris Trit. D6 (HAB, Vorschrift 6), Atropa belladonna Trit. D4 jeweils 60 mg. Die Bestandteile werden über die letzten 2 Stufen als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Mandelentzündungen.
Hinweis: Bei häufig wiederkehrenden Mandelentzündungen und länger als 3 Tage anhaltendem oder über 39 °C ansteigendem Fieber sollte wie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Angin-Heel SD ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler nicht anzuwenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Säuglinge 0-12 Monate	nach Rücksprache mit dem Arzt 2 mal tägl. ½ Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen	nach Rücksprache mit dem Arzt alle 1-2 Stunden, höchstens 8 mal tägl., ½ Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen
Kleinkinder 1-5 Jahre	3 mal tägl. ½ Tablette langsam im Mund zergehen lassen	alle 1-2 Stunden, höchstens 12 mal tägl., ½ Tablette langsam im Mund zergehen lassen
Schulkinder 6-11 Jahre	2 mal tägl. 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen	alle 1-2 Stunden, höchstens 8 mal tägl., 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosierung	Erwachsenendosierung

Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hydrargyrum bicyanatum (Quecksilbercyanid)
Diphtherieartige Entzündungen (Diphtheroide) der Mandeln, des Gaumens, des Rachens und des Kehlkopfes.
Phytolacca americana (Kermesbeere)
Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises (Tonsillitis als Fokus!).
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben (ödematöse Schwellungszustände).
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Schleimhäute wie Mandelabszess und chronische Mittelohrvereiterung. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung.
Atropa belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, der Haut und der Gelenke.

An-io-Injeel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Reg.-Nr.: 2522194.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum formicicum Dil. D10, Acidum formicicum Dil. D30, Acidum formicicum Dil. D200, Asclepias tuberosa Dil. D10, Asclepias tuberosa Dil. D30, Asclepias tuberosa Dil. D200), Selenicereus grandiflorus Dil. D10, Selenicereus grandiflorus Dil. D30, Selenicereus grandiflorus Dil. D200, Castoreum Dil. D10, Castoreum Dil. D30, Castoreum Dil. D200, Crataegus Dil. D10, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200, Plumbum jodatum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 6), Plumbum jodatum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 6), Plumbum jodatum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 1,1 mg; Nitroglycerinum Dil. D10, Nitroglycerinum Dil. D30, Nitroglycerinum Dil. D200, Spigelia anthelmia Dil. D10, Spigelia anthelmia Dil. D30, Spigelia anthelmia Dil. D200 jeweils 2,2 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Halten die Krankheitssymptome während der Anwendung des Arzneimittels an, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern. (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum formicicum (Ameisensäure)
Allergien.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze)
Nervenschmerzen im Brustbereich (z.B. Interkostalneuralgien – „abstrahlende bzw. ausstrahlende Herzschmerzen“).
Selenicereus grandiflorus/Cactus (Königin der Nacht)
Krämpfe der Gefäße. Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Castoreum (Bibergeil)
Nervöse Verstimmungs- und Erschöpfungszustände.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Plumbum jodatum (Bleijodid)
Allgemeine Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Nitroglycerinum/Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris (bes. auch vertebragene!). Nervenschmerz. Kopfschmerz.

Apis-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522197.00.01
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Reg.-Nr.: 2522197.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D10, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200, Apis mellifica Dil. D1000 jeweils 0,01 g; Apisinum Dil. D6, Apisinum Dil. D30, Urginea maritima Dil. D10, Urginea maritima Dil. D30 jeweils 0,025 g; Kalium stibyltartaricum Dil. D10, Kalium stibyltartaricum Dil. D30, Kalium stibyltartaricum Dil. D200 jeweils 0,04 g; Apis mellifica Dil. D2 0,01 g; Urginea maritima Dil. D2 0,025 g; Kalium stibyltartaricum Dil. D2 0,04 g. Die Bestandteile 1-11 werden mit Ethanol 43 % (m/m), die Bestandteile 12 und 13 mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D4, Apis mellifica Dil. D10, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200, Apis mellifica Dil. D1000 jeweils 1,1 mg; Apisinum Dil. D8, Apisinum Dil. D30, Scilla Dil. D4, Scilla Dil. D10, Scilla Dil. D30 jeweils 2,75 mg; Tartarus stibiatus Dil. D4, Tartarus stibiatus Dil. D10, Tartarus stibiatus Dil. D30, Tartarus stibiatus Dil. D200 jeweils 4,4 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Halten die Krankheitssymptome während der Anwendung des Arzneimittels an, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.
Gegenanzeigen: Mischung: Bei Überempfindlichkeit gegen Bienengift soll Apis-Homaccord nicht angewendet werden. Nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei Säuglingen und Kleinkindern.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei Überempfindlichkeit gegen Bienengift soll Apis-Homaccord nicht angewendet werden. Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Apis-Homaccord in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Apisinum (Bienengift)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Scilla (Meerzwiebel)
Herzschwäche (und zwar insbes. mit Neigung zu kardialen Ödemen = „feuchte Herzinsuffizienz").
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege (erschwerte Expektoration) mit Kreislaufschwäche. Eitrige Hauterkrankungen.

Arnica-Salbe-Heel S

- **SALBE** Zul.-Nr.: 24863.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica montana Ø 10 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A); Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol 96 %. Enthält 17,7 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören Myalgien nach Überlastung, Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Schmerzen, Rötungen, Schwellungen oder Überwärmen im Bereich der Arterien oder Venen können Ausdruck einer schwerwiegenden Erkrankung sein und erfordern die umgehende Rücksprache mit dem Arzt.
Bei länger als 1-2 Wochen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Arnica oder anderen Korbblütlern. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Wie alle Arzneimittel sollen auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen.
Bei der Anwendung als Salbenverband nur luftdurchlässige Materialien (z.B. Baumwolle) verwenden.
Das Arzneimittel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden soll vermieden werden.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Myalgie. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Arteria-Heel® N

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046321.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Secale cornutum Dil. D4, Viscum album Dil. D4, Barium iodatum Dil. D6, Arnica montana Dil. D12 jeweils 1 g; Nicotiana tabacum Dil. D8, Phosphorus Dil. D8 jeweils 2 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Periphere Durchblutungsstörungen.
Hinweis: Bei anhaltendem Schmerz, Blässe, Kälte und Kribbelgefühl in dem betroffenen Arm/Bein ist sofort ein Arzt aufzusuchen, da es sich um einen plötzlich aufgetretenen Verschluss der zuführenden Blutgefäße handeln kann, der notfallmäßiges Eingreifen erfordert.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Arteria-Heel N in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 10 Tropfen. Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeit lang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Secale cornutum (Mutterkorn)
Muskelkrämpfe, Krampfleiden, Lähmungen, Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten (arterielle Durchblutungsstörungen), Blutungsneigung.
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.
Barium jodatum (Bariumjodid)
Bluthochdruck und Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Phosphorus (Phosphor)
Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten. Nerven- und Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.

Aurumheel® N Tropfen

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046344.00.00

Zusammensetzung: 10,0 g (= 10,6 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium tetrachloroauratum Dil. D6 1,0 g; Valeriana officinalis Dil. D1 0,5 g; Cytisus scoparius Dil. D1, Convallaria majalis Dil. D2 jeweils 0,2 g; Arnica montana Dil. D1 0,1 g; Crataegus Ø 6,0 g.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervös bedingte Herz- und Kreislaufstörungen.
Hinweis: Bei unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder Wasseransammlungen in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.
Gegenanzeigen: Aurumheel N Tropfen sind bei Überempfindlichkeit gegen Arnica und andere Korbblütler nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes sollen Aurumheel N Tropfen bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. In Schwangerschaft und Stillzeit sollten Aurumheel N Tropfen auch wegen des Alkoholgehaltes nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb – auch wegen des Alkoholgehaltes – bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält 45 Vol.-% Alkohol.
In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Aurumheel N Tropfen nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Natrium tetrachloroauratum (Goldchlorid-Chlornatrium)
Chronische Lebererkrankungen.
Valeriana officinalis (Baldrian)
Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen.
Cytisus scoparius (Besenginster)
Herzrhythmusstörungen.
Herzschwäche (mit konsekutiver Hypotonie).
Convallaria majalis (Maiglöckchen)
Herzrhythmusstörungen. Herzschwäche.
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Myalgie nach Überlastung.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Barijodeel®

- **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 2522448.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium carbonicum Trit. D12, Strychnos ignatii Trit. D6, Stramonium Trit. D4, Kalium phosphoricum Trit. D6, Arnica montana Trit. D4 jeweils 30 mg; Causticum Hahnemanni Trit. D6, Semecarpus anacardium Trit. D6, Aconitum napellus Trit. D12 jeweils 45 mg; Calcium iodatum Trit. D4 15 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten zwei Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.).
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Barijodeel ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arnica montana (Bergwohlverleih) oder anderen Korbblütlern nicht anzuwenden. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Siehe unter “Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise”.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Das Arzneimittel enthält Lactose.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Barium carbonicum (Bariumkarbonat)
Entwicklungsverzögerung bei Kindern. Chronische Entzündung der Mandeln und der oberen Atemwege (Lymphatismus). Bluthochdruck. Gefäßverkalkung.
Strychnos ignatii/Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Datura stramonium/Stramonium (Stechapfel)
Krampfzustände. Krankheiten mit Beeinträchtigung seelischer Funktionen (z.B. Unruhe- und Erregungszustände, geschwätziges Delirium).
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände.
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Myalgien. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Causticum Hahnemanni
Chronische Ekzeme. Krampfleiden. Lähmungen. Verstimmungszustände.
Semecarpus anacardium/Anacardium (Malakkanuss)
Hautausschläge. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.
Aconitum napellus (Eisenhut)
Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Calcium iodatum (Kalziumjodid)
Lymphknotenvergrößerung sowie Mandelschwellung mit Erkältungsneigung (Lymphatismus).

Belladonna-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522793.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D2, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000, Echinacea Dil. D10, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 0,05 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D4, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000, Echinacea Dil. D10, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Lokalisierte Entzündungen, z.B. Angina tonsillaris, Furunkel, Karbunkel.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Steigerung der körpereigenen Abwehr).

Berberis-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522794.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis Dil. D10, Berberis Dil. D30, Berberis Dil. D200 jeweils 0,04 g; Colocynthis (HAB 1934) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Veratrum (HAB 1934) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)), Veratrum (HAB 1934) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)), Veratrum (HAB 1934) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)) jeweils 0,03 g; Berberis Dil. D2 0,04 g; Veratrum (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)) 0,03 g; Colocynthis (HAB 1934) Dil. D2 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)) 0,03 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-9 und 10-11 werden jeweils gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis Dil. D4, Berberis Dil. D10, Berberis Dil. D30, Berberis Dil. D200 jeweils 4,4 µl; Colocynthis Dil. D4, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200, Veratrum Dil. D5, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung:√Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Reiz- und Entzündungszustände (mit und ohne Konkremente) im Bereich des Urogenitaltraktes und der Gallenwege.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Berberis (Berberitze)
Leber- und Gallenleiden.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Durchfallerkrankungen.

Bronchalis-Heel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046404.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Trit. D4, Sticta Trit. D4, Tartarus stibiatus Trit. D4, Kreosotum Trit. D5, Ipecacuanha Trit. D4, Lobelia inflata Trit. D4 jeweils 30 mg; Hyoscyamus Trit. D4, Bryonia Trit. D4 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat (Ph.Eur.).
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der Atemwege. Bei länger anhaltenden Beschwerden, Atemnot, Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Siehe auch unter "Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Atemorgane.
Sticta (Lungenflechte)
Akute Entzündungen der Atemwege.
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Atemwege. Blutungsneigung. Verhaltensstörungen bei Kindern (Geistesabwesenheit). Altersbedingte Erkrankungen (z.B. auch Appetitlosigkeit, Kachexie; Alterspruritus, Depressionen).
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten.
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie)
Störungen des vegetativen Nervensystems (z.B. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Dyspnoe, Bronchialspasmen, Reizhusten, Singultus). Heuschnupfen. Asthma bronchiale.
Hyoscyamus (Bilsenkraut)
Spastische Zustände der Atemwege. Unruhe und Erregungszustände. Schlafstörungen.
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündungen der Atemorgane und des Rippenfells (pleuritischer Reizhusten).

Bryaconeel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046433.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Trit. D4 120 mg; Aconitum napellus Trit. D4 150 mg; Phosphorus Trit. D5 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe gemäß HAB, Vorschrift 40c.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akuter und chronischer Rheumatismus.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder wiederkehrenden Beschwerden ist eine ärztliche Abklärung erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollte Bryaconeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung des Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Bei diesem Präparat sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung und Anwendungsfehler: Bei der Einnahme größerer Mengen (z.B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündungen der Atemorgane sowie des Rippenfells und des Bauchfells (also der serösen Häute) und der Leber. Akuter und chronischer Rheumatismus.

Aconitum napellus (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen (Neuralgien und Neuritiden). Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Herzschwäche, Herzschmerzen und Kreislaufstörungen. Nerven- und Kopfschmerzen (sowie generell bei Rheumatismus). Genesungsstörungen (verzögerte bzw. verlängerte Rekonvaleszenz!) und Erschöpfungszustände.

Cactus compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Zul.-Nr.: 6045913.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D5, Kalium carbonicum Dil. D5, Cactus Dil. D3 jeweils 22 µl; Glonoinum Dil. D5 13,2 µl. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (pektanginöse Beschwerden). Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine. Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen kann es zu kurzzeitigen Beschwerden in Form von Herzklopfen, beschleunigtem Herzschlag, Blutdruckabfall oder Schwindel kommen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Die Dosierungsanleitung muss individuell vorgenommen werden. Zur Langzeitbehandlung 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.v. gegebenenfalls auch i.c. (neural) injizieren. Bei akuten Beschwerden 1 Ampulle bis zu 3 mal täglich i.v., i.m. oder s.c.
Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Cactus compositum S

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 18349.00.00

Zusammensetzung: 1 g (= 1,07 ml; 1 ml = 31 Tropfen) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenicereus grandiflorus Dil. D1, Spigelia anthelmia Dil. D3, Kalium carbonicum Dil. D3 jeweils 0,01 g; Nitroglycerinum Dil. D3 0,006 g; Crataegus Dil. D1 0,964 g.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 51 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cactus/Selenicereus grandiflorus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Krämpfe der Gefäße. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung (Endo-, Myo-, Perikarditis). Angina pectoris (auch vertebragene!). (Ausstrahlende) Nervenschmerzen. Kopfschmerzen.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen mit Wasseransammlung in Geweben. Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris!). Allgemeine Schwäche.
Glonoinum/Nitroglycerinum (Nitroglyzerin)
Bluthochdruck. Kopfschmerzen. Angina pectoris.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Calcoheel®

- **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 2522084.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D8 180 mg; Solanum dulcamara Trit. D6, Chamomilla recutitia Trit. D4 jeweils 30 mg; Carbo vegetabilis Trit. D12 60 mg. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-4 werden über zwei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Calcoheel enthält Chamomilla recutita (Kamille). Es sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen den einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen andere Korbblütler nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich je eine Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.
Dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Infekte. Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harnwege, der Gelenke, der Haut, ausgelöst durch Kälte und Nässe („Nasswettermittel").
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden (Dentitio difficilis). Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane. Heftige Schmerzzustände (infolge nervöser Überempfindlichkeit). Reizbare Verstimmungszustände (Unruhe und Erregung).
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Krampfaderleiden. Entzündung der Atemwege. Heiserkeit. Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht (Meteorismus). Schleimhautblutung (bes. des Zahnfleischs). Herz- und Kreislaufschwäche.

Calendula-Salbe-Heel S

- **SALBE** Zul.-Nr.: 24864.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Calendula officinalis Ø 10,0 g.
Sonstige Bestandteile: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Dickflüssiges Paraffin, Weißes Vaselin, Gereinigtes Wasser, Ethanol 96 %. Enthält 14,7 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Quetsch-, Riss- und Defektwunden; Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.
Gegenanzeigen: Calendula-Salbe-Heel S ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ringelblume oder andere Korbblütler und bei Überempfindlichkeit gegen einen der Hilfsstoffe nicht anzuwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Calendula-Salbe-Heel S. Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Der Kontakt der Salbe mit Augen, Schleimhäuten sowie tiefen offenen Wunden sollte vermieden werden. Nach dem Auftragen der Salbe sollten die Hände gründlich gereinigt werden.
Nebenwirkungen: Sehr selten können allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung und Juckreiz) auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen. Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautbezirke auftragen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Calendula (Ringelblume)
Hauteiterungen und schlecht heilende Wunden, Quetsch-, Riss- und Defektwunden; Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.

Cantharis compositum S

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Zul.-Nr.: 6045876.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lytta vesicatoria Dil. D4, Acidum arsenicosum Dil. D8, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D8 jeweils 22 mg. Die Bestandteile 1 und 2 sowie 3 und 4 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Begleittherapie bei Entzündungen der Harnorgane.
Hinweis: Bei Blut im Urin, bei Fieber, bei akuter Behinderung des Harnabflusses oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung von Cantharis compositum S kann verstärkt Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Aufgrund des enthaltenen Quecksilbers können allergische Reaktionen auftreten.
Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Hinweis: In der homöopathischen Literatur wird beschrieben, dass durch die vorangehende oder folgende Gabe von Coffea arabica (Coffea) eine Beeinträchtigung der therapeutischen Wirkung von Lytta vesicatoria (Cantharis) auftreten kann.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Das Arzneimittel soll langsam i.v. appliziert werden.
Nach Abbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Lytta vesicatoria/Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen der Schleimhäute, des Harn- und Geschlechtsapparates. Ergüsse in Körperhöhlen.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane (Pyelitis, Zystitis, Urethritis). Nierenentzündungen (Glomerulonephritis). Entkräftende Krankheiten.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen der Schleimhäute (z.B. Pyelitis, Zystitis, Urethritis). Mandelabszess. Nervöse Überempfindlichkeit (bes. gegenüber Schmerzen und Kälte).

Carbo compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522107.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo vegetabilis Dil. D10, Lachesis mutus Dil. D10, Melilotus officinalis Dil. D8, Atropa belladonna Dil. D6, Arnica montana Dil. D6 jeweils 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden anfangs täglich 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Beschwerden 1-3mal wöchentlich 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Herz- und Kreislaufschwäche (mit Kreislaufversagen, Kollapszuständen, Dyspnoe).
Lachesis mutus (Buschmeister)
Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Rheumatismus. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen (geschwätzig, misstrauisch; delirant) und Verstimmungszustände (Stimmungswechsel, Depressionen, Gedächtnisschwäche).
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (als Folge eines roten Blutdruckes bzw. bei Plethora).
Atropa belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Gehirnhäute.
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung.
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Cardiacum-Heel® T

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046516.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia anthelmia Trit. D4 60 mg; Gelsemium Trit. D4, Glonoinum Trit. D5, Sulfur Trit. D12, Cactus Trit. D4, Kalium carbonicum Trit. D4, Arnica Trit. D4 jeweils 30 mg. Die Bestandteile 1 bis 6 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse pektanginöse Beschwerden.
Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen oder Schweißausbrüchen verbunden sind, ist eine unverzügliche ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.
Gegenanzeigen: Cardiacum-Heel T ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arnica oder andere Korbblütler nicht anzuwenden.
Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise."
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahmen zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Angina pectoris (auch vertebragener Genese). Nervenschmerzen (ausstrahlende). Kopfschmerzen.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verstimmungszustände.
Cactus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben (Anasarka). Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris!). Allgemeine Schwäche.
Arnica (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Ceanothus-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ceanothus americanus Dil. D10, Ceanothus americanus Dil. D30, Ceanothus americanus Dil. D200, Lachesis Dil. D10, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Oberbauchsyndrom; Pankreopathie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ceanothus americanus (Säckelblume)
Drüsenerkrankungen. Milzvergrößerung (mit „Knäuelgefühl" im linken Oberbauch, Atemnot).
Lachesis (Buschmeister)
Herz- und Kreislaufschwäche. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Cerebrum compositum NM

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum suis Dil. D8, Embryo suis Dil. D10, Hepar suis Dil. D10, Placenta suis Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D6, Selenium Dil. D10, Thuja Dil. D6, Ignatia Dil. D8, Acidum phosphoricum Dil. D10, China Dil. D4, Sulfur Dil. D10, Kalium bichromicum Dil. D8, Gelsemium Dil. D4, Ruta Dil. D4, Arnica Dil. D28, Aesculus hippocastanum Dil. D4, Manganum phosphoricum Dil. D8 aquos., Magnesium phosphoricum Dil. D10, Anacardium Dil. D6, Conium Dil. D4, Hyoscyamus Dil. D6, Aconitum napellus Dil. D6, Cocculus Dil. D4, Ambra Dil. D10 jeweils 22 µl.
Die Bestandteile 1-16 und 18-24 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Abwehrsysteme bei Entwicklungsstörungen der Kinder, Legasthenie, vegetativer Dystonie, Depressionen, Arteriosklerose; nach Commotio cerebri; nach Enzephalitis; bei Neuralgien, Erregungszuständen, amyotrophischer Lateralsklerose, multipler Sklerose, Parkinsonscher Schüttellähmung, Gedächtnisschwäche, nervöser Erschöpfung, bei sonstigen geriatrischen Indikationen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls auch i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände. Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.
Selenium (Selen)
Verdauungsschwäche. Schwächezustände.
Thuja (Lebensbaum)
Verdauungsschwäche. Verstimmungszustände.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
China (Chinarinde)
Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Nervenschmerzen.
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Nervenschmerzen. Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals.
Anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose mit hypoxämischem zerebralem Schwindel). Lähmung und Lähmigkeit. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Hyoscyamus (Bilsenkraut)
Unruhe und Erregungszustände. Schlafstörungen. Spastische Zustände der Atemwege und der Verdauungswege.
Aconitum (Eisenhut)
Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Cocculus (Kockelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Hinterhauptkopfschmerz. Krämpfe. Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Ambra (Grauer Amber)
Nervöse Übererregbarkeit und nervöse Erschöpfung. Schlafstörungen. Fehlsteuerungen des vegetativen Nervensystems. Traurige Verstimmungszustände. Gefäßverkalkung. Voralterung.
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Kalium bichromicum (Kaliumdichromat)
Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, des Harnsystems. Chronische Geschwüre der Haut. Nervenschmerz und Rheumatismus.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Lähmungen und Krampfleiden.
Ruta (Weinraute)
Körperliche Überanstrengung (z.B. auch Kopfschmerzen und Asthenopie nach Überanstrengung der Augen).
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Aesculus (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden. Lenden-Kreuzbeinschmerz.

Chelidonium-Homaccord® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Chelidonium-Homaccord® NT

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 62566.00.00

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10, D30, D200 jeweils 6,6 µl; Belladonna Dil. D10, D30, D200, D1000 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10, D30, D200 jeweils 0,06 g; Belladonna Dil. D10, D30, D200, D1000 jeweils 0,03 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung zur Injektion: Cholangitis; Cholezystitis; Gallenkoliken; Hepatitis acuta und chronica; Stauungsikterus; Leberschädigung (Parenchymschäden). Als Nebenmittel bei Arrhythmia cordis.

Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Wenden Sie dieses Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt an, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 1-3 mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen des Magen-Darm-Kanals.

China-Homaccord® S

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522195.00.01
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Reg.-Nr.: 2522195.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10,0 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: China Dil. D10, China Dil. D30, China Dil. D200 jeweils 0,06 g; Sepia Dil. D30, Sepia Dil. D200, Sepia Dil. D1000 jeweils 0,04 g; China Dil. D2 0,06 g; Sepia Dil. D6 0,4 g. Die Bestandteile 1-6 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: China Dil. D4, China Dil. D10, China Dil. D30, China Dil. D200 jeweils 6,6 mg; Sepia Dil. D30, Sepia Dil. D200, Sepia Dil. D1000, Sepia Dil. D6 aquos. jeweils 4,4 mg. Die Bestandteile 1-7 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden, bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.m., s.c. oder i.v. injiziert werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
China (Chinarinde)
Fieberanfälle. Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Schleimhautblutungen. Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Nervenschmerzen (auch als Folge von pathologischen Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule).
Sepia (Tintenfisch)
Verschiedene, besonders chronische Hauterkrankungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Rheumatische Erkrankungen. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).

Cimicifuga-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522192.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Reg.-Nr.: 2522192.00.01

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 g = 19 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga racemosa Dil. D2, Cimicifuga racemosa Dil. D10 Cimicifuga racemosa Dil. D30, Cimicifuga racemosa Dil. D200 jeweils 0,08 g; Strontium carbonicum Dil. D30, Strontium carbonicum Dil. D200, Strontium carbonicum Dil. D8 jeweils 0,02 g. Die Bestandteile 2-6 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga racemosa Dil. D4, Cimicifuga racemosa Dil. D10, Cimicifuga racemosa Dil. D30, Cimicifuga racemosa Dil. D200 jeweils 8,8 mg; Strontium carbonicum Dil. D30, Strontium carbonicum Dil. D200, Strontium carbonicum Dil. D8 aquos. jeweils 2,2 mg. Die Bestandteile 1-6 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral 1-2 mal i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cimicifuga racemosa (Wanzenkraut)
Rheumatischer und wirbelsäulenbedingter Muskelschmerz. Krampfschmerz des Herzens (vertebragene Angina pectoris), des Magen-Darm-Kanals, der Gallenblase und im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.
Strontium carbonicum (Strontiumkarbonat)
Rheumatischer Schmerz (z.B. auch bei Arthrosen und Osteoporose).

Cinnamomum-Homaccord® N

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522666.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 19 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinnamomum Dil. D10, Cinnamomum Dil. D30, Cinnamomum Dil. D200, Hamamelis Dil. D10, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 0,01 g; Millefolium Dil. D4, Millefolium Dil. D10, Millefolium Dil. D30, Millefolium Dil. D200 jeweils 0,08 g; Hamamelis Dil. D3 0,01 g; Cinnamomum Ø 0,1 g. Die Bestandteile 1-10 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cinnamomum Dil. D3 11 µl; Cinnamomum Dil. D10, Cinnamomum Dil. D30, Cinnamomum Dil. D200, Hamamelis Dil. D3, Hamamelis Dil. D10, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Millefolium Dil. D4, Millefolium Dil. D10, Millefolium Dil. D30, Millefolium Dil. D200 jeweils 8,8 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Kapillare Sickerblutungen; Blutungsneigung.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Zimt und Perubalsam.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Mischung: Es können allergische Haut- und Schleimhautreaktionen auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei Blutungen anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei Blutungen 2 mal täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cinnamomum (Ceylon-Zimt)
Gebärmutterblutungen.
Hamamelis (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen (und zwar besonders venöse Blutungen).
Millefolium (Scharfgarbe)
Hellrote Blutungen (und zwar besonders präkapillare arteriovenöse [Anastomosen] Sickerblutungen). Krampfaderleiden.

Circulo-Injeel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum Dil. D10, Argentum Dil. D30, Argentum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Barium jodatum Dil. D10, Barium jodatum Dil. D30, Barium jodatum Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200, Solanum nigrum Dil. D10, Solanum nigrum Dil. D30, Solanum nigrum Dil. D200, Tabacum Dil. D10, Tabacum Dil. D30, Tabacum Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Secale cornutum Dil. D6, Secale cornutum Dil. D10, Secale cornutum Dil. D30, Secale cornutum Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Periphere Durchblutungsstörungen; Akroparästhesien.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Argentum (Silber)
Geistige Erschöpfung und Störungen des Nervensystems (z.B. Gedächtnisschwäche, Unruhe, Schwindel, Tremor) mit Lähmigkeit und Krämpfen der Gliedmaßen.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Verschleißkrankheiten. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände.
Barium jodatum (Bariumjodid)
Bluthochdruck und Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).

Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen (z.B. Lymphatismus bzw. exsudative Diathese mit feuchtkalten Händen und Füßen).
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)
Hirn- und Hirnhautreizungen (und zwar auch als Folge von zerebralen Durchblutungsstörungen mit konsekutiver Demenz und Verwirrungszuständen).
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Secale cornutum (Mutterkorn)
Muskelkrämpfe, Krampfleiden, Lähmungen.
Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten.

Cocculus-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cocculus Dil. D10, Cocculus Dil. D30, Cocculus Dil. D200, Petroleum Dil. D6, Petroleum Dil. D10, Petroleum Dil. D30, Petroleum Dil. D200, Cocculus Dil. D4 jeweils 0,5 g. Die Bestandteile 1 bis 7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Kinetosen; Erschöpfungszustände nach Überarbeitung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Cocculus (Kokkelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Reisekrankheit, -übelkeit. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Hinterhauptkopfschmerz. Krämpfe und Lähmungen. Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Petroleum (Steinöl)
Schwindel.

Coenzyme compositum Ampullen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 37573.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ascorbinsäure Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 15 % (m/m)), Thiaminchloridhydrochlorid Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Gereinigtem Wasser), Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Gereinigtem Wasser), Pyridoxinhydrochlorid Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Gereinigtem Wasser), Nicotinamid Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Acidum cis-aconiticum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Acidum citricum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 43 % (m/m)), Acidum fumaricum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 % (m/m)), 2-Oxoglutarsäure Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), DL-Apfelsäure Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Acidum succinicum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Barium oxalsuccinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 6), Natriumpyruvat Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), L-Cystein Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Gerenigtem Wasser), Pulsatilla Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10, Sulfur Dil. D10, Adenosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Gereinigtem Wasser), Nadid Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Gereinigtem Wasser), Coenzym A Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Gereinigtem Wasser), Beta vulgaris rubra Dil. D4 (HAB, Vorschrift 2a), Natrium oxalaceticum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 6), Manganum phosphoricum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 6), Magnesiumorotat Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 6), Cerium oxalicum Dil. D8 aquos., α-Liponsäure Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 6) jeweils 22 mg. Die Bestandteile 1-21 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen 1-2 ml bis zu 3 mal pro Tag s.c., i.v., oder i.m. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-2 mal pro Tag s.c., i.v. oder i.m. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit zu reduzieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Acidum citricum (Zitronensäure)
Zahnfleischbluten. Auszehrende Krankheiten.
Acidum succinicum (Bernsteinsäure)
Heuschnupfen.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Cerium oxalicum (Ceroxalat)
Erbrechen, Krampfhusten.

Colchicum compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522111.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum Dil. D6, Conium Dil. D4, Galium aparine Dil. D4, Podophyllum Dil. D4, Hydrastis Dil. D4 jeweils 22 mg.

Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Halten die Krankheitssymptome während der Anwendung des Arzneimittels an, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Colchicum (Herbstzeitlose)
Ergüsse in Körperhöhlen. Entzündung des Magen-Darm-Kanals (mit Brechreiz und Erbrechen schon beim Geruch oder Anblick der Speisen).
Conium (Gefleckter Schierling)
Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Galium aparine (Klebkraut)
Nierensteinleiden. Geschwüre besonders der Zunge.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Brechdurchfall (oft mit stinkenden spritzenden Stühlen = „Hydrantenstühle“).
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.

Colocynthis-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522805.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis (HAB 1934) Dil. D2 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)) jeweils 0,08 g; Gnaphalium polycephalum (HAB 1934) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 3a), Gnaphalium polycephalum (HAB 1934) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 3a), Gnaphalium polycephalum (HAB 1934) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 3a), Gnaphalium polycephalum (HAB 1934) Dil. D1 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,02 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2 bis 7 werden gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis Dil. D4, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200 jeweils 8,8 µl; Gnaphalium polycephalum Dil. D3, Gnaphalium polycephalum Dil. D10, Gnaphalium polycephalum Dil. D30, Gnaphalium polycephalum Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Neuralgien, besonders Ischias; Osteochondrose, besonders der LWS.
Gegenanzeigen: Mischung: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Colocynthis (Koloquinte)
Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.
Gnaphalium polycephalum (Vielköpfiges Ruhrkraut)
Rheumatismus. Ischiasschmerz. Nervenschmerzen.

Cor suis compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 37455.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cor suis Dil. D8 (HAB, V. 42), Hepar suis Dil. D8 (HAB, V. 42), Crataegus Dil. D6, Arnica montana Dil. D4, Strychnos ignatii Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D8, Ouabainum Dil. D8 (HAB, V. 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 43% (m/m)), Ranunculus bulbosus Dil. D6, Selenicereus grandiflorus Dil. D3, Nitroglycerinum Dil. D4, Kalium carbonicum Dil. D4, Kalmia latifolia Dil. D4, Spigelia anthelmia Dil. D10, Carbo vegetabilis Dil. D18, Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D8 (HAB, V. 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m)), Acidum fumaricum Dil. D8 (HAB, V. 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 86% (m/m)), Acidum DL-malicum Dil. D8 (HAB, V. 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m)), Acidum sarcolacticum Dil. D6 (HAB, V. 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 15% (m/m)), Natrium diethyloxalaceticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vorschrift 6) jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 18 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Halten die Krankheitssymptome während der Anwendung des Arzneimittels an, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.
Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen Arnica oder andere Korbblütler darf Cor suis compositum N nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist das Arzneimittel sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen täglich 1 Ampulle und bei chronischen Verlaufsformen 3-1mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen sowie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Verstimmungszustände.
Ranunculus bulbosus (Knollenhahnenfuß)
Erkrankung des Brustfelles. Rheumatismus im Brustkorbbereich (mit stechenden Brustschmerzen). Nervenschmerzen.
Cactus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Bluthochdruck. Angina pectoris.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben (Anasarka). Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris). Allgemeine Schwäche.
Kalmia (Berglorbeer)
Rheumatische und andere Herzerkrankungen. Nervenschmerzen.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris. Nervenschmerz.

Cralonin® Tropfen

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 9054.00.00

Cralonin®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Zul.-Nr.: 6046574.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Ø 7,0 g; Spigelia anthelmia Dil. D2, Kalium carbonicum Dil. D3 jeweils 0,1 g.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D2 8,8 mg; Spigelia anthelmia Dil. D1, Kalium carbonicum Dil. D2 jeweils 1,1 mg.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Altersherz, nervöse Herzstörungen; Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Angina pectoris).
Hinweis: Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen oder Schweißausbrüchen verbunden sind und sich nicht innerhalb einer halben Stunde verbessern, ist notfallmäßig ein Arzt hinzuzuziehen. Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer, vom Arzt verordneter Arzneimittel.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Altersherz, nervöse Herzstörungen, Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (Angina pectoris).
Hinweis: Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über 6 Wochen oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen empfehlen wir die Rücksprache mit Ihrem Arzt. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.
Gegenanzeigen: Mischung: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cralonin in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 45 Vol.-% Alkohol.
Zur Anwendung von Cralonin Tropfen bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierte Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Mischung: In Einzelfällen kann es im Sinne einer homöopathischen Erstverschlimmerung zu einer vorübergehenden Hautrötung im Gesicht (Flush), zu Herzjagen und Pulsfrequenzerhöhung, zu Ödembildung oder auch zu Schwindel, Übelkeit und leichten Magenbeschwerden kommen.
Hinweis: Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde höchstens 12 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Beschwerden täglich (auch alle 6-8 Stunden), sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris. Nervenschmerz.
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben (Anasarka). Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems (vertebragene Angina pectoris). Allgemeine Schwäche.

Cruroheel® S

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046657.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum oxydatum rubrum Trit. D8 (HAB, Vorschrift 6), Apis mellifica Trit. D4, Lycopodium clavatum Trit. D4, Acidum silicicum Trit. D6 jeweils 30 mg; Hamamelis virginiana Trit. D4, Carbo vegetabilis

Trit. D8, Pulsatilla pratensis Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür).
Hinweis: Cruroheel S dient der unterstützenden Behandlung und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Maßnahmen wie z.B. eine Kompressionsbehandlung der Beine. Bei Rötung der Wundränder sowie bei unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cruroheel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hydrargyrum oxydatum rubrum (Rotes Quecksilberoxyd)
Haut- und Schleimhauteiterungen.
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben. Allergien.
Lycopodium clavatum (Bärlapp)
Krampfaderleiden. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen.
Acidum silicicum (Silicea)
Chronische Entzündungen. Eiterungen und Fistelbildung der Haut, der Knochen und Gelenke. Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke.
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hautblutungen.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Krampfaderleiden.
Pulsatilla pratensis (Kuhschelle)
Krampfaderleiden. Schlafstörungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Cutis compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Reg.-Nr.: 37465.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cutis suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Hepar suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Splen suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Placenta suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula suprarenalis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Funiculus umbilicalis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Thuja Dil. D8, Galium aparine Dil. D6, Selenium Dil. D10, Thallium sulfuricum Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 15 % (m/m)) D13, Ignatia Dil. D6, Sulfur Dil. D10, Cortisonacetat Dil. D28 (HAB, Vorschrift 6a), Urtica (HAB 34) urens Dil. D4 (HAB, Vorschrift 2a), Acidum phosphoricum Dil. D6, Calcium fluoratum Dil. D13, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D13, Aesculus Dil. D6, Ichthyolum Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 15 % (m/m)) D28, Ledum Dil. D4, Arctium lappa (HAB 34) Dil. D6 (HAB, Vorschrift 2a), Acidum formicicum Dil. D198, 2-Oxoglutarsäure Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)) D10, Acidum fumaricum Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 % (m/m)) D10, Natrium oxalaceticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathsiches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei bekannter Allergie gegen Ichtyol (Ammoniumbituminosulfonat) soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Schwangerschaft und Stillzeit: Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann verstärkt Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Aufgrund des enthaltenen homöopathischen Wirkstoffes Mercurius solubilis können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopatischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen (bes. bei Neigung zu proliferativen Prozessen wie Warzen, Papillomen, Naevi). Verstimmungszustände.
Galium aparine (Klebkraut)
Geschwüre (besonders der Zunge).
Selenium (Selen)
Hautausschläge, fettige Haut. Verdauungsschwäche.
Thallium sulfuricum (Thalliumsulfat)
Haarausfall.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen (vor allem bei unreiner Haut mit Pruritus und schlechtem Körpergeruch). Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden. Nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Urtica urens (Kleine Brennnessel)
Nesselsuchtartige Hauterkrankungen.
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände. Kalkstoffwechselstörungen.
Calcium fluoratum (Calciumfluorid)
Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Hauterkrankungen. Lymphdrüsenentzündungen. Entkräftende Krankheiten.
Aesculus (Rosskastanie)
Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden.
Ichthyolum (Ammoniumbituminosulfonat)
Eiternde Hautentzündungen.

Ledum (Sumpfporst)
Stich- und Bissverletzungen (auch Folgen von Insektenstichen – Bienen, Wespen, Hornissen – bzw. Ameisen- oder Hummelbissen). Haut- und Schleimhautblutungen.
Arctium lappa (Klette)
Nässende Hautausschläge.
Acidum formicicum (Ameisensäure)
Ekzeme. Allergien.

Diarrheel® SN

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046717.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitricum Trit. D8, Acidum arsenicosum Trit. D8, Colchicum autumnale Trit. D6, Colocynthis (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Hydrargyrum bichloratum Trit. D8, Podophyllum Trit. D6, Veratrum album Trit. D4 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten zwei Stufen.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung krampfartiger Beschwerden bei Durchfall.
Bei Durchfallerkrankungen muss, insbesondere bei Kindern, auf Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Durchfälle bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern die Rücksprache mit dem Arzt. Auch Erwachsene sollten bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutreinigungstee oder Temperaturerhöhungen einhergehen sowie bei wiederkehrenden Durchfällen einen Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Siehe auch unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Nach Einnahme kann verstärkt Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Aufgrund des enthaltenen homöopathischen Wirkstoffes Hydrargyrum bichloratum (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. In diesem Fall ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Verstimmungszustände.
Colchicum (Herbstzeitlose)
Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung des Dick- und Enddarmes.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Brechdurchfall.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Kreislaufversagen. Durchfallerkrankung.

Discus compositum N mit Kalmia

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046367.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6046338.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalmia latifolia Dil. D8, Hydrargyrum oxidatum rubrum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Asa foetida Dil. D8 jeweils 0,1 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalmia latifolia Dil. D8, Hydrargyrum oxidatum rubrum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Asa foetida Dil. D8 jeweils 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemäß HAB.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Gelenk- und Bindegewebserkrankungen.
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Mischung: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Wie alle Arzneimittel sollte Discus compositum N mit Kalmia in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Discus compositum N mit Kalmia nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Bei diesem Präparat sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich 5 bis 10 Tropfen einnehmen.
Anwendungshinweis bei Kindern: Bei Säuglingen bis zum 1. Lebensjahr 10 Tropfen, bei Kleinkindern bis zum 6. Lebensjahr 20 Tropfen, bei Kindern zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr 30 Tropfen in ein halbes Glas Wasser geben. Davon 1 bis 3 mal täglich, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich, jeweils 1 Teelöffel geben.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. oder i.v. Bei chronischen Verlaufsformen 1 Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Mischung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml Flasche werden 8,3 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Kalmia latifolia (Berglorbeer)
Rheumatische und andere Herzerkrankungen. Rheumatismus. Nervenschmerzen.
Mercurius praecipitatus ruber (Rotes Quecksilberoxyd)
Haut- und Schleimhauteiterungen.
Asa foetida (Stinkasant)
Knochenerkrankungen.

Droperteel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046746.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Trit. D4 90 mg; Lachesis mutus Trit. D12, Carbo vegetabilis Trit. D12 jeweils 75 mg; Dactylopius coccus Trit. D4, Kalium carbonicum Trit. D12 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Bronchitis, Begleittherapie bei Keuchhusten.
Hinweis: Bei länger als 3 Tage anhaltendem oder über 39 °C ansteigendem Fieber, bei eitrigem oder blutigem Hustenauswurf, bei Atemnot sowie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, 1 Tablette, im Mund zergehen lassen.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
0-3 Jahre	2 mal tägl. ½ Tablette	4 mal tägl. ½ Tablette
4-6 Jahre	3 mal tägl. ½ Tablette	6 mal tägl. ½ Tablette
7-11 Jahre	2 mal tägl. 1 Tablette	6 mal tägl. ½ Tablette

Die Tabletten im Mund zergehen lassen.
Bei Säuglingen und Kleinkindern kann die entsprechende Einzeldosis auch mit etwas Flüssigkeit vermischt eingegeben werden.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Drosera (Sonnentau)
Entzündungen der Atemwege und besonders Keuchhusten.
Lachesis mutus (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute. Infektionskrankheiten. Herz- und Kreislaufschwäche.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Entzündung der Atemwege. Heiserkeit. Herz- und Kreislaufschwäche.
Dactylopius coccus/Coccus cacti (Cochenille)
Entzündungen der Atemwege (typisch: Krampfhusten mit zähem, strähnigem, fadenziehendem Schleim).
Kalium carbonicum (Kaliumkarbonat)
Chronische Entzündung der Atemwege und des Rippenfells. Wasseransammlung in Geweben. Allgemeine Schwäche.

Drosera-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 37465.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Dil. D2, Drosera Dil. D10, Drosera Dil. D30, Drosera Dil. D200, Cuprum aceticum Dil. D4, Cuprum aceticum Dil. D10, Cuprum aceticum Dil. D30, Cuprum aceticum Dil. D200 jeweils 0,05 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Drosera Dil. D4, Drosera Dil. D10, Drosera Dil. D30, Drosera Dil. D200, Cuprum aceticum Dil. D6, Cuprum aceticum Dil. D10, Cuprum aceticum Dil. D30, Cuprum aceticum Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Pertussis; Bronchiolitis; asthmatoide Bronchitis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Drosera (Sonnentau)
Entzündungen der Atemwege und besonders Keuchhusten.
Cuprum aceticum (Kupferazetat)
Erkrankungen mit Krampfneigung. Asthma. Keuchhusten.

Dulcamara-Homaccord®

• **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522305.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 19 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Dulcamara Dil. D2, Dulcamara Dil. D10, Dulcamara Dil. D30, Dulcamara Dil. D200, Aranea diadema (HAB 34) Dil. D6 (HAB, Vorschrift 4b Ø mit Ethanol 86 % (m/m)) , Aranea diadema (HAB 34) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 4b Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Aranea diadema (HAB 34) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4b mit Ethanol 86 % (m/m)), Aranea diadema (HAB 34) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4b mit Ethanol 86 % (m/m)) jeweils 0,05 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen. Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Infekte. Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harnwege, der Gelenke, der Haut, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Aranea diadema (Kreuzspinne)
Periodisch auftretende Nervensschmerzen. Anfallsweise Fieber. Gefühlsempfindungsstörung (allgemeine Frostigkeit).
Schmerzhafte Gelenkerkrankung.

Duodenoheel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045209.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Semecarpus anacardium Trit. D4, Argentum nitricum Trit. D6, Cephaelis ipecacuanha Trit. D4, Iodum Trit. D6 jeweils 30 mg; Lachesis mutus Trit. D12, Petroleum rectificatum Trit. D6, Robinia pseudacacia Trit. D4 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Magenübersäuerung, zur unterstützenden Behandlung von Entzündungen und Geschwüren des Zwölffingerdarms.
Hinweis: Bei Blut im Stuhl (Teerstuhl), bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten sowie bei allen unklaren Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Säuglingen und Kleinkindern. Bei Jodüberempfindlichkeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Im Allgemeinen 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Semecarpus anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Verstimmungszustände.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege.
Cephaelis ipecacuanha (Brechwurzel)
Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung.
Iodum (Jod)
Schilddrüsenüberfunktion.
Anmerkung: Hierfür ist charakteristisch Heißhunger sowie Abmagerung trotz guten Appetits, also Symptome, die auch betr. Duodenitis mit und ohne Ulkus typisch sind (Nüchternschmerz, Besserung durch Essen).
Lachesis mutus (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Petroleum rectificatum (Steinöl)
Entzündungen des Magen-Darm-Kanals.
Robinia pseudacacia (Scheinakazie)
Magenübersäuerung. Durchfall.

Echinacea compositum SN

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D3, Aconitum napellus Dil. D3, Sanguinaria Dil. D4, Sulfur Dil. D8, Baptisia Dil. D4, Lachesis Dil. D10, Bryonia Dil. D6, Eupatorium perfoliatum Dil. D6, Pulsatilla Dil. D8, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8, Thuja Dil. D8, Phosphorus Dil. D8, Cortisonacetat Dil. D13, Streptococcinum Dil. D18, Staphylococcinum Dil. D18, Phytolacca Dil. D6, Zincum metallicum Dil. D10, Gelsemium Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D4, Arnica Dil. D4, Acidum arsenicosum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D8, Euphorbium Dil. D6 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der körpereigenen Abwehr bei: Fieber und Entzündungen, (Pocken-)Impf-Enzephalitis, Grippe, Angina, Furunkeln, Abszessen, Phlegmonen, Fokaltoxikosen, Gingivitis, Stomatitis, Sinusitis, Gastroenteritis, Enterocolitis, Zystitis, Pyelitis, Kolpitis, Fluor albus, Adnexitis, Glomerulonephritis, Fisteleiterungen, Osteomyelitis, Otitis media, chronischem Hirnabszess, Meningitis, Milzbrand, Karbunkel, Mononukleose, Hautkrankheiten, Mastitis.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler und Giftsumachgewächse.
Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.

Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Echinacea compositum SN nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Aufgrund des Bestandteiles kanadische Blutwurz soll Echinacea compositum SN in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
In Einzelfällen sind während der Behandlung mit sanguinarinhaltigen Arzneimitteln Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, zur allgemeinen Anregung der Abwehrsysteme 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren. Die intramuskuläre oder intravenöse Injektion und die jeweilige Dosierung müssen individuell dem Krankheitsfall und der Reaktion des Patienten angepasst werden.
Bei Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte (Transaminasen) kontrolliert werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:

Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).

Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.

Sanguinaria (Kanadische Blutwurzel)
Migränöse Kopfschmerzen. Entzündungen der Atmungsorgane. Rheumatismus.

Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Baptisia (Wilder Indigo)
Schwere, fiebrige Infektionen. Allgemeine Blutvergiftung (Sepsis bzw. Septikämie häufig bei Abwehrschwäche). Verwirrtheitszustände.

Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Drüsenerkrankungen. Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung. Venenentzündungen. Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Rheumatismus. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells, des Bauchfells (also der serösen Häute) sowie der Leber. Akuter und chronischer Rheumatismus (Synovitis, Synovialitis!).

Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf)
Grippe, grippeähnliche fieberhafte Erkrankungen. Fieberhafte Erkrankungen des Leber-Galle-Systems. Rheumatismus.

Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der Augen, der Mundhöhle, der Mandeln, des Dick- und Enddarmes, der Nieren, der ableitenden Harnwege, der Scheide.

Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.

Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen. Rheumatismus. Nerven- und Kopfschmerzen. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane, Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Phytolacca (Kermesbeere)
Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen, besonders der Atemorgane. Entzündung und Erkrankung der Brustdrüse. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

Zincum metallicum (Zink)
Krämpfe und Nervenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule, des Gehirns und des Rückenmarks. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände. Schlafstörungen.

Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Infektionskrankheiten. Lähmungen und Krampfleiden.

Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute wie Furunkel, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.

Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Juckende Hautkrankheiten. Fieberhafte Infektionskrankheiten mit Benommenheit. Entzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Entzündungen der Augen. Regelstörungen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Lähmigkeiten, Lähmungen. Schwindel. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.

Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Verstimmungszustände.

Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.

Euphorbium (Euphorbium)
Akute Entzündung der Haut. Entzündung der Atemwege (und zwar besonders der oberen Luftwege: Rhinitis, Sinusitis).

Engystol®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 44442.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Trit. D6, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D10, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D30 jeweils 75 mg; Sulfur Trit. D4, Sulfur Trit. D10 jeweils 37,5 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten und grippale Infekte.
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden, unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Engystol in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von Engystol Tabletten können in einzelnen Fällen Hautausschläge auftreten. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und der behandelnde Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal täglich 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen. Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Kleinkinder 1-6 Jahre	nach Rückspr. mit dem Arzt 3 mal tägl. ½ Tabl. unter der Zunge zergehen lassen	nach Rückspr. mit dem Arzt alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal tägl., ½ Tabl. unter der Zunge zergehen lassen
Schulkinder 6-12 Jahre	2 mal tägl. 1 Tabl. unter der Zunge zergehen lassen	alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 8 mal tägl., 1 Tabl. unter der Zunge zergehen lassen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Die Tabletten unter der Zunge zergehen lassen. Bei Kleinkindern kann die entsprechende Einzeldosis auch mit etwas Flüssigkeit vermischt eingegeben werden.
Engystol sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche eingenommen werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung:
Bei einer erheblichen Überschreitung der vorgesehenen Dosierung kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Engystol®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Zul.-Nr.: 6045221.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Dil. D6, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D10, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D30 jeweils 6,6 mg; Sulfur Dil. D10, Sulfur Dil. D4 jeweils 3,3 mg. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten und grippale Infekte.
Hinweis: Bei anhaltenden und unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Wie alle Arzneimittel sollte Engystol in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von Engystol kann es in seltenen Fällen zu juckenden Hautausschlägen kommen. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und der behandelnde Arzt aufzusuchen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Beschwerden 1 mal täglich 1 Ampulle (1,1 ml) bis zu einer Woche i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollen ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)
Virusinfektionen.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Erigotheel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522089.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (=1,1g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Origanum vulgare Dil. D6, Origanum vulgare Dil. D10, Origanum vulgare Dil. D30 jeweils 6,6 mg; Centaurium erythraea e planta tota Dil. D10 (HAB, V. 3a), Centaurium erythraea e planta tota Dil. D30 (HAB, V. 3a) jeweils 4,4 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral nur 1 mal 1 bis 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Euphorbium comp. SN

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046781.00.01
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6046781.00.00

Euphorbium comp. Nasentropfen SN

- **DOSIERSPRAY OHNE TREIBGAS**

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Luffa operculata Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10, Hydrargyrum biiodatum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D10, Euphorbium Dil. D3, Pulsatilla pratensis Dil. D2 jeweils 0,1 g. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla pratensis Dil. D2, Luffa operculata Dil. D6, Hepar sulfuris Dil. D10, Euphorbium Dil. D4, Hydrargyrum biiodatum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D10 jeweils 22 mg. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Nasentropfen: 100 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphorbium Dil. D4, Pulsatilla Dil. D2, Luffa operculata Dil. D2, Mercurius bijodatus Dil. D8, Hepar sulfuris Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D10 jeweils 1 g. Die Bestandteile 1-3 werden über die letzte Stufe, die Bestandteile 4-6 über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke jeweils gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Mischung, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Sinusitis), Tubenkatarrhe.
Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Nasentropfen: Schnupfen unterschiedlicher Ursache (viral, bakteriell, allergisch), trockener Schnupfen, chronischer Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung, zur Erleichterung der Nasenatmung bei Heuschnupfen.
Gegenanzeigen: Mischung: Bei Schilddrüsenerkrankungen Euphorbium comp. SN nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphorbium comp. SN in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen nicht angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei Schilddrüsenerkrankungen Euphorbium comp. SN nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphorbium comp. SN in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nasentropfen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion, Nasentropfen: Keine.
Nebenwirkungen: Mischung, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Nasentropfen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Mischung, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Nasentropfen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen; bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 10 Tropfen einnehmen.
Kinder erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Kleinkinder 1-6 Jahre	3 mal täglich 5 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 5 Tropfen einnehmen
Schulkinder 6-12 Jahre	3 mal täglich 7 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 7 Tropfen einnehmen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Zuständen täglich 1 Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle s.c., i.m., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Kinder ab 12 Jahre erhalten die Erwachsenendosierung.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Nasentropfen: Soweit nicht anders verordnet, 3-5 mal täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen, bei Kindern unter 6 Jahren 3-4 mal täglich 1 Sprühstoß. Das Präparat kann unbedenklich auch bei Säuglingen angewendet werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Nasentropfen: Dosierspray mit 20 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Euphorbium (Euphorbium)
Entzündung der Atemwege (und zwar besonders der oberen Luftwege: Rhinitis und Sinusitis).
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen des Auges (Konjunktivitis).Mittelohrentzündungen. Masern. Kopfschmerzen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Luffa operculata (Luffaschwamm)
Schnupfen. Heuschnupfen.
Hydrargyrum biiodatum/Mercurius bijodatus (Quecksilberjodid)
Eitrige Schleimhautentzündungen der Nase, des Rachens, der Mandeln und der Augen.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Schleimhäute, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Migräne.

Ferrum-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522796.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D200, Ferrum phosphoricum Dil. D30, Ferrum phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,02 g; Ferrum sulfuricum Dil. D10, Ferrum sulfuricum Dil. D30, Ferrum sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,01 g; Ferrum sesquichloratum Dil. D4, Ferrum sesquichloratum Dil. D10, Ferrum sesquichloratum Dil. D30, Ferrum sesquichloratum Dil.

D200 jeweils 0,005 g; Spiraea ulmaria Dil. D10, Spiraea ulmaria Dil. D30, Spiraea ulmaria Dil. D200 jeweils 0,045 g; Ferrum metallicum Dil. D8,Ferrum phosphoricum Dil. D8 jeweils 0,02 g; Ferrum sulfuricum Dil. D6 0,01 g; Spiraea ulmaria Dil. D2 0,045 g.
Die arzneilich wirksamen Bestandteile 15 bis 17 werden gemeinsam über die letzten zwei Stufen und die arzneilich wirksamen Bestandteile 1 bis 14 gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D10, Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D200, Ferrum phosphoricum Dil. D10, Ferrum phosphoricum Dil. D30, Ferrum phosphoricum Dil. D200 jeweils 2,2 µl; Ferrum sulfuricum Dil. D10, Ferrum sulfuricum Dil. D30, Ferrum sulfuricum Dil. D200 jeweils 1,1 µl; Ferrum sesquichloratum Dil. D6, Ferrum sesquichloratum Dil. D10, Ferrum sesquichloratum Dil. D30, Ferrum sesquichloratum Dil. D200 jeweils 0,55 µl; Spiraea ulmaria Dil. D4, Spiraea ulmaria Dil. D10, Spiraea ulmaria Dil. D30, Spiraea ulmaria Dil. D200 jeweils 4,95 µl; Ferrum sulfuricum Dil. D8 1,1 µl. Die Bestandteile 1 bis 17 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Schulter-Arm-Syndrom; Epicondylitis.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ferrum metallicum (Eisen)
Nervenschmerzen.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke.
Ferrum sulfuricum (Eisensulfat)
Schilddrüsenüberfunktion.
Ferrum sesquichloratum (Ferrum muriaticum)
Rheumatismus der rechten Schulter.
Spiraea ulmaria (Mädesüß)
Rheumatismus (insbesondere auch Muskelrheumatismus und Epicondylitis; „Salicylsäure der Homöopathie“).

Galium-Heel® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522076.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Galium aparine Dil. D3, Galium album (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 2a) jeweils 0,44 µl; Sedum acre Dil. D3, Sempervivum tectorum Dil. D4, Clematis Dil. D4, Thuja Dil. D3, Caltha palustris Dil. D3, Ononis spinosa Dil. D4, Juniperus communis Dil. D4, Hedera helix Dil. D4, Echinacea Dil. D5, Phosphorus Dil. D8, Aurum metallicum Dil. D10, Apis mellifica Dil. D12, Acidum nitricum Dil. D6 jeweils 0,55 µl; Urtica (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 2a) 0,22 µl; Calcium fluoratum Dil. D8 aquos., Argentum Dil. D8 aquos., Betula alba (HAB 34) Dil. D2 (HAB, Vorschrift 1a) jeweils 0,55 µl. Die Bestandteile 1-16 werden über 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen parenteral 1 Ampulle täglich i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Galium aparine (Klebkraut)
Nierensteinleiden. Geschwüre (fördert Granulationen!) besonders der Zunge.
Sedum acre (Mauerpfeffer)
Afterschmerzen (z.B. Hämorrhoiden und Fissura ani).
Sempervivum tectorum (Hauswurz)
Knotige Verhärtungen in Haut, Zunge und Brust. Warzen.
Clematis (Aufrechte Waldrebe)
Hautausschläge. Lymphdrüsenschwellung. Lid- und Bindehautentzündung. Entzündung der Harnblase, der Harnröhre, der Hoden, der Brustdrüse.
Thuja (Lebensbaum)
Haut- und Schleimhauterkrankungen (und zwar besonders bei Krankheiten mit Neigung zu proliferativen Prozessen wie Warzen, Kondylome, Papillome, Polypen). Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.
Caltha palustris (Sumpfdotterblume)
Hautausschläge (wie Pemphigus vulgaris und Pusteln).
Ononis spinosa (Hauhechel)
Wassersucht.
Juniperus communis (Wacholder)
Ausscheidungsstörungen der ableitenden Harnorgane. Dyspeptische Beschwerden.
Hedera helix (Efeu)
Akute Entzündungen der Atemwege (z.B. Nasen-[Nebenhöhlen]Katarrhe), der Verdauungsorgane. Schilddrüsenüberfunktion. Rheumatische Erkrankungen.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Steigerung der körpereigenen Abwehr).

Calcium fluoratum (Kalziumfluorid)
Entzündungen der oberen Luftwege und des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten. Rheumatismus, Wirbelsäulenbeschwerden. Knochenentzündungen und -entkalkungen. Nerven- und Kopfschmerzen, Lähmungen. Entwicklungsstörungen bei Kindern. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane, Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.
Aurum metallicum (Gold)
Schleimhauteiterungen. Knochen- und Knochenhautentzündungen. Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Angina pectoris. Verhärtung drüsiger Organe. Depressive Verstimmungszustände.
Argentum (Silber)
Chronische Rachen- und Kehlkopfentzündung. Geistige Erschöpfung und Störungen des Nervensystems mit Lähmigkeit und Krämpfen der Gliedmaßen. Entzündliche Schwellung der Eierstöcke.
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.
Urtica urens (Kleine Brennnessel)
Nesselsuchtartige Hauterkrankungen. Nierenleiden. Gicht.

Gastricumeel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045333.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitricum Trit. D6, Acidum arsenicosum Trit. D6 jeweils 30 mg; Pulsatilla pratensis Trit. D4, Strychnos nux-vomica Trit. D4, Carbo vegetabilis Trit. D6, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Magenentzündung, Sodbrennen, Blähsucht.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Nicht bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, 1 Tablette, im Mund zergehen lassen.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Säuglinge 0-12 Monate	nach Rücksprache mit dem Arzt 2 mal täglich ½ Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen.	nach Rücksprache mit dem Arzt alle 1-2 Stunden, höchstens 8 mal täglich, ½ Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen.
Kleinkinder 1-5 Jahre	3 mal täglich ½ Tablette langsam im Mund zergehen lassen.	alle 1-2 Stunden, höchstens 12 mal täglich, ½ Tablette langsam im Mund zergehen lassen.
Schulkinder 6 - 11 Jahre	2 mal täglich 1 Tablette langsam Mund im zergehen lassen.	alle 1-2 Stunden, höchstens 8 mal täglich, 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosierung	Erwachsenendosierung

Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände (wie Erschöpfung, Unruhe, Angst, Verzweiflung).
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche (generelles Schleimhautmittel). Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände (melancholischer Hypochonder mit erhöhter Reizbarkeit).
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht. Schleimhautblutungen.
Stibium sulfuratum nigrum (Schwarzer Spießglanz)
Verdauungsstörungen (wie Dyspepsie, Appetitlosigkeit mit Widerwillen gegen alle Speisen, Völlegefühl).

Gelsemium-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522778.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium Dil. D10, Gelsemium Dil. D30, Gelsemium Dil. D200 jeweils 0,04 g; Rhus toxicodendron Dil. D3, Rhus toxicodendron Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D30, Rhus toxicodendron Dil. D200, Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 0,03 g; Gelsemium Dil. D2 0,04 g; Cimicifuga Dil. D2 0,03 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1 bis 10 sowie 11 und 12 werden jeweils gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium Dil. D4, Gelsemium Dil. D10, Gelsemium Dil. D30, Gelsemium Dil. D200 jeweils 4,4 µl; Rhus toxicodendron Dil. D5, Rhus toxicodendron Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D30, Rhus toxicodendron Dil. D200, Cimicifuga Dil. D4, Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Zervikalsyndrom; Migraine cervicale (Osteochondrose der HWS); Neuralgien verschiedener Lokalisation.
Gegenanzeigen: Mischung: Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen (besonders auch Okzipital- und Trigeminusneuralgien). Nervöse Störungen.
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Lähmigkeiten, Lähmungen. Schwindel. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.
Cimicifuga (Wanzenkraut)
Rheumatischer und wirbelsäulenbedingter Muskelschmerz. Krampfschmerz des Herzens und im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.

Ginseng compositum N

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ginseng Dil. Ø 20 g; Hydrastis Dil. D10, Colchicum Dil. D10, Conium Dil. D10, Pulsatilla Dil. D10, Kreosotum Dil. D10, Viscum album Dil. D8, Sulfur Dil. D10, China Dil. D10, Galium aparine Dil. D8, Sempervivum tectorum Dil. D8, Coenzym A Dil. D10, Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz Dil. D10, Nadid Dil. D10, Acidum sarcolacticum Dil. D2, Natrium oxalaceticum Dil. D8 jeweils 1 g. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die 2 letzten Stufen mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Verbesserung der Konstitution bei Giftbelastungen der Abwehrsysteme, auch bei Neoplasien.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-6 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Ginseng (Ginsengwurzel)
Rheumatismus. Schwächezustände.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Lähmung und Lähmigkeit. Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Blutungsneigung. Verhaltensstörungen bei Kindern. Altersbedingte Erkrankungen.
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
China (Chinarinde)
Entzündungen der Atemwege. Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Schleimhautblutungen. Blutarmut. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag. Nervenschmerzen.
Galium aparine (Klebkraut)
Nierensteinleiden. Geschwüre (fördert Granulationen) besonders der Zunge.
Sempervivum tectorum (Hauswurz)
Knotige Verhärtungen in Haut, Zunge und Brust. Warzen.

Glonoin-Homaccord® N Tropfen

• **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522813.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,6 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glonoinum Dil. D10, Glonoinum Dil. D30, Lycopus virginicus Dil. D4, Lycopus virginicus Dil. D10, Lycopus virginicus Dil. D30, Glonoinum Dil. D3, Lycopus virginicus Dil. D1 jeweils 0,01 g; Crataegus Ø 6,0 g. Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 45 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.
Lycopus virginicus (Wolfsfuß)
Herzklopfen, besonders bei Schilddrüsenüberfunktion.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Glyoxal compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522070.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glyoxal Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D5 mit gereinigtem Wasser) 22 mg; Methylglyoxal Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D5 mit gereinigtem Wasser) 22 mg. Die Bestandteile werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Eventuell auftretende kurzfristige Temperaturerhöhungen sollten vor erneuter Injektion abgeklungen sein. Bei bestehenden fieberhaften Erkrankungen soll Glyoxal compositum nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Graphites-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Reg.-Nr.: 2522086.00.00

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D10, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D10, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 5,5 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung: Ekzeme, besonders trockene, chronische. Zur Langzeittherapie bei Narben, Keloiden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuell Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Graphites (Reißblei)
Verdauungsschwäche (insbesondere chronische [atonische] Obstipation). Altersbedingte Erkrankungen. Ekzeme und andere Erkrankungen der Haut (z.B. Narben und Keloide). Entzündung der Schleimhäute.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.

Gripp-Heel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045385.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Trit. D4 120 mg; Bryonia Trit. D4, Lachesis Trit. D12 jeweils 60 mg; Eupatorium perfoliatum Trit. D3, Phosphorus Trit. D5 jeweils 30 mg. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1 bis 5 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte.
Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei eitrigem Auswurf, bei Fieber oder atemabhängigen Schmerzen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Gripp-Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Nach Besserung der akuten Beschwerden 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Kinder zwischen dem 6. und dem 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Die Dauer der Anwendung ist ohne ärztlichen Rat auf 1-2 Wochen zu begrenzen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Gripp-Heel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Zul.-Nr.: 6045362.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum napellus Dil. D3 4,4 µl; Lachesis Dil. D11, Bryonia Dil. D3 jeweils 2,2 µl; Eupatorium perfoliatum Dil. D2, Phosphorus Dil. D4 jeweils 1,1 µl. Die Bestandteile 1-3 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte.
Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei eitrigem Auswurf, bei Fieber oder atemabhängigen Schmerzen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Gripp-Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden 1 Ampulle (1,1 ml) pro Tag intravenös, intramuskulär, subkutan oder intrakutan anwenden, nach Besserung der akuten Beschwerden 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle (1,1ml) intravenös, intramuskulär, subkutan oder intrakutan anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Dauer der Anwendung ist ohne ärztlichen Rat auf 1-2 Wochen zu begrenzen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells und des Bauchfells (also der serösen Häute) sowie der Leber. Akuter und chronischer Rheumatismus (Grippe-Rheumatoide).
Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Infektionskrankheiten. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf)
Grippe, grippeähnliche fieberhafte Erkrankungen. Fieberhafte Erkrankungen des Leber-Galle-Systems. Rheumatismus.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen (verzögerte Rekonvaleszenz!) und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen. Nerven- und Kopfschmerzen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Hamamelis-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522139.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 19 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis Dil. D2, Hamamelis Dil. D30, Hamamelis Dil. D200 jeweils 0,08 g; Carduus marianus Dil. D6, Carduus marianus Dil. D30, Carduus marianus Dil. D200 jeweils 0,02 g. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.
Carduus marianus/Silybum marianum (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens). Hämorrhoiden.

Hamamelis-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522139.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis virginiana Dil. D4, Hamamelis virginiana Dil. D30, Hamamelis virginiana Dil. D200 jeweils 8,8 µl; Silybum marianum Dil. D6, Silybum marianum Dil. D30, Silybum marianum Dil. D200 jeweils 2,2 µl. Die Bestandteile werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Hamamelis-Homaccord ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Carduus marianus (Mariendistel) oder andere Korbblütler nicht anzuwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 110 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.
Carduus marianus/Silybum marianum (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens). Hämorrhoiden.

Hamamelis-Salbe-Heel S

- **SALBE** Zul.-Nr.: 19799.00.00

Zusammensetzung: 10,0 g enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Hamamelis virginiana Ø 1,0 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A); Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol. Enthält 14,5 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist Rücksprache mit Ihrem Arzt erforderlich.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hamamelis-Salbe-Heel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautbezirke auftragen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tube mit 50 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfadern, Haut- und Schleimhautblutungen.

Hepar comp. Heel

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar suis Dil. D8, Cyanocobalaminum Dil. D4, Duodenum suis Dil. D10, Thymus suis Dil. D10, Colon suis Dil. D10, Vesica fellea suis Dil. D10, Pankreas suis Dil. D10, China Dil. D4, Lycopodium Dil. D4, Chelidonium Dil. D5, Carduus marianus Dil. D3, Histamin Dil. D10, Sulfur Dil. D13, Avena sativa Dil. D6, Natrium oxalaceticum Dil. D10, 2-Oxoglutarsäure Dil. D10, DL-Äpfelsäure Dil. D10, Acidum fumaricum Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D28, Taraxacum Dil. D4, Cynara scolymus Dil. D6, Veratrum Dil. D4, α-Liponsäure Dil. D8, Orotsäure Dil. D6 jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 22 sowie die Bestandteile 23 und 24 werden jeweils über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Aufgrund des Bestandteils Schöllkraut (Chelidonium) soll Hepar comp. Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.

Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
China (Chinarinde)
Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag.
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen. Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens).
Hämorrhoiden.
Histamin (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen.
Niedriger Blutdruck. Herzbeschwerden.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen.
Akute und chronische Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Verdauungsschwäche. Hämorrhoiden und Blutungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände (auch bei verzögerter Rekonvaleszenz). Schlafstörungen (Insomnie) bei Überforderungen nach Krankheiten.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen.
Taraxacum (Löwenzahn)
Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.
Cynara scolymus (Artischocke)
Chronische Leber-Galle-Störungen.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung.
Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Hepeel® N

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045505.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6045451.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium majus Trit. D6, Nux moschata Trit. D4 jeweils 30 mg; Phosphorus Trit. D6 15 mg; Veratrum album (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)) 60 mg; Colocynthis (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)) 90 mg; Lycopodium clavatum Trit. D3, Chinchona pubescens Trit. D3 jeweils 30 mg; Carduus marianus Trit. D2 15 mg. Die Bestandteile 1-5 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1-8 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat (Ph. Eur).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1, g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D6 1,1 mg; Phosphorus Dil. D5 0,55 mg; Veratrum (HAB 34) Dil. D5 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)) 2,2 mg; Colocynthis (HAB 34) Dil. D5 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)) 3,3 mg; Lycopodium Dil. D2, China Dil. D2, Nux moschata Dil. D3 jeweils 1,1 mg; Carduus marianus Dil. D1 0,55 mg. Die Bestandteile 1-4 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Zur unterstützenden Behandlung bei Leberfunktionsstörungen.
Gegenanzeigen: Tabletten: Nicht anwenden bei Chininüberempfindlichkeit.
Aufgrund des Bestandteils Chelidonium (Schöllkraut) nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit. Sie auch unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise". Flüssige Verdünnung zur Injektion: Nicht anwenden bei Chininüberempfindlichkeit. Sie auch unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Lebererkrankungen bedürfen grundsätzlich der Abklärung und Überwachung durch den Arzt. Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol). Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Tabletten: Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. 1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können nach Anwendung von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen parenteral 1-2 ml i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal wöchentlich 1-2 ml i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahmen zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Lycopodium (Bärlapp)
Folgen von Infektionskrankheiten. Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Stoffwechselkrankheiten. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Cinchona pubescens (Chinarinde)
Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Allgemeine Entkräftung. Hautausschlag.
Nux moschata (Muskatnuss)
Verdauungsschwäche mit Blähsucht (Meteorismus).
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens).
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Verdauungsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals und des Gallensystems.

Homaccorde®

Homaccorde stellen eine Serie von Präparaten dar, die in Packungen zu 30 und 100 ml liquidum zur peroralen Medikation sowie in Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml zur parenteralen Injektion zur Verfügung stehen.

Die Homaccorde eignen sich besonders gut zur Therapie chronischer Erkrankungen, da neben den Tiefpotenzen auch die Hochpotenzen der verwandten Grundmittel als so genannter „Potenzenaccord" in der Arzneilösung enthalten sind, wodurch der therapeutische Effekt verbreitert, vertieft und nachhaltig verstärkt wird (3,7,9).
Durch die gleichzeitig in der Arzneilösung enthaltenen höheren und höchsten Potenzen werden dabei etwa mögliche Erstreaktionen abgedämpft. Nach Anwendung der Homaccorde werden daher praktisch auch keine bzw. nur sehr selten Erstverschlimmerungen festgestellt (4,6,8,12,13,14).
Alle Homaccorde können untereinander und mit anderen peroralen und Ampullenpräparaten der Biotherapeutika-Heel im Wechsel oder in Mischung verabfolgt werden.
Bei den Ampullen-Zubereitungen der Homaccorde liegen die Grundpotenzen der einzelnen Bestandteile im Allgemeinen 2-3 Potenzen höher als bei den Liquidum-Zubereitungen.
Die Homaccorde sind in diesem Index alphabetisch eingeordnet.
NB. Für die Rezeptur empfiehlt es sich, mit den Auslieferungsapotheken evtl. Abkürzungen für „Homaccord" zu vereinbaren (HA., Hcd., Hom. u.a.).
In den Potenzenaccorden behalten die einzelnen Potenzstufen, auch wenn sie miteinander vermengt sind, trotzdem ihre eigenständige Wirkung bei, so dass sich keine summarische Mittelwirkung der verschiedenen Potenzen ergibt (1,2,4,5,10,11,15).

Literatur:

1. Bildet J, Bonini F, Gendre P, Aubin M, Demarque D, Quilichini R. Etude au microscope électronique de l´action de dilutions de Phosphorus 15CH sur l´hépatite toxique du rat. Ann Hom Fr, 19, 209-219 (1977)
2. Bildet J. Etude de l´action de differentes dilutions homeopathiques de Phosphorus sur l´hépatite toxique du rat. Extracto de la tesis doctoral, Bordeaux II, 28-72, (1975)
3. Cahis M. Die Homöopathie experimentell bewiesen; aus dem spanischen übersetzt von Dr. med. Kubasta und Sopie Kubasta, Berliner Homöopathische Zeitschrift Bd. IV (XXXII) (1913)
4. Frase W: Die Wirksamkeit homöopathischer Dilutionen in Form von Potenzenaccorden, Biol Med 1998;27(6):276-8
5. Gomez D, Jorge M. Aportación al estudio de la eficacia de diluciones homeopáticas de Phosphorus, Medicina Biologica 5, 1, 4-14 (1992)
6. Harisch, G., Dittmann, J., Untersuchungen zur Wirkung von Ubichinon Injeel und Injeel forte mit zellfreien Systemen, Biologische Medizin 1997; 26(3):99-104
7. Julian O. Materia medica der Nosoden, Haug-Verlag Heidelberg (1983)
8. Junker, H., Die Wirkung extremer Potenzverdünnungen auf Organismen. Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, 1928,219,647-672
9. Katz, J., Nachprüfung der Cahis'schen Versuche mit den sogenannten „homöopathischen Akkorden„, AHZ,1913,Jg.61, 323-349
10. Ludwig W.: Bioresonanztherapie. Von der Biochemie zur Biophysik – Die ultrafeinen Bioenergien des Organismus- Hufeland-Journal 6/1, Haug-Verlag Heidelberg, 1991
11. Popp F.A.: Biophotonen, Schriftenreihe Krebsgeschehen Bd. 3, Fischer-Verlag, Heidelberg, 1984
12. Reckeweg, H.-H., Das Problem der Hochpotenzen und der Potenzenakkorde, Biologische Medizin,2,5,291-303 (1973)
13. Sünder, K-H., Die Injeele, Fortschritte der Medizin, Nr.21, vom 03. November 1955
14. Veith, H., Naturwissenschaftlicher Wirkungsnachweis homöopathischer Zubereitungen in der Injeel-Form. Biologische Medizin, Heft 6/1978, 379-386
15. Vosgerau, M., Grundlagen und Ergebnisse der Therapie mit Potenzenakkorden, Homotoxin-Journal 9,6,135-143, 1970

Hormeel® SN

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Reg.-Nr.: 2522410.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum nitricum Dil. D4, Conyza canadensis Dil. D3, Viburnum opulus Dil. D3, Pulsatilla pratensis Dil. D4, Cyclamen purpurascens Dil. D4, Strychnos ignatii Dil. D6 jeweils 0,55 µl; Aquilegia vulgaris Dil. D4, Origanum majorana Dil. D4, Myristica fragrans Dil. D6 jeweils 1,1 µl; Sepia officinalis Dil. D6 0,55 µl; Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8 1,1 µl. Die Bestandteile 1-9 sowie 10 und 11 werden jeweils über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen. Bei Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Siehe unter unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle s.c., i.m., i.v. injizieren. Bei akuten Zuständen 1 Ampulle täglich s.c., i.m., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Hormeel® SNT

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045528.00.00

Zusammensetzung: 10,0 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sepia officinalis Dil. D6 0,5 g; Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8 1,0 g; Conyza canadensis Dil. D3, Viburnum opulus Dil. D3, Cyclamen purpurascens Dil. D4, Strychnos ignatii Dil. D6 jeweils 0,5 g; Myristica fragrans Dil. D6 1,0 g. Die Bestandteile 1 und 2 werden über die vorletzte Stufe mit Gereinigtem Wasser und über die letzte Stufe mit Ethanol 30% (m/m), die Bestandteile 3-7 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Störungen im weiblichen Zyklus.
Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft.
Siehe auch unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise"
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Mädchen unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündung der Haut und Schleimhäute (inkl. Urethra und Vulva) mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.
Erigeron/Conyza canadensis (Berufskraut)
Blutungen der Gebärmutter (Menorrhagie, Metrorrhagie).
Viburnum opulus (Schneeball)
Schmerzhafte Menstruationsblutung.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Sepia (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände.
Cyclamen purpurascens (Alpenveilchen)
Kopfschmerzen. Regelstörungen. Verstimmungszustände.
Strychnos ignatii (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.
Aquilegia vulgaris (Akelei)
Schlafstörungen bei Nervosität.
Majorana (Majoran)
Gesteigerte sexuelle Erregbarkeit (sowie nervöse Reizbarkeit).
Nux moschata/Myristica fragans (Muskatnuss)
Nervöse körperliche Beschwerden. Verdauungsschwäche mit Blähsucht. Wahrnehmungsstörungen (wie Benommenheit).

Husteel®

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045586.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arsenum iodatum Dil. D6, Atropa belladonna Dil. D4 jeweils 2,0 g; Cuprum aceticum Dil. D6 1,0 g; Causticum Hahnemanni Dil. D6 3,0 g; Urginea maritima var. rubra Dil. D4 2,0 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 % (m/m) gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Husten, z.B. bei Bronchitis oder Erkältungskrankheiten.
Hinweis: Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden, bei Atemnot, eitrigem oder blutigem Auswurf sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Husteel ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Wegen des Alkoholgehalts soll Husteel bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Husteel – auch wegen des Alkoholgehaltes – nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, soll das Arzneimittel bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.
Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
1-3 mal täglich 5-10 Tropfen. Bei Hustenanfällen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 5-10 Tropfen.
Kinder erhalten die in der Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Kleinkinder 1-6 Jahre	1-3 mal täglich 3 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 10 mal täglich 3 Tropfen
Schulkinder 6-12 Jahre	1-3 mal täglich 4 Tropfen	alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 10 mal täglich 4 Tropfen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosis	Erwachsenendosis

Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes der 30 ml/100 ml Flaschen werden etwa 8,3 g/27,5 g Alkohol aufgenommen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Arsenum jodatum (Arsentrijodid)
Schnupfen. Bronchitis (insbesondere trockener Reizhusten). Drüsenschwellungen (inkl. der Hilusdrüsen). Altersherz.
Atropa belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Atemorgane.
Scilla (Meerzwiebel)
Herzschwäche (auch als Folge einer chronischen Stauungsbronchitis; Cor pulmonale).
Cuprum aceticum (Kupferazetat)
Erkrankungen mit Krampfneigung. Asthma. Keuchhusten. Angina pectoris.
Causticum Hahnemanni
Erkrankungen der Atemwege. Verstimmungszustände.

Ignatia-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Reg.-Nr.: 2522138.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos ignatii Dil. D6, Strychnos ignatii Dil. D10, Strychnos ignatii Dil. D30, Strychnos ignatii Dil. D200, Moschus (HAB 34) Dil. D8 (HAB, SV. 4b, Ø = D2 mit Ethanol 30% (m/m)), Moschus (HAB 34) Dil. D30 (HAB, SV. 4b, Ø = D2 mit Ethanol 30% (m/m)), Moschus (HAB 34) Dil. D200 (HAB, SV. 4b, Ø = D2 mit Ethanol 30% (m/m)) jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5 und 10 zu 1,1 ml, Klinikpackung mit 100 Ampullen.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Moschus (Drüsensekret des männlichen Moschustieres)
Nervöse Störungen (wie Angst, Schreckhaftigkeit, Ohnmachten).

Injeel-Chol®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10, Chelidonium Dil. D30, Chelidonium Dil. D200, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000 jeweils 2,2 µl; Carduus marianus Dil. D10, Carduus marianus Dil. D30, Carduus marianus Dil. D200, China Dil. D10, China Dil. D30, China Dil. D200, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Taraxacum Dil. D10, Taraxacum Dil. D30, Taraxacum Dil. D200, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 1,1 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Cholangitis; Cholezystitis; Cholelithiasis. Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden.
Gegenanzeigen: Aufgrund des Bestandteils Chelidonium (Schöllkraut) nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit.
Injeel-Chol ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Carduus marianus (Mariendistel) oder andere Korbblütler nicht anzuwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Chelidonium (Schöllkraut)
Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen des Magen-Darm-Kanals.
Carduus marianus (Mariendistel)
Leber-Galle-Erkrankungen (insbesondere auch bei Stauungen im Pfortadergebiet und in den Venen des kleinen Beckens).
China (Chinarinde)
Akute Durchfälle. Verdauungsschwäche. Gallenkoliken. Allgemeine Entkräftung.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.
Lycopodium (Bärlapp)
Folgen von Infektionskrankheiten. Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Stoffwechselkrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Taraxacum (Löwenzahn)
Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Durchfallerkrankung. Drohendes Kreislaufversagen. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Kamillen-Salbe-Heel S

• **SALBE** Reg.-Nr.: 28793.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Chamomilla recutita Ø 10,0 g.
Sonstige Bestandteile: Salbengrundlage: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB 10 mit Ethanol bestehend aus: Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A); Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser; Ethanol 96%. Enthält 14,8 Vol.-% Ethanol.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine bekannt.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, Salbe 1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautbezirke auftragen.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tuben mit 50 g Salbe.

Klimakt-Heel® T

• **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sanguinaria canadensis Trit. D6, Sepia officinalis Trit. D4, Sulfur Trit. D4, Strychnos ignatii Trit. D4, Simarouba cedron Trit. D4 jeweils 30 mg; Stannum metallicum Trit. D12 60 mg; Lachesis mutus Trit. D12 90 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Klimakterische Beschwerden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Klimakt-Heel T in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie das Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Sanguinaria canadensis (Kanadische Blutwurzel)
Migränöse Kopfschmerzen. Beschwerden der Wechseljahre.
Sepia officinalis (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders im Klimakterium).
Sulfur (Schwefel)
Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Strychnos ignatii (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Simarouba cedron (Cedronsamen)
Periodische Nervenschmerzen (besonders Trigeminus- und Ziliarneuralgien).
Stannum metallicum (Zinn)
Nerven- und Kolikschmerzen.
Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Lachesis mutus (Buschmeister)
Wechseljahrsbeschwerden. Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen.
Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Leptandra compositum

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045652.00.01
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6045652.00.00

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veronica virginica Dil. D2, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D3, Podophyllum peltatum Dil. D3, Acidum arsenicosum Dil. D4, Carbo vegetabilis Dil. D10, Niccolum metallicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Phosphorus Dil. D6 jeweils 0,1 g. Die Bestandteile 1 bis 3 werden mit Ethanol 62 % (m/m) und die Bestandteile 4 bis 6 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veronica virginica Dil. D2, Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D3, Podophyllum peltatum Dil. D3, Acidum arsenicosum Dil. D4, Carbo vegetabilis Dil. D10, Niccolum metallicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a), Phosphorus Dil. D6 jeweils 22 mg. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Leber-Galle-Störungen mit Verdauungsbeschwerden.
Bei Gelbsucht, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Mischung: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 10 Tropfen einnehmen.
Kinder können die in der folgenden Tabelle angegebenen Tropfen mit Wasser verdünnt einnehmen.

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Säuglinge 0-1 Jahr	3 mal täglich 3 Tropfen	Alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 3 Tropfen
Kleinkinder 1-6 Jahre	3 mal täglich 5 Tropfen	Alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 5 Tropfen
Schulkinder 6-12 Jahre	3 mal täglich 7 Tropfen	Alle halbe bis ganze Stunde, bis zu 12 mal täglich 7 Tropfen
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenen-dosierung	Erwachsenen-dosierung

Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Veronica virginica (Virginischer Ehrenpreis)
Entzündungen der Leber, des Gallensystems. Diarrhoe.
Picrasma excelsa, Quassia amara (Bitterholz)
Lebererkrankungen. Verdauungsschwäche.
Podophyllum peltatum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Schwere Infektionen. Verstimmungszustände.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht (Meteorismus).
Niccolum metallicum (Nickel)
Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Verdauungsorgane (Phosphorus als Parenchymmittel: Leber, Pankreas). Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Lilium compositum Heel

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522492.00.00

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D4, Ammonium bromatum Dil. D4, Lilium lancifolium Dil. D4, Aurum iodatum Dil. D12, Crabro vespa (HAB 34) Dil. D4 (HAB, Vorschrift 4 b Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Chamaelirium luteum Dil. D4, Palladium Dil. D12 (HAB, Vorschrift 6), Platinum metallicum Dil. D12 jeweils 10 g; Melilotus officinalis Dil. D3, Viburnum opulus Dil. D2 jeweils 5 g. Die Bestandteile 1-9 werden über die vorletzte Stufe und die Bestandteile 1-10 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Halten die Krankheitssymptome an, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Bei Bromüberempfindlichkeit soll das Arzneimittel nicht eingenommen werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: 1–3 mal täglich je 5-10 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Ammonium bromatum (Ammoniumbromid)
Entzündungen der Atemwege.
Lilium tigrinum (Tigerlilie)
Beschwerden bei Gebärmuttersenkung in den Wechseljahren. Entzündungen und Schmerzen der weiblichen Geschlechtsorgane. Reizbare Verstimmungszustände.
Aurum jodatum (Goldjodid)
Bluthochdruck; Beschwerden bei Schlagaderverkalkung. Verhärtung drüsiger Organe.
Crabro vespa (Hornisse)
Schleimhautschwellung. Entzündung der Harnorgane. Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel)
Gebärmuttersenkung. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Palladium (Palladium)
Eierstockerkrankungen. Gebärmuttersenkung. Verhaltensstörungen.
Platinum metallicum (Platin)
Nerven-, Kopf- und Krampfschmerzen. Erkrankungen und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Gesteigerte Erregbarkeit. Verstimmungszustände.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen. Krampfaderleiden.
Viburnum opulus (Schneeball)
Schmerzhafte Menstruationsblutung.

Lithiumeel® comp.

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045126.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lithium carbonicum Trit. D3, Colchicum autumnale Trit. D4, Ferrum phosphoricum Trit. D6, Natrium carbonicum Trit. D4 jeweils 30 mg; Strychnos nux-vomica Trit. D6, Toxicodendron quercifolium Trit. D6 jeweils 90 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Gicht und rheumatische Erkrankungen.
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Lithium carbonicum (Lithiumkarbonat)
Gicht. Nierenleiden bei vermehrter Harnsäure im Blut (Gichtniere = Urat-Nephropathie sowie Urat-Nephrolithiasis). Rheumatische Erkrankungen.
Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung (auch gichtischer Genese!). Nierenentzündung.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke (Schulter-Arm-Syndrom!).
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Körperliche (z.B. Bänderschwäche) und geistige (z.B. Apathie) Schwäche. Verstimmungszustände.
Strychnos nux-vomica (Brechnuss)
Beschwerden durch Nahrungs- und Genussmittel. Kopfschmerzen. Nervenschmerzen und rheumatische Schmerzen. Muskelkrämpfe. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Toxicodendron quercifolium e summitatibus rec. (Giftsumach)
Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.

Luffeel® comp. Heuschnupfenspray

- **NASENTROPFEN** Zul.-Nr.: 45856.00.00

Zusammensetzung: 10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Luffa operculata Dil. D4, Luffa operculata Dil. D12, Luffa operculata Dil. D30, Thryallis glauca Dil. D4, Thryallis glauca Dil. D12, Thryallis glauca Dil. D30 jeweils 1,0 g; Histaminum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), Histaminum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Histaminum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a), Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit gereinigtem Wasser.
Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat; Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat; Natriumchlorid; Wasser für Injektionszwecke; Benzalkoniumchlorid-Lösung (Konservierungsmittel).
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Allergischer Schnupfen, insbesondere Heuschnupfen.
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden, unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Benzalkoniumchlorid sollten auf die Anwendung von Luffeel comp. Heuschnupfenspray verzichten. Da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, sollte Luffeel comp. Heuschnupfenspray in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von Luffeel comp. Heuschnupfenspray kann es in seltenen Fällen zu Reizungen der Nasenschleimhaut mit Brennen, vermehrter Nasensekretion und Nasenbluten kommen. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Falle sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Bei akuten Zuständen sollte Luffeel comp. Heuschnupfenspray ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche angewendet werden. Bei chronischen Verlaufsformen sollte eine Einzelgabe einmal im Monat erfolgen.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Sprühflaschen mit 20 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Luffa operculata (Luffaschwamm)
Heuschnupfen.
Thryallis glauca (Galphimia glauca)
Haut- und Schleimhautallergien.
Histaminum (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen.
Sulfur (Schwefel)
Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane.

Luffeel® comp.

- **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 30887.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aralia racemosa Trit. D1, Arsenum jodatum Trit. D8, Lobelia inflata Trit. D6, Luffa operculata Trit. D12 jeweils 25 mg. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten beiden Stufen als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden alle 15 Minuten 1 Tablette im Mund zergehen lassen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aralia racemosa (Amerikanische Narde)
Allergische Erkrankung der Atemorgane wie Heuschnupfen und Asthma.
Arsenum iodatum (Arsentrijodid)
Bronchitis.
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie)
Störungen des Atemzentrums mit Blutdruckabfall. Heuschnupfen. Asthma bronchiale.
Luffa operculata (Luffaschwamm)
Heuschnupfen.

Lymphomyosot®

- **TABLETTEN** Reg.-Nr.: 30479.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis Trit. D3, Veronica officinalis Trit. D3, Teucrium scorodonia Trit. D3, Pinus silvestris Trit. D4, Gentiana lutea Trit. D5, Equisetum hyemale ex herba rec. Trit. D4 (HAB, Vorschrift 2a), Smilax Trit. D6, Scrophularia nodosa Trit. D3, Juglans (HAB 34) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 3a), Calcium phosphoricum Trit. D12, Natrium sulfuricum Trit. D4, Fumaria officinalis Trit. D4, Levothyroxinum Trit. D12 (HAB, Vorschrift 6), Aranea diadema (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 4b) jeweils 15,0 mg; Geranium robertianum Trit. D4, Nasturtium officinale Trit. D4, Ferrum jodatum Trit. D12 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 30,0 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 3 Tabletten im Mund zergehen lassen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 100 und 250 Tabletten.

Lymphomyosot® N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION** Reg.-Nr.: 2522116.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis Dil. D3, Veronica officinalis Dil. D3, Teucrium scorodonia Dil. D3, Pinus silvestris Dil. D4, Gentiana lutea Dil. D5, Equisetum hyemale (HAB 34) Dil. D4 (HAB, V. 2a), Smilax Dil. D6, Scrophularia nodosa Dil. D3, Calcium phosphoricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D4, Fumaria officinalis Dil. D4, Levothyroxin Dil. D12 (HAB, V. 6), Aranea diadema (HAB 34) Dil. D6 (HAB, V. 4b, Ø mit Ethanol 86% (m/m)) jeweils 0,55 mg; Geranium robertianum Dil. D4, Nasturtium officinale Dil. D4, Ferrum jodatum Dil. D12 (HAB, V. 6) jeweils 1,1 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden täglich 1 Ampulle i.v., i.m., oder s.c. injizieren. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Bei chronischen Beschwerden 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Lymphomyosot® N

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 18 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis Dil. D3, Veronica officinalis Dil. D3, Teucrium scorodonia Dil. D3, Pinus silvestris Dil. D4, Gentiana lutea Dil. D5, Equisetum hyemale Dil. D4, Sarsaparilla Dil. D6, Scrophularia nodosa Dil. D3, Calcium phosphoricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D4, Fumaria officinalis Dil. D4, Levothyroxin Dil. D12, Aranea diadema Dil. D6 jeweils 5 g; Geranium robertianum Dil. D4, Nasturtium aquaticum Dil. D4, Ferrum jodatum Dil. D12 jeweils 10 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol (30 % (m/m).
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Bei Neigung zur Ödembildung (Flüssigkeitsansammlung im Gewebe) und Infektanfälligkeit. Drüsenschwellungen. Geschwollene Mandeln, chronische Mandelentzündung.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 15-20 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Myosotis arvensis (Vergissmeinnicht)
Chronische Bronchitis (auch bei „Hilusdrüsen-Kindern"; Lymphatismus bzw. exsudative Diathese!).
Teucrium scorodonia (Gamander)
Chronische Entzündungen der Atemwege (wie Rhinitis [polyposa]).
Pinus silvestris (Kiefer)
Entzündungen der Atemwege. Ekzeme und Nesselsucht.
Gentiana lutea (Gelber Enzian)
Verdauungsstörungen (wie Flatulenz, Meteorismus, Diarrhoe).
Equisetum hyemale (Winterschachtelhalm)
Nieren- und Harnwegserkrankungen.
Smilax/Sarsaparilla (Sarsaparille)
Juckende Hautausschläge. Entzündungen und Reizungen der Harnorgane. Rheumatismus.
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)
Schwächezustände. Drüsenverhärtungen. Milchschorf.
Juglans (Walnuss)
Eitrige Hautausschläge. Lymphknotenentzündungen. Leberstörungen.
Calcium phosphoricum (Kalziumphosphat)
Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Appetitstörungen. Kalkmangelzustände. Wirbelsäulenerkrankungen.
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Leber-Galle-Störungen. Bronchial-Asthma. Rheumatismus.
Fumaria officinalis (Erdrauch)
Chronisches, juckendes Ekzem bei Leberstörungen.
Aranea diadema (Kreuzspinne)
Periodisch auftretende Nervensschmerzen. Anfallsweise Fieber. Gefühlsempfindungsstörung. Schmerzhafte Gelenkerkrankung.
Nasturtium aquaticum/officinale (Brunnenkresse)
Reizzustände der ableitenden Harnwege (diuretische Wirkung).
Ferrum jodatum (Eisenjodid)
Kropfleiden bei Schilddrüsenüberfunktion. Nierenentzündungen. Chronische Lymphdrüsenschwellung.

Melilotus-Homaccord® N Tropfen

• **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522797.00.00

Melilotus-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,6 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Melilotus officinalis Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D10, Melilotus officinalis Dil. D30, Melilotus officinalis Dil. D200 jeweils 0,02 g; Crataegus Dil. D10, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 0,08 g; Melilotus officinalis Dil. D1 0,02 g; Crataegus Ø 6,0 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1 bis 7 werden gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Melilotus officinalis Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D10, Melilotus officinalis Dil. D30, Melilotus officinalis Dil. D200 jeweils 2,2 µl; Crataegus Dil. D10, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 8,8 µl; Melilotus officinalis Dil. D2 2,2 µl; Crataegus Dil. D2 8,8 µl. Die Bestandteile 1 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Plethora; präapoplektische Zustände; Hypertonie.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 45 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (kongestive).
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

Mercurius-Heel® S

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045184.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D10 90 mg; Hepar sulfuris Trit. D8, Lachesis mutus Trit. D12, Phytolacca americana Trit. D4, Ailanthus altissima Trit. D3, Echinacea Trit. D3 jeweils 30 mg; Atropa belladonna Trit. D4 60 mg. Gemeinsame Potenzierung der letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung entzündlicher und eitriger Hauterkrankungen, wie Furunkel und Karbunkel, und unterstützende Behandlung von Entzündungen und Eiterungen der Mandeln.
Bei starker Entzündung oder Eiterungen von Haut oder Mandeln sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollte Mercurius-Heel S in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann aufgrund des Inhaltsstoffes Mercurius solubilis Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Aufgrund des Inhaltsstoffes Echinacea (Sonnenhut) können in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich eine Tablette im Mund zergehen lassen; bei akuten Beschwerden / bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Mercurius-Heel S sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Hauterkrankungen. Mandel-, Lymphdrüsen-, Leber- und Nierenentzündungen. Entzündungen anderer drüsiger Organe. Entkräftende Krankheiten.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute wie Furunkel, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung.
Lachesis mutus (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Drüsenerkrankungen. Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung.
Phytolacca americana (Kermesbeere)
Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen. Entzündung und Erkrankung der Brustdrüse.
Ailanthus altissima (Götterbaum)
Schwerste Infektionskrankheiten mit Übergang in allgemeine Blutvergiftung (Sepsis, Septikämie).
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Atropa belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.

Metro-Adnex-Injeel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522189.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D10, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200, Lachesis Dil. D10, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200, Lachesis Dil. D1000, Lilium tigrinum Dil. D10, Lilium tigrinum Dil. D30, Lilium tigrinum Dil. D200, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Hydrargyrum bichloratum Dil. D10, Hydrargyrum bichloratum Dil. D30, Hydrargyrum bichloratum Dil. D200 jeweils 1,1 mg; Pulsatilla Dil. D10, Pulsatilla Dil. D30, Pulsatilla Dil. D200, Pulsatilla Dil. D1000, Crabro vespa (HAB 34) Dil. D10 (HAB, V. 4b), Crabro vespa (HAB 34) Dil. D30 (HAB, V. 4b), Crabro vespa (HAB 34) Dil. D200 (HAB, V. 4b) jeweils 1,65 mg; Cimicifuga Dil. D10, Cimicifuga Dil. D30, Cimicifuga Dil. D200 jeweils 2,2 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen. Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m., s.c. oder i.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Auch homöopatische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.
Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute. Wechseljahrsbeschwerden. Krämpfe. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Lilium tigrinum (Tigerlilie)
Beschwerden bei Gebärmuttersenkung in den Wechseljahren. Entzündungen und Schmerzen der weiblichen Geschlechtsorgane. Nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden. Reizbare Verstimmungszustände.
Lycopodium (Bärlapp)
Regelstörungen und Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der ableitenden Harnwege sowie der Scheide.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Crabro vespa (Hornisse)
Schleimhautschwellung. Entzündung der Harnorgane. Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane.
Cimicifuga (Wanzenkraut)
Krampfschmerz im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane (insbesondere prämenstruell). Regel-, Schwangerschaft- und Wechseljahrbeschwerden. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.

Mezereum-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522809.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum Dil. D2, Mezereum Dil. D10, Mezereum Dil. D15, Mezereum Dil. D30, Mezereum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D4, Acidum arsenicosum Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D15, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 0,05 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2 bis 11 werden gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum Dil. D4, Mezereum Dil. D10, Mezereum Dil. D15, Mezereum Dil. D30, Mezereum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D10, Acidum arsenicosum Dil. D15, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung: Vesikulöse Ekzeme; Herpes zoster; Pruritus.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Mezereum (Seidelbast)
Juckende Hautreizungen und Hauteiterungen (vesikulär-pustulös). Nervenschmerzen. Knochenschmerzen und andere Schmerzzustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Verstimmungszustände.

Momordica compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Zul.-Nr.: 6045712.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Momordica balsamina Dil. D6, Iodum Dil. D8, Podophyllum peltatum Dil. D6, Carbo vegetabilis Dil. D10, Lycopodium clavatum Dil. D6, Mandragora e radice siccata Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D12, Veratrum (HAB 1934) Dil. D4 (HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)), Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8 aquos. jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 8 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Verdauungsstörungen, insbesondere bei Störungen der Bauchspeicheldrüse.
Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Momordica compositum N in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung von Momordica compositum N kann verstärkt Speichelfluss auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen. Außerdem können aufgrund des Bestandteiles Mercurius solubilis Hahnemanni (Quecksilber) gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Erwachsene und Kinder über 12 Jahre erhalten bei akuten Zuständen parenteral 1 mal täglich 1 Ampulle i.m., s.c. oder i.v. Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Momordica balsamina (Balsamapfel)
Durchfallerkrankungen (Diarrhoea pancreatica!). Blähungskoliken.
Iodum (Jod)
Schilddrüsenüberfunktion (Abmagerung trotz guten Appetits, Heißhunger). Furunkulose. Akne vulgaris.
Podophyllum peltatum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemenge, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Entzündungen drüsiger Organe. Entkräftende Krankheiten.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht.
Lycopodium clavatum (Bärlapp)
Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen (mit Dyspepsie und Meteorismus), Stoffwechselkrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Mucosa compositum

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucosa naris suis Dil. D8, Mucosa oris suis Dil. D8, Mucosa pulmonis suis Dil. D8, Mucosa oculi suis Dil. D8, Mucosa vesicae felleae suis Dil. D8, Mucosa vesicae urinariae suis Dil. D8, Mucosa pylori suis Dil. D8, Mucosa duodeni suis Dil. D8, Mucosa oesophagi suis Dil. D8, Mucosa jejuni suis Dil. D8, Mucosa ilei suis Dil. D8, Mucosa coli suis Dil. D8, Mucosa recti suis Dil. D8, Mucosa ductus choledochi suis Dil. D8, Ventriculus suis Dil. D8, Pankreas suis Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D6, Belladonna Dil. D10, Oxalis acetosella Dil. D6, Anacardium Dil. D6, Phosphorus Dil. D8, Lachesis Dil. D10, Ipecacuanha Dil. D8, Nux vomica Dil. D13, Veratrum Dil. D4, Pulsatilla Dil. D6, Kreosotum Dil. D10, Sulfur Dil. D8, Colibacillinum Dil. D28, Condurango Dil. D6, Kalium bichromicum Dil. D8, Hydrastis Dil. D4, Mandragora Dil. D10, Momordica balsamina Dil. D6, Ceanothus Dil. D4, Natrium oxalaceticum Dil. D8 aquos. jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 35 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der körpereigenen Abwehr bei Schleimhauterkrankungen und -katarrhen verschiedener Art und Lokalisation, z.B. im Verdauungstrakt mit und ohne Ulkus, im Bereich der oberen und unteren Luftwege, der ableitenden Harnwege und der Bindehaut des Auges.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., gegebenenfalls i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:

Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.

Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane.

Anacardium (Malakkanuss)
Verdauungsschwäche. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Geistige Erschöpfung. Verstimmungszustände. Wahnvorstellungen.

Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

Lachesis (Buschmeister)
Entzündungen und Blutungen der Schleimhäute (bläulich-düsterrote Schwellungszustände). Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung.

Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen der Atemorgane. Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Harnwegserkrankungen. Krämpfe an Hohlorganen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.

Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Durchfallerkrankung. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

Kreosotum (Buchenholzteerkreosot)
Entzündungen der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Altersbedingte Erkrankungen.

Sulfur (Schwefel)
Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Condurango (Kondurangorinde)
Risse und Geschwüre an den Lippen und am After. Entzündung und Verengung der Speiseröhre.

Kalium bichromicum (Kaliumdichromat)
Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, des Harnsystems.

Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals.

Momordica balsamina (Balsamapfel)
Durchfallerkrankungen. Blähungskoliken.

Ceanothus americanus (Säckelblume)
Milzvergrößerung (mit „Knäuelgefühl“ im linken Oberbauch).

Naso-Heel® SNT

• **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045238.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml); 1 ml = 27 Tropfen enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arum maculatum Dil. D4 0,5 g; Lobaria pulmonaria Dil. D4, Hydrastis canadensis Dil. D4 jeweils 1 g; Ammonium carbonicum Dil. D3, Lemna minor Dil. D3, Hydrargyrum biiodatum Dil. D8 jeweils 0,5 g; Phosphorus Dil. D6, Kalium bichromicum Dil. D5, Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D8 jeweils 1 g. Die Bestandteile 1 bis 6 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 1 bis 8 über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: akuter und chronischer Schnupfen (Rhinitis) mit und ohne Nebenhöhlenbeteiligung.
Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Chromüberempfindlichkeit. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Siehe unter “Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise”.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Naso-Heel SNT in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Nach Einnahme können verstärkt Speichelfluss und Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5-10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Arum maculatum (Gefleckter Aronstab)
Entzündungen der oberen Atemwege. Nasenpolypen.
Mercurius bijodatus (Quecksilberjodid)
Eitrige Schleimhautentzündungen der Nase, des Rachens, der Mandeln und der Augen.
Ammonium carbonicum (Ammoniumkarbonat)
Entzündungen der Mundhöhle und der Atemwege.
Lemna minor (Wasserlinse)
Chronischer Schnupfen.
Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Zinnober)
Eitrige Bindehaut- und Nasennebenhöhlenentzündung.
Sticta (Lungenflechte)
Akute Entzündungen der Atemwege.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane. Kopfschmerzen. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane.
Kalium bichromicum (Kaliumdichromat)
Schleimhautentzündungen der Atemwege.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterungen auch mit Geschwürbildung. Polypen.

Natrium-Homaccord®

• **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522817.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium carbonicum Dil. D10, Natrium carbonicum Dil. D30, Natrium carbonicum Dil. D200, Natrium chloratum Dil. D10, Natrium chloratum Dil. D30, Natrium chloratum Dil. D200, Natrium chloratum Dil. D1000 jeweils 0,03 g; Natrium nitricum Dil. D10, Natrium nitricum Dil. D15, Natrium nitricum Dil. D30 jeweils 0,04 g. Gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Chronische Entzündungen der Atemwege. Ausfluss. Verdauungsschwäche. Verstimmungszustände.
Natrium chloratum (Natrium muriaticum)
Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände (Verschlossenheit, mürrisches Wesen).
Natrium nitricum (Natriumnitrat)
Infekte. Verdauungsschwäche. Schwächezustände.

Nervoheel® N

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6045267.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum phosphoricum Trit. D4, Strychnos ignatii Trit. D4, Sepia officinalis Trit. D4 jeweils 60 mg; Kalium bromatum Trit. D4, Zincum isovalerianicum Trit. D4 jeweils 30 mg. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die vorletzte Stufe und die Bestandteile 1 bis 5 über die letzte Stufe als Verreibung gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erschöpfungszustände mit nervösen Beschwerden.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
Strychnos ignatii (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Sepia officinalis (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).
Kalium bromatum (Kaliumbromid)
Erregungszustände des Zentralnervensystems. Zerebrales Anfallsleiden. Alpdruck. Schlafwandeln und Schlaflosigkeit. Gedächtnisschwäche.
Zincum isovalerianicum (Zinkvalerianat)
Nervöse Schlafstörungen mit „unruhigen Beinen". Nervenschmerzen.

Neralgo-Rhem-Injeel ~~Neuralgo-Rheum-Injeel®~~ Namensänderung zum 15.09.07

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D10, Causticum Hahnemanni Dil. D30, Causticum Hahnemanni Dil. D200, Colchicum Dil. D10, Colchicum Dil. D30, Colchicum Dil. D200, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D10, Ferrum metallicum Dil. D30, Lithium benzoicum Dil. D10, Lithium benzoicum Dil. D30, Rhus toxicodendron Dil. D10, Rhus toxicodendron Dil. D30, Spiraea ulmaria Dil. D10, Spiraea ulmaria Dil. D30 jeweils 1,1 µl; Gnaphalium polycephalum Dil. D6, Gnaphalium polycephalum Dil. D10, Gnaphalium polycephalum Dil. D30 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Anwendungsgebiete: Neuralgien; Weichteilrheumatismus; arthritische Beschwerden; Bandscheibenbeschwerden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Causticum Hahnemanni
Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Lähmungen. Verstimmungszustände.
Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung.
Colocynthis (Koloquinte)
Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.
Ferrum metallicum (Eisen)
Nervenschmerzen.
Lithium benzoicum (Lithiumbenzoat)
Rheumatismus. Gicht.
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.
Spiraea ulmaria (Mädesüß)
Rheumatismus.
Gnaphalium polycephalum (Vielköpfiges Ruhrkraut)
Rheumatismus. Ischiasschmerz. Nervenschmerzen.

Neurexan®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 16814.00.01
  MISCHUNG Zul.-Nr.: 16814.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Passiflora incarnata Dil. D2, Avena sativa Dil. D2, Coffea arabica Dil. D12, Zincum isovalerianicum Dil. D4 jeweils 0,6 mg.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.
Mischung: 100 g (= 104,7 ml; 1 ml = 19 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Passiflora incarnata Dil. D2, Avena sativa Dil. D2, Coffea arabica Dil. D12, Zincum valerianicum Dil. D4 jeweils 0,06 g.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 Vol.-%, Gereinigtes, Wasser.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände.
Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Tabletten: Keine bekannt.
Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Mischung: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Tabletten: Wie alle Arzneimittel sollten auch Neurexan während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Neurexan daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
Mischung: Neurexan sollten wegen nicht ausreichender Untersuchungen – und wegen des Alkoholgehaltes – in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll daher – und wegen des Alkoholgehaltes – bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Enthält 36 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: 1-3 mal täglich 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen; bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde bis zu 12 mal täglich 1 Tablette unter der Zunge zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Mischung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 Tropfen, bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 5 Tropfen einnehmen.
Die Tropfen können mit etwas Flüssigkeit vermischt eingenommen werden. Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen nach Möglichkeit eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung: Tabletten: Bei der Einnahme großer Mengen (z.B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50, 100 und 250 Tabletten.
Mischung: Tropfflaschen mit 30 ml und 100 ml Tropfen.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Passiflora incarnata (Passionsblume)
Schlafstörung. Krampfleiden. Unruhezustände.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände. Schlafstörungen bei Überforderungen nach Krankheiten.
Coffea arabica (Kaffee)
Schlafstörungen. Neuralgien.
Zincum isovalerianicum (Zinkvalerianat)
Nervöse Schlafstörungen mit "unruhigen Beinen". Nervenschmerzen.

Neuro-Injeel® Ampullen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522198.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum phosphoricum Dil. D10, Acidum phosphoricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D30, Platinum metallicum Dil. D10, Platinum metallicum Dil. D30, Sepia officinalis Dil. D10, Sepia officinalis Dil. D30, Valeriana officinalis Dil. D10, Valeriana officinalis Dil. D30 jeweils 1,1 mg; Avena sativa Dil. D10, Avena sativa Dil. D30, Strychnos ignatii Dil. D10, Strychnos ignatii Dil. D30 jeweils 2,2 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen. Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. s.c. oder i.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure)
Geistige und körperliche Erschöpfungszustände.
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.
Platinum metallicum (Platin)
Nerven-, Kopf- und Krampfschmerzen. Gesteigerte Erregbarkeit. Verstimmungszustände.
Sepia (Tintenfisch)
Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände (besonders auch im Klimakterium).
Valeriana (Baldrian)
Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände. Schlafstörungen bei Überforderungen nach Krankheiten.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

Nux vomica-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522783.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (=10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nux vomica Dil. D10, Nux vomica Dil. D15, Nux vomica Dil. D30, Nux vomica Dil. D200, Nux vomica Dil. D1000, Bryonia Dil. D2, Bryonia Dil. D6, Bryonia Dil. D10, Bryonia Dil. D15, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 0,02 g; Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Colocynthis (HAB 1934) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Colocynthis (HAB 1934) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Lycopodium Dil. D3, Colocynthis (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)) jeweils 0,03 g; Nux vomica Dil. D2 0,02 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1 bis 19 und 20 bis 21 werden jeweils gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m)), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nux vomica Dil. D4, Nux vomica Dil. D10, Nux vomica Dil. D15, Nux vomica Dil. D30, Nux vomica Dil. D200, Nux vomica Dil. D1000, Bryonia Dil. D4, Bryonia Dil. D6, Bryonia Dil. D10, Bryonia Dil. D15, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 2,2 µl; Lycopodium Dil. D5, Lycopodium Dil. D10, Lycopodium Dil. D30, Lycopodium Dil. D200, Lycopodium Dil. D1000, Colocynthis Dil. D5, Colocynthis Dil. D10, Colocynthis Dil. D30, Colocynthis Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich; Meteorismus. Beschwerden nach Nikotin-, Alkohol- und Kaffeegenuss.
Gegenanzeigen: Mischung: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine bekannt. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Hämorrhoiden. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Kopfschmerzen. Nervenschmerzen. Krämpfe an Hohlorganen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Bryonia (Zaunrübe)
Akute Entzündung des Bauchfells, der Leber (mit Meteorismus; Obstipation wechselnd mit Durchfall).
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals und des Gallensystems.

Oculoheel®

- **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Trit. D4, Natrium chloratum Trit. D6 jeweils 30 mg; Rhus toxicodendron Trit. D12, Hepar sulfuris Trit. D12, Spigelia anthelmia Trit. D6 jeweils 60 mg; Staphisagria Trit. D4 45 mg; Aethiops mineralis Trit. D8 15 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Konjunktivitis, Blepharitis, Dakryozystitis (besonders chronische Formen).
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Apis mellifica (Honigbiene)
Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben (Ödeme der Augenlider, Konjunktivitiden, Dakryozystitiden, Hordeola). Allergien.
Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Entzündungen der Augen. Kopfschmerzen.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und der Schleimhäute. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Nervenschmerz. Kopfschmerz (u.a. Ziliarneuralgien, Infra- und Supraorbitalneuralgien).
Staphisagria (Stephanskörner)
Entzündungen der Augen (z.B. Blepharo-Konjunktivitis, Dakryozystitis, Hordeola).
Aethiops mineralis (Quecksilbermohr)
Krustige Entzündungen der Haut und Augenlider (Blepharitis squamosa bzw. crustosa).

Osteoheel® S

• **TABLETTEN**

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hekla lava Trit. D6, Kalium jodatum Trit. D4, Asa foetida Trit. D4, Stillingia sylvatica Trit. D4, Aranea diadema Trit. D6, Natrium sulfuricum Trit. D4 jeweils 30 mg; Mercurius praecipitatus ruber Trit. D9, Calcium phosphoricum Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Periostitis; Exostosen, z.B. Fersenbeinsporn. Tinnitus aurium infolge Otosklerose.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie das Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Hekla lava (Lava vom Heklavulkan)
Knochen- und Knochenhautentzündungen. Knochenauswüchse (Exostosen; osteosklerotische Herde mit Stapes-Ankylose bei Otosklerose!).
Kalium jodatum (Kaliumjodid)
Weichteilrheumatismus.
Asa foetida (Stinkasant)
Knochenerkrankungen.
Stillingia sylvatica (Stillingie)
Knochen- und Knochenhautschmerzen.
Aranea diadema (Kreuzspinne)
Schmerzhafte Gelenkerkrankungen (Verschlimmerung durch Nässe und Kälte).
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Rheumatismus.
Calcium phosphoricum (Kalziumphosphat)
Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Kalkmangelzustände. Wirbelsäulenerkrankungen (Osteochondrose mit Zacken- bzw. exostotischer Spangenbildung).

Paeonia comp.-Heel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046692.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Paeonia officinalis Trit. D3 120 mg; Graphites Trit. D6 60 mg; Strychnos nux-vomica Trit. D4, Sulfur Trit. D4, Acidum nitricum Trit. D8, Hamamelis virginiana Trit. D3 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündliche Hautveränderungen und Einrisse im Analbereich; Hämorrhoiden.
Hinweis: Bei Blut im Stuhl sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
Gegenanzeigen: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen; bei akuten Beschwerden / bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Paeonia officinalis (Pfingstrose)
Hämorrhoiden und andere Aftererkrankungen.
Graphites (Reißblei)
Verdauungsschwäche (z.B. chronische – insbesondere atonische – Obstipation). Ekzeme und andere Erkrankungen der Haut. Entzündung der Schleimhäute.
Strychnos nux-vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Verstopfung. Hämorrhoiden. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Verdauungsschwäche. Hämorrhoiden und Blutungen. Nervöse Störungen. Schwächezustände.
Acidum nitricum (Salpetersäure)
Entzündungen der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Verstimmungszustände.
Hamamelis virginiana (Virginischer Zauberstrauch)
Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.

Phosphor-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522798.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D10, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200 jeweils 0,04 g; Argentum nitricum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D200, Paris quadrifolia Dil. D6, Paris quadrifolia Dil. D10, Paris quadrifolia Dil. D30, Paris quadrifolia Dil. D200 jeweils 0,03 g. Gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D10, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200 jeweils 4,4 µl; Argentum nitricum Dil. D10, Argentum nitricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D200, Paris quadrifolia Dil. D6, Paris quadrifolia Dil. D10, Paris quadrifolia Dil. D30, Paris quadrifolia Dil. D200 jeweils 3,3 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Heiserkeit. Laryngitis. Pharyngitis. Petechiale Blutungen.
Gegenanzeigen: Mischung: Keine bekannt.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine bekannt. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Atemorgane (z.B. Tracheitis und Laryngitis mit – schmerzhafter – Heiserkeit). Blutungen.
Paris quadrifolia (Einbeere)
Entzündungen der Atemwege (z.B. Laryngitis mit – schmerzloser – Heiserkeit).

Plantago-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522815.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Plantago major Dil. D2, Plantago major Dil. D10, Plantago major Dil. D15, Plantago major Dil. D30, Plantago major Dil. D200 jeweils 0,06 g; Belladonna Dil. D3, Belladonna Dil. D10, Belladonna Dil. D15, Belladonna Dil. D30, Belladonna Dil. D200, Belladonna Dil. D1000, Ignatia Dil. D4, Ignatia Dil. D10, Ignatia Dil. D30, Ignatia Dil. D200 jeweils 0,02 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzte Stufe.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Plantago major (Breitblättriger Wegerich)
Einnässen.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Krämpfe an Hohlorganen.

Podophyllum compositum

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045824.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6045824.00.01

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Podophyllum peltatum Dil. D2, Podophyllum peltatum Dil. D10, Acidum hydrochloricum Dil. D4, Acidum hydrochloricum Dil. D10, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8, Strychnos ignatii Dil. D3 jeweils 1 g. Die Bestandteile 2 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 1 und 6 werden mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Podophyllum peltatum Dil. D2, Podophyllum peltatum Dil. D10, Acidum hydrochloricum Dil. D4, Acidum hydrochloricum Dil. D10, Strychnos ignatii Dil. D3, Hydrargyrum bichloratum Dil. D8 jeweils 22 mg. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Hämorrhoidalbeschwerden; zur unterstützenden Behandlung bei Erkrankungen des Dickdarms, wie z.B. Colitis mucosa (Reizdarm mit vermehrter Schleimbeimengung zum Stuhl) und Colitis ulcerosa (chronische Dickdarmentzündung mit Geschwürsbildung).
Hinweis: Vor der Behandlung mit diesem Arzneimittel ist eine ärztliche Abklärung der Erkrankung erforderlich. Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden, sowie Blut im Stuhl oder Fieber sollte ein Arzt aufgesucht werden. Dieses Arzneimittel ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.
Gegenanzeigen: Mischung: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Während der Schwangerschaft und Stillzeit soll das Arzneimittel nicht verabreicht werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Mischung: Im Allgemeinen 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 10 Tropfen einnehmen. Kinder ab 12 Jahre erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt die Erwachsenendosierung.
Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Tropfen möglichst eine Zeitlang im Mund behalten werden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre: Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Zustand nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall. Mastdarmvorfall.
Acidum hydrochloricum (Acidum muriaticum)
Schwächezustände. Appetitlosigkeit. Hämorrhoiden. Schleimhautulzera. Hämorrhagische Diathese.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände.
Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.
Hydrargyrum bichloratum (Mercurius sublimatus corrosivus)
Hochakute Schleimhautentzündung der Augen, der Mundhöhle, der Mandeln, des Dick- und Enddarmes, der Nieren, der ableitenden Harnwege, der Scheide.

Pulsatilla compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522087.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla Dil. D6, Sulfur Dil. D8, Cortisonacetat Dil. D18 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 22 mg. Die Bestandteile werden über die letzten zwei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, initial täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Pulsatilla (Kuhschelle)
Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Ranunculus-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522858.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ranunculus bulbosus Dil. D2, Ranunculus bulbosus Dil. D10, Ranunculus bulbosus Dil. D15, Ranunculus bulbosus Dil. D30, Ranunculus bulbosus Dil. D200, Asclepias tuberosa Dil. D4, Asclepias tuberosa Dil. D10, Asclepias tuberosa Dil. D20, Asclepias tuberosa Dil. D30, Asclepias tuberosa Dil. D200 jeweils 0,05 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2 bis 10 werden gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ranunculus bulbosus Dil. D4, Ranunculus bulbosus Dil. D10, Ranunculus bulbosus Dil. D15, Ranunculus bulbosus Dil. D30, Ranunculus bulbosus Dil. D200, Asclepias tuberosa Dil. D6, Asclepias tuberosa Dil. D10, Asclepias tuberosa Dil. D20, Asclepias tuberosa Dil. D30, Asclepias tuberosa Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten zwei Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Interkostalneuralgien; pleuritische Schmerzen; Herpes zoster.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ranunculus bulbosus (Knollenhahnenfuß)
Viruserkrankungen der Haut und Hornhaut des Auges. Erkrankung des Brustfelles. Rheumatismus im Brustkorbbereich. Nervenschmerzen.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze)
Trockene Rippenfellentzündung. Rheumatismus und Nervenschmerzen im Brustbereich (Interkostalneuralgien).

Rauwolfia compositum

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 37474.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rauwolfia serpentina Dil. D3, Aurum jodatum Dil. D10, Kalmia Dil. D4, Melilotus officinalis Dil. D8, Sulfur Dil. D10, Belladonna Dil. D6, Arnica Dil. D4, Conium Dil. D3, Viscum album Dil. D3, Lycopodium Dil. D6, Cynara scolymus (HAB 34) Dil. D8 (HAB, Vorschrift 3a), Ren suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a) Hepar suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 22 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Bei bekannter Allergie auf Mistelzubereitungen, bei chronischen, granulomatösen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen und bei Hyperthyreose mit nicht ausgeglichener Stoffwechsellage soll das Arzneimittel nicht angewendet werden.
Akut entzündliche bzw. hochfieberhafte Erkrankungen: Die Behandlung sollte bis zum Abklingen der Entzündungszeichen unterbrochen werden. Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arnica (Arnica montana), Artischoke (Cyanara scolymus) oder andere Korbblütler.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Geringe Steigerung der Körpertemperatur, örtlich begrenzte entzündliche Reaktionen um die Einstichstelle der subkutanen Injektion sowie vorübergehende leichte Schwellungen regionaler Lymphknoten sind unbedenklich. Gelegentlich können Venen mit entzündlichen Reizerscheinungen reagieren. Eine vorübergehende Therapiepause ist hier erforderlich.
In seltenen Fällen können bei Unverträglichkeit gegen Mistel örtliche oder allgemeine allergische oder allergieähnliche Reaktionen wie: Generalisierter Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlag, Schwellung im Gesichtsbereich (Quincke Ödem), Schüttelfrost, Atemnot, Blutdruckabfall, Schock auftreten, die ein Absetzen des Präparates und sofortige ärztliche Behandlung erforderlich machen. In seltenen Fällen kann es zur Aktivierung von Entzündungen kommen (z.B. chronische Sinusitis, Zahnwurzelgranulome).
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweise: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Rauwolfia serpentina (Indische Schlangenwurzel)
Bluthochdruck. Verstimmungszustände.
Aurum jodatum (Goldjodid)
Bluthochdruck; Beschwerden bei Schlagaderverkalkung.
Kalmia (Berglorbeer)
Rheumatische und andere Herzerkrankungen.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (besonders kongestive bei „Rotem Hochdruck“).
Sulfur (Schwefel)
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Arnica (Bergwohlverleih)
Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Lähmung und Lähmigkeit. Verstimmungszustände.
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung.
Lycopodium (Bärlapp)
Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Cynara scolymus (Artischocke)
Chronische Leber-Galle-Störungen.

Reneel® NT

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046953.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis Trit. D2 15 mg; Cantharis Trit. D5 30 mg; Causticum Hahnemanni Trit. D4 60 mg; Plumbum aceticum Trit. D6 30 mg; Alumina Trit. D12 75 mg; Sabal serrulatum Trit. D2 30 mg. Die Bestandteile 2-5 werden über zwei Stufen, die Bestandteile 2-6 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege. Bei Blut im Urin, Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Siehe auch unter “Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise”.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Berberis (Berberitze)
Trockene Hautausschläge. Leber- und Gallenleiden. Nieren- und Blasenleiden.
Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen des Harn- und Geschlechtsapparates.

Causticum Hahnemanni
Erkrankungen der Harnwege (bes. schmerzhafte Blasenschwäche mit Brennschmerz). Verstimmungszustände.
Plumbum aceticum (Bleiazetat)
Nervenschmerzen. Mumps.
Alumina (Tonerde)
Trockene Hautausschläge.
Chronisch trockene Schleimhautentzündungen.
Sabal serrulatum (Zwergpalme)
Entzündungen der ableitenden Harnwege.
Blasenentleerungsstörungen.

Rheuma-Heel®

• **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046924.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Trit. D6, Bryonia Trit. D4, Causticum Hahnemanni Trit. D4, Arnica montana Trit. D4, Ferrum phosphoricum Trit. D6 jeweils 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Weichteilrheumatismus (Schmerzzustände und Bewegungseinschränkungen an Muskeln, Sehnen und Bändern).
Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich.
Gegenanzeigen: Rheuma-Heel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse oder bei Überempfindlichkeit gegen Arnica und andere Korbblütler.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rheuma-Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Toxicodendron quercifolium (Giftsumach)
Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Bryonia (Zaunrübe)
Akuter und chronischer Rheumatismus.
Causticum Hahnemanni
Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.
Arnica (Bergwohlverleih)
Myalgie nach Überlastung.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke.

Rhododendroneel® SN

• **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6046901.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 18 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhododendron Dil. D3; Filipendula ulmaria Dil. D3, Asclepias tuberosa Dil. D6, Solanum dulcamara Dil. D4, Ledum palustre Dil. D4, Aconitum napellus Dil. D4 jeweils 1,0 g; Lithium benzoicum Dil. D3 (HAB, Vorschrift 5a; Lösung D1 mit Ethanol 43% (m/m)), Pulsatilla pratensis Dil. D3, Acidum benzoicum e resina Dil. D3, Alsine media (HAB 34) Dil. D2 (HAB, Vorschrift 2a) jeweils 0,5 g. Die Bestandteile 1-9 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-10 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung rheumatischer Beschwerden.
Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden anfangs alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Rhododendron (Alpenrose)
Rheumatismus. Nervenschmerzen (Verschlimmerung besonders vor Regenwetter, Gewitter, Sturm!).
Spiraea ulmaria (Mädesüß)
Rheumatismus.
Asclepias tuberosa (Knollige Seidenpflanze)
Rheumatismus und Nervenschmerzen im Brustbereich.
Solanum dulcamara (Bittersüß)
Fieberhafte Entzündungen der Gelenke, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Ledum (Sumpfporst)
Gicht und Gelenkrheumatismus.
Aconitum (Eisenhut)
Schmerzhafte Nervenerkrankungen.
Stellaria media (Vogelmiere)
Rheumatismus.
Lithium benzoicum (Lithiumbenzoat)
Rheumatismus. Gicht.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Rheumatische Erkrankungen.
Acidum benzoicum e resina (Benzoesäure)
Rheumatische, gichtige und degenerative Gelenkerkrankungen. Ganglien.

Sabal-Homaccord®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sabal serrulatum Dil. Ø 0,9 g; Sabal serrulatum Dil. D10, Sabal serrulatum Dil. D30 jeweils 0,3 g; Hepar sulfuris Dil. D10, Hepar sulfuris Dil. D15, Hepar sulfuris Dil. D30, Hepar sulfuris Dil. D200 jeweils 0,7 g. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser, Gereinigtes.

Anwendungsgebiete: 1. Stadium des Prostataadenoms (früher sog. Prostatahypertrophie); Reizblase.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 45 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Sabal-Homaccord®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522545.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Serenoa repens Dil. D2, Serenoa repens Dil. D10, Serenoa repens Dil. D30 jeweils 3,3 µl; Hepar sulfuris Dil. D12, Hepar sulfuris Dil. D15, Hepar sulfuris Dil. D30, Hepar sulfuris Dil. D200 jeweils 7,7 µl. Die Bestandteile 2 bis 7 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5 und 10 Ampullen zu 1,1 ml; Klinikpackung mit 100 Ampullen.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Sabal serrulatum/Serenoa repens (Zwergpalme)
Entzündungen der ableitenden Harnwege. Blasenentleerungsstörungen (z.B. Harnträufeln bzw. Ischuria paradoxa beim Prostataadenom; „Homöopathischer Katheter“).
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen der Schleimhäute. Nervöse Überempfindlichkeit.

Schwef-Heel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Zusammensetzung: 100 g (= 118 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D4, Sulfur Dil. D6, Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 20 g. Die Bestandteile 3-5 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m), über die letzte Stufe mit Ethanol 86 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Anwendungsgebiete: Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien. Zur Anregung der Abwehrmechanismen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 85 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik des Einzelbestandteiles:
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen.

Selenium-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522815.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 20 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium Dil. D10, Selenium Dil. D15, Selenium Dil. D30, Selenium Dil. D200, Kalium phosphoricum Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D30, Kalium phosphoricum Dil. D200, Kalium phosphoricum Dil. D2 jeweils 0,05 g. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-7 werden gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium Dil. D10, Selenium Dil. D15, Selenium Dil. D30, Selenium Dil. D200, Kalium phosphoricum Dil. D6, Kalium phosphoricum Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D30, Kalium phosphoricum Dil. D200 jeweils 5,5 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation . Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Leistungsschwäche, insbesondere cerebraler Art und/oder arteriosklerotischer Ursache.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Selenium (Selen)
Schwächezustände (inkl. Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Neurasthenie [= „reizbare Schwäche“]).
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände.
Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.

Solidago comp. Heel

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 2522416.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Juniperus communis Dil. D2, Oleum terebinthinae (HAB 1934) Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 86 % (m/m)), Helleborus (HAB 34) Ø (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Berberis Ø, Apocynum Dil. D1, Petroselinum Dil. D1, Sarsaparilla Dil. D2, Solidago virgaurea Dil. D2 jeweils 2 mg.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen Solidago virgaurea oder andere Korbblütler darf Solidago comp. Heel nicht eingenommen werden. Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise."
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Solidago comp. Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweise: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 2-3 mal wöchentlich 2 ml Injektionslösung intramuskulär oder intravenös injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit die Anwendung zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2 ml.

Charakteristik/Symptomatik Einzelbestandteile:
Juniperus communis (Wacholder)
Ausscheidungsstörungen der ableitenden Harnorgane.
Oleum terebinthinae rectificatum (Terpentinöl)
Entzündungen der Harnorgane.
Helleborus (Christrose)
Nierenentzündung.
Berberis (Berberitze)
Nierenerkrankungen und Harnwegserkrankungen, insbesondere Nierensteinleiden.
Apocynum (Indianerhanf)
Chronische Nierenentzündung mit Wassersucht.
Petroselinum (Petersilie)
Harnwegsentzündungen, Reizblase.
Solidago virgaurea (Goldrute)
Nierenschwäche (diuretische Wirkung).
Sarsaparilla (Sarsaparille)
Reizungen der Harnorgane.

Spascupreel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046835.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6046858.00.00

Spascupreel® S

- **SUPPOSITORIEN** Zul.-Nr.: 6046812.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis (HAB 1934) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 4a, Ø, mit Ethanol 86 % (m/m)), Ammonium bromatum Trit. D4, Atropinum sulfuricum Trit. D6, Veratrum (HAB 1934) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)), Magnesium phosphoricum Trit. D6, Gelsemium Trit. D6 jeweils 30 mg; Agaricus (HAB 1934) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 3a), Chamomilla Trit. D3, Cuprum sulfuricum Trit. D6 jeweils 15 mg; Aconitum napellus Trit. D6 60 mg; Passiflora incarnata Trit. D2 15 mg. Die arzneilich wirksamen Bestandteilen 1-10 werden über die vorletzte Stufe, die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-11 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat (Ph. Eur.).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis (HAB 1934) Dil. D4 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Ammonium bromatum Dil. D4, Atropinum sulfuricum Dil. D6, Veratrum (HAB 1934) Dil. D6 (HAB, Vorschrift 4a, Ø, mit Ethanol 62 % (m/m)), Gelsemium Dil. D6 jeweils 1,1 mg; Agaricus (HAB 1934) Dil. D4 (HAB, Vorschrift 3a), Chamomilla Dil. D3, Cuprum sulfuricum Dil. D6 jeweils 0,55 mg; Aconitum napellus Dil. D6 2,2 mg; Magnesium phosphoricum Dil. D6 aquos. 1,1 mg; Passiflora incarnata Dil. D2 0,55 mg. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-9 werden gemeinsam über die letzten 2 Stufen potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Suppositorien: 1 Zäpfchen (= 2,0 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colocynthis (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)), Ammonium bromatum Dil. D3, Atropinum sulfuricum Dil. D5, Veratrum (HAB 1934) Dil. D5 (HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)), Magnesium phosphoricum Dil. D6, Gelsemium Dil. D5 jeweils 1,1 mg; Passiflora incarnata Dil. D1, Chamomilla Dil. D2, Cuprum sulfuricum Dil. D5, Agaricus Dil. D3 jeweils 0,55 mg; Aconitum Dil. D5 2,2 mg.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung krampfartiger Beschwerden der Verdauungsorgane. Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Kamille und andere Korbblütler.
Siehe auch unter “Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise”.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Tabletten: Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. 1 Tablette = 0,025 BE
Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion, Suppositorien: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden mehrmals alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden bis zu 3 mal täglich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Beschwerden 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Suppositorien: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen stündlich, höchstens 6 mal täglich, je ein Zäpfchen in den After einführen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Zäpfchen in den After einführen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Kleinkinder vom 2. bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung: Keine bekannt.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.
Suppositorien: Packungen mit 12 und 60 Zäpfchen zu 2,0 g. Nicht über 30 °C lagern.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Colocynthis (Koloquinte)
Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane. Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.
Atropinum sulfuricum (Atropinsulfat)
Kongestive Entzündungen der oberen Atemwege. Entzündungen der Ausscheidungsorgane einschließlich der Haut.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Nervenschmerzen. Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals. Regelschmerzen.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Krampfleiden.
Passiflora incarnata (Passionsblume)
Schlafstörung. Krampfleiden. Unruhezustände.
Agaricus (Fliegenpilz)
Erregungszustände. Folgen von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Blasen- und Darmentleerungsstörungen.
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden. Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane, der weiblichen Geschlechtsorgane. Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Cuprum sulfuricum (Kupfersulfat)
Krämpfe der (glatten und quergestreiften) Muskulatur. Nächtlicher Krampfhusten.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.

Spigelon®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046166.00.00
  MISCHUNG Zul.-Nr.: 6046137.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Trit. D3, Bryonia Trit. D3, Gelsemium Trit. D3, Melilotus officinalis Trit. D3 jeweils 30 mg; Thuja Trit. D12 60 mg; Natrium carbonicum Trit. D3 30 mg; Acidum silicicum Trit. D12 60 mg; Spigelia anthelmia Trit. D3 30 mg. Die Bestandteile 1-7 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-8 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat (Ph.Eur.).
Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia anthelmia Dil. D3, Atropa belladonna Dil. D3, Bryonia Dil. D3, Gelsemium sempervirens Dil. D3, Melilotus officinalis Dil. D3, Natrium carbonicum Dil. D3 jeweils 1 g; Acidum silicicum Dil. D12, Thuja occidentalis Dil. D12 jeweils 2,0 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 % (m/m).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spigelia anthelmia Dil. D3, Belladonna Dil. D3, Bryonia Dil. D3, Gelsemium Dil. D3, Melilotus officinalis Dil. D3 jeweils 1,1 µl; Acidum silicicum Dil. D12, Thuja Dil. D12 jeweils 2,2 µl; Natrium carbonicum Dil. D3 1,1 µl. Die Bestandteile 1-7 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Tabletten: Bei Kopfschmerzen.
Mischung: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kopfschmerzen. Bei Erbrechen, Seh- oder Bewusstseinsstörungen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Konstitutionelle Kopfschmerzen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Siehe auch unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Tabletten: Bei Erbrechen, Seh- oder Bewusstseinsstörungen sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfern.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Fall Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden mehrmals alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden mehrmals alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Nervenschmerz. Kopfschmerz.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen.
Gelsemium (Wilder Jasmin)
Kopfschmerzen. Nervöse Störungen.
Melilotus officinalis (Steinklee)
Kopfschmerzen (besonders kongestive bei „Rotem Hochdruck").
Natrium carbonicum (Natriumkarbonat)
Geistige Schwäche. Verstimmungszustände (Konstitutionsmittel; u.a. Verschlimmerung der Kopfschmerzen durch geistige Anstrengung).
Acidum silicicum (Silicea)
Geistige Erschöpfung (Konstitutionsmittel; u.a. körperliche [Bindegewebs- bzw. Mesenchymschwäche] sowie seelische Schwäche [Neurasthenie]).
Thuja (Lebensbaum)
Verstimmungszustände (Konstitutionsmittel; u.a. hydrogenoide Konstitution [Grauvogl]).

Strophanthus compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strophanthus Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D10, Aconitum napellus Dil. D6, Latrodectus mactans Dil. D10, Spigelia anthelmia Dil. D4, Cactus Dil. D3, Veratrum Dil. D4, Tabacum Dil. D10, Glonoinum Dil. D4, Carbo vegetabilis Dil. D10 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Antihomotoxischer Regulationseffekt bei Durchblutungsstörungen des Herzens, zur Prophylaxe und Therapie des Myokardinfarktes.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, täglich bis 3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Strophanthus (Strophanthus)
Herzschwäche.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Verschleißkrankheiten (z.B. auch Myokardose, Myodegeneratio cordis). Gutartige, bösartige Gewebewucherungen.
Verstimmungszustände.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.
Latrodectus mactans (Schwarze Witwe)
Angina pectoris.
Spigelia anthelmia (Wurmkraut)
Akute Herzentzündung. Angina pectoris.
Cactus (Königin der Nacht)
Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen.
Tabacum (Tabak)
Beschwerden bei Blutdruckabfall. Angina pectoris.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Bluthochdruck. Angina pectoris.
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Herz- und Kreislaufschwäche.

Strumeel® T

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6047036.00.00

Strumeel forte® NF

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 60446108.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Trit. D3 150 mg; Calcium iodatum Trit. D4 90 mg; Fucus vesiculosus (HAB 34) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 4a) 30 mg. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1 bis 3 über die letzte Stufe mit Lactose gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Dil. D2 5 g; Calcium iodatum Dil. D3 3 g; Fucus vesiculosus (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a) 1 g. Die Bestandteile 1 und 3 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kropfleiden.
Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels bei Schilddrüsenerkrankungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.
Bei Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung muss der Arzt unbedingt auf die Arzneimitteleinnahme hingewiesen werden, da die Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden können.
Gegenanzeigen: Tabletten: Bei Jodüberempfindlichkeit, sowie bei einer Überfunktion der Schilddrüse oder bei Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, darf Strumeel T nicht eingenommen werden. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Mischung: Bei Jodüberempfindlichkeit, sowie bei einer Überfunktion der Schilddrüse oder bei Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, darf Strumeel forte NF nicht eingenommen werden.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren auch aufgrund des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden.
Enthält 40 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Anwendungsfehler und Überdosierung: Tabletten: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Euspongia officinalis (gerösteter Meerschwamm)
Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie der Schilddrüse. Erkrankung der Herzkranzgefäße, der Hauptschlagader.
Calcium iodatum (Kalziumjodid)
Kropfleiden.
Fucus vesiculosus (Blasentang)
Übergewicht. Kropfleiden.

Sulfur comp.-Heel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046077.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Daphne mezereum Trit. D4, Acidum arsenicosum Trit. D6 jeweils 15 mg; Pix liquida (HAB 34) Trit. D6 (HAB, Vorschrift 5a; D1 bis D3 mit Ethanol 86% (m/m)) 60 mg; Caladium seguinum (HAB 34) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 3a), Capsicum annuum Trit. D4 jeweils 90 mg; Sulfur Trit. D4 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Ekzemartige Hauterkrankungen; Juckreiz.
Hinweis: Bei starker Entzündung der Haut, bei Eiterungen sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen.
Daphne mezereum (Seidelbast)
Juckende Hautreizungen und Hauteiterungen. Nervenschmerzen und andere Schmerzzustände.
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen (einschließlich der Haut: Ekzeme, Dermatitiden u.a.).
Pix liquida (Holzteer)
Rissekzem der Hände und Finger.
Caladium seguinum (Schweigrohr)
Juckreiz der Genitalorgane.

Tartephedreel® N

- **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045327.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium stibyltartaricum Dil. D4, Atropa belladonna Dil. D4, Natrium sulfuricum Dil. D4, Arsenum jodatum Dil. D6 jeweils 1,0 g; Blatta orientalis Dil. D6, Lobelia inflata Dil. D4, Cephaelis ipecacuanha Dil. D4, Naphthalinum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Anisum stellatum (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 4a) jeweils 0,5 g. Gemeinsame Potenzierung über die vorletzte Stufe mit Ethanol 62 % (m/m), über die letzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m).
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege.
Bei länger anhaltenden Beschwerden, sowie bei Atemnot, Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zu Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden. Bei Schulkindern unter 12 Jahren soll das Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial mehrmals alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Tartarus stibiatus (Brechweinstein)
Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche.
Atroppa belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane.
Natrium sulfuricum (Natriumsulfat)
Bronchial-Asthma.
Arsenum jodatum (Arsentrijodid)
Schnupfen. Bronchitis.
Anisum stellatum (Sternanis)
Bronchitis.
Lobelia inflata (Aufgeblasene Lobelie)
Störungen des vegetativen Nervensystems. Heuschnupfen. Asthma bronchiale.
Cephaelis ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten.
Blatta orientalis (Schabe)
Bronchitis. Asthma.

Testis compositum N Ampullen

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 37456.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Testis suis Dil. D4 (HAB, Vorschrift 42a), Embryo suis Dil. (HAB, Vorschrift 42a, D3 mit Ethanol 15 % (m/m)) D8, Glandula suprarenalis suis Dil. (HAB, Vorschrift 42a, D3 mit Ethanol 15 % (m/m)) D13, Kalium picrinicum Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D3 mit Gereinigtem Wasser) D6, Ginseng Dil. D4, Damiana Dil. D8, Caladium seguinum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 3a), Cor suis Dil. (HAB, Vorschrift 42a, D3 mit Ethanol 15 % (m/m)) D8, Cortisonacetat Dil. D13 (HAB, Vorschrift 6), Agnus castus Dil. D6, Selenium Dil. D10, Cantharis Dil. D8, Conium Dil. D28, Lycopodium Dil. D28, Phosphorus Dil. D8, Diencephalon suis Dil. (HAB, Vorschrift 42a, D3 mit Ethanol 15 % (m/m)) D10, Magnesium phosphoricum Dil. D10 aquos., Ferrum phosphoricum Dil. D10, Zincum metallicum Dil. D10, Ascorbinsäure Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 15 % (m/m)) D6, Manganum phosphoricum Dil. D8 aquos. (HAB, Vorschrift 6) jeweils 22 mg. Die Bestandteile 1 bis 20 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahren Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Ginseng (Ginsengwurzel)
Schwächezustände.
Damiana (Damiana)
Sexuelle Schwäche.
Caladium seguinum (Schweigrohr)
Juckreiz der Genitalorgane.
Agnus castus (Keuschlamm)
Sexuelle Störungen bei Männern.
Nervöse Verstimmungszustände.
Selenium (Selen)
Schwächezustände.
Cantharis (Spanische Fliege)
Akute Entzündungen des Harn- und Geschlechtsapparates (starker Harndrang mit brennenden Schmerzen).
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Verstimmungszustände.
Lycopodium (Bärlapp)
Entzündungen der Harnorgane. Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Phosphorus (Phosphor)
Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Wirbelsäulenbeschwerden. Knochenentkalkungen (Osteoporose, Osteomalazie).
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Nervenschmerzen. Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals.
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule.
Zincum metallicum (Zink)
Krämpfe und Nervenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule, des Gehirns und des Rückenmarks. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände. Schlafstörungen.

Thalamus compositum N

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**
  Reg.-Nr.: 37457.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thalamus opticus suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42 a), Corpus pineale suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42 a), Glandula suprarenalis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42 a), Viscum album Dil. D10 jeweils 22 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen parenteral 1-2 ml bis zu 1mal täglich i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathischen erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-2 ml 1-3 mal wöchentlich i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Viscum album (Mistel)
Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl. Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.

Tonico-Injeel®

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aurum metallicum Dil. D10, Aurum metallicum Dil. D30, Aurum metallicum Dil. D200 jeweils 1,65 µl; Chininum arsenicosum Dil. D10, Chininum arsenicosum Dil. D30, Helonias dioica Dil. D10, Helonias dioica Dil. D30, Hypericum Dil. D10, Hypericum Dil. D30, Selenium Dil. D10, Selenium Dil. D30 jeweils 1,1 µl; Kalium phosphoricum Dil. D10, Kalium phosphoricum Dil. D30 jeweils 2,2 µl; Nux vomica Dil. D10, Nux vomica Dil. D30 jeweils 2,75 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Erschöpfungszustände physischer, aber auch psychischer Art. Geistige Entwicklungsstörungen der Kinder.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Aurum metallicum (Gold)
Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Depressive Verstimmungszustände.
Chininum arsenicosum (Chininarsenit)
Schwächezustände. Blutarmut. Nervenschmerzen.
Helonias dioica (Falsche Einhornwurzel)
Erschöpfungs- und Verstimmungszustände.
Hypericum (Johanniskraut)
Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems. Verstimmungszustände. Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Selenium (Selen)
Verdauungsschwäche. Schwächezustände.
Kalium phosphoricum (Kaliumphosphat)
Durchfälle. Verdauungsschwäche. Depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustände. Nach Überanstrengung und schweren Krankheiten.
Nux vomica (Brechnuss)
Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Kreislaufbeschwerden. Schwindel. Kopfschmerzen. Muskelkrämpfe. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.

Traumeel® S

- **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG, TABLETTEN FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION SALBE**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D4 25 g; Aconitum napellus Dil. D3 10 g; Symphytum Dil. D8 8 g; Calendula Dil. D2, Hamamelis Dil. D2, Millefolium Dil. D3 jeweils 5 g; Chamomilla Dil. D3 8 g; Echinacea Dil. D2 2 g; Echinacea purpurea Dil. D2 2 g; Hypericum Dil. D2 1 g; Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8 10 g; Hepar sulfuris Dil. D8 10 g; Arnica Dil. D2 5 g; Bellis perennis Dil. D2 2 g.
Die Bestandteile 1-3 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-10 über die letzte Stufe mit Ethanol 30 % (m/m) gemeinsam potenziert. Die Bestandteile 11 und 12 werden über die vorletzte Stufe mit Gereinigtem Wasser, über die letzte Stufe mit Ethanol 15 % (m/m) gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser, Gereinigtes.
Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Millefolium Trit. D3 15 mg; Belladonna Trit. D4 75 mg; Aconitum napellus Trit. D3 30 mg; Chamomilla Trit. D3, Symphytum Trit. D8 jeweils 24 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D8, Hepar sulfuris Trit. D8 jeweils 30 mg; Calendula Trit. D2, Hamamelis Trit. D2 jeweils 15 mg; Bellis perennis Trit. D2, Echinacea Trit. D2, Echinacea purpurea Trit. D2 jeweils 6 mg; Hypericum Trit. D2 3 mg; Arnica Trit. D2 15 mg.
Die Bestandteile 1-7 werden über die vorletzte Stufe, die Bestandteile 1-13 über die letzte Stufe gemeinsam als Verreibung potenziert.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calendula Dil. D2 2,2 µl; Belladonna Dil. D2 2,2 µl; Aconitum napellus Dil. D2 1,32 µl; Bellis perennis Dil. D2 1,1 µl; Hypericum Dil. D2 0,66 µl; Echinacea Dil. D2 0,55 µl; Echinacea purpurea Dil. D2 0,55 µl; Symphytum Dil. D6 2,2 µl; Chamomilla Dil. D3 2,2 µl; Millefolium Dil. D3 2,2 µl; Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 1,1 µl; Hepar sulfuris Dil. D6 2,2 µl; Hamamelis Dil. D1 0,22 µl; Arnica Dil. D2 2,2 µl. Die Bestandteile 1-7 werden jeweils über die letzte Stufe, die Bestandteile 8-10 über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Salbe: 100 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica Dil. D3 1,5 g; Calendula Dil. Ø, Hamamelis Dil. Ø jeweils 0,45 g; Echinacea angustifolia Dil. Ø, Echinacea purpurea Dil. Ø, Chamomilla Dil. Ø jeweils 0,15 g; Symphytum Dil. D4, Bellis perennis Dil. Ø jeweils 0,1 g; Hypericum Dil. D6, Millefolium Dil. Ø jeweils 0,09 g; Aconitum napellus Dil. D1, Belladonna Dil. D1 jeweils 0,05 g; Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 0,04 g; Hepar sulfuris Dil. D6 0,025 g.
Sonstige Bestandteile: Wasserhaltige, hydrophile Salbe DAB mit 12,5 Vol.-% Ethanol, enthält: Cetylstearylalkohol (Typ A), Emulgierender; Paraffin, Dickflüssiges; Vaselin, Weißes; Ethanol 96 %; Wasser, Gereinigtes.
Anwendungsgebiete: Flüssige Verdünnung, Tabletten, Salbe: Verletzungen wie Verstauchungen und Verrenkungen, Prellungen, Blut- und Gelenkergüsse, entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse am Stütz- und Bewegungsapparat (z.B. Sehnenscheiden-, Schleimbeutelentzündungen, Tennisarm), Arthrosen der Hüft-, Knie- und kleinen Gelenke.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Verletzungen wie Verstauchungen und Verrenkungen, Prellungen, Blut- und Gelenkergüsse, Knochenbrüche, postoperative und posttraumatische Ödeme und Weichteilschwellungen. Entzündliche und mit Entzündungen verbundene degenerative Prozesse an den verschiedenen Organen und Geweben, besonders auch am Stütz- und Bewegungsapparat (Tendovaginitis, Styloiditis, Epicondylitis, Bursitis, Periarthritis humeroscapularis u.a.), Arthrosen der Hüft-, Knie- und kleinen Gelenke, Commotio cerebri acuta.
Gegenanzeigen: Flüssige Verdünnung, Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Salbe: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler (Arnica).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion, Salbe: Keine.
Nebenwirkungen: Flüssige Verdünnung, Tabletten: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Nach intraartikulärer Applikation von Traumeel S (Injektionslösung) kann es in seltenen Fällen zu vorübergehenden schmerzhaften Reizzuständen des Gelenkes, eventuell mit steriler Ergussbildung kommen; eine entzündungshemmende Behandlung führt zum Abklingen der Beschwerden. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) und anderen Korbblütlern wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Salbe: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurden über lokale allergische Reaktionen (Entzündungen an der Haut) berichtet.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei Weichteilschwellungen 3 mal täglich 30 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Tabletten: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3 mal wöchentlich 1-2 Ampullen i.m., s.c., i.c. (evtl. Quaddelung), i.v., intraartikulär bzw. periartikulär injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Salbe: Soweit nicht anders verordnet, morgens und abends, bei Bedarf auch öfters, auf die betroffenen Stellen (auch auf Schürfwunden) auftragen, gegebenenfalls auch Salbenverband.
Hinweis: Eine großflächige Anwendung von Traumeel S Salbe ist zu vermeiden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Tabletten: Packungen mit 50 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.
Salbe: Tuben mit 50 und 100 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Arnica (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Calendula (Ringelblume)
Schlecht heilende Wunden. Quetsch-, Riss- und Defektwunden. Erfrierungen und Verbrennungen der Haut.
Hamamelis (Virginischer Zauberstrauch)
Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.
Millefolium (Schafgarbe)
Hellrote Blutungen. Krampfschmerz.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen u.a. der Haut und der Gelenke.
Aconitum (Eisenhut)
Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen.
Mercurius solubilis Hahnemanni (Gemisch, das im wesentlichen Mercuroamidonitrat enthält)
Schleimhautentzündungen. Lymphdrüsenentzündungen. Knochenschmerzen und Rheumatismus.
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute.
Chamomilla (Kamille)
Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Symphytum (Beinwell)
Knochen- und Knochenhautverletzungen.
Bellis perennis (Gänseblümchen)
Blutungen, Blutergüsse. Muskelschmerzen, besonders nach Verletzungen und Überanstrengungen.
Echinacea (Schmalblättrige Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Echinacea purpurea (Purpurrote Kegelblume)
Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen (Anregung der körpereigenen Abwehr).
Hypericum (Johanniskraut)
Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems.

Ubichinon compositum Ampullen

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2,2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coenzym Q10 Dil. D10, Ascorbinsäure Dil. D6, Thiaminchloridhydrochlorid Dil. D6, Riboflavin-5'-phosphat Mononatriumsalz 2 H_2O Dil. D6, Pyridoxinhydrochlorid Dil. D6, Nicotinamid Dil. D6, Myrtillus Dil. D4, Colchicum Dil. D4, Podophyllum Dil. D4, Conium Dil. D4, Hydrastis Dil. D4, Acidum sarcolacticum Dil. D6, Hydrochinon Dil. D8, Sulfur Dil. D8, Trichinoyl Dil. D10, Anthrachinon Dil. D10, 1,4-Naphthochinon Dil. D10, para-Benzochinon Dil. D10, Adenosin-5'-triphosphat, Dinatriumsalz Dil. D10, Coenzym A Dil. D10, Galium aparine Dil. D6, Acetylsalicylsäure Dil. D10, Histamin Dil. D10, Nadid Dil. D10, Magnesium-D-gluconat 2 H_2O Dil. D10, α-Liponsäure Dil. D8 aquos., Manganum phosphoricum Dil. D8 aquos., Natrium oxalaceticum Dil. D8 aquos. jeweils 22 µl. Die Bestandteile 1 bis 25 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Anregung der Giftabwehrmechanismen zwecks Wiederingangsetzung blockierter Fermentsysteme bei Fermentfehlfunktionen und bei degenerativen Erkrankungen (zelluläre Phasen).
Gegenanzeigen: Nicht anwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c. injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,2 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Colchicum (Herbstzeitlose)
Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Podophyllum (Maiapfel)
Störungen des Leber-Galle-Systems. Nach Gallenblasenoperation. Brechdurchfall.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)
Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.
Acidum sarcolacticum (Acidum L(+)-lacticum)
Muskelschmerzen.
Sulfur (Schwefel)
Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen. Leber- und Verdauungsschwäche. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Histamin (Histamin)
Allergische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Niedriger Blutdruck. Herzbeschwerden.

Valerianaheel®

• **MISCHUNG** Zul.-Nr.: 6045497.00.00

Zusammensetzung: 10 g (= 11 ml; 1 ml = 21 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Valeriana Ø 6,5 g; Lupulus Ø, Crataegus Ø, Hypericum Dil. D1 jeweils 0,5 g; Melissa Ø 0,3 g; Chamomilla Ø, Avena sativa Ø jeweils 0,2 g; Acidum picrinicum Dil. D5 1,0 g; Kalium bromatum Dil. D1 0,1, Ammonium bromatum Dil. D1, Natrium bromatum Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)) jeweils 0,1 g.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab: Dazu gehören: Nervös bedingte Unruhe- und Erschöpfungszustände. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Valerianaheel nicht anwenden bei bekannter Allergie gegen Kamille oder andere Korbblütler, bei Bromüberempfindlichkeit oder bei Überempfindlichkeit gegen einen der anderen arzneilich wirksamen Bestandteile.
Das Arzneimittel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Enthält 66 Vol.-% Alkohol.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 15 Tropfen; abends 20 Tropfen. Einzelgabe bei Säuglingen und Kleinkindern 3 Tropfen, im Alter von 2-6 Jahren 5 Tropfen, von 6-12 Jahren 10 Tropfen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Valeriana (Baldrian)
Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen.
Lupulus (Hopfen)
Nervosität. Schlafstörungen.
Crataegus (Weißdorn)
Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.
Hypericum (Johanniskraut)
Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems. Verstimmungszustände. Gehirngefäßverkalkung.
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen. Zahnungsbeschwerden. Krämpfe.
Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Avena sativa (Hafer)
Erschöpfungszustände. Schlafstörungen. Bei Überforderungen nach Krankheiten.
Acidum picrinicum (Pikrinsäure)
Geistige und nervöse Erschöpfungszustände. Gehirngefäßverkalkung (Zerebralsklerose).
Kalium bromatum (Kaliumbromid)
Erregungszustände des Zentralnervensystems. Zerebrales Anfallsleiden. Alpdruck. Schlafwandeln und Schlaflosigkeit. Folgen des Schlaganfalls. Gedächtnisschwäche.
Natrium bromatum (Natriumbromid)
Seelische Störungen mit Antriebssteigerung.

Veratrum-Homaccord®

- **MISCHUNG** Reg.-Nr.: 2522667.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION

Zusammensetzung: Mischung: 10 g (= 10,5 ml; 1 ml = 18 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum (HAB 34) Dil. D10 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)], Veratrum (HAB 34) Dil. D30 [HAB, Vorschrift 42a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)], Veratrum (HAB 34) Dil. D200 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] jeweils 0,06 g; Aloe Dil. D10, Aloe Dil. D30 jeweils 0,02 g; Potentilla erecta Dil. D10, Potentilla erecta Dil. D30 jeweils 0,01 g; Rheum Dil. D10, Rheum Dil. D30 jeweils 0,01 g; Veratrum (HAB 34) Dil. D2 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] 0,06 g; Aloe Dil. D2 0,02 g; Potentilla erecta Ø 0,03 g; Rheum Ø 0,1 g. Die Bestandteile 1 bis 9 werden mit Ethanol 43 % (m/m) und die Bestandteile 10 bis 11 werden mit Ethanol 62 % (m/m) über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 %, Wasser, Gereinigtes.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum Dil. D4, Veratrum Dil. D10, Veratrum Dil. D30, Veratrum Dil. D200 jeweils 6,6 µl; Aloe Dil. D4, Aloe Dil. D10, Aloe Dil. D30 jeweils 2,2 µl; Tormentilla Dil. D10, Tormentilla Dil. D30, Rheum Dil. D10, Rheum Dil. D30, Tormentilla Dil. D2, Rheum Dil. D2 jeweils 1,1 µl. Die Bestandteile 1 bis 11 werden über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Mischung: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Gastroenteritis. Kollapszustände.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Mischung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Mischung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden). Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik ausgewählter Einzelbestandteile:
Veratrum (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankungen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.
Aloe (Aloe)
Magen-Darmstörungen. Stuhlinkontinenz. Hämorrhoiden.
Rheum (Rhabarber)
Durchfallerkrankungen.

Vertigoheel®

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 13442.00.00
  MISCHUNG Zul.-Nr.: 6046396.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 6045511.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anamirta cocculus Trit. D4 210 mg; Conium maculatum Trit. D3, Ambra grisea Trit. D6, Petroleum rectificatum Trit. D8 jeweils 30 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.
Mischung: 10 g (= 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium maculatum Dil. D3, Ambra grisea Dil. D6, Petroleum rectificatum Dil. D8 jeweils 1,0 g; Anamirta cocculus Dil. D4 7,0 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium maculatum Dil. D2, Ambra grisea Dil. D5, Petroleum rectificatum Dil. D7 jeweils 1,1 mg; Anamirta cocculus Dil. D3 7,7 mg. Die Bestandteile 1 und 2 werden über die letzte Stufe mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Verschiedene Schwindelzustände.
Hinweis: Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Tabletten: Bei Überempfindlichkeit gegen Lactose (Milchzucker).
Mischung, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Tabletten: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 4 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 4 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Mischung: Vertigoheel sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Wie alle Arzneimittel sollte Vertigoheel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen; bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Nach Rücksprache mit einem Arzt kann die Dosis bei Bedarf auf 3 mal täglich 3 Tabletten erhöht werden.
Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
4 - 6 Jahre	3 mal tägl. ½ Tablette	6 mal tägl. ½ Tablette
7 - 11 Jahre	2 mal tägl. 1 Tablette	8 mal tägl. ½ Tablette

Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollen ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Mischung: 3 mal täglich 10 Tropfen einnehmen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 10 Tropfen einnehmen.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei anfallsweisem Schwindel täglich, sonst 3-1 mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.
Hinweis: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 100 und 250 Tabletten.
Mischung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Anamirta cocculus (Kokkelskörner)
Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Reisekrankheit, -übelkeit. Verkalkung der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.
Conium (Gefleckter Schierling)
Verkalkungen der Hirngefäße (Zerebralsklerose). Verstimmungszustände.
Ambra grisea (Grauer Amber)
Nervöse Übererregbarkeit und nervöse Erschöpfung. Fehlsteuerungen des vegetativen Nervensystems. Traurige Verstimmungszustände. Gefäßverkalkung. Voralterung.
Petroleum rectificatum (Steinöl)
Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. Schwindel.

Viburcol® N

• **SUPPOSITORIEN** Zul.-Nr.: 6046456.00.00

Zusammensetzung: 1 Zäpfchen (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chamomilla Dil. D1, Belladonna Dil. D2, Plantago major (HAB 34) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 2a) jeweils 1,1 mg; Pulsatilla Dil. D2 2,2 mg; Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8 4,4 mg.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Krankheitsbedingte Unruhezustände bei Säuglingen und Kleinkindern. Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten im Säuglings- und Kindesalter.
Bei Atemnot, Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Bauchschmerzen sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Sofern Viburcol N auch bei Erwachsenen angewendet wird, ist Folgendes zu beachten. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Viburcol N in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen kann es nach der Anwendung von Viburcol N zu Durchfall oder Hautreaktionen kommen.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der PAckungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Säuglinge nach Rücksprache mit einem Arzt täglich höchstens 1 Zäpfchen. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr täglich 1-2 Zäpfchen. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr täglich 1-3 Zäpfchen. Kinder ab 12 Jahren täglich 1-4 Zäpfchen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 12 Zäpfchen zu 1,1 g.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Chamomilla (Kamille)
Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden. Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane. Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.
Belladonna (Tollkirsche)
Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.
Plantago major (Breitblättriger Wegerich)
Schmerzen im Kopfbereich. Einnässen. Durchfall. Hautausschläge.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Blasenentzündungen. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Calcium carbonicum Hahnemanni (Innere weiße Teile der Austernschale)
Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen.

Vomitusheel®

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG**

Vomitusheel® S

• **SUPPOSITORIEN**

Zusammensetzung: Flüssige Verdünnung: 100 g (= 105 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ipecacuanha Dil. D4, Aethusa Dil. D4, Nux vomica Dil. D4 jeweils 10 g; Apomorphinum hydrochloricum Dil. D6 15 g; Colchicum Dil. D6 25 g; Ignatia Dil. D6 30 g. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Ethanol 30 % (m/m).
Suppositorien: 1 Zäpfchen (= 2,0 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ipecacuanha Dil. D2, Aethusa Dil. D2, Nux vomica Dil. D2 jeweils 1,1 mg; Apomorphinum hydrochloricum Dil. D4 1,65 mg; Colchicum Dil. D4 2,75 mg; Ignatia Dil. D4 3,3 mg.
Sonstiger Bestandteil: Hartfett.
Anwendungsgebiete: Erbrechen und Brechreiz verschiedener Genese.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Flüssige Verdünnung: Enthält 35 Vol.-% Alkohol.
Suppositorien: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Flüssige Verdünnung: Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Zuständen initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Suppositorien: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden stündlich 1 Zäpfchen; nach Besserung der Beschwerden nur noch 3(-2) mal täglich 1 Zäpfchen. Bei Säuglingen bis ½ Jahr 2 mal täglich 1 Zäpfchen.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Flüssige Verdünnung: Tropfflaschen mit 30 und 100 ml.
Suppositorien: Packungen mit 12 und 60 Zäpfchen zu 2,0 g.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Ipecacuanha (Brechwurzel)
Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung.
Aethusa (Hundspetersilie)
Akuter Brechdurchfall. Milchunverträglichkeit.
Nux vomica (Brechnuss)
Fieberhafte Erkrankungen. Entzündungen der Atemorgane. Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Schwindel. Krämpfe an Hohlorganen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.
Apomorphinum hydrochloricum (Apomorphinhydrochlorid)
Erbrechen bei verschiedenen Krankheiten.
Colchicum (Herbstzeitlose)
Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

Ypsiloheel® N

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 6046522.00.00

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Asa foetida Trit. D4, Strychnos ignatia Trit. D4, Paris quadrifolia Trit. D4, Thuja occidentalis Trit. D6 jeweils 30 mg; Pulsatilla pratensis Trit. D4, Lachesis mutus Trit. D8, Nitroglycerinum Trit. D6 jeweils 45 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.
Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen wie Herzklopfen, Engegefühl im Hals, Schlafstörungen, Magen-Darmbeschwerden. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen, für die Anwendung und Warnhinweise".
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zu Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
1 Tablette = 0,025 BE
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 50 und 250 Tabletten.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Asa foetida (Stinkasant)
Verschiedene nervöse Störungen.
Ignatia (Ignatiusbohne)
Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen.
Paris quadrifolia (Einbeere)
Kopfschmerz. Täuschungen des Geruchs- oder Tastsinns.
Thuja (Lebensbaum)
Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Verstimmungszustände.
Pulsatilla (Kuhschelle)
Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Regelstörungen aller Art. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.
Lachesis (Buschmeister)
Wechseljahrsbeschwerden. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.
Glonoinum (Nitroglyzerin)
Kopfschmerzen. Bluthochdruck. Angina pectoris.

Zeel® comp. N

- **TABLETTEN** Zul.-Nr.: 48834.00.00
  FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION
  Zul.-Nr.: 37188.00.00

Zusammensetzung: Tabletten: In einer Tablette sind verarbeitet: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D2 1 mg; Solanum dulcamara Dil. D2 0,3 mg; Sulfur Dil. D6 0,75 mg; Arnica montana Dil. D2 0,5 mg; Sanguinaria canadensis Dil. D4 0,45 mg.
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur).
Flüssige Verdünnung zur Injektion: 1 Ampulle zu 2,0 ml (= 2,0 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D4 10 mg; Arnica montana Dil. D4 2 mg; Solanum dulcamara Dil. D4 1 mg; Sanguinaria canadensis Dil. D4 1 mg; Sulfur Dil. D10 3 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Rheumatische Gelenkbeschwerden.
Hinweis: Bei akuten Gelenkbeschwerden, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung einhergehen, sowie bei unklaren oder andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Gegenanzeigen: Tabletten, Flüssige Verdünnung zur Injektion: Zeel comp. N darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse oder bei Überempfindlichkeit gegen Arnica und andere Korbblütler.
Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Zeel comp. N nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Aufgrund des Bestandteils kanadische Blutwurz (Sanguinaria canadensis) soll Zeel comp. N in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Tabletten: Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. 1 Tablette = 0,025 BE.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Keine.

Nebenwirkungen: Tabletten: In Einzelfällen sind während der Behandlung mit sanguinarinhaltigen Arzneimitteln Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildet. In sehr seltenen Fällen können – auch einige Tage nach Einnahme des Arzneimittels – Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler (Arnica) sind in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen (bis zur anaphylaktischen Reaktion) möglich. Es kann vorübergehend zu einer Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle kommen. In Einzelfällen sind während der Behandlung mit sanguinarinhaltigen Arzneimitteln Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildet. In sehr seltenen Fällen können – auch einige Tage nach der Anwendung des Arzneimittels – Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten.
Hinweis: Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Bei diesem Präparat sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Tabletten: 3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Soweit nicht anders verordnet: 2 mal wöchentlich 1 Ampulle, s.c. (einschließlich periartikulär), i.m., i.c., i.v. injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsformen und Packungsgrößen:
Tabletten: Packungen mit 100 und 250 Tabletten.
Flüssige Verdünnung zur Injektion: Packungen mit 10, 50 und 100 Ampullen zu 2,0 ml.

Zeel® comp. N

• **SALBE** Reg.-Nr.: 19348.00.00

Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D2 0,27 g; Arnica montana Dil. D2 0,3 g; Solanum dulcamara Dil. D2 0,075 g; Sanguinaria canadensis Dil. D2 0,225 g; Sulfur Dil. D6 0,27 g.
Sonstige Bestandteile: Emulgierender Cetylstearylalkohol; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaselin; Gereinigtes Wasser.
Konservierungsstoff: Ethanol 13,2 Vol.-%.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Arnicaüberempfindlichkeit. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse und Bestandteile der Salbengrundlage.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Keine.
Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Gegenmaßnahmen: Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, morgens und abends auf die betroffenen Stellen auftragen, z.B. im Bereich des Kniegelenkes einen 4-5 cm langen Salbenstrang einmassieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgröße:
Tuben mit 100 g Salbe.

Charakteristik/Symptomatik der Einzelbestandteile:
Toxicodendron quercifolium/Rhus toxicodendron (Giftsumach)
Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Arnica montana (Bergwohlverleih)
Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.
Solanum dulcamara (Bittersüß)
Entzündungen der Gelenke, ausgelöst durch Kälte und Nässe.
Sanguinaria canadensis (Kanadische Blutwurzel)
Rheumatismus (Muskeln, Weichteile, Gelenke).
Sulfur (Schwefel)
Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

Zitronensäurezyklus-Heel

• **FLÜSSIGE VERDÜNNUNG ZUR INJEKTION**

Zusammensetzung: 1 Sammelpackung (10 Ampullen) enthält je 1 Ampulle zu 1,1 ml: Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel, Natrium pyruvicum-Injeel, Natrium oxalaceticum-Injeel, Acidum citricum-Injeel, Acidum cis-aconiticum-Injeel, Baryum oxalsuccinicum-Injeel, Acidum α-ketoglutaricum-Injeel, Acidum succinicum-Injeel, Acidum fumaricum-Injeel, Acidum DL-malicum-Injeel.
Anwendungsgebiete: Alle Erkrankungen, die den zellulären Phasen zuzuordnen sind (Imprägnationsphasen, Degenerationsphasen, Dedifferenzierungsphasen) und damit durch enzymatische Fehlsteuerungen oder Blockierungen bzw. Störungen der Zellatmung gekennzeichnet sind, z.B.: Bewegungsschwäche, Nervenschmerzen, Nervenentzündungen, Migräne, Hautkrankheiten, Asthma, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Leber-, Nieren- und Pankreaserkrankungen, Herzmuskelschwäche, Herzschmerzen, Arterienverkalkung, Drüsenfunktionsschwäche (z.B. Diabetes, gestörte Schilddrüsenfunktion), Präkanzerosen. Zur Regeneration nach Röntgen- oder radioaktiver Bestrahlung.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, eine Mischinjektion nach folgendem Dosierungsplan, 1-2 mal wöchentlich, im Abstand von 3 bis 7 Tagen, i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

1. Injektion	Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel + Natrium pyruvicum-Injeel + Natrium oxalaceticum-Injeel
2. Injektion	Acidum citricum-Injeel + Acidum cis-aconiticum-Injeel
3. Injektion	Baryum oxalsuccinicum-Injeel + Acidum α-ketoglutaricum-Injeel
4. Injektion	Acidum succinicum-Injeel + Acidum fumaricum-Injeel + Acidum DL-malicum-Injeel

Nach einer Pause von 2 bis 4 Wochen Wiederholung dieser Injektionsserie. Die einzelnen Säuren bzw. deren Salze können auch jeweils für sich allein in der Injeel oder Injeel-forte-Form wiederholt injiziert werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 1,1 ml.

Angaben zu den Einzelmitteln in der Sammelpackung siehe unter den jeweiligen Einzelmittel-Injeelen (indermediärer Katalysator, Gruppe A), Kapitel 3. „Homöopathische Einzelmittel in Potenzenaccorden und Einzelpotenzen".

2 Heel-Homöopathische Einzelmittel in Potenzenaccorden und Einzelpotenzen

- **ACETYLCHOLINCHLORID-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21201.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acetylcholinum chlordatum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Acetylcholinum chlodatum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m(m)), Acetylcholinum chlordatum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)) jeweils 0,367 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Im homöopathischen Umkehreffekt ist dieses Präparat einzusetzen bei allgemeiner Vagotonie, z.B. bei (Neigung zu) Hypotonie, spastischer Bronchitis und Asthma bronchiale, Spasmen im Magen-Darm-Trakt mit und ohne Ulzerationen, vermehrter (Schweiß) Drüsensekretion, (Neigung zu) Bradykardie und reduzierter Schlagstärke bzw. Kontraktionskraft des Herzmuskels sowie auch bei Muskelspastizität.

- **ACETYLSALICYLSÄURE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119805.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum acetylsalicylicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum acetylsalicylicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum acetylsalicylicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Sollten Sie jedoch Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*homöopathisiertes Allopathikum)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum acetylosalicylicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Magen-Darmstörungen, Blutungen, Ohrensausen.

- **ACIDUM ACETYLOSALICYLICUM-INJEEL**

siehe Acetylsalicylsäure-Injeel

- **ACIDUM CIS-ACONITICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121154.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum cis-aconiticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM CIS-ACONITICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121154.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum cis-aconiticum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum cis-aconiticum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Abwehrschwäche. Leichte Erkältlichkeit, Empfindlichkeit gegen Wind und Temperaturschwankungen, verbunden mit Kopfneuralgien, neuralgischen Zahnschmerzen, urtikariellen Ekzemen auf der Kopfhaut. Plötzliche Asthmaanfälle, Stenokardien (meist verbunden mit Tachykardien). Nächtliche Knochenschmerzen, auch in der Wirbelsäule, Scheuermann-Krankheit. Erschöpfungszustände nach Viruskrankheiten und chronischen Infektionen. Alle Beschwerden treten plötzlich auf, bevorzugt abends, und bessern sich durch trockene warme Anwendungen. Stimmung häufig wechselnd (auch depressiv), reizbar, jähzornig.

- **ACIDUM CITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13653.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum citricum Dil. D10, Acidum citricum Dil. D30, Acidum citricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM CITRICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13653.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum citricum Dil. D6, Acidum citricum Dil. D10, Acidum citricum Dil. D30, Acidum citricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum citricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Zahnfleischbluten. Auszehrende Krankheiten.

- **ACIDUM FORMICICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14580.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum formicicum Dil. D12, Acidum formicicum Dil. D30, Acidum formicicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Acidum formicicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM FORMICICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14580.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum formicicum Dil. D4, Acidum formicicum Dil. D12, Acidum formicicum Dil. D30, Acidum formicicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Acidum formicicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum formicicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.
Dazu gehören: Rheumatismus der Muskeln und Gelenke, Ekzeme; Umstimmungsmittel bei Allergien.

- **ACIDUM FUMARICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2120903.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum fumaricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum fumaricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum fumaricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Nicht bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. Wenn Sie Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Nicht bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ACIDUM FUMARICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20904.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum fumaricum Dil. D6 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung Dil. D2 mit Ethanol 86% (m/m)], Acidum fumaricum Dil. D10 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86% (m/m)], Acidum fumaricum Dil. D30 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86% (m/m)], Acidum fumaricum D200 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86% (m/m)] jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Regenerierende Wirkung auf die Zellatmung, „Schwächemittel". Hyperhidrosis bei herabgesetzter Nierenfunktion. Pastöser aufgedunsener Habitus mit bläulicher Gesichtsfarbe und Kurzatmigkeit (Dyspnoe) sowie mit fettiger Haut und fettigem Haar und geschwollenen Augenlidern. Fermentstörungen der Verdauungsorgane (schlechte Fettverdauung). Entzündliche Erkrankungen der Schleimhäute (Sinusitis, Nasen-Rachen-Raum, Bronchitis) und der weiblichen Geschlechtsorgane (Ovariitis, Parametritis). Klimakterische Beschwerden (Schweißausbrüche, Wallungen).

• **ACIDUM α-KETOGLUTARICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121158.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **ACIDUM α-KETOGLUTARICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121158.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Lufthunger (z.B. beim Asthma bronchiale und beim Lungenemphysem sowie beim Sportherz) sowie Zerschlagenheitsgefühl bzw. Zerschlagenheitsschmerz inklusive Weichteil- bzw. Muskelrheumatismus. Drüsenunterfunktionen (Schilddrüse, Ovarien, exkretorischer und inkretorischer Pankreas).

• **ACIDUM L(+)-LACTICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21019.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum L-(+)-lacticum Dil. D4 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung. D2 mit Ethanol 15% (m/m)], Acidum L-(+)-lacticum Dil. D12 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung. D2 mit Ethanol 15% (m/m)], Acidum L-(+)-lacticum Dil. D30 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung. D2 mit Ethanol 15% (m/m)], Acidum L-(+)-lacticum Dil. D200 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung. D2 mit Ethanol 15% (m/m)] jeweils 0,275 g. Die Bestandteile zwei bis vier werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum sarcolacticum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Muskelschmerzen.

- **ACIDUM DL-MALICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121156.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum DL-malicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung des Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. Sollten Sie jedoch Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ACIDUM DL-MALICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121156.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum DL-malicum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum DL-malicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hauptmittel für die Entgiftung und Sauerstoffzufuhr in drüsigen Geweben und Muskeln. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Degenerativ und toxisch bedingte Erkrankungen des Herzmuskels: Myokardschwäche, postinfektiöse Herzmuskelschwäche, Tachykardie, Sportherz. Chronische Bronchitis und Sinusitis mit trockenen Schleimhäuten von Kindheit an. Starke Seborrhö, trockene, schuppende Ekzeme und Psoriasis mit heftigem Juckreiz, Gehörgangsekzem. Pluriglanduläre Insuffizienz (Diabetes mellitus, Struma, Myxödem).Typisch sind kalte Hände und Füße mit bläulicher Verfärbung sowie große Empfindlichkeit gegenüber Wetterwechsel.

- **ACIDUM NITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13620.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum nitricum Dil. D12, Acidum nitricum Dil. D30, Acidum nitricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum nitricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündung der Haut und Schleimhäute mit Neigung zu Hautrissen. Geschwüre. Gut- und bösartige Gewebewucherungen. Krankheiten mit Abmagerung. Verstimmungszustände.

- **ACIDUM PHOSPHORICUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16255.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum phosphoricum Dil. D12, Acidum phosphoricum Dil. D30, Acidum phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Acidum phosphoricum-Injeel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Geistige und körperliche Erschöpfungszustände. Kalkstoffwechselstörungen. Durchfälle.

- **ACIDUM SARCOLACTICUM-INJEEL FORTE**
  siehe Acidum L (+)-lacticum-Injeel forte.

- **ACIDUM SUCCINICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 6018968.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum succinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Acidum succinicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum succinicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Heuschnupfen.

- **ACIDUM SULFURICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13707.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum sulfuricum Dil. D6, Acidum sulfuricum Dil. D12, Acidum sulfuricum Dil. D30, Acidum sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Magenbeschwerden. Hämorrhagische Diathese. Entkräftung. Haut- und Venenerkrankungen.

- **ACONITUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16257.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum napellus Dil. D12, Aconitum napellus Dil. D30, Aconitum napellus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aconitum-Injeel S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aconitum napellus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochakute entzündliche Erkrankungen. Schmerzhafte Nervenerkrankungen. Hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen.

- **ADENOSINTRIPHOSPHAT (ATP)-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20990.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adenosinum triphosphoricum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit gereinigtem Wasser), Adenosinum triphosphoricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit gereinigtem Wasser), Adenosinum triphosphoricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit gereinigtem Wasser), Adenosinum triphosphoricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit gereinigtem Wasser) jeweils 0,275 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine Individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Unterstützung der energieverbrauchenden Systeme; deshalb angezeigt bei Schädigung der energieverwertenden Systeme (Zitronensäurezyklus u.a.), besonders also bei Therapieschäden.

- **ADEPS SUILLUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502410.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Adeps suillus Dil. D12 [HAB, SV. 5a, Lösung. D2 mit 50 Teilen Ether und 49 Teilen Ethanol 99,7% (m/m)], Adeps suillus Dil. D30 [HAB, SV. 5a, Lösung. D2 mit 50 Teilen Ether und 49 Teilen Ethanol 99,7% (m/m)], Adeps suillus Dil. D200 [HAB, SV. 5a, Lösung. D2 mit 50 Teilen Ether und 49 Teilen Ethanol 99,7% (m/m)] jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nach Genuss tierischer Fette (besonders Schweineschmalz) auftretende Beschwerden. Cholesterinämie. Bindegewebsverschlackung. Adipositas. Akne vulgaris; Seborrhö; akute und chronische Ekzeme. Gallenkoliken. Blepharitis, Hordeolum, Chalazion. Beschwerden durch Homotoxine, die durch Gewichtsverluste – z.B. auch bei überschnellen Abmagerungs-, Fasten-, Entwässerungskuren infolge massiver Einschwemmung von Fettgewebe (Depositionsphase) in die Lymph- und Blutbahn – freigemacht sind (intermediäre Abbau-Toxine).

- **ADRENALIN-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19821.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Epinephrinum Dil. D8 (HAB, SV 5a Lösung D3 mit Wasser für Injektionszwecke), Epinephrinum Dil. D12 (HAB, SV 5a Lösung D3 mit Wasser für Injektionszwecke), Epinephrinum Dil. D30 (HAB, SV 5a Lösung D3 mit Wasser für Injektionszwecke), Epinephrinum Dil. D200 (HAB, SV 5a Lösung D3 mit Wasser für Injektionszwecke) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Epinephrinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bluthochdruck. Angina pectoris.

- **AESCULUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13710.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aesculus hippocastanum Dil. D12, Aesculus hippocastanum Dil. D30, Aesculus hippocastanum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **AESCULUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13710.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Aesculus hippocastanum Dil. D6, Aesculus hippocastanum Dil. D12, Aesculus hippocastanum Dil. D30, Aesculus hippocastanum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aesculus hippocastanum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten. Hämorrhoiden. Lenden-Kreuzbeinschmerz.

- **AGNUS CASTUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14162.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitex agnus-castus Dil. D12, Vitex agnus-castus Dil. D30, Vitex agnus-castus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Agnus castus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vitex agnus-castus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Sexuelle Störungen bei Männern. Störungen des Milchflusses. Nervöse Verstimmungszustände.

• ALOE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14155.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aloe Dil. D12, Aloe Dil. D30, Aloe Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aloe-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aloe entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Magen-Darmstörungen. Stuhlinkontinenz. Hämorrhoiden.

• ANTHRACHINON-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anthrachinon D8, Anthrachinon D12, Anthrachinon D30, Anthrachinon D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Gastrointestinale Störungen mit Durchfällen („Alles schlägt auf den Darm“). Hypotonie, die sich durch fast kein anderes Mittel besser beeinflussen lässt. Ferner: Lungenaffektionen (z.B. Pneumonie) und Erkältungskrankheiten, Pleuritis, zumeist mit Erguss. Niereninsuffizienz, besonders wenn gleichzeitig Durchfall (siehe oben) mit großem Elendsgefühl und starken Kopfschmerzen vorliegt. Trockene, schuppende Hautaffektionen, besonders in den Beugen.

• ANTIMONIUM CRUDUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14414.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Stibium sulfuratum nigrum Dil. D12, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D30, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Antimonium crudum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Stibium sulfuratum nigrum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verdauungsstörungen. Hauterkrankungen. Rheumatismus.

- **APIS-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17298.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D12, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **APIS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17298.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Apis mellifica Dil. D4, Apis mellifica Dil. D8, Apis mellifica Dil. D12, Apis mellifica Dil. D30, Apis mellifica Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bienengiftüberempfindlichkeit.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei s.c. Injektion kann es zu Rötungen an der Einstichstelle kommen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Apis mellifica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen. Allergien.

- **ARGENTUM NITRICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14318.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitricum Dil. D12, Argentum nitricum Dil. D30, Argentum nitricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Argentum nitricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Argentum nitricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege. Migräne.

- **ARNICA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17306.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica montana Dil. D12, Arnica montana Dil. D30, Arnica montana Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **ARNICA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17306.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arnica montana Dil. D4, Arnica montana Dil. D12, Arnica montana Dil. D30, Arnica montana Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Korbblütler.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Arnica montana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Blutungen aller Art. Myalgie nach Überlastung. Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.

- **ARSENICUM ALBUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17304.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum arsenicosum Dil. D12, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• ARSENICUM ALBUM-INJEEL FORTE S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17305.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum arsenicosum Dil. D6, Acidum arsenicosum Dil. D12, Acidum arsenicosum Dil. D30, Acidum arsenicosum Dil. D200, Acidum arsenicosum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 1 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum arsenicosum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen aller Schweregrade in allen Geweben und Organen. Schwere Infektionen. Verschleißkrankheiten. Gutartige und bösartige Gewebewucherungen. Verstimmungszustände.

• ARSENUM JODATUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14660.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arsenum jodatum Dil. D12, Arsenum jodatum Dil. D30, Arsenum jodatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Arsenum jodatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Arsenum jodatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schnupfen. Bronchitis. Drüsenschwellung. Altersherz.

• ARTERIA SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20972.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arteria suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Arteria suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Arteria suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel, sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• ARTERIA SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20973.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Arteria suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Arteria suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Arteria suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Arteria suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Durchblutungsstörungen, Claudicatio intermittens. Wadenkrämpfe. Diabetes mellitus. Gangrän. Periarteriitis. Morbus Buerger-Winiwarter (Thrombangiitis obliterans).

• ASA FOETIDA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14317.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Asa foetida Dil. D12, Asa foetida Dil. D30, Asa foetida Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Asa foetida-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Asa foetida entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Atemwege; nervöse Störungen der Verdauungswege; Knochenerkrankungen; Krampfaderleiden; Hautgeschwüre und Fistelbildungen; Störungen der Milchabsonderung; Kopfschmerzen; verschiedene nervöse Störungen.

• ASTHMA-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Asthma-Nosode D10, Asthma-Nosode D30, Asthma-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Asthma bronchiale. Emphysem. Chronische Bronchitis. Stauungslunge. Silikosis. Zyanose. Empirisch bewährt auch bei Keuchhustenanfällen, Harnträufeln, spastischer Obstipation, chronischen Ekzemen und Angstzuständen jeder Art, Platzangst (auch bei Kindern). Zur Anregung der Histaminentgiftung bei sonstigen Imprägnationsphasen.

• ATP-INJEEL FORTE

siehe Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte.

• AURUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14703.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aurum metallicum Dil. D12, Aurum metallicum Dil. D30, Aurum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Aurum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Aurum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhauteiterungen. Knochen- und Knochenhautentzündungen. Bluthochdruck. Gefäßverkalkungen. Angina pectoris. Verhärtung drüsiger Organe. Depressive Verstimmungszustände.

• BACILLINUM HUMANUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacillinum humanum-Nosode D20 (HAB, Vorschrift 43), Bacillinum humanum-Nosode D30 (HAB, Vorschrift 43), Bacillinum humanum-Nosode D200 (HAB, Vorschrift 43) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Tuberculinum BURNETT Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege. Hautkrankheiten. Kopfschmerzen. Schwächezustände.

• BACTERIUM COLI-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bacterium coli-Nosode D12, Bacterium coli-Nosode D30, Bacterium coli-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Müdigkeit. Körperliche und geistige Erschöpfbarkeit. Anwendung falscher Worte. Gedächtnisverlust für letzte Ereignisse. Furchtsamkeit und Unentschlossenheit, häufig verbunden mit Meteorismus. Frösteln nach dem Essen. Zunge weiß-gelblich belegt mit rotem Strich in der Mitte. Auch bei Urintenesmen und trübem, übelriechendem Urin. Verschlimmerung durch feuchte Kälte. O. Julian weist auf gute Wirkungen bei Salpingitis (zu interponieren bei chronischer Adnexitis), Zystitis, Nierensteinen, Cholangitis und depressiven Psychosen hin. Besonders indiziert nach Therapie mit Antibiotika, die ja bekanntlich die physiologische Coli-Flora im Darm mehr oder minder schädigen (Darm-Dysbiose) und bei sonstigen Antibiotikaschäden.

• BAPTISIA-INJEEL S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17406.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Baptisia tinctoria Dil. D12 (HAB, Vorschrift 3a), Baptisia tinctoria Dil. D30 (HAB, Vorschrift 3a), Baptisia tinctoria Dil. D200 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a)
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Baptisia tinctoria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwere, fiebrige Infektionen. Allgemeine Blutvergiftung. Verwirrtheitszustände.

• BARYUM CARBONICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14693.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium carbonicum Dil. D6 aquos., Barium carbonicum Dil. D12, Barium carbonicum Dil. D30, Barium carbonicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Baryum carbonicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Barium carbonicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entwicklungsverzögerung bei Kindern. Chronische Entzündung der Mandeln und der oberen Atemwege. Bluthochdruck. Gefäßverkalkung.

- **BARYUM OXALSUCCINICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21413.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium oxalsuccinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 6), Barium oxalsuccinicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 6), Barium oxalsuccinicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BARYUM OXALSUCCINICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21414.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium oxalsuccinicum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 6), Barium oxalsuccinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 6), Barium oxalsuccinicum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 6), Barium oxalsuccinicum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 3 und 4 werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe A)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Indiziert bei regulativen Störungen des endokrinen Systems, besonders auch in der Pubertät und im Klimakterium. Ferner: Chronische Katarrhe und Asthma mit großer Dyspnoe. Bei allen Ohrenerkrankungen im Kindesalter sowie bei herabgesetztem Geruchsvermögen (Hyposmie, Anosmie). Blutandrang zum Kopf. Status nach Apoplexie. Sehschwäche, Kurzsichtigkeit schon im Kindesalter, Schielen. Augenmuskellähmungen nach Infektionskrankheiten. Entzündliche Erkrankungen der Augenlider. Durchblutungsstörungen der Extremitäten.

- **BELLADONNA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17314.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Atropa belladonna Dil. D12, Atropa belladonna Dil. D30, Atropa belladonna Dil. D200, Atropa belladonna Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BELLADONNA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17314.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Atropa belladonna Dil. D4, Atropa belladonna Dil. D12, Atropa belladonna Dil. D30, Atropa belladonna Dil. D200, Atropa belladonna Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 1 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Atropa belladonna entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochfieberhafte Entzündungen der Mandeln, der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane, der Gehirnhäute, der Haut und der Gelenke.

- **PARA-BENZOCHINON-INJEEL UND FORTE**
  siehe Para-Benzochinon-Injeel und forte

- **BERBERIS VULGARIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19315.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis vulgaris Dil. D12, Berberis vulgaris Dil. D30, Berberis vulgaris Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Berberis vulgaris entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nierenerkrankungen und Harnwegserkrankungen, insbesondere Nierensteinleiden. Gicht. Rheumatismus. Erkrankungen der Leber und Gallenblase. Trockene Hauterkrankungen. Fisteln.

- **BRONCHUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121497.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bronchus suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42), Bronchus suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42), Bronchus suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BRONCHUS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121498.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bronchus suis Dil. D8 (HAB, V. 42), Bronchus suis Dil. D12 (HAB, V. 42), Bronchus suis Dil. D30 (HAB, V. 42), Bronchus suis Dil. D200 (Hab, V. 42) jeweils 0,275 ml.
Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 Ampulle i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Emphysem, Asthma bronchiale. Chronische Bronchitis. Stauungen im kleinen Kreislauf.

- **BRYONIA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17312.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Dil. D12, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **BRYONIA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17312.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bryonia Dil. D4, Bryonia Dil. D12, Bryonia Dil. D30, Bryonia Dil. D200, Bryonia Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 1 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Bryonia cretica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündung der Atemorgane, des Rippenfells, des Bauchfells, der Leber; akuter und chronischer Rheumatismus.

• CACTUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15231.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenicereus grandiflorus Dil. D12, Selenicereus grandiflorus Dil. D30, Selenicereus grandiflorus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cactus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Selenicereus grandiflorus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krämpfe der Muskulatur, der Gefäße, der Hohlorgane. Schleimhautblutungen. Organische und funktionelle Herzkrankheit. Gefäßverkalkung. Bluthochdruck.

• CALCIUM CARBONICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14412.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium carbonicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CALCIUM CARBONICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14412.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D6 aquos., Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium carbonicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium carbonicum Hahnemanni entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kalkstoffwechselstörungen. Chronische Haut- und Schleimhauterkrankungen. Proliferative Schleimhautprozesse.

• **CALCIUM FLUORATUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14416.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium fluoratum Dil. D12, Calcium fluoratum Dil. D30, Calcium fluoratum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium fluoratum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CALCIUM FLUORATUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14416.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium fluoratum Dil. D6 aquos., Calcium fluoratum Dil. D12, Calcium fluoratum Dil. D30, Calcium fluoratum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium fluoratum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium fluoratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der oberen Luftwege und des Magen-Darm-Kanals. Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe. Schilddrüsenerkrankungen.

• **CALCIUM PHOSPHORICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14361.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium phosphoricum Dil. D12, Calcium phosphoricum Dil. D30, Calcium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium phosphoricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CALCIUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14361.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium phosphoricum Dil. D6 aquos., Calcium phosphoricum Dil. D12, Calcium phosphoricum Dil. D30, Calcium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium phosphoricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Konstitutionsmittel bei Lymphatismus. Erschöpfungszustände. Appetitstörungen. Kalkmangelzustände. Wirbelsäulenerkrankungen.

- **CALCIUM SULFURICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14363.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calcium sulfuricum Dil. D6, Calcium sulfuricum Dil. D12, Calcium sulfuricum Dil. D30, Calcium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Calcium sulfuricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calcium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Eiterung der Haut und Unterhaut mit Fistelneigung. Chronische Schleimhauteiterung.

- **CALCULI BILI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Calculi bili-Nosode D10, Calculi bili-Nosode D30, Calculi bili-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Calculi biliarii-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gallensteinleiden.

- **cAMP D8; D12; D30** als Einzelpotenzen.

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19393.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Adenosin-3‘,5‘-cyclophosphoricum Dil. D8 / Dil. D12 / Dil. D30 1,1 g [HAB, SV 5a, D3 mit Ethanol 15% (m/m)].
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Zur Anwendung dieses Arzneimittels als Injektion bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur stimulativen Reaktivierung bei Fermentblockaden (Zellmembranfermente wie Adenylat-Zyklase) bei zellulären Phasen sowie zur stimulativen Aktivierung von Enzymsystemen.

- **CANTHARIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14593.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lytta vesicatoria Dil. D12, Lytta vesicatoria Dil. D30, Lytta vesicatoria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cantharis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lytta vesicatoria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündungen der Schleimhäute, des Harn- und Geschlechtsapparates, des Magen-Darm-Kanals, der Haut mit Blasenbildung. Ergüsse in Körperhöhlen.

• CARBO VEGETABILIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14551.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo vegetabilis Dil. D12, Carbo vegetabilis Dil. D30, Carbo vegetabilis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Carbo vegetabilis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CARBO VEGETABILIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14551.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carbo vegetabilis Dil. D6, Carbo vegetabilis Dil. D12, Carbo vegetabilis Dil. D30, Carbo vegetabilis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Carbo vegetabilis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Carbo vegetabilis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfaderleiden. Entzündung der Atemwege. Heiserkeit. Schwäche der Verdauungsorgane mit Blähsucht. Schleimhautblutung. Herz- und Kreislaufschwäche.

• CARCINOMA COLI-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma coli-Nosode D10, Carcinoma coli-Nosode D30, Carcinoma coli-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden/zusätzlichen Therapie bei Dickdarmkarzinom (auch und besonders postoperativ, z.B. bei Anus-praeter-Trägern). Sigmoiditis, Colitis mucosa et ulcerosa.

• **CARCINOMA MAMMAE-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Carcinoma mammae-Nosode D10, Carcinoma mammae-Nosode D30, Carcinoma mammae-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden bzw. zusätzlichen Therapie bei Mammakarzinom (auch und besonders postoperativ sowie nach Bestrahlung). Ferner bei Mastopathia chronica cystica, Mastitis cystica, Zystenmamma, (zystischer) diffuser Mamma-Fibromatose, „Schrotkugelbrust“.

• **CARDUUS MARIANUS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14583.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Silybum marianum Dil. D4, Silybum marianum Dil. D12, Silybum marianum Dil. D30, Silybum marianum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Carduus marianus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Silybum marianum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Leber-Galle-Erkrankungen. Hämorrhoiden und Krampfleiden. Rheumatismus der Schulter, der Hüfte.

• **CARTILAGO SUIS-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21234.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cartilago suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Cartilago suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Cartilago suis Dil. D200 (HAB; Vorschtift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m., s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **CARTILAGO SUIS-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cartilago suis D8, Cartilago suis D12, Cartilago suis D30, Cartilago suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cartilago entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Begleittherapie bei Gelenkerkrankungen.

- **CAUSTICUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17412.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), Causticum Hahnemanni Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a) Causticum Hahnemanni Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CAUSTICUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17412.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Causticum Hahnemanni Dil. D4, Causticum Hahnemanni Dil. D12, Causticum Hahnemanni Dil. D30, Causticum Hahnemanni Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Causticum Hahnemanni entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Erkrankungen der Atemwege, der Harnwege. Chronische Ekzeme. Chronische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Krampfleiden. Lähmungen. Verstimmungszustände.

- **CEREBELLUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502832.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebellum suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebellum suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebellum suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CEREBELLUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 250283.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebellum suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebellum suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebellum suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebellum suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Kinetosen. Menièresches Syndrom. Schwindel. Hyperemesis gravidarum. Schlaflosigkeit.

- **CEREBRUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21284.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebrum suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Cerebrum suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CEREBRUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21285.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum suis Dil. D8 (HAB, V. 42a), Cerebrum suis Dil. D12 (HAB, V. 42a), Cerebrum suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Cerebrum suis Dil. Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Geistige Erschöpfungszustände und Entwicklungsstörungen. Funktionsschwäche und Durchblutungsstörungen des Gehirns. Progressive Paralyse (Nachbehandlung). Paraplegie. Arteriosklerotische Demenz. Enzephalomalazie.

- **CEREBRUM TOTALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum totalis suis D10, Cerebrum totalis suis D30, Cerebrum totalis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CEREBRUM TOTALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cerebrum totalis suis D8, Cerebrum totalis suis D12, Cerebrum totalis suis D30, Cerebrum totalis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Indikationen wie Cerebrum suis (Großhirn) und Cerebrum frontalis suis (vordere Hirnabschnitte; Stirnhirn).

- **CHAMOMILLA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14573.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chamomilla recutita Dil. D12, Chamomilla recutita Dil. D30, Chamomilla recutita Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Chamomilla-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Chamomilla recutita entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemorgane. Zahnungsbeschwerden. Entzündungen und Krämpfe der Verdauungsorgane, der weiblichen Geschlechtsorgane. Heftige Schmerzzustände. Reizbare Verstimmungszustände.

• CHELIDONIUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14587.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium majus Dil. D12, Chelidonium majus Dil. D30, Chelidonium majus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Chelidonium-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CHELIDONIUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14587.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium majus Dil. D4, Chelidonium majus Dil. D12, Chelidonium majus Dil. D30, Chelidonium majus Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei bestehenden Lebererkrankungen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe soll Chelidonium-Injeel forte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Das Arzneimittel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrung vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen sind während der Behandlung mit Schöllkrautpräparaten Anstiege der Leber-Transaminasen und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentöse-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildete.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Falle sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihren Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Bei der Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte kontrolliert werden Chelidonium-Injeel forte sollte ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Chelidonium majus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems. Entzündung der Atemorgane und des Rippenfelles. Rheumatismus.

• CHOLESTERINUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14575.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cholesterolum Dil. D12, Cholesterolum Dil. D30, Cholesterolum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cholesterinum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CHOLESTERINUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14575.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cholesterolum Dil. D6, Cholesterolum Dil. D12, Cholesterolum Dil. D30, Cholesterolum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cholesterinum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cholesterinum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Lebererkrankungen und Vermehrung von Cholesterin im Blut.

• CIMICIFUGA-INJEEL S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17300.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga racemosa Dil. D12, Cimicifuga racemosa Dil. D30, Cimicifuga racemosa Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• CIMICIFUGA-INJEEL FORTE S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17300.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cimicifuga racemosa Dil. D4, Cimicifuga racemosa Dil. D12, Cimicifuga racemosa Dil. D30, Cimicifuga racemosa Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cimicifuga racemosa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatischer und wirbelsäulenbedingter Muskelschmerz. Krampfschmerz des Herzens, des Magen-Darm-Kanals, der Gallenblase und im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Regel-, Schwangerschaft- und Wechseljahrbeschwerden. Nervöse Erregungs- und depressive Verstimmungszustände.

• CISTUS CANADENSIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21295.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (=1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cistus canadensis (HAB 34) Dil. D12 (HAB, Vorschrift 3a), Cistus canadensis (HAB 34) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 3a), Cistus canadensis (HAB 34) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,367 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Helianthemum canadense entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Juckende Hautflechte. Entzündung der Lymphdrüsen. Entzündung der Brustdrüse. Erkrankung der Atemwege.

• COCCULUS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14504.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anamirta cocculus Dil. D6, Anamirta cocculus Dil. D12, Anamirta cocculus Dil. D30, Anamirta cocculus Dil. D200, Anamirta cocculus Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cocculus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Anamirta cocculus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache. Reise-Krankheit, -Übelkeit. Verkalkung der Hirngefäße. Hinterhauptkopfschmerz. Krämpfe und Lähmungen. Regelstörungen. Nervöse Störungen und Verstimmungszustände auch nach Schlafmangel.

- **COFFEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14555.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coffea arabica Dil. D12, Coffea arabica Dil. D30, Coffea arabica Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Coffea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Coffea arabica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schlafstörungen. Neuralgien.

- **COLCHICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14510.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum autumnale Dil. D12, Colchicum autumnale Dil. D30, Colchicum autumnale Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Colchicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COLCHICUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14510.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum autumnale Dil. D6, Colchicum autumnale Dil. D12, Colchicum autumnale Dil. D30, Colchicum autumnale Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Colchicum-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Colchicum autumnale entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute und chronische Gicht. Akuter Gelenkrheumatismus. Sehnenscheidenentzündung. Ergüsse in Körperhöhlen. Nierenentzündung. Entzündung des Magen-Darm-Kanals.

- **COLIBACILLINUM-INJEEL**

siehe Bacterium coli-Injeel

- **COLOCYNTHIS-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17410.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Citrullus colocynthis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 4a), Citrullus colocynthis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a), Citrullus colocynthis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COLOCYNTHIS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17410.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Citrullus colocynthis Dil. D4 (HAB, Vorschrift 4a), Citrullus colocynthis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 4a), Citrullus colocynthis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a), Citrullus colocynthis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Citrullus colocynthis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals, des Gallensystems, der Harnorgane. Nervenentzündungen und Nervenschmerzen, besonders des Gesichts. Ischiasschmerz.

- **COLON SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19458.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colon suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a) , Colon suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Colon suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COLON SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colon suis D8, Colon suis D12, Colon suis D30, Colon suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnliche Wirkungen wie Coecum suis, jedoch kräftiger. Auch bei Enterospasmen (Flexura lienalis, Sigmoid). Nabelkoliken, Darmtenesmen, Darmatonie (spastisch-atonische Obstipation!) sowie bei Colitis mucosa et ulcerosa. Insomnie. Ist als Zwischenmittel oder zu Beginn der Kur bei allen schweren Giftlagen indiziert.

- **CONIUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17408.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium maculatum Dil. D12, Conium maculatum Dil. D30, Conium maculatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CONIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17408.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium maculatum Dil. D4, Conium maculatum Dil. D12, Conium maculatum Dil. D30, Conium maculatum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 1 bis 4 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Conium maculatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verkalkungen der Hirngefäße. Lähmung und Lähmigkeit. Drüsenschwellungen. Neubildungen in verschiedenen Organen. Verstimmungszustände.

- **COR SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cor suis D10, Cor suis D30, Cor suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COR SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cor suis D8, Cor suis D12, Cor suis D30, Cor suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hypotonie. Angina pectoris. Koronardurchblutungsstörungen. Herzinsuffizienz. Sportherz. Paroxysmale Tachykardie. Nachbehandlung post infarctum.

- **CORPUS LUTEUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21248.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus luteum suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Corpus luteum suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Corpus luteum suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen des weiblichen Hormonhaushaltes. Frühzeitiges Altern. Klimakterium. Störungen im Ablauf der Schwangerschaft.

- **CORPUS PINEALE SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21570.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus pineale suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Corpus pineale suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Corpus pineale suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
(Suis-Oranpräparat)
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Wirkt bremsend auf Neoplasmaphasen. Papillome der Blase. Asthma bronchiale. Versuchsweise auch bei epileptiformen Zuständen und Degenerationsphasen allgemeiner Art als Neben- und Zwischenmittel sowie bei Chorea minor.

- **CORPUS VITREUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Corpus vitreum suis D8, Corpus vitreum suis D12, Corpus vitreum suis D30, Corpus vitreum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Glaskörpertrübungen. Glaukom. Katarakta.

- **CORTISON-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13856.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cortisonacetat Dil. D12 (HAB, Vorschrift 8a), Cortisonacetat Dil. D30 (HAB, Vorschrift 8a), Cortisonacetat Dil. D200 (HAB, Vorschrift 8a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CORTISON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13856.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cortisonacetat Dil. D6 (HAB, Vorschrift 6 und 11), Cortisonacetat Dil. D12 (HAB, Vorschrift 8a), Cortisonacetat Dil. D30 (HAB, Vorschrift 8a), Cortisonacetat Dil. D200 (HAB, Vorschrift 8a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Folgen von Cortisonmissbrauch und anderen Cortison-Therapieschäden. Schädigungen der NNR, der Hypophyse, besonders des Hypophysenvorderlappens (Simmonds-Kachexie bzw. Simmonds-Sheehan-Syndrom, Dystrophia adiposogenitalis). Bindegewebsschwäche bzw. Bindegewebsschäden, z.B. Osteoporose, Osteomalazie, Osteochondrose, Bänderschwäche mit Umknicken der Gelenke, Sudecksche Atrophie und andere am Bindegewebe manifest werdende Erkrankungen.

- **COXSACKIE-VIRUS-A_9-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie-Virus A_9-Nosode D15, Coxsackie-Virus A_9-Nosode D30, Coxsackie-Virus A_9-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **COXSACKIE-VIRUS-A_9-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie-Virus A_9-Nosode D10, Coxsackie-Virus A_9-Nosode D15, Coxsackie-Virus A_9-Nosode D30, Coxsackie-Virus A_9-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Adjuvans bei „enteralen" Erkrankungen, Magen-Darm-Affektionen wie Gastritis, Duodenitis, Colitis mucosa und ulcerosa, Colon irritable; ferner Zystopyelitis, Urethritis, Reizblase, Prostatitis, Epididymitis, Rhinitis, Sinusitis, Sinubronchiales Syndrom.

• COXSACKIE-VIRUS-B_4-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie Virus B_4-Nosode D15, Coxsackie Virus B_4-Nosode D30, Coxsackie Virus B_4-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• COXSACKIE-VIRUS-B_4-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Coxsackie Virus B_4-Nosode D10, Coxsackie Virus B_4-Nosode D15, Coxsackie Virus B_4-Nosode D30, Coxsackie Virus B_4-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Nosodenpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bei den Folgezuständen von „zentralen" Affektionen, z.B. bei Zuständen nach Meningitis bzw. Meningismus, nach Enzephalitis und den entsprechenden psychischen Symptomen u.a. auch Depressionen, Erschöpfungszustände, Konzentrationsschwäche, pathologische Ermüdbarkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen u.a.

• CRATAEGUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14737.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crataegus Dil. D12, Crataegus Dil. D30, Crataegus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Crataegus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Crataegus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herz- und Kreislaufstörungen wie Herzschwäche, Altersherz, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Störungen des Blutdruckes.

• CROTALUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19591.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Crotalus horridus horridus e veneno sicc. Dil. D12 [HAB, SV 5a, Lösung. D2 mit Glycerol 85% (m/m)], Crotalus horridus horridus e veneno sicc. Dil. D30 [HAB, SV 5a, Lösung. D2 mit Glycerol 85% (m/m)], Crotalus horridus horridus e veneno sicc. Dil. D200 [HAB, SV 5a, Lösung. D2 mit Glycerol 85% (m/m)] jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Crotalus horridus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwere Infektionen der Haut, der Schleimhäute. Neigung zu allgemeiner Blutvergiftung. Blutungen aller Art. Lähmungen.

- **CUPRUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14695.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cuprum metallicum Dil. D12, Cuprum metallicum Dil. D30, Cuprum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cuprum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **CUPRUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14695.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cuprum metallicum Dil. D6 aquos., Cuprum metallicum Dil. D12, Cuprum metallicum Dil. D30, Cuprum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cuprum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cuprum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Cerebrales Anfallsleiden. Muskelkrämpfe. Krämpfe der glatten Muskulatur, des Magen-Darm-Kanals, der Atemorgane, der Gefäße, der Herzkranzgefäße. Kreislaufversagen.

- **CURARE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20917.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Curare D12 (HAB, Vorschrift 6), Curare D30 (HAB, Vorschrift 6), Curare D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 0,367 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuell Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Curare entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Lähmungen. Lähmigkeiten. Krämpfe.

- **CUTIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21367.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cutis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Cutis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Cutis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Allergische Reaktionen. Dermatosen. Ekzem. Seborrhö. Pemphigus. Rhagaden. Psoriasis. Dekubitus. Dermatomykosen. Elephantiasis. Sklerodermie. Nach Verbrennungen (auch Röntgenstrahlen). Neurodermitis. Störungen der Nierenexkretion (Ableitung auf der Haut!), Hyperhidrosis u.a.

• CYNARA SCOLYMUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19474.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cynara scolymus (HAB 34) Dil. D10 (HAB, Vorschrift 3a), Cynara scolymus (HAB 34) Dil. D30 (HAB, Vorschrift 3a), Cynara scolymus (HAB 34) Dil. D200 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Dauer der Anwendung: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cynara scolymus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Leber-Galle-Störungen.

• CYSTEIN-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2121052.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cysteinum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), Cysteinum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Cysteinum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Retoxische Störungen und Therapieschäden jeder Art und Lokalisation. Zu interponieren bei allen zellulären Phasen, speziell bei Leberschäden verschiedener Art, Asthma bronchiale, Leukämie, Präkanzerosen und Neoplasmaphasen.

• CYSTOPYELONEPHRITIS-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cystopyelonephritis-Nosode D12, Cystopyelonephritis-Nosode D30, Cystopyelonephritis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronisch-rezidivierende Entzündungen und Folgezustände im Bereich der ableitenden Harnwege einschließlich des Nierenparenchyms („interstitielle“ Nephritis, „Phenacetin-Niere“, Papillennekrosen).

- **DISCUS INTERVERTEBRALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502749.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Discus intervertebralis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Discus intervertebralis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Discus intervertebralis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i..m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **DISCUS INTERVERTEBRALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502748.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Discus intervertebralis suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Discus intervertebralis suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Discus intervertebralis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Discus intervertebralis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1 - 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Discus intervertebralis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Begleittherapie bei Bandscheibenschäden.

- **DUODENUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19462.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Duodenum suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Duodenum suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Duodenum suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ulcus duodeni. Ulkusdiathese. Duodenitis. Pankreatitis. Gastrokardialer Symptomenkomplex (Roemheld). Pylorospasmus.

- **ECHINACEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14710.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D12, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Echinacea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• ECHINACEA-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14710.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Dil. D4, Echinacea Dil. D12, Echinacea Dil. D30, Echinacea Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe, oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Echinacea-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Echinacea angustifolia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen.

• EMBRYO TOTALIS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21238.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Embryo totalis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Embryo totalis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Embryo totalis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur Revitalisierung (durchblutungsfördernd und allgemein stimulativ). Generell bei zellulären Phasen, Arteriosklerose, Muskeldystrophie.

• EUPATORIUM PERFOLIATUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14993.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Eupatorium perfoliatum Dil. D12, Eupatorium perfoliatum Dil. D30, Eupatorium perfoliatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Eupatorium perfoliatum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Eupatorium perfoliatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Grippe, grippeähnliche fieberhafte Erkrankungen. Fieberhafte Erkrankungen des Leber-Galle-Systems. Rheumatismus.

- **EUPHRASIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14907.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphrasia officinalis Dil. 12, Euphrasia officinalis Dil. D30, Euphrasia officinalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Euphrasia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Euphrasia officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Augen. Entzündung der oberen Luftwege.

- **FERRUM METALLICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14903.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Dil. D6 aquos., Ferrum metallicum Dil. D12, Ferrum metallicum Dil. D30, Ferrum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ferrum metallicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ferrum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Blutungen. Blutarmut. Kreislaufstörungen. Verdauungsschwäche. Nervenschmerzen. Entzündung der Atemwege.

- **FERRUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21055.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum phosphoricum D6 aquos., Ferrum phosphoricum D12, Ferrum phosphoricum D30, Ferrum phosphoricum D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2-4 werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 i.v., i.m. oder s.c injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ferrum phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberhafte, entzündliche Erkrankungen der Atemorgane. Blutungen und deren Folgen. Rheumatische Erkrankungen der Wirbelsäule und der Schultergelenke.

- **FORMICA RUFA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14935.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Formica rufa Dil. D12, Formica rufa Dil. D30, Formica rufa Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Formica rufa-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Formica rufa entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gichtige Erkrankungen. Rheumatismus. Entzündungen der Luftwege. Allergische Erkrankungen.

• FUCUS VESICULOSUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19644.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fucus vesiculosus (HAB 34) Dil. D12 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)], Fucus vesiculosus (HAB 34) Dil. D30 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)], Fucus vesiculosus (HAB 34) Dil. D200 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)] jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Fucus vesiculosus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Übergewicht. Kropfleiden.

• FUNICULUS UMBILICALIS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20974.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Funiculus umbilicalis suis Dil. D10 (HAB, V. 42), Funiculus umbilicalis suis Dil. D30 (HAB, V. 42), Funiculus umbilicalis suis Dil. D200 (HAB, V. 42) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• FUNICULUS UMBILICALIS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20975.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Funiculus umbilicalis suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42), Funiculus umbilicalis suis Dil. D12 (HAB, vorschrift 42), Funiculus umbilicalis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42), Funiculus umbilicalis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 bis 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahren Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fast bei allen chronischen Erkrankungen indiziertes Bindegewebsmittel. Bindegewebsschäden. Osteochondrose. Osteomalazie, gegebenenfalls mit Zervikalsyndrom und vertebragenen Neuralgien. Vorzeitiges Altern sowie geriatrische Indikationen jeder Art inklusive Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose und sonstige Gefäßleiden sowie Runzelbildung, Fibrome. Ferner Autoaggressionskrankheiten, Schäden durch Antibiotika und sonstige Chemotherapeutika, allgemeine Therapieschäden. Strahlenschäden. Pruritus (inklusive vulvae), Psoriasis, Akne rosacea, Elephantiasis, Erythema exsudativum multiforme et nodosum, Skrofulose, Neurodermitis, öde-

matöse Hautveränderungen, Dermatitiden. Myopie (insbesondere bei der häufigsten Form der Myopie, der Achsenmyopie infolge zu großer a-p-Länge des Augapfels mit erhöhter Dehnbarkeit des Augapfels und der Folge einer Myopia maligna). Uterusprolaps bzw. Descensus uteri (bindegewebige Beckenbodeninsuffizienz mit Erschlaffung des Band- und Halteapparates). Muskelatrophie. Ödematöse Weichteilschwellungen sowie Myxödem. Dystrophia adiposogenitalis. Adynamie, Marasmus, Kachexie. Vegetative Dystonie. Ggf. wichtiges Nebenmittel bei Arthrosen (inklusive Koxarthrosen), bei Exostosen sowie bei Tendovaginitis. Ferner Nebenmittel bei Divertikulitis, chronischer Colitis, Ulcus duodeni et ventriculi, Fissura ani, Harnröhrenstrikturen, Hydrozele sowie bei Morbus Bechterew und Myositis ossificans. Wichtiges Nebenmittel ferner beim Lungenemphysem, beim Glaukom sowie bei Lymphogranulomatose, Sarkomen und Karzinomen sowie bei Multipler Sklerose und Otosklerose.

- **GELSEMIUM-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17296.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium sempervirens Dil. D6, Gelsemium sempervirens Dil. D10, Gelsemium sempervirens Dil. D30, Gelsemium sempervirens Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GELSEMIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17296.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gelsemium sempervirens Dil. D4, Gelsemium sempervirens Dil. D6, Gelsemium sempervirens Dil. D10, Gelsemium sempervirens Dil. D30, Gelsemium sempervirens Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Gelsemium sempervirens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerzen. Nervöse Störungen. Infektionskrankheiten. Lähmungen und Krampfleiden.

- **GINGIVA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gingiva suis D10, Gingiva suis D30, Gingiva suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Parodontose. Parodontitis. Apikale Foki. Gingivitis. Chronische Aphthenbildung.

- **GINSENG-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19464.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ginseng Dil. D12, Ginseng Dil. D30, Ginseng Dil. D200 jeweils 0,367 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Panax pseudoginseng entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Schwächezustände.

- **GLANDULA LYMPHATICA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21447.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula lymphatica suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula lymphatica suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula lymphatica suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **GLANDULA LYMPHATICA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula lymphatica suis D8, Glandula lymphatica suis D12, Glandula lymphatica suis D30, Glandula lymphatica suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
außer Handel
ab 01.10.2007
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Lymphatismus. Exsudative Diathese. Unklare Lymphdrüsenschwellungen sonstiger Genese. Nabelkoliken. Chronische Tonsillitis. Tonsillarhypertrophie. Agranulozytose. Als Nebenmittel bei Morbus Hodgkin (Lymphogranulomatose), Lymphsarkom und Retikulosen.

- **GLANDULA PARATHYREOIDEA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21397.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula parathyreoidea suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula parathyreoidea suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula parathyreoidea suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i. v., i. m. oder s. c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Glandula parathyreoidea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kalziumstoffwechselstörungen.

- **GLANDULA PINEALIS SUIS-INJEEL UND FORTE**

siehe Corpus pineale suis-Injeel und forte.

- **GLANDULA SUPRARENALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20956.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula suprarenalis suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Glandula suprarenalis suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Glandula suprarenalis suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Adynamie. Erschöpfungszustände. Morbus Addison und andere Erscheinungen der Nebennierenerschöpfung. Primär chronische Polyarthritis. Hypotonie. Vagotonie. Asthma bronchiale. Neurodermitis. Rhagaden. Colitis mucosa. Spasmophilie. Nach Verbrennungen. Geriatrikum.

• **GLANDULA THYMI SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21297.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula thymi suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula thymi suis (HAB, Vorschrift 42a) Dil. D30, Glandula thymi suis (HAB, Vorschrift 42a) Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 - 2 ml i. v., i. m. oder s. c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Wachstums- und Entwicklungsstörungen. Mongolismus. Neoplasmaphasen.

• **GLANDULA THYREOIDEA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21299.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glandula thyreoidea suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula thyreoidea suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Glandula thyreoidea suis Dil. D200 HAB, Vorschrift 42a jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Mongolismus. Myxödem. Adipositas. Struma parenchymatosa et colloides. Leber- und Nierenerkrankungen. Neoplasmaphasen.

• **GLYOXAL-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21005.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Glyoxalum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit gereinigtem Wasser), Glyoxalum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit gereinigtem Wasser), Glyoxalum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit gereinigtem Wasser) jeweils 0,367 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Alle zellulären Phasen, besonders auch Neoplasmaphasen und Viruskrankheiten.

• **GNAPHALIUM POLYCEPHALUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21160.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Gnaphalium polycephalum (HAB 34) Dil. D12 (HAB, V. 3a), Gnaphalium polycephalum (HAB 34) Dil. D30 (HAB, V. 3a), Gnaphalium polycephalum (HAB 34) Dil. D200 (HAB, V. 3a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Pseudognaphalium obtusifolium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Ischiasschmerz. Nervenschmerzen. Durchfallerkrankungen.

• GONOCOCCINUM-INJEEL UND FORTE

siehe Medorrhinum-Injeel und forte

• GRANULOMA DENTIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Granuloma dentis-Nosode D10, Granuloma dentis-Nosode D30, Granuloma dentis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur unterstützenden Therapie bei Fokalerkrankungen und Fokaltoxikosen nach entsprechender Herdausschaltung; gegebenenfalls auch zur „Fokussuche“ („diagnostische Suchspritze“). Erkrankungen mit fokaler Genese bzw. Anamnese wie z.B. Krankheitsbilder aus dem rheumatischen Formenkreis, chronische Neuralgien und Neuritiden, Kopfschmerzen, Endo-, Myo-, Perikarditiden mit und ohne Herzrhythmusstörungen, Herzklappenfehler, Herzinsuffizienzerscheinungen. Ferner auch bei Parulis und Parodontopathien.

• GRAPHITES-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14910.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D12, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Graphites-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• GRAPHITES-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14910.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Graphites Dil. D6, Graphites Dil. D12, Graphites Dil. D30, Graphites Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Graphites-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Graphites entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Regelstörung. Verdauungsschwäche. Altersbedingte Erkrankungen. Ekzeme und andere Erkrankungen der Haut. Entzündung der Schleimhäute.

- **GRIPPE-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Grippe-Nosode D10, Grippe-Nosode D30, Grippe-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1-3 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Eine der am meisten indizierten Nosoden überhaupt, weil Grippe(spät)folgen jeder Art sehr häufig sind, z.B. chronische Polysinusitis, asthmatoide Beschwerden, anhaltende Heiserkeit, rheumatische Beschwerden mit mehr oder minder heftigen Schmerzen (Grippe-Rheumatoid), Erschöpfung und Müdigkeit, Herzbeschwerden, Durchblutungsstörungen, Zerschlagenheitsgefühl der Glieder – gegebenenfalls verbunden mit Muskelschmerzen –, Kopfschmerzen. Frösteln sowie anhaltende Nachtschweiße u.a.
Ferner allgemeine Neigung zu Korpulenz und Adipositas – auch bei Kindern – aufgrund einer Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose). Neigung zu chronisch-rezidivierenden Erkältungen.
Generell gilt: Nach überstandener Infektion bzw. nach soeben durchgemachter Infektionskrankheit stellen die entsprechenden Nosoden ein ausgezeichnetes Mittel dar, die im Mesenchym abgelagerten Toxine zur (schnelleren) Ausscheidung zu bringen.

- **HAMAMELIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14941.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis virginiana Dil. D12, Hamamelis virginiana Dil. D30, Hamamelis virginiana Dil. D200, Hamamelis virginiana Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hamamelis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HAMAMELIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14941.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hamamelis virginiana Dil. D4, Hamamelis virginiana Dil. D6, Hamamelis virginiana Dil. D12, Hamamelis virginiana Dil. D30, Hamamelis virginiana Dil. D200, Hamamelis virginiana Dil. D1000 jeweils 0,183 ml. Die Bestandteile 2 bis 6 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hamamelis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hamamelis virginiana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krampfaderleiden. Hämorrhoiden. Haut- und Schleimhautblutungen.

- **HEKLA LAVA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21030.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hekla Lava Dil. D12 (HAB, Vorschrift 6), Hekla Lava Dil. D30 (HAB, Vorschrift 6), Hekla Lava Dil. D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hekla Lava entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Knochen- und Knochenhautentzündungen. Knochenauswüchse.

• HEPAR SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21240.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Hepar suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Hepar suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• HEPAR SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21241.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Hepar suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Hepar suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Hepar suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.
Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Leberschäden und mangelnde Leberentgiftung. Chronische Ekzeme. Neurodermitis. Psoriasis. Erythematodes. Porphyrie. Auch bei Dermatomykosen, Pemphigus und Kraurosis vulvae. Männliche Sterilität. Röntgenkater. Hypoglykämie. Anorexia nervosa. Als Zwischenmittel bei zellulären Phasen häufig indiziert. Zur Anregung der entgiftenden Leberfunktion auch bei Arthrosis deformans und Periarthritis humeroscapularis indiziert.

• HEPAR SULFURIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19570.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hepar sulfuris Dil. D12, Hepar sulfuris Dil. D30, Hepar sulfuris Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hepar sulfuris calcarea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Eiterungen der Haut und Schleimhäute wie Furunkel, chronische Mittelohrvereiterung und Mandelabszess. Zur Behandlung der lymphatischen Veranlagung. Nervöse Überempfindlichkeit.

- **HERPES SIMPLEX-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Herpes simplex-Nosode D12, Herpes simplex-Nosode D30, Herpes simplex-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronisch rezidivierende Herpesinfektionen gleich welcher Ursache (Herpes febrilis, menstrualis, solaris, „Schreckbläschen“) und Lokalisation (Herpes labialis, [pro]genitalis, gingivalis). Auch bei herpetiformen Hautkrankheiten und arzneibedingten (As, J, Hg) Herpesarten sowie Infektionskrankheiten, die mit einem Herpes labialis (febrilis) gegebenenfalls einhergehen können.

- **HERPES ZOSTER-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Herpes zoster-Nosode D12, Herpes zoster-Nosode D30, Herpes zoster-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zur Nachbehandlung des Herpes zoster. Ferner bei den oft sehr therapierefraktären postherpetischen Neuralgien, ebenso aber auch bei anderen Herpes- bzw. Zoster-ähnlichen Erkrankungen (symptomatische Ähnlichkeit!).

- **HISTAMIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Histaminum D12, Histaminum D30, Histaminum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HISTAMIN-INJEEL FORTE** außer Handel ab 25.07.2007

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Histaminum D6, Histaminum D12, Histaminum D30, Histaminum D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Histamin entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Allergische Erkrankungen wie Asthma bronchiale, Rhinitis vasomotorica; allergische Erkrankungen der Haut; ferner Gastritis und Duodenitis mit und ohne Ulcus, Magen- und Darmspasmen; gesteigerter Sekretion der Speichel- und Dränendrüsen sowie der Bronchialdrüsen. Da Histamin auch bei Brandwunden, Quetschungen, Frakturen, Gewebszertrümmerungen freigesetzt wird, ist das homöopathisierte Histamin auch bei diesen Traumen angezeigt. Histamin wird zur Desensibilisierung eingesetzt.

- **HYDRASTIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14884.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrastis canadensis Dil. D12, Hydrastis canadensis Dil. D30, Hydrastis canadensis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hydrastis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HYDRASTIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14884.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrastis canadensis Dil. D4, Hydrastis canadensis Dil. D12, Hydrastis canadensis Dil. D30, Hydrastis canadensis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hydrastis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hydrastis canadensis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhauteiterung auch mit Geschwürbildung. Entzündungen und Koliken des Leber-Galle-Systems und des Magen-Darm-Kanals. Polypen.

- **HYDROCHINON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19671.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrochinonum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Hydrochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Hydrochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)), Hydrochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)) jeweils 0,275 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Bei toxischen Belastungen des Leberparenchyms sowie bei Störungen in der Sauerstoffutilistion, z.B. bei Imprägnationsphasen – wie Asthma bronchiale (Dyspnoe) und Dermatosen – sowie bei Präkanzerosen. Ferner chronische trockene Ekzeme, besonders wenn diese bei dem geringsten Diätfehler exazerbieren.

- **HYOSCYAMUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14938.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hyoscyamus niger Dil. D4, Hyoscyamus niger Dil. D12, Hyoscyamus niger Dil. D30, Hyoscyamus niger Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hyoscyamus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hyoscyamus niger entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Unruhe und Erregungszustände. Schlafstörungen. Spastische Zustände der Atemwege und der Verdauungswege.

• HYPERICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14956.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypericum perforatum Dil. D12, Hypericum perforatum Dil. D30, Hypericum perforatum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hypericum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• HYPERICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14956.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypericum perforatum Dil. D3, Hypericum perforatum Dil. D6, Hypericum perforatum Dil. D12, Hypericum perforatum Dil. D30, Hypericum perforatum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Hypericum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hypericum perforatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verletzungen des peripheren oder zentralen Nervensystems. Verstimmungszustände. Gehirngefäßverkalkung. Asthma.

• HYPOPHYSIS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20976.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypophysis suis Dil. D10 (HAB, V. 42), Hypophysis suis Dil. D30 (HAB, V. 42), Hypophysis suis Dil. D200 (HAB, V. 42) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 mal i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• HYPOPHYSIS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20977.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypophysis suis Dil. D8 (HAB, V. 42), Hypophysis suis Dil. D12 (HAB, V. 42), Hypophysis suis Dil. D30 (HAB, V. 42), Hypophysis suis Dil. D200 (HAB, V. 42) jeweils 0,275 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuell Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hypophysis cerebri entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schwindel- und Verwirrtheitszustände.

- **HYPOTHALAMUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21132.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypothalamus suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Hypothalamus suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Hypothalamus suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **HYPOTHALAMUS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hypothalamus suis D8, Hypothalamus suis D12, Hypothalamus suis D30, Hypothalamus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Schlafstörungen. Morbus Parkinson. Epileptiforme Zustände. Reifungs- und Entwicklungsstörungen, auch solche geistiger Art bei Kindern. Chorea minor. Nymphomanie. Erregungszustände. Simmonds-Kachexie.

- **IGNATIA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17414.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos ignatii Dil. D12, Strychnos ignatii Dil. D30, Strychnos ignatii Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **IGNATIA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17414.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos ignatii Dil. D4, Strychnos ignatii Dil. D12, Strychnos ignatii Dil. D30, Strychnos ignatii Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strychnos ignatii entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervöse Störungen. Verstimmungszustände. Krämpfe an Hohlorganen und Muskeln.

- **INFLUENZINUM-INJEEL**

siehe Grippe-Nosode-Injeel.

- **IPECACUANHA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14954.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cephaelis ipecacuanha Dil. D12, Cephaelis ipecacuanha Dil. D30, Cephaelis ipecacuanha Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ipecacuanha-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Cephaelis ipecacuanha entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bronchitis. Bronchialasthma. Keuchhusten. Magen-Darm-Entzündung. Schleimhautblutung. Kreislaufstörungen.

- **JABORANDI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14947.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pilocarpus Dil. D12, Pilocarpus Dil. D30, Pilocarpus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Jaborandi-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Pilocarpus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Augenbeschwerden. Vermehrte Schweißbildung.

- **KALIUM BICHROMICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 14953.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium bichromicum Dil. D12, Kalium bichromicum Dil. D30, Kalium bichromicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kalium bichromicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium bichromicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, des Harnsystems. Chronische Geschwüre der Haut. Nervenschmerz und Rheumatismus.

- **KALIUM CARBONICUM-INJEEL FORTE N**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 3812.00.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium carbonicum Dil. D6, Kalium carbonicum Dil. D12, Kalium carbonicum Dil. D30, Kalium carbonicum Dil. D200, Kalium carbonicum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium carbonicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündung der Atemwege, des Rippenfells. Herzerkrankungen. Wasseransammlung in Geweben. Abnutzungskrankheiten des Skelettsystems. Allgemeine Schwäche. Menstruationsstörungen. Erkrankungen in der Schwangerschaft.

- **KALMIA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17285.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalmia latifolia Dil. D12, Kalmia latifolia Dil. D30, Kalmia latifolia Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalmia latifolia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische und andere Herzerkrankungen. Rheumatismus. Gürtelrose. Nervenschmerzen.

- **KIEFEROSTITIS-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kieferostitis-Nosode D12, Kieferostitis-Nosode D30, Kieferostitis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fokalerkrankungen und Fokaltoxikosen, z.B. chronische Neuralgien (besonders des 2. und 3. Trigeminus-Astes) sowie Sinusitiden, die trotz Entfernung sämtlicher Zähne weiterbestehen! Ferner: Knochen- und Periostaffektionen.

- **KREOSOTUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15138.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kreosotum Dil. D12, Kreosotum Dil. D30, Kreosotum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kreosotum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kreosotum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Harn- und Geschlechtsorgane. Blutungsneigung. Verhaltensstörungen bei Kindern. Altersbedingte Erkrankungen.

- **LACHESIS-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15530.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lachesis Dil. D12, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200, Lachesis Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **LACHESIS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15531.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lachesis Dil. D8, Lachesis Dil. D12, Lachesis Dil. D30, Lachesis Dil. D200, Lachesis Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lachesis muta entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute. Wechseljahrsbeschwerden. Drüsenerkrankungen. Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung. Venenentzündungen. Angina pectoris. Herz- und Kreislaufschwäche. Nervenschmerzen. Rheumatismus. Krämpfe. Lähmungen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

• LARYNX SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Larynx suis D8, Larynx suis D12, Larynx suis D30, Larynx suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Heiserkeit. Aphonie. Störungen der Stimmbildung. Stimmbandpolypen. Versuchsweise bei Ca. laryngis.

• LEDUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15057.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ledum palustre Dil. D12, Ledum palustre Dil. D30, Ledum palustre Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ledum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ledum palustre entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Gicht und Gelenkrheumatismus. Verrenkungen. Verstauchungen. Lähmigkeit. Stich- und Bissverletzungen. Keuchhusten und andere Entzündungen der Atemwege. Haut- und Schleimhautblutungen.

• LUFFA OPERCULATA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15120.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Luffa operculata Dil. D10, Luffa operculata Dil. D30, Luffa operculata Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Luffa operculata-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Luffa operculata entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schnupfen. Heuschnupfen. Verdauungsschwäche.

• LYCOPODIUM-INJEEL S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17394.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopodium clavatum Dil. D8, Lycopodium clavatum Dil. D12, Lycopodium clavatum Dil. D30, Lycopodium clavatum Dil. D200, Lycopodium clavatum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **LYCOPODIUM-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17394.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopodium clavatum Dil. D4, Lycopodium clavatum Dil. D8, Lycopodium clavatum Dil. D12, Lycopodium clavatum Dil. D30, Lycopodium clavatum Dil. D200, Lycopodium clavatum Dil. D1000 jeweils 0,183 ml. Die Bestandteile 2 bis 6 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lycopodium clavatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemorgane. Allgemeine Blutvergiftung. Folgen von Infektionskrankheiten. Entzündungen und Störungen des Leber-Galle-Systems, Verdauungsstörungen, Stoffwechselkrankheiten. Entzündungen der Harnorgane, Nierensteinleiden. Krampfaderleiden. Verschiedene chronische und akute Hauterkrankungen. Regelstörungen und Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Andere Alterskrankheiten. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

- **MAGNESIUM-MANGANUM-PHOSPHORICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502874.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium phosphoricum Dil. D12, Magnesium phosphoricum Dil. D30, Magnesium phosphoricum Dil. D200, Manganum phosphoricum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 6), Manganum phosphoricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 6), Manganum phosphoricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 0,183 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen hömöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Katalysatorische Wirkung der Spurenelemente Magnesium und Manganum. Aktivator für intermediäre Katalysatoren des Zitronensäurezyklus.

- **MAGNESIUM PHOSPHORICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15234.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium phosphoricum Dil. D6 aquos., Magnesium phosphoricum Dil. D12, Magnesium phosphoricum Dil. D30, Magnesium phosphoricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Magnesium phosphoricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Magnesium phosphoricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervenschmerzen. Schmerzhafte Krämpfe des Magen-Darm-Kanals. Regelschmerzen.

- **MAMMA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21574.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mamma suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Mamma suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Mamma suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

außer Handel

- **MAMMA SUIS-INJEEL FORTE** ab 01.10.2007

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21575.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mamma suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Mamma suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Mamma suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Mamma suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Laktorrhoe. Mastodynie. Präkanzerose. Fibrombildung. Schlaffe und unterentwickelte Brüste. Zwischenschmerz. Post amputationem mammae.

- **MEDORRHINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medorrhinum-Nosode D12, Medorrhinum-Nosode D30, Medorrhinum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDORRHINUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medorrhinum-Nosode D10, Medorrhinum-Nosode D12, Medorrhinum-Nosode D30, Medorrhinum-Nosode D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Medorrhinum-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane, der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Rheumatismus. Verhaltensauffälligkeiten. Voralterung.

- **MEDULLA OBLONGATA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21572.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla oblongata suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Medulla oblongata suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Medulla oblongata suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 ml.
Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

außer Handel
ab15.11.2007

- **MEDULLA OBLONGATA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla oblongata suis D8, Medulla oblongata suis D12, Medulla oblongata suis D30, Medulla oblongata suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Paralysis agitans. Progressive Bulbärparalyse. Polyneuritis. Multiple Sklerose. Amyotrophische Lateralsklerose. Tabes dorsalis. Spinalparalyse. Chorea minor. Hypotonie. Störungen in den vegetativen Zentren, z.B. auch bei Asthma bronchiale.

- **MEDULLA OSSIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21242.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla ossis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Medulla ossis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Medulla ossis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDULLA OSSIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla ossis suis D8, Medulla ossis suis D12, Medulla ossis suis D30, Medulla ossis suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Anämie. Leukämie. Agranulozytose und sonstige Therapieschäden. Strahlenschäden. Koxitis. Osteomalazie. Osteomyelitis chronica. Exostosen. Arthritis deformans. Morbus Sudeck.

- **MEDULLA SPINALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21703.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla spinalis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Medulla spinalis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Medulla spinalis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MEDULLA SPINALIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21704.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Medulla spinalis suis Dil. D8, Medulla spinalis suis Dil. D12, Medulla spinalis suis Dil. D30, Medulla spinalis suis Dil. D200 jeweils 0,275 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Multiple Sklerose. Amyotrophische Lateralsklerose. Tabes dorsalis. Paresen. Myelitis. Paraplegie. Chorea minor.

- **MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI- INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15600.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D12, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D30, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D200, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Es kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15607.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D10, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D12, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D30, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D200, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Es kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Mercurius solubilis Hahnemanni entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schleimhautentzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Hauterkrankungen. Mandel-, Lymphdrüsen-, Leber- und Nierenentzündungen. Entzündungen anderer drüsiger Organe. Knochenschmerzen und Rheumatismus. Entkräftende Krankheiten. Gehirngefäßverkalkung.

- **MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15601.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hydrargyrum bichloratum Dil. D12, Hydrargyrum bichloratum Dil. D30, Hydrargyrum bichloratum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mercurius sublimatus corrosivus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Es kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Hydrargyrum bichloratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochakute Schleimhautentzündung der Augen, der Mundhöhle, der Mandeln, des Dick- und Enddarmes, der Nieren, der ableitenden Harnwege, der Scheide.

- **MUCOSA NASALIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13860.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucosa nasalis suis Dil. D10, (HAB, Vorschrift 42), Mucosa nasalis suis Dil. D30, (HAB, Vorschrift 42), Mucosa nasalis suis Dil. D200, (HAB, Vorschrift 42) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mucosa nasalis suis-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **MUCOSA NASALIS SUIS-INJEEL FORTE** außer Handel ab 25.07.2007

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13860.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mucosa nasalis suis Dil. D8, (HAB, Vorschrift 42), Mucosa nasalis suis Dil. D12, (HAB, Vorschrift 42), Mucosa nasalis suis Dil. D30, (HAB, Vorschrift 42), Mucosa nasalis suis Dil. D200, (HAB, Vorschrift 42) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Mucosa nasalis suis-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: (Poly)Sinusitis chronica. Rhinitis. Ozaena. Nasenpolypen. Nasen- und Nebenhöhlenaffektionen sonstiger Art, evtl. mit Reflexzuständen an inneren Organen (z.B. Ulcus duodeni, Asthma bronchiale).

- **MUSCULUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Musculus suis D10, Musculus suis D30, Musculus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, anfangs 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• MUSCULUS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Musculus suis D8, Musculus suis D12, Musculus suis D30, Musculus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Myotonie. Muskuläre Insuffizienz. Muskeldystrophie. Muskelatrophie. Schwäche- und Erschöpfungszustände. Insomnie.

• MYOMA UTERI-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myoma uteri-Nosode D10, Myoma uteri-Nosode D30, Myoma uteri-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Myome des Uterus, Uterus myomatosus. Menorrhagien, Metrorrhagien. Frigidität. Sterilität junger Frauen.

• MYRISTICA SEBIFERA-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21163.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myristica sebifera Dil. D6, Myristica sebifera Dil. D12, Myristica sebifera Dil. D30, Myristica sebifera Dil. D200 jeweils 0,275 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Virola sebifera entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Eiterungen.

• NAGELMYKOSE-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nagelmykose-Nosode D10, Nagelmykose-Nosode D30, Nagelmykose-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Erkrankungen der Hautanhangsgebilde sowie der Haut. Nagelmykosen und Dermatomykosen. Haarausfall. Auch bei Erkrankungen einzusetzen, die als retoxische Schädigungen nach extern bzw. intern behandelten Mykosen auftreten, z.B. chronische Neuralgien. Hier ist die Anamnese der ausschlaggebende Faktor.

- **NAPHTHOCHINON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21627.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 1,4-Naphthochinonum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 % (m/m)), 1,4-Naphthochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 % (m/m)), 1,4-Naphthochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 % (m/m)), 1,4-Naphthochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 86 % (m/m)) jeweils 0,275 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Alle zellulären Phasen, speziell Neoplasmaphasen und Viruskrankheiten, jedoch auch toxische Infektionen (Reaktionsphasen). Hauptindikationen sind vor allem Karzinome im Bereich des Darmes und der Geschlechtsorgane (Carcinoma uteri und Carcinoma prostatae) sowie generell alle Tumoren, nach deren operativer Entfernung eine Strahlenbehandlung (gegebenenfalls mit Strahlenschäden) durchgeführt wurde.

- **NATRIUM MURIATICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16009.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium chloratum Dil. D8, Natrium chloratum Dil. D12, Natrium chloratum Dil. D30, Natrium chloratum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium muriaticum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **NATRIUM MURIATICUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16009.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium chloratum Dil. D6, Natrium chloratum Dil. D8, Natrium chloratum Dil. D12, Natrium chloratum Dil. D30, Natrium chloratum Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium muriaticum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Natrium chloratum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Migräne. Magen-Darm-Erkrankungen. Verstimmungszustände. Hauterkrankungen. Erkrankungen des Stützgewebes.

- **NATRIUM OXALACETICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13858.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium oxalaceticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a u. 11), Natrium oxalaceticum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 8a), Natrium oxalaceticum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 8a) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal pro Wochen jeweils den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan, oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NATRIUM OXALACETICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13858.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium oxalaceticum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 6 u. 11), Natrium oxalaceticum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a u. 11), Natrium oxalaceticum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 8a), Natrium oxalaceticum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 8a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 3 und 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal pro Woche jeweils den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten (Abwehrschwäche). Empfindlich gegen Wind und Feuchtigkeit sowie gegen Licht- und Sonneneinstrahlung. Überempfindlichkeit gegen Eiweiß und Fette (nicht gegenüber Zucker). Ferner: Therapieresistenter Schwindel, Status vor und nach Apoplexie, Hypertonie, akute und chronische Gastritis. Entzündliche Erkrankungen der Nieren und des Nierenbeckens sowie starkes Schwitzen bei Tag und Nacht mit Gelbfärbung der Wäsche. Schweiß riecht nach Ammoniak, Harn riecht nach Spargel.

• **NATRIUM PYRUVICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502768.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium pyruvicum Dil. D10 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)], Natrium pyruvicum Dil. D30 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)], Natrium pyruvicum Dil. D200 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43 % (m/m)] jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m., oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **NATRIUM PYRUVICUM-INJEEL FORTE**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502767.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium pyruvicum Dil. D6 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43% (m/m)], Natrium pyruvicum Dil. D10 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43% (m/m)], Natrium pyruvicum Dil. D30 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43% (m/m)], Natrium pyruvicum Dil. D200 [HAB, Vorschrift 5a Lösung D1 mit Ethanol 43% (m/m)] jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe A)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnlichkeit mit Sulfur-Symptomen (da bei einem Pyruvatstau Sulfur-ähnliche Symptome auftreten!). Angezeigt bei allen zelluläre Phasen, so z.B. bei Asthma bronchiale, juckenden Ekzemen, Psoriasis, rheumatischen und gichtischen Manifestationen, organischen Nervenkrankheiten, Psychosen, Präkanzerosen. Migräne, morgens auftretend und bis Sonnenuntergang anhaltend mit Brechreiz und Elendsgefühl. Durchblutungsstörungen (auch bei Diabetes mellitus). Generell vor allem auch bei allen Therapieschäden.

• **NATRIUM SULFURICUM-INJEEL**
Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15596.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium sulfuricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D30, Natrium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium sulfuricum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• NATRIUM SULFURICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15596.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium sulfuricum Dil. D4, Natrium sulfuricum Dil. D12, Natrium sulfuricum Dil. D30, Natrium sulfuricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Natrium sulfuricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Natrium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Leber-Galle-Störungen. Morgendiarrhoe. Bronchial-Asthma. Folgen eines Traumas des Nervensystems. Rheumatismus.

• NERVUS OPTICUS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nervus opticus suis D10, Nervus opticus suis D30, Nervus opticus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• NERVUS OPTICUS SUIS-INJEEL FORTE

außer Handel ab15.11.2007

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nervus opticus suis D8, Nervus opticus suis D12, Nervus opticus suis D30, Nervus opticus suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Atrophia nervi optici (z.B. postluetisch [Tabes dorsalis] oder toxisch bzw. postneuritisch sowie bei MS). Sehstörungen. Flimmerskotom. Migräne.

• NUX VOMICA-INJEEL S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17396.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos nux-vomica Dil. D12, Strychnos nux-vomica Dil. D30, Strychnos nux-vomica Dil. D200, Strychnos nux-vomica Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• NUX VOMICA-INJEEL FORTE S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17396.01.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strychnos nux-vomica Dil. D4, Strychnos nux-vomica Dil. D12, Strychnos nux-vomica Dil. D30, Strychnos nux-vomica Dil. D200, Strychnos nux-vomica Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strychnos nux-vomica entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fieberhafte Erkrankungen. Entzündungen der Atemorgane. Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals. Leber- und Gallestörungen. Verstopfung. Hämorrhoiden. Beschwerden durch Nahrungsmittel, Arzneimittel und Genussmittel. Harnwegserkrankungen. Kreislaufbeschwerden. Schwindel. Angina pectoris-Beschwerden. Blutungen. Kopfschmerzen. Nervenschmerzen und rheumatische Schmerzen. Krämpfe an Hohlorganen, Muskelkrämpfe. Lähmungen. Schlafstörungen. Nervliche Überreiztheit. Verstimmungszustände.

• OCULUS TOTALIS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21578.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Oculus totalis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Oculus totalis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Oculus totalis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werde.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• OCULUS TOTALIS SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21579.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Oculus totalis suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Oculus totalis suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Oculus totalis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Oculus totalis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Augenerkrankungen imprägnativer und degenerativer Art. Glaukom. Katarakta. Chronische Konjunktivitis. Skleritis. Bei chronischen Granulationen (Tbc) Vorsicht!

außer Handel
ab 01.09.2007

• OS PETROSUM SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os petrosum suis D8, Os petrosum suis D12, Os petrosum suis D30, Os petrosum suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Otosklerose. Ohrgeräusche, Schwerhörigkeit. Sonstige Imprägnations- und Degenerationsphasen des Innenohres.

- **OS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os suis D10, Os suis D30, Os suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **OS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Os suis D8, Os suis D12, Os suis D30, Os suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Osteoporose. Osteomalazie. Morbus Sudeck. Exostosen. Periostitis. Rachitis.

- **OTITIS MEDIA-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Otitis media-Nosode D10, Otitis media-Nosode D30, Otitis media-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische und chronisch-rezidivierende Otitis media, chronisch laufende/nässende Ohren, Cholesteatom. Otitis externa. Sinusitis. Ohrtubenkatarrh. Eventuell auch wirksam bei chronischer Zystitis bzw. Neigung dazu, da Ohr und Harnblase gewisse Korrelationen aufweisen. Als Wechselmittel bei Osteomyelitis und entzündlichen Prozessen/Eiterungen sonstiger Art und Lokalisation.

- **OVARIALCYSTE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarialcyste-Nosode D10, Ovarialcyste-Nosode D30, Ovarialcyste-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zystische Veränderungen jeder Art und Lokalisation, insbesondere versuchsweise bei Ovarialzysten, besonders nach durchgeführter Zystenoperation zur Vermeidung von Rezidiven. Beschwerden während der Menarche, Klimakterium praecox, „gynäkologische Migräne“, z.B. vor oder während der Menses.

- **OVARIUM SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20958.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarium suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Ovarium suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Ovarium suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordne: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **OVARIUM SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20959.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ovarium suis Dil. D8 (HAB, V. 42a), Ovarium suis Dil. D12 (HAB, V. 42a), Ovarium suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Ovarium suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordne: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Ovarialfunktion. Dysmenorrhoe. Amenorrhoe. Klimakterium mit ovariellen Ausfallerscheinungen. Hypermenorrhoe. Metrorrhagien. Weibliche Sterilität. Klimakterische Neurosen mit Depressionen. Nymphomanie. Eifersuchtswahn. Kraurosis vulvae. Mastodynie. Osteomalazie.

- **PANKREAS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21244.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreas suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Pankreas suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Pankreas suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PANKREAS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21245.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pankreas suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Pankreas suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Pankreas suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Pankreas suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.
Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Diabetes mellitus (pankreogener). Marasmus. Kachxie. Chronische Enteritis. Duodenitis. Störungen der Darmfermentation. Dysbakterie. Adynamie. Gastrokardialer Symptomenkomplex (Roemheld).

- **PARA-BENZOCHINON-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119356.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: para-Benzochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung des Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PARA-BENZOCHINON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119357.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: para-Benzochinonum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), para-Benzochinonum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,275 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei der Anwendung des Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. Sollten Sie jedoch Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Durch das gesamte Arzneimittelbild von Para-Benzochinon zieht sich Entartung der verschiedensten Gewebe bis zum Tumor mit fast hoffnungsloser Kachexie und totaler Entgleisung des Stoffwechsels bei vollkommener Reaktionslosigkeit auf sonst gut gewählte Medikamente. Anwendungsgebiete: Alle zellulären Phasen, z.B. auch Leukämie, Asthma bronchiale, organische Nervenerkrankungen, Hepatitis u.a. sowie Präkanzerosen und Neoplasmaphasen.

- **PARATHYREOIDEA SUIS-INJEEL**

siehe Glandula parathyreoidea suis-Injeel

- **PARODONTOSE-NOSODE-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Parodontose-Nosode D12, Parodontose-Nosode D30, Parodontose-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Als Adjuvans bei allen Parodontopathien sowie bei Zahnfleischbluten und Zahnfleischatrophie. Fokalherde, die von Parodontopathien ausgehen.

- **PENICILLIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19358.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Penicillin D12 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Wasser für Injektionszwecke), Penicillin D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Wasser für Injektionszwecke), Penicillin D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Wasser für Injektionszwecke) jeweils 0,367 ml. Die arzneilich wirksamen Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*homöopathisiertes Allopathikum)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Benzylpenicillinum-Kalium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Haut- und Schleimhautentzündungen.

- **PETROLEUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Petroleum D12, Petroleum D30, Petroleum D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Petroleum rectificatum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene Hautkrankheiten. Entzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals, der Harnorgane. Rheumatismus. Schwindel.

- **PHOSPHORUS-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17294.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D12, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200, Phosphorus Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PHOSPHORUS-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17295.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phosphorus Dil. D6, Phosphorus Dil. D12, Phosphorus Dil. D30, Phosphorus Dil. D200, Phosphorus Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Phosphorus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der Atemorgane, der Verdauungsorgane, der Harn- und Geschlechtsorgane. Schwere Infektionskrankheiten. Genesungsstörungen und Erschöpfungszustände. Herzschwäche, Herzschmerzen, Kreislaufstörungen. Blutungen, Blut- und Gefäßkrankheiten. Rheumatismus, Wirbelsäulenbeschwerden. Knochenentzündungen und -entkalkungen. Nerven- und Kopfschmerzen, Lähmungen. Entwicklungsstörungen bei Kindern. Überempfindlichkeit der Sinnesorgane, Augenerkrankungen. Verhaltensauffälligkeiten und Verstimmungszustände.

- **PHYTOLACCA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17287.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Phytolacca americana Dil. D4, Phytolacca americana Dil. D12, Phytolacca americana Dil. D30, Phytolacca americana Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Phytolacca americana entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochfieberhafte Infekte. Schleimhautentzündungen, besonders der Atemorgane. Entzündung und Erkrankung der Brustdrüse. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

- **PLACENTA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Placenta suis D10, Placenta suis D30, Placenta suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PLACENTA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Placenta suis D8, Placenta suis D12, Placenta suis D30, Placenta suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Periphere Durchblutungsstörungen. Cutis marmorata. Dysbasia Intermittens. Morbus Buerger. Wadenkrämpfe. Dekubitus. Perniones. Ulcus cruris. Rhagaden. Ekzeme. Faltenbildung der Haut. Sklerodermie. Dysmenorrhoe. Muskelrheumatismus.

- **PLUMBUM METALLICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15178.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Plumbum metallicum Dil. D12, Plumbum metallicum Dil. D30, Plumbum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Plumbum metallicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Plumbum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervenschmerzen und -entzündungen. Krampfzustände. Lähmungen und andere Erkrankungen des Nervensystems. Leberstörungen. Koliken. Verstopfung. Nierenentzündungen. Mumps. Schlagaderverkalkungen. Verstimmungs- und Verwirrtheitszustände.

- **PNEUMOCOCCINUM-INJEEL**

siehe Klebsiella pneumoniae-Injeel

- **POLYPUS NASALIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Polypus nasalis-Nosode D10, Polypus nasalis-Nosode D30, Polypus nasalis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nasenpolypen und Polypen der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen, Lymphatismus, adenoide Vegetationen, Tonsillarhypertrophie (besonders auch der Rachenmandel). Durch eine chronische Tonsillarhypertrophie (insbesondere der unpaarigen Rachenmandel = Tonsilla pharyngica) kann es wie auch durch polypös stark behinderte Nasenatmung (offener Mund) im Kindesalter zu geistigen Entwicklungsstörungen kommen!

- **PROSTATA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502824.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Prostata suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Prostata suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Prostata suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PROSTATA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502823.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (=1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Prostata suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Prostata suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Prostata suis Dil. D30, (HAB, Vorschrift 42a), Prostata suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Prostataadenom. Störungen der Miktion und Potenz. Frühzeitiges Altern. Marasmus und Kachexie.

- **PSORINUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Psorinum-Nosode Dil. D12, Psorinum-Nosode Dil. D30, Psorinum-Nosode Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Psorinum-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene chronische Hauterkrankungen. Chronische Schleimhautentzündungen, besonders der Atemorgane. Schwächezustände, besonders nach schweren Krankheiten. Kopfschmerzen. Verstimmungszustände.

- **PULMO SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulmo suis D10, Pulmo suis D30, Pulmo suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PULMO SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulmo suis D8, Pulmo suis D12, Pulmo suis D30, Pulmo suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Asthma bronchiale. Raucherbronchitis. Emphysem. Bronchiektasen. Bei Tbc: Vorsicht, nicht im fieberhaften Stadium injizieren. Nachwirken lassen, d.h. nur in größeren Zeitabständen applizieren!

- **PULPA DENTIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulpa dentis suis D10, Pulpa dentis suis D30, Pulpa dentis suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(Suis-Organpräparat)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Apikales Fokusgeschehen. Schlechte Zahnentwicklung. Parodontose. Parodontitis. Karies.

- **PULSATILLA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17398.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla pratensis Dil. D12, Pulsatilla pratensis Dil. D30, Pulsatilla pratensis Dil. D200 , Pulsatilla pratensis Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **PULSATILLA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17398.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pulsatilla pratensis Dil. D4, Pulsatilla pratensis Dil. D12, Pulsatilla pratensis Dil. D30, Pulsatilla pratensis Dil. D200, Pulsatilla pratensis Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten beiden Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Pulsatilla pratensis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautkrankheiten. Krampfaderleiden. Entzündungen der Atemwege und Neigung zu Erkältungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane, Verdauungsschwäche. Entzündungen und Störungen der weiblichen Genitalorgane, Scheidenentzündung mit Ausfluss, Regelstörungen aller Art. Störungen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Blasenentzündungen, Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Entzündungen des Auges. Mittelohrentzündungen. Masern, Mumps. Kopfschmerzen. Schlafstörungen, seelische Störungen. Nervöse Störungen, Verstimmungszustände.

- **PYELON SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pyelon suis D10, Pyelon suis D30, Pyelon suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hydronephrose. Chronische Pyelitis. Zystopyelitis. Nephrolithiasis. Prostataadenom. Nephrose. Urämie. Eklampsie.

- **RAUWOLFIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15290.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rauwolfia serpentina Dil. D8, Rauwolfia serpentina Dil. D12, Rauwolfia serpentina Dil. D30, Rauwolfia serpentina Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rauwolfia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Rauwolfia serpentina entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Bluthochdruck. Verstimmungszustände.

- **REN SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 20964.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ren suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42), Ren suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42), Ren suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopatischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 bis 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopatisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **REN SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ren suis D8, Ren suis D12, Ren suis D30, Ren suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nephrolithiasis. Hydronephrose. Zystopyelitis. Albuminurie. Nephrosen. Ödeme. Oxalurie. Prostataadenom. Darniederliegende Nierenfunktion mit unzureichender Ausscheidung. Hyperhidrosis. Hinweis: Bei Glomerulonephritis nicht im akuten Stadium.

• **RETINA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502741.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Retina suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Retina suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Retina suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1 - 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• **RETINA SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2502740.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Retina suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Retina suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Retina suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Retina suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml.
Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1 - 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chorioditis. Störungen des Gesichtssinnes. Degenerative Erkrankungen der Netzhaut und des Auges. Myopie (bes. Achsenmyopie mit verlängertem Augapfel und Neigung zu Netzhautschädigung!). Versuchsweise bei Glaukom.

• **RHODODENDRON-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15296.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhododendron Dil. D12, Rhododendron Dil. D30, Rhododendron Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rhododendron-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **RHODODENDRON-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15296.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Rhododendron Dil. D6, Rhododendron Dil. D12, Rhododendron Dil. D30, Rhododendron Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Rhododendron-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Rhododendron entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatismus. Nervenschmerzen. Hodenentzündungen.

- **RHUS TOX-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17400.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Toxicodendron quercifolium Dil. D30, Toxicodendron quercifolium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **RHUS TOX-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17400.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Toxicodendron quercifolium Dil. D4, Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Toxicodendron quercifolium Dil. D30, Toxicodendron quercifolium Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten beiden Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Toxicodendron quercifolium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Juckende Hautkrankheiten. Fieberhafte Infektionskrankheiten mit Benommenheit. Entzündungen der Atemwege, des Magen-Darm-Kanals. Entzündungen der Augen. Regelstörungen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen. Lähmigkeiten, Lähmungen. Schwindel. Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln. Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. Angst-, Unruhe- und Verstimmungszustände.

- **RUTA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15298.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ruta graveolens Dil. D12, Ruta graveolens Dil. D30, Ruta graveolens Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ruta-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Ruta graveolens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Quetschungen, Prellungen, Verrenkungen, körperliche Überanstrengung. Krampfaderleiden. Rheumatismus besonders der Wirbelsäule.

• **SALMONELLA TYPHI-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salmonella typhi-Nosode D12, Salmonella typhi-Nosode D30, Salmonella typhi-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Hochfieberhafte Erkrankungen, hämorrhagische Enterokolitis, bradykarde Herzstörungen sowie auch bei „typhoiden Folgezuständen“ bzw. „post-typhösen“ Zuständen/Symptomen wie Meteorismus, Cholangitis, Cholezystitis, Bronchitis, Bronchopneumonie. Ferner seltenere Komplikationen im Verlauf eines Typhus abdominalis wie z.B. Otitis, Konjunktivitis, Netzhautblutungen, Muskeldegeneration, Polyneuritis, Parotitis, Osteomyelitis, Pankreopathie, Endo- und Myokarditis (hier oft Übergang von Bradykardie in Tachykardie!) sowie Perikarditis, Hepatitis, Spondylitis. Verwirrtheits- und Benommenheitszustände z.B. bei Zerebralsklerose.

• **SANGUINARIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15323.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sanguinaria canadensis Dil. D12, Sanguinaria canadensis Dil. D30, Sanguinaria canadensis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sanguinaria-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sanguinaria canadensis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Migränöse Kopfschmerzen. Entzündungen der Atmungsorgane. Beschwerden der Wechseljahre. Rheumatismus.

• **SELENIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19603.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Selenium Dil. D12, Selenium Dil. D30, Selenium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Selenium amorphum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautausschläge, fettige Haut. Entzündungen der oberen Luftwege. Verdauungsschwäche. Schwächezustände.

• **SEPIA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21164.00.00

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sepia officinalis Dil. D12, Sepia officinalis Dil. D30, Sepia officinalis Dil. D200, Sepia officinalsi Dil. D1000 jeweils 0,275 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **SEPIA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sepia D6, Sepia D12, Sepia D30, Sepia D200, Sepia D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sepia officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene, besonders chronische Hauterkrankungen. Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane. Vielfache Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Entzündungen der Harnorgane und Harnentleerungsstörungen. Rheumatische Erkrankungen. Krampfaderleiden. Kopfschmerzen. Schlafstörungen. Erschöpfungszustände. Seelische Störungen und depressive Verstimmungszustände.

- **SEROTONIN-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Serotonin D10, Serotonin D30, Serotonin D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Versuchsweise einzusetzen bei „Karzinoid-Syndromen" (u.a. Flushs, Tachykardie, Tachypnoe, Endokardfibrose; Trikuspidalinsuffizienz, Pulmonalstenose (Veränderungen besonders am rechten Herzen!)) sowie bei zerebralen Erregungszuständen und bei Migräneanfällen im Sinne des Serotonin- (bzw. Histamin)-Kopfschmerzes (Bing-Horton-Syndrom). Ferner: Allergische bzw. toxische Hautaffektionen, z.B. nach Kontakt mit Kraken, Salamandern, Tintenfischen, Moluscae (Murex), Brennnesseln.

- **SILICEA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15394.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum silicicum Dil. D12, Acidum silicicum Dil. D30, Acidum silicicum Dil. D200, Acidum silicicum Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Silicea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

außer Handel
ab 25.07.2007

- **SILICEA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15394.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum silicicum Dil. D6 aquos., Acidum silicicum Dil. D12, Acidum silicicum Dil. D30, Acidum silicicum Dil. D200, Acidum silicicum Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Silicea-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Acidum silicicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen, Eiterungen und Fistelbildung der Haut, der Lymphdrüsen, der Schleimhäute, der Knochen und Gelenke. Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke. Gewebewucherungen. Geistige Erschöpfung.

• SINUSITIS-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 13862.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sinusitis-Nosode Dil. D10 (HAB, Vorschrift 44), Sinusitis-Nosode Dil. D30 (HAB, Vorschrift 44), Sinusitis-Nosode Dil. D200 (HAB, Vorschrift 44) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sinusitis-Nosode-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c. oder i.c. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sinusitis-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Wiederkehrende Nasennebenhöhlenentzündung.

• SOLIDAGO VIRGAUREA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15425.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solidago virgaurea Dil. D12, Solidago virgaurea Dil. D30, Solidago virgaurea Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Solidago virgaurea-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• SOLIDAGO VIRGAUREA-INJEEL FORTE

außer Handel ab 25.07.2007

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15425.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Solidago virgaurea Dil. D4, Solidago virgaurea Dil. D12, Solidago virgaurea Dil. D30, Solidago virgaurea Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Solidago virgaurea-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Solidago virgaurea entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nierenschwäche. Leberstörungen.

• SPLEN SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21383.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1, g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Splen suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Splen suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Splen suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Leukämie. Anämie. Agranulozytose. Bei Karzinom zur Revitalisierung allgemein zu verwenden sowie generell zur Steigerung der Infektabwehr besonders auch im Senium.

• SPONGIA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15315.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Dil. D12, Euspongia officinalis Dil. D30, Euspongia officinalis Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spongia-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• SPONGIA-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15315.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Dil. D4, Euspongia officinalis Dil. D12, Euspongia officinalis Dil. D30, Euspongia officinalis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Spongia-Injeel forte ist bei Jodüberempfindlichkeit nicht anzuwenden. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spongia-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Euspongia officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündung und Krampfzustände der Atemorgane. Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe wie: Lymphdrüsen, Schilddrüse, Hoden, Nebenhoden. Entzündung des Herzens, Herzschwäche. Erkrankung der Herzkranzgefäße, der Hauptschlagader.

• STAPHISAGRIA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19417.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Staphisagria Dil. D12, Staphisagria Dil. D30, Staphisagria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden.
Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Delphinium staphisagria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hautausschläge. Entzündungen der Augen. Erkrankungen der Zähne. Verdauungsschwäche. Reizzustände an den ableitenden Harnwegen und den Geschlechtsorganen. Nervenschmerzen. Koliken. Schmerzen und Folgezustände nach Verletzungen und Operationen. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

- **STAPHYLOCOCCUS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Staphylococcus-Nosode D12, Staphylococcus-Nosode D30, Staphylococcus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische und chronisch rezidivierende Erkrankungen, bei denen Staphylokokken gegebenenfalls in Form einer Mischinfektion bzw. einer Sekundärinfektion ursächlich in Frage kommen, z.B. Furunkel, Karbunkel, Panaritien, Impetigo contagiosa staphylogenes (Bockhart), Blepharitis, Hordeolum, Akne vulgaris et conglobata, Unterschenkelgeschwüre, Pyodermia chronica papillaris et exulcerans, Osteomyelitis, phlegmonöse Veränderungen, Otitis media, Zystopyelitiden, Pneumonie, Enterokolitiden, Myelitiden u. a. Allgemein bei retoxischen Phasen, die auf Schädigungen durch Staphylokokkengifte beruhen (z.B. Autoaggressionskrankheiten) sowie Krankheitsbilder, bei welchen sich in der Anamnese die oben aufgezeigten Erkrankungen finden. Staphylococcus kann auch mit guter Wirkung eingesetzt werden bei Myokardschädigungen, Leberschädigungen, Nierenschädigungen und Bindegewebsschädi-gungen sowie bei Schilddrüsenerkrankungen.

- **STICTA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15313.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lobaria pulmonaria Dil. D12, Lobaria pulmonaria Dil. D30, Lobaria pulmonaria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sticta-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Lobaria pulmonaria entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündungen der Atemwege.

- **STRAMONIUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15327.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Datura stramonium Dil. D12, Datura stramonium Dil. D30, Datura stramonium Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Stramonium-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Datura stramonium entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Hochfieberhafte Infektionen. Krampfzustände. Krankheiten mit Beeinträchtigung seelischer Funktionen. Entzündung der Augen.

• STREPTOCOCCUS HAEMOLYTICUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptococcus haemolyticus-Nosode D12, Streptococcus haemolyticus-Nosode D30, Streptococcus haemolyticus-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Angina (häufig mit Neigung zu Tonsillarabszessen), Otitis media, Phlegmonen, Impetigo contagiosa streptogenes (Tilburg-Fox), Empyeme, Mastitis puerperalis, Endo-, Myo-, Perikarditis, Pneumonie, Meningitis, Osteomyelitis. Primär chronische Polyarthritis. Choreatische Zuckungen, Grimassieren, Tics, Muskelhypotonie. Psychische Veränderungen wie Antriebsschwäche, Unterwürfigkeit, Unaufmerksamkeit, Sprunghaftigkeit, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen, psychotische Bilder, halluzinatorische Psychosen, Alpdrücken, Aufstampfen mit den Füßen. Symptomatisch besteht Intoleranz gegen Lärm, Licht, Luftzug sowie unmotiviertes Weinen, Gefühl von Vibrieren der Wirbelsäule bei ausgestrecktem Liegen sowie Ohrenrauschen, Sehstörungen und das Gefühl salziger Lippen. Streptococcus haemolyticus ist auch bei Fokalherden bzw. Fokaltoxikosen und bei Autoaggressionskrankheiten stets mit einzusetzen, speziell wenn der Verdacht auf Beteiligung von Streptokokken in der Pathogenese besteht.

• STREPTOCOCCUS VIRIDANS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Streptococcus viridans-Nosode D10, Streptococcus viridans-Nosode D30, Streptococcus viridans-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Ähnliche Indikationen wie bei Streptococcus haemolyticus; jedoch – sowohl unter symptomatischen als auch unter anamnestisch-ätiologischen Gesichtspunkten! – speziell bei Endocarditis lenta und bei Lenta-Sepsis-Symptomen einzusetzen sowie bei schleichenden bzw. bei „typhösen“ Fieberzuständen sowie ferner bei Autoaggressionskrankheiten, gegebenenfalls als Zwischenmittel bei Neoplasmaphasen.

• STROPHANTHUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15331.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Strophanthus gratus Dil. D12, Strophanthus gratus Dil. D30, Strophanthus gratus Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Strophanthus-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Strophanthus gratus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herzschwäche, Erwartungsangst.

- **STRUMA NODOSA-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Struma nodosa-Nosode D10, Struma nodosa-Nosode D30, Struma nodosa-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Knotige Struma (Adenom), die oft mit Zysten durchsetzt ist; dabei häufig Verkalkungen und gelegentlich Blutungen (Struma nodosa calcificata bzw. haemorrhagica). Versuchsweise auch bei anderen Struma-Formen. Postoperativ zur Vermeidung eventueller Struma-Rezidive.

- **SULFUR-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17291.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **SULFUR-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15838.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D6, Sulfur Dil. D12, Sulfur Dil. D30, Sulfur Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sulfur-Injeel forte S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sulfur entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verschiedene, besonders chronische Hautkrankheiten, juckende Ekzeme und Hauteiterungen. Akute und chronische Entzündungen der Atemorgane, des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane. Leber- und Verdauungsschwäche. Krampfaderleiden, Hämorrhoiden und Blutungen. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Blutdruckstörungen. Rheumatische Beschwerden. Schlafstörungen, nervöse Störungen. Schwächezustände. Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände.

- **SYMPATHICUS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sympathicus suis D10, Sympathicus suis D30, Sympathicus suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Vegetative Dystonie. Morbus Sudeck. Hypotonie. Raynaudsche Gangrän. Morbus Buerger. Hypernephrom (versuchsweise). Migräne. Asthma bronchiale. Ulcus duodeni. Angina pectoris. Diabetes mellitus.

- **SYMPHYTUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19628.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Symphytum officinale e radice D12 (HAB, Vorschrift 3a), Symphytum officinale e radice D30 (HAB, Vorschrift 3a), Symphytum officinale e radice D200 (HAB, Vorschrift 3a) jeweils 0,367 g. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angave einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauerenden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Sympytum oficinale e radice entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Knochen- und Knochenhautverletzungen

• SYZYGIUM JAMBOLANUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15426.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Syzygium cumini Dil. D4, Syzygium cumini Dil. D12, Syzygium cumini Dil. D30, Syzygium cumini Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Syzygium jambolanum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Syzygium cumini entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Verwendung als Zusatzmittel bei Zuckerkrankheit.

• TABACUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15309.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Nicotina tabacum Dil. D12, Nicotina tabacum Dil. D30, Nicotina tabacum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Tabacum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.
Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Nicotina tabacum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Beschwerden bei Blutdruckabfall. Brechdurchfall. Angina pectoris.

• TARAXACUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19558.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Taraxacum Dil. D12, Taraxacum Dil. D30, Taraxacum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1 - 2 ml i. v., i. m. oder s. c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Taraxacum officinale entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.

- **TARTARUS STIBIATUS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15237.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Kalium stibyltartaricum Dil. D6, Kalium stibyltartaricum Dil. D12, Kalium stibyltartaricum Dil. D30, Kalium stibyltartaricum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Tartarus stibiatus-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Kalium stibyltartaricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der unteren Atemwege mit Kreislaufschwäche. Brechdurchfälle. Entzündungen der Harnorgane. Eitrige Hauterkrankungen. Rheumatische Erkrankungen der unteren Wirbelsäule.

- **TESTIS SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21385.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Testis suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Testis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Testis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml.
Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1 - 2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **TESTIS SUIS-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21386.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Testis suis Dil. D8 (HAB, Vorschrift 42a), Testis suis Dil. D12 (HAB, Vorschrift 42a), Testis suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Testis suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Impotentia virilis. Sterilität. Frühzeitiges Altern. Erschöpfungszustände. Revitalisierungsfaktor. Hydrozele. Samenstrangneuralgien. Versuchsweise bei Osteomalazie und Osteoporose beim männlichen Geschlecht.

- **TEUCRIUM SCORODONIA-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 16093.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Teucrium scorodonia Dil. D3, Teucrium scorodonia Dil. D8, Teucrium scorodonia Dil. D12, Teucrium scorodonia Dil. D30, Teucrium scorodonia Dil. D200 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Teucrium scorodonia-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Teucrium scorodonia entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Chronische Entzündungen der Atemwege.

- **THALLIUM SULFURICUM-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21072.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thallium sulfuricum Dil. D12 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 15% (m/m)], Thallium sulfuricum Dil. D30 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 15% (m/m)], Thallium sulfuricum Dil. D200 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Ethanol 15% (m/m)] jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Thallium sulfuricum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Haarausfall. Nervenschmerzen.

- **THUJA-INJEEL S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17302.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thuja occidentalis Dil. D12, Thuja occidentalis Dil. D30, Thuja occidentalis Dil. D200, Thuja occidentalis Dil. D1000 jeweils 0,275 ml. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **THUJA-INJEEL FORTE S**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17302.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thuja occidentalis Dil. D4, Thuja occidentalis Dil. D12, Thuja occidentalis Dil. D30, Thuja occidentalis Dil. D200, Thuja occidentalis Dil. D1000 jeweils 0,22 ml. Die Bestandteile 2 bis 5 werden über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten beiden Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Thuja occidentalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Haut- und Schleimhauterkrankungen. Verdauungsschwäche. Rheumatismus. Verstimmungszustände.

- **THYMUS SUIS-INJEEL**

siehe Glandula thymi suis-Injeel

- **THYREOIDEA SUIS-INJEEL**

siehe Glandula thyreoidea suis-Injeel

- **TONSILLA SUIS-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21176.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsilla suis Dil. D10 (HAB, V. 42a), Tonsilla suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Tonsilla suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Tonsillarhypertrophie. Chronische Tonsillitis. Lymphatismus. Exsudative Diathese. Skrofulose. Auch bei Lymphogranulomatose und Retikulosen versuchsweise einzusetzen.

• TONSILLITIS-NOSODE-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tonsillitis-Nosode D10, Tonsillitis-Nosode D30, Tonsillitis-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Zustand nach unbiologisch behandelter Tonsillitis, sowie zur Begleitbehandlung von Folgezuständen, wie z.B. Polyarthritis rheumatica, Glomerulonephritis, Nephrosen, Endo-, Myokarditiden, Myokard- und Leberschädigungen.

• TRICHINOYL-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21376.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Trichinoylum D8 aquos. (HAB, Vorschrift 6), Trichinoylum Dil. D12 (HAB, Vorschrift 6), Trichinoylum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 6), Trichinoylum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 6) jeweils 0,275 g. Die Bestandteile 2-4 werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Regeneration blockierter Atmungsfermente, entgiftungsfördernd. Alle zellulären Phasen, einschließlich Viruskrankheiten und Neoplasmaphasen.

• TUBA EUSTACHII SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21508.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tuba Eustachii suis Dil. D8 (HAB, V. 42a), Tuba Eustachii suis Dil. D12 (HAB, V. 42a), Tuba Eustachii suis Dil. D30 (HAB, V. 42a), Tuba Eustachii suis Dil. D200 (HAB, V. 42a) jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Chronische Katarrhe der Ohrtrompete mit Ohrensausen und Schwerhörigkeit. Mittelohraffektionen, z.B. Hydrops des Mittelohrs = Serotympanon (= akuter Ohrtubenkatarrh) bzw. Seromukotympanon (= chronischer Ohrtubenkatarrh).

• TYPHOIDINUM-INJEEL

siehe Salmonella typhi-Injeel

• UBICHINON-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21374.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ubichinon Dil D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung 3 mit absolutem Ethanol), Ubichinon Dil. D12 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D3 mit absolutem Ethanol), Ubichinon Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D3 mit absolutem Ethanol), Ubichinon Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D3 mit absolutem Ethanol) jeweils 0,275 g. Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordne: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe B)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Impfschäden nach der Pockenschutzimpfung. Entzündliche Hauterkrankungen. Schleimhautentzündungen und -eiterungen mit wundmachenden Sekreten. Adjuvans bei multipler Sklerose. Allgemein angezeigt bei allen zellulären Phasen (Imprägnations-, Degenerations-, Neoplasmaphasen – inklusive Viruskrankheiten), bei denen die eigenen Abwehrleistungen nicht mehr ausreichen.

• URETER SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ureter suis D10, Ureter suis D30, Ureter suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Nephrolithiasis. Störungen der Nierenexkretion. Hydronephrose. Nephrose. Zystopyelitis. Glomerulonephritis. Prostataleiden. Gewisse Fälle renaler Hypertonie.

• URETHRA SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Urethra suis D10, Urethra suis D30, Urethra suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Harnröhrenstrikturen. Chronische Reizzustände in der Urethra und im Urogenitalsystem. Pruritus vulvae.

• URTICA-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Urtica urens D12, Urtica urens D30, Urtica urens D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 1-3 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 1-3 mal täglich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Urtica urens entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nesselsuchtartige Hauterkrankungen. Nierenleiden. Gicht.

• UTERUS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21278.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Uterus suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Uterus suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Uterus suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Prolapsus uteri. Myomatosis uteri. Dysmenorrhoe. Präkanzerose des Uterus. Erosio portionis uteri. Weibliche Sterilität. Sonstige degenerative Erkrankungen des Uterus.

• VACCININUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vaccininum-Nosode D20, Vaccininum-Nosode D30, Vaccininum-Nosode D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet
a) bei Anwendung gemäß den Regeln der symptomatischen Ähnlichkeit: 2 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
b) bei Anwendung gemäß den Regeln der anamnestischen ätiologischen Ähnlichkeit: 1 mal pro Woche 1 Ampulle intramuskulär, subkutan oder intrakutan injizieren;
c) bei Anwendung unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Ätiologie: mehrmals bis zu 3 mal täglich bzw. alle 2 Tage 1 Ampulle.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Nosodenpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vaccininum-Nosode entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Folgen von Pockenimpfungen. Entzündliche Hautkrankheiten. Kopfschmerzen.

• VALERIANA-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15310.01.00
Zusammensetzung: 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Valeriana officinalis Dil. D4, Valeriana officinalis Dil. D12, Valeriana officinalis Dil. D30, Valeriana officinalis Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Valeriana-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern ist ärztliche Erfahrung notwendig. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Valeriana officinalis entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Schlafstörungen mit Unruhe. Nervöse Störungen. Ischiasschmerz.

• VENA SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19826.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vena suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Vena suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Vena suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• VENA SUIS-INJEEL FORTE

außer Handel ab15.11.2007

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vena suis D8, Vena suis D12, Vena suis D30, Vena suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Venöse Stase, Varikosis, Thrombose(neigung), Ulcus cruris. Durchblutungsstörungen. Claudicatio intermittens. Thromb(end)-angiitis obliterans (Morbus Buerger) – hierbei meist gleichzeitig bzw. vorher auch Thrombophlebitis. Periarteriitis nodosa (Kussmaul-Maier-Syndrom). Wadenkrämpfe, Mitralvitium.

• VENTRICULUS SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19828.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ventriculus suis Dil. D10 (HAB, Vorschrift 42a), Ventriculus suis Dil. D30 (HAB, Vorschrift 42a), Ventriculus suis Dil. D200 (HAB, Vorschrift 42a) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m., oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Achylia gastrica. Anaemia perniciosa. Postinfektiöse Anämie. Präkanzerose des Magens. Chronische Magengeschwürsleiden. Sodbrennen.

• VERATRUM-INJEEL FORTE S

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 17402.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml flüssige Verdünnung zur Injektion enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Veratrum album Dil. D4 (HAB, Vorschrift 4a), Veratrum album Dil. D12 (HAB, Vorschrift 4a), Veratrum album Dil. D30 (HAB, Vorschrift 4a), Veratrum album Dil. D200 (HAB, Vorschrift 4a) jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden mit Ethanol 43 % (m/m) über die drittletzte Stufe und mit Wasser für Injektionszwecke über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 3-1 mal wöchentlich, bei akuten Beschwerden 3-1 mal täglich, den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Veratrum album entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten. Durchfallerkrankung. Nervenschmerzen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung.

• VESICA FELLEA SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica fellea suis D10, Vesica fellea suis D30, Vesica fellea suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• VESICA URINARIA SUIS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica urinaria suis D10, Vesica urinaria suis D30, Vesica urinaria suis D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• VESICA URINARIA SUIS-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vesica urinaria suis D8, Vesica urinaria suis D12, Vesica urinaria suis D30, Vesica urinaria suis D200 jeweils 0,275 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche, danach 1 mal den Inhalt 1 Ampulle pro Woche intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*Suis-Organpräparat)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Störungen der Nierenexkretion. Urämie, Nephrolithiasis. Oxalurie. Zystopyelitis. Hydronephrose. Glomerulonephritis und Nephrose. Papillome der Blase. Blasentenesmen. Prostataadenom. Wirkt kanalisierend und anregend auf die Nierenexkretion und die gesamte Giftentlastung; daher bei zahlreichen chronischen Krankheiten zu interponieren.

• VINCETOXICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15312.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vincetoxicum hirundinaria Dil. D10, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D30, Vincetoxicum hirundinaria Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Vincetoxicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• VIPERA BERUS-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21001.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vipera berus e veneno sicc. Dil. D15 (HAB, SV. 5a, Lösung D2 mit Glycerol 85%), Vipera berus e veneno sicc. Dil. D30 (HAB, SV. 5a, Lösung D2 mit Glycerol 85%), Vipera berus e veneno sicc. Dil. D200 (HAB, SV. 5a, Lösung D2 mit Glycerol 85%) jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Vipera berus entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Akute Entzündungen der Haut und der Venen. Blutungsneigung. Herz-Kreislauf-Schwäche. Angina pectoris.

• VISCUM ALBUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119419.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viscum album Dil. D12, Viscum album Dil. D30, Viscum album Dil. D200 jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei bekannter Allergie auf Mistelzubereitungen, bei chronischen granulomatösen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen und bei Hyperthyreose mit nicht ausgeglichener Stoffwechsellage sollen Viscum album haltige Arzneimittel nicht angewendet werden. Akut entzündliche bzw. hochfieberhafte Erkrankungen: Die Behandlung sollte bis zum Abklingen der Entzündungszeichen unterbrochen werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Geringere Steigerung der Körpertemperatur, örtlich begrenzte entzündliche Reaktionen um die Einstichstelle der subkutanen Injektion, sowie vorübergehende leichte Schwellungen regionaler Lymphknoten sind unbedenklich. Gelegentlich können Venen mit entzündlichen Reizerscheinungen reagieren. Eine vorübergehende Therapiepause ist hier erforderlich. In seltenen Fällen können bei Unverträglichkeit gegen Mistel örtliche oder allgemeine allergische oder allergieähnliche Reaktionen wie: Generalisierter Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlag, Schwellung im Gesichtsbereich (Quincke Ödem), Schüttelfrost, Atemnot, Blutdruckabfall, Schock auftreten, die ein Absetzen des Präparates und sofortige ärztliche Behandlung erforderlich machen. In seltenen Fällen kann es zur Aktivierung von Entzündungen kommen (z.B. chronische Sinusitis, Zahnwurzelgranulome).
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.v. injizieren.
Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

- **VISCUM ALBUM-INJEEL FORTE**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19420.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Viscum album Dil. D3, Viscum album Dil. D12, Viscum album Dil. D30, Viscum album Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2-4 werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Bei bekannter Allergie auf Mistelzubereitungen, bei chronischen granulomatösen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen und bei Hyperthyreose mit nicht ausgeglichener Stoffwechsellage soll Viscum album-Injeel forte nicht angewendet werden.
Akut entzündliche bzw. hoch fieberhafte Erkrankungen: Die Behandlung sollte bis zum Abklingen der Entzündungszeichen unterbrochen werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Geringere Steigerung der Körpertemperatur, örtlich begrenzte entzündliche Reaktionen um die Einstichstelle der subkutanen Injektion sowie vorübergehende leichte Schwellungen regionaler Lymphknoten sind unbedenklich. In seltenen Fällen können bei Unverträglichkeit gegen Mistel örtliche oder allgemeine allergische oder allergieähnliche Reaktionen wie: Generalisierter Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlag, Schwellung im Gesichtsbereich (Quincke-Ödem), Schüttelfrost, Atemnot, Schock auftreten, die ein Absetzen des Präparates und sofortige ärztliche Behandlung erforderlich machen. In seltenen Fällen kann es zur Aktivierung von Entzündungen kommen (z.B. chronische Sinusitis, Zahnwurzelgranulome). Gelegentlich können Venen mit entzündlichen Reizerscheinungen reagieren. Eine vorübergehende Therapiepause ist auch hier erforderlich.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Viscum album entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.
Dazu gehören: Hoher und niedriger Blutdruck, Schwindelgefühl.
Herzkranzgefäßverengung und Herzrhythmusstörung. Verschleißkrankheiten der Gelenke.

- **VITAMIN B_2-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19815.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natrium Riboflavinum phosphoricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5 a, Lösung D 2 mit Wasser für Injektionszwecke), Natrium Riboflavinum phosphoricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5 a, Lösung D 2 mit Wasser für Injektionszwecke), Natrium Riboflavinum phosphoricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5 a, Lösung D 2 mit Wasser für Injektionszwecke) jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.
Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(intermediärer Katalysator, Gruppe C)
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Co-Faktor für Fermentfunktionen (Flavoproteide und Redoxsysteme).

- **VITAMIN B_6-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 2119502.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a), Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D30 (HAB, Vorschrift 5a), Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a) jeweils 0,367 g. Gemeinsame Potenzierung über die drittletzte Stufe mit Ethanol 43 % (m/m) und über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 2-1 mal wöchentlich eine Ampulle i.m., s.c. oder i.v. injizieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Co-Faktor für Fermentfunktionen (Transaminasen, Dehydratasen, Desulfhydrasen, Dekarboxylasen).

- **VITAMIN B_{12}-INJEEL**

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21390.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cyanocobalamium Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Wasser), Cyanocobalamium Dil D30 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Wasser), Cyanocobalamium Dil. D200 (HAB, Vorschrift 5a, Lösung D2 mit Wasser) jeweils 0,367 g.
Die Bestandteile werden über die letzten drei Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahren Therapeuten zu wenden.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Fett- und Kohlenhydratstoffwechselstörungen; Anregung der entgiftenden Leberfunktion.

• VITAMIN C-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 21003.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Vitamin C Dil. D10 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 15% (m/m)], Vitamin C Dil. D30 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 15% (m/m)], Vitamin C Dil. D200 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 15% (m/m)] jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2 mal wöchentlich den Inhalt 1 Ampulle intramuskulär, subkutan, intrakutan oder intravenös injizieren.
Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
(*intermediärer Katalysator, Gruppe C)*
Die Anwendungsgebiete gemäß Homoeopathia antihomotoxica von Reckeweg: Coferment-Faktor im Stoffwechsel (u.a. in Redoxsystemen; Mitwirkung beim Aufbau der Grundsubstanz des Bindegewebes).

• ZINCUM METALLICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15227.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum metallicum Dil. D12, Zincum metallicum Dil. D30, Zincum metallicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Zincum metallicum-Injeel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

• ZINCUM METALLICUM-INJEEL FORTE

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 15227.01.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum metallicum Dil. D6 aquos., Zincum metallicum Dil. D12, Zincum metallicum Dil. D30, Zincum metallicum Dil. D200 jeweils 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert.
Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.
Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Zincum metallicum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen bis zu 3 mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren.

Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Zincum metallicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Krämpfe und Nervenschmerzen. Erkrankungen der Wirbelsäule, des Gehirns und des Rückenmarks. Erschöpfungs- und Verstimmungszustände. Schlafstörungen.

• ZINCUM VALERIANICUM-INJEEL

Flüssige Verdünnung zur Injektion Reg.-Nr.: 19607.00.00
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml (= 1,1 g) enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Zincum valerianicum Dil. D12, Zincum valerianicum Dil. D30, Zincum valerianicum Dil. D200 jeweils 0,367 ml. Die Bestandteile werden über die letzten 3 Stufen gemeinsam potenziert. Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur parenteral einmal 1-2 ml i.v., i.m. oder s.c. injiziert werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.
Die Anwendungsgebiete gemäß der Aufbereitungsmonographie Zincum valerianicum entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nervöse Schlafstörungen mit „unruhigen Beinen“. Nervenschmerzen.