

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Diarrhée

Conduite à tenir devant diarrhée aiguë simple chez un résident adulte, en dehors des tableaux graves ou compliqués.

Indications

- Au moins 3 selles liquides ou très molles en 24 h.
- Inconfort digestif modéré sans signe de gravité.
- Contexte compatible avec épisode aigu simple.

Vérifications préalables

- Prendre température et rechercher douleurs abdominales.
- Rechercher sang, glaires, vomissements ou déshydratation.
- Rechercher antibiothérapie récente, laxatifs ou constipation préalable.
- Tracer fréquence, aspect et contexte des selles.

Ne pas appliquer ce protocole

- Fièvre élevée, sang dans les selles ou douleurs abdominales importantes.
- Déshydratation, hypotension, confusion, altération de l'état général.
- Immunodépression ou fragilité majeure.
- Suspicion de fécalome avec fausse diarrhée.

Conduite à tenir

- Renforcer l'hydratation orale si possible.
- Régime transitoire pauvre en résidus si adapté.
- Traitement symptomatique uniquement s'il est déjà prescrit.
- Prévenir le médecin si persistance ou contexte infectieux.

Surveillance et traçabilité

- Noter nombre de selles, aspect, température et signes associés.
- Surveiller hydratation, état général et tolérance digestive.
- Tracer tout traitement administré et son effet.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si diarrhée persistante, fébrile ou mal tolérée.
- Appel 15 si détresse, collapsus, trouble de conscience, abdomen aigu ou déshydratation sévère.

Mention de sécurité

Le traitement antidiarrhéique n'est pas systématique. Éliminer cause infectieuse grave, iatrogénie, antibiothérapie récente ou fausse diarrhée.

Fait à :

Le : / /

Signature :