

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

## Hypothermie

Conduite à tenir devant température basse ou refroidissement clinique, hors arrêt cardio-respiratoire.

### Indications

- Température corporelle basse ou refroidissement marqué.
- Marbrures, frissons, somnolence, ralentissement inhabituel.
- Exposition au froid ou contexte infectieux possible.

### Vérifications préalables

- Confirmer la mesure si possible.
- Rechercher signes neurologiques, respiratoires ou hémodynamiques.
- Vérifier vêtements, environnement, humidité et causes possibles.
- Prendre paramètres si cela ne retarde pas l'alerte.

### Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas réchauffer brutalement un résident instable.
- Ne pas faire boire si trouble de conscience ou risque de fausse-route.
- Ne pas sous-estimer hypothermie chez personne âgée.
- Ne pas retarder secours si signes de gravité.

### Conduite à tenir

- Réchauffer progressivement : couverture, vêtements secs, ambiance tempérée.
- Boisson chaude seulement si conscience normale et déglutition sûre.
- Prévenir rapidement IDE/médecin.
- Surveiller température et état neurologique.

### Surveillance et traçabilité

- Tracer température, circonstances, paramètres et mesures de réchauffement.
- Noter évolution clinique et efficacité du réchauffement progressif.
- Surveiller récurrence ou aggravation.

### Alerte immédiate

- Appel médical rapide si hypothermie persistante ou mal tolérée.
- Appel 15 si température très basse, confusion, somnolence, bradycardie, hypotension ou hypothermie profonde suspectée.

### Mention de sécurité

Une hypothermie peut révéler infection, dénutrition, endocrinopathie ou exposition environnementale. Réchauffement progressif.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature :