

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Règles douloureuses

Conduite à tenir devant dysménorrhée simple chez une résidente, hors saignement abondant ou symptôme inhabituel.

Indications

- Douleurs menstruelles connues compatibles avec dysménorrhée simple.
- État général conservé.
- Besoin de mesures simples ou traitement prescrit.

Vérifications préalables

- Confirmer caractère menstruel des douleurs.
- Évaluer intensité, abondance du saignement et symptômes associés.
- Vérifier antalgique prescrit, allergies et contre-indications.
- Rechercher possibilité de grossesse selon contexte clinique.

Ne pas appliquer ce protocole

- Saignement très abondant, malaise, pâleur majeure.
- Douleur inhabituelle, unilatérale, brutale ou persistante.
- Fièvre, vomissements importants ou suspicion de grossesse.
- Douleur non améliorée par mesures habituelles.

Conduite à tenir

- Repos, calme, chaleur locale si bien tolérée et protégée par linge.
- Administrer antalgique prescrit selon protocole individuel.
- Hydratation et surveillance de l'abondance des règles.
- Prévenir médecin si doute ou inefficacité.

Surveillance et traçabilité

- Tracer douleur, traitement donné, abondance du saignement et évolution.
- Noter signes associés : malaise, vomissements, fièvre.
- Surveiller répétition des épisodes invalidants.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si douleur inhabituelle, saignement abondant ou malaise.
- Appel 15 si hémorragie importante, syncope, douleur aiguë sévère ou détresse.

Mention de sécurité

Une dysménorrhée simple ne doit pas masquer une urgence gynécologique, hémorragique ou une grossesse.

Fait à :

Le : / /

Signature :