

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

## Ruptures d'approvisionnement

Conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un médicament ou dispositif nécessaire, pour éviter interruption non sécurisée.

### Indications

- Médicament manquant, non livré ou rupture annoncée.
- Dispositif de soin indisponible.
- Risque d'interruption de traitement.

### Vérifications préalables

- Identifier produit, dosage, forme et délai critique.
- Vérifier stock local, pharmacie partenaire et alternatives disponibles.
- Repérer résidents concernés et nombre de prises restantes.
- Prévenir rapidement IDE/pharmacien référent.

### Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas substituer seul médicament ou forme sans validation.
- Ne pas interrompre traitement critique sans décision médicale.
- Ne pas déconditionner ou fractionner à risque sans consigne.
- Ne pas attendre rupture complète pour alerter.

### Conduite à tenir

- Contacter pharmacie et médecin pour substitution ou sécurisation.
- Prioriser traitements critiques et résidents à risque.
- Mettre en place consigne temporaire claire et écrite.
- Informer l'équipe de la conduite retenue.

### Surveillance et traçabilité

- Tracer date, produit concerné, démarches et décisions.
- Surveiller modification clinique liée à substitution ou décalage.
- Archiver réponse pharmacie / médecin.

### Alerte immédiate

- Appel médical rapide pour antiépileptique, insuline, anticoagulant, antiparkinsonien, palliatif ou psychotrope critique indisponible.
- Appel urgent si impossibilité d'assurer un traitement vital.

### Mention de sécurité

Une rupture est un risque de sécurité du circuit du médicament. Anticipation et validation pharmaco-médicale sont essentielles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature :