

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Hypoglycémie – Resucrage / glucagon

Correction immédiate selon conscience et déglutition ; glucagon nominatif si forme sévère.

Indications

- Glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L) ou seuil du plan diabète individuel.
- Sueurs, pâleur, faim, tremblements, agitation, confusion ou malaise.
- Patient diabétique ou traité par insuline/sulfamide/glinide.
- Traiter sur signes évocateurs si la mesure est impossible et l'urgence manifeste.

Vérifications préalables

- Mesurer la glycémie sans retarder le traitement.
- Évaluer conscience et sécurité de déglutition.
- Vérifier dernier repas, traitement, effort et épisodes antérieurs.
- Identifier le glucagon nominatif, sa forme, son dosage et sa péremption.

Recommandations / IMPORTANT

- Aucun apport oral si conscience altérée ou risque de fausse route.
- Ne pas laisser seul ; protéger, PLS si respiration normale.
- Rechercher l'erreur d'insuline, le repas manqué, l'effort, l'alcool ou l'infection.
- Après sulfamide/insuline longue : risque de récurrence prolongée.

Intervention IDE

- Conscient : adulte/ado 15 g de glucose ; enfant 0,3 g/kg (max. 15 g).
- À 15 min : reconstrôler ; si < 0,70 g/L, répéter. Puis collation/repas.
- Sévère : appel 15 + BAQSIMI 3 mg (glucagon), poudre nasale unidose dès 4 ans, si prescrit.
- Ou GLUCAGEN KIT 1 mg/mL (glucagon), après reconstitution, IM/SC : 1 mg si ≥ 25 kg ; 0,5 mg si < 25 kg.

Surveillance et traçabilité

- Tracer signes, glycémies, glucides, glucagon, doses, heures et réponse.
- Contrôler la glycémie 15 min après chaque action, puis à 30–60 min selon risque.
- Surveiller conscience, respiration, vomissements et récurrence.
- Informer le médecin pour adaptation thérapeutique.

Alerte immédiate

- Appel 15 : trouble de conscience, convulsions, impossibilité d'avaler ou absence de réponse au glucagon.
- Appel urgent si échec après 2 cycles de resucrage ou récurrence rapide.
- Après glucagon, prévenir le risque de vomissement/inhalation.

Mention de sécurité

La sécurité de déglutition prime. Le glucagon est un traitement de secours et ne remplace pas l'appel au 15 ; donner des glucides dès le réveil complet et rechercher systématiquement la cause. Compte rendu IDE écrit, daté et signé au dossier.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :