

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE MÉDICAL DE SOINS INFIRMIERS — ARTICLE R.4311-6 CSP

Paracétamol – Douleur et/ou fièvre

Administration après vérification du poids, des prises cumulées, des contre-indications et de la forme disponible.

Indications

- Douleur légère à modérée évaluée avec une échelle adaptée.
- Fièvre ou inconfort fébrile sans signe immédiat de gravité.
- Voie orale sûre et forme adaptée disponible.
- Prescription anticipée quantitative signée.

Vérifications préalables

- Poids actuel fiable ; âge et capacité à avaler.
- Rechercher tous les médicaments contenant du paracétamol.
- Noter dernière prise et cumul exact des 24 dernières heures.
- Allergie, maladie hépatique, alcool, dénutrition, déshydratation et insuffisance rénale.

Recommandations / IMPORTANT

- Contre-indiqué en insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Avis médical si < 50 kg, maladie hépatique, alcoolisme, dénutrition sévère ou déshydratation importante.
- Si DFG < 10 mL/min : intervalle minimal 8 h.
- Ne pas masquer une douleur atypique ou une fièvre mal tolérée.

Intervention IDE

- Adulte/ado ≥ 50 kg : 1 g per os si besoin, au moins 6 h entre les prises.
- Maximum du protocole : 3 g sur toute période de 24 h.
- Enfant ou < 50 kg : 20 mg/kg/prise, toutes les 6 h si besoin ; max 80 mg/kg/j et 3 g/j.
- Durée maximale : 3 jours pour fièvre, 5 jours pour douleur, puis avis médical.

Surveillance et traçabilité

- Tracer indication, score, température, dose, forme, heure et cumul.
- Réévaluer douleur/fièvre après 1 à 2 h selon la forme.
- Surveiller prises répétées, efficacité et tolérance.
- Informer le médecin si besoin régulier ou effet insuffisant.

Alerte immédiate

- Avis médical : douleur intense/inhabituelle, fièvre persistante, rash ou suspicion de surdosage.
- Appel 15 : trouble de conscience, convulsion, détresse, douleur thoracique ou état grave.
- En cas de surdosage possible : avis toxicologique/urgence sans attendre les symptômes.

Mention de sécurité

Additionner toutes les sources de paracétamol avant chaque prise. Le maximum de 3 g/j ne doit jamais conduire à dépasser 80 mg/kg/j chez un patient de moins de 50 kg. Administration ou acte tracé dans le dossier de soins.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :